






Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4899/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4899/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4899/A




Early European Books. Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4899/A


4899/A

L XLVI

16/p

PEREDA (Peters. Pindus)





52601
PETRI PAVLI

PEREDAE SETA-
BENSIS, DOCTORIS

MEDICI, ET APVD

*Valentinos publici Medicinæ
professoris.*


IN MICHAELIS IOANNIS

Paschalij methodum curandi Scholia,
exercentibus medicinam
maximè vtilia.

*Ad Illustrissimum & Reuerendissimum dominum Gasparem
à Chiroga, Archiepiscopum Toletanum, Hispaniarum
primate, & sacrosanctæ fidei Catholicæ
primum cognitorem.*



L V G D V N I,
EX OFFICINA IVNTARVM
ET
PAVLI GVITTII.
M. D. LXXXVII.





ILLVSTRISSIMO

ET REVERENDISSIMO DO-

MINO GASPARI A CHIROGA,

Archiepiscopo Toletano, Hispaniarum primati,

& fidei Catholicae primo cognitori,

Petrus Pereda medicus,

felicitatem.



OGITANTI mihi, Præsul amplissime, cui studiorum meorum primitias consecrarem, occurrebant multi, quibus me multum debere cognoscebam: quibusque honestè me, labores meos, totamque familiam committere possem. Deerat autem aliis magnarum rerum cognitio, quam mihi ad hanc rem apprimè necessariam videbam, aliis auctoritas, quæ meas lucubrationes ab omni reprehensione contineret: aliis denique prudentia, quæ diuturno rerum usu & experientia comparata, non parum utilitatis meo operi videbatur allatura. Quibus quidem omnibus, vitæ integritas, facilitas morum, generis splendor maximus, & summa in-

erant ornamenta virtutis. Tu tamen vnus ex omnibus præcipuè occurrifti, in quem vifa est natura, ex aliis hauftas virtutum dotes transfudiffe: & qui præter generis nobilitatem, auguftam quidem illam, & plane regiam, multiplici rerum ſcientia, auctoritate, & prudentia reliquos anteires. Quid enim memorem tuam in ferendis laboribus conſtantiam? in regendis clientum animis ſolertiam? in gubernandis populis ſagacitatem? Quid referam beneficia, quibus me tibi deuinctum ſentio, cum fratrem meum in fidem tuam recepiſti, & receptum maximis honoribus affeciſti? Tacebo ne humanitatem, qua vnus maximè excellis? Dum enim quantos in litteris feceris progreſſus contemplor, te earundem ornamentum intueor: dum multarum diſciplinarum perfectam cognitionem mihi ob oculos pono, quem tibi anteponam nescio. Denique vbi in omni virtutis genere præſtantiam ſuſpicio, tam exiguum tempus ad iſta referenda doleo. Quæ ita eſſe, vel me tacente dignitatis gradus, in quem tanto optimorum hominum applauſu euectus es, neceſſariò comprobatur. Illi enim ſoli ad iſtam dignitatem, & honoris locum efferuntur, quibus maxima eſt cum virtute coniuncta ſapientia, cum ſapientia
huma

humanitas, & cum humanitate summa
christianæ religionis obseruatio. Hæc Phi-
lippum Hispaniarum regem æquissimum,
vbi Archiepiscopus renuntiatus es, non la-
tuerunt. Hæc Toletanæ ciuitatis non igno-
rauit auctoritas. Hæc nullum genus homi-
num, etsi immane & barbarum effugerunt.
Omnes enim tuam probitatem, humanita-
tem in pauperes, facilitatem in amicos, & in
cæteros integritatis splendorem agnoscunt.
Atque, vt hæc omittā, ne videar meridiano
soli accensam facem attulisse, & rem per se
nobilē sermonis humilitate obscurasse. scias
velim, me, Valētinæ vrbis medicum tui per-
petuò obseruantissimum, vt medicinæ can-
didatis meo quocunque labore gratum fa-
cerem, Methodum quandam medendi à
Paschaliō huius vrbis quondam medico in-
signi conscriptam, emendatiorem excude-
re, & scholiis illustriorem efficere voluisse.
Qua in re quos sim æmulos habiturus, non
ignoras. videor enim multos iam mihi blat-
terantes, & turpia effutientes audire, meque
acriter accusantes, quod hæc scholia eo so-
lum nomine ediderim, vt huic graui medi-
co, & aliis practicis facerem iniuriam, non,
vt studiosam iuuetutem, immenso quodam
schedarum onere, citra rationem oppres-


sam, & multoties prauè edoctam meis vigi-
liis subleuarem. Aliquos præterea deieran-
tes, ostentationis graua, non communis uti-
litatis ratione hunc laborem suscepisse. Scio
& fore alios, qui suo modo studeant ali-
quam mihi infamiz notam inferre. Quos
omnes te patrono quantum asperner, ani-
mus ipse, quem tua nobilitas ad hæc scri-
benda fecit, testatur. Spero enim me tua hu-
manitate, fide, & nomine tanquam Militia-
dis clypeo testum, intrepidè omnes aduer-
sarium ictus clusuram neque futurum ef-
se quemquam, qui, si te mihi, operique meo
defensorem audierit, non penitus obmu-
tescat, & eos, quos in me antea dentes acue-
rat, non facile obtundat. Hos igitur, Præsul
Amplissime, primos labores meos, rudes sa-
nè & impolitos, meæ tamen in te obseruan-
tiæ, & voluntatis sempiternæ monumenta
accipies, eosque pro tua sapientia ita foue,
ut, qui me tui semper studiosissimum audie-
runt, iidem intelligant quo tibi magis de-
berem, denuò te maiora apud me beneficia
collocasse. Experientur enim ij lætis scho-
liis fortasse, communi utilitati à me fuisse
inseruitum, & ob eam rem facilius, quod à
te postulo, perpetrasse. Quod ut facias, te ve-
hementer etiam atque etiam rogo, efficies
enim

enim vt qui in puluere & tenebris diutissi-
me vixi, excusso nunc puluere, & fugatis te-
nebris, per te in loca clariora euadā, omnē-
que laborem contemnam, si hunc tibi gra-
tum cognouerim. Vale litterarum decus, &
ornamentum, & totius Hispaniæ sidus ful-
gentissimum, tuūque Peredam nominis
tui, & gloriæ propugnatorem acerrimum, vñ
fratrem quem apud te habes, & quem tibi
esse charissimum cognosco, ama. Id si fece-
ris, & me tibi iam maximè deuinctum sum-
mo beneficio in perpetuum obligabis,

& ad maiora aggredienda nunc
quasi dormientem
excitabis.

*

4



AMICI AD VINCENTIVM

G I S B E R T I V M.

C A R M E N.

Quæris quid Gisberte noui sit: nil ego præter
Hoc vniam scio (namque alijs, quæ plurima vulgus
Nunc hominum narrat, non est cur immorer, ad te
Cum scribam magni Hippocratis, doctique Galeni.
Scripta volutantem, vel quæ sunt seria cumque
Arctantem breuibus chartis, atque ordine pulchro.)
Alta igitur cum concepisset mente Pereda,
Est Asclepiadum qui vnus, fœtum, & pariturus
Iam esset, eum excipere ipsa sinu malè sana refugit.
Tellus, pallenti inuidia stimulata medentum:
Sic, qua concepit fœtum, non edidit vrbe
Egregij mens culta viri: partus tamen ipse
Aureus hanc urbem inuisit, quæ flore medentum
Collado tumet, vni cupit ille probari,
Quem stupet hæc, & deinde omnis mirabitur ætas:
Tèque adit in lucem nunc æditus, atque salutat
Nomine non solum nostro, doctique parentis,
Verum et iam Bonifantis amici, quem auguror olim
Artis Thæbeæ sidus fulgere e coruscum.
Tu hunc partum Gisberte fove, defende, meretur.

M I C H A E

MICHAELIS IOANNIS
PASCHALII AD
inuidum.

C A R M E N.

Iam nouus exorior: iam depositaq; senecta
Humo tollentem splendida colla vides:
Me tamen exuta nitidum prodire senecta
Palles? tu palles ergo nitore meo?
Aeterno ô utinam tu iam squallore tegare:
Exuias liceat nec posuisse tibi.
At contra aeterno niteat splendore Pereda,
Cuius, sic maculas tersit, amica manus.

* 5

PAVLI ASTORIS DERTVSEN-
SIS PHILOSOPHIÆ CANDIDATI
de sui magistri scholiis.




EPIGRAMMA.

Hippolyti lacera vt vidit, disiectaque passim
Membra Dehs, pulchris qui nittet vsque comis:
Ingemuit, casum iuuenis miseratus acerbum,
Atque salutari contigit illa manu.
Præsentem sensisse Deum quæ tacta, & in auram
Hanc ipsam vitæ mox rediisse ferunt.
Impete barbarico sic, & compage soluta
Artis Phæbe, tuæ, membra Pereda legit:
Hippocratis pandensque sinus, & laxa Galeni
Æquora percurrent, hinc opem, & inde petit.
Nec magis Hippolytus tibi, quam tu Phæbe Pereda
Debes, inuentum qui tibi seruat idem.

PETRVS


✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿
P E T R V S P E R E D A
L E C T O R I S A L V T E M.



MEDICINA, quæ tota est practica, cum habeat finem opus aliquod, nempe sanitatis consecutionem in duas præcipuas partes diuiditur: quarum vna sanitatem præsentem tuetur: & altera, curando morbos, eam restituit. Curatio morborum ab empiricis experientia, à methodicis verò communitatibus quibusdam perficitur. Quorum curatio non recte procedit, quia nec omnes morbi curantur experientia, neque curamus hominem vniuersalem. Proinde Hippocrates, Galenus, & alij docti viri methodo rationali, quæ ex indicationibus constat, morbos curant. Sic multi libros ediderunt, in quibus morborum docent curationem methodo rationali. Inter quos Michael Paschalius enumeratur, vir sua ætate doctus, & expertus: cuius liber per omnium manus circumfertur, & ex ipso multi morborum remedia desumunt. Cæterum cum hic vir doctus scripserit tempore, quo multæ falsæ
barba

barbarorum sententiæ vigeant, & veritates Galeni, quas modò multorum annorum lectione habemus, erāt occultæ. Proinde in eius librum, qui inter alios breviora, & vſitata habet remedia (quod optimū est) ſcholia ſcribere decreui: vt ex iis, quæ ipſe rectè docuit, & quæ addita à nobis ſunt ex rei natura, optima & legitima fieret morborum curatio. Tu lector amicè hæc accipe, neque morosè reprehendas.

ELEN





ELENCHVS BREVIS

EORVM, QVÆ SINGVLIS

CAPITIBVS CONTINENTVR.



Primus numerus caput, Secundus folium indicat: a. primam paginam: b. secundam.

D e pilorum decidentia	cap. i. fol. i. a
De morbo Gallico	2. 11. b
De vlceribus capitis manantibus, & curatione pediculorum capitis, & aliarum partium	3. 17. a
De dolore capitis à quacunque causa contingat ipsum dolore affici	4. 23. a
De phrenitide	5. 24. b
De lethargo	6. 29. b
De vertigine	7. 31. b
De morbo comitali	8. 33. b
De melancholia	9. 38. b
De incubone	10. 42. a
De ijs qui amore insaniunt	11. 43. a
De apoplexia	12. 45. b
De paralyfi, Latinis resolutione	13. 48. a
De conuulsione	14. 50. b
De tremore	15. 54. b
De ophthalmia	16. 55. a
De imbecillo aspectu	17. 58. a
De albugine oculorum	18. 59. b
De	

<i>De suffusione</i>	19. 59.b
<i>De dolore aurium</i>	20. 61.a
<i>De sanguinis è naribus profluvio</i>	21. 62.b
<i>De rubedine faciei</i>	22. 65.b
<i>De dolore dentium, atque etiam de ipsis denigratis & mobilibus</i>	23. 67.a
<i>De angina</i>	24. 68.b
<i>De coriza, catarrho, raucedine, & tussi</i>	25. 71.a
<i>De orthopnœa, asthmate, dyspnœa</i>	26. 74.a
<i>De peripneumonia & pleuritide</i>	27. 76.b
<i>De sanguinis sputo</i>	28. 81.a
<i>De empyemate, id est, suppuratione & tabe</i>	29. 83.a
<i>De palpitatione cordis & syncope</i>	30. 86.a
<i>De imbecillitate ventriculi, & de dolore & inflammatione eiusdem</i>	31. 90.b
<i>De singultu</i>	32. 93.a
<i>De appetentia immodica, quam medici caninam appellare solent</i>	33. 94.a
<i>De cibi fastidio</i>	34. 94.b
<i>De cholera</i>	35. 97.a
<i>De diarrhœa</i>	36. 99.b
<i>De lyenteria</i>	37. 104.a
<i>De dysenteria</i>	38. 106.a
<i>De tenesmo</i>	39. 109.a
<i>De cholico dolore, & ileo</i>	40. 110.a
<i>De inflammatione hepatis</i>	41. 115.b
<i>De obstructione hepatis</i>	42. 117.b
<i>De ictero</i>	43. 119.b
<i>De hydrope</i>	44. 122.a
<i>De lienis obstructione</i>	45. 127.a
<i>De suppressione urinae</i>	46. 128.a
<i>De renum calculo & vesica</i>	47. 131.a
<i>De</i>	

<i>De ardore vrinae</i>	48.	137.b
<i>De mictu sanguinis</i>	49.	140.a
<i>De diabete</i>	50.	140.b
<i>De lumbricis</i>	51.	142.b
<i>De hæmorrhoidibus</i>	52.	145.b
<i>De procidentia ani</i>	53.	149.b
<i>De procidentia vteri</i>	54.	150.b
<i>De immodicis mensibus</i>	55.	151.b
<i>De suppressis mensibus</i>	56.	155.a
<i>De vteri suffocatione</i>	57.	158.b
<i>De mola vteri</i>	58.	160.b
<i>De partu laborioso, & secundis detentis</i>	59.	161.b
<i>De ramice</i>	60.	164.a
<i>De arthritide</i>	61.	167.a

INDEX CAPITVM

Secundi libri.

D E synocho	cap. 1.	172.b
<i>De febre ardenti</i>	2.	180.a
<i>De tertiana exquisita</i>	3.	183.b
<i>De tertiana notha</i>	4.	187.a
<i>De quotidiana</i>	5.	188.a
<i>De quartana</i>	6.	189.a
<i>De febribus compositis</i>	7.	192.a
<i>De heſtica</i>	8.	192.b
<i>De febre peſtilenti</i>	9.	198.a
<i>De exanthematibus, quæ à noſtris medicis variolæ & morbilli dicuntur</i>	10.	205.b

FINIS.

Nos Ioannes Dymas Loris
Dei & Apostolicæ sedis gratia Bar-
cinonensis Episcopus Viso exami-
ne ac approbatione infrascripto-
rum doctorum fratris Ioannis Pe-
drolo ordinis Carmelitarū, & Lau-
rentij à sanct Ioan societatis Iesu, &
fratris Francisci Ferdinandi ordinis
Sancti Francisci, concedimus li-
centiam imprimendi prædictum li-
brum in nostra diœcesi, die vigesi-
ma quinta Maij. 1579.

Ioannes Ep̃s Barcinonensis.



PETRI PAVLI PEREDÆ

S E T A B E N S I,

doctoris Medici: & apud Valentinus publi-
ci medicinæ professoris, in Michaëlis
Ioannis Paschalij methodum cu-
randi, scholia: studiosis me-
dicinæ maximè uti-
lia.

*De pilorum decidentia, in quo multa continentur ty-
ronibus necessaria ad curationem omnium
morborum. C A P. I.*



Decidentia pilorum (quam caluitiem *Descriptio*
appellamus) affectio capitis est, qua
vniuersi eius capilli deficiunt. Proue- *Causa*
nit ea aut ob cutis raritatem, aut ob
humoris defectum, ex quo ipsi gene-
ratur, atq; nutriuntur. Porro si a cu-
tis laxitate id cōtingat, prompte & à
calore, & a frigore caput læditur:
quod raritatis proprium signum est.

Sin ex alimenti defectu, primum extenuantur, deinde cōci-
dunt vniuersi. Quam rem in iis, qui tabe laborant, quotidie *Signa*
cernimus euenire, maximum inde argumētum desumentes;
decidentium pilorum ob alimenti defectum tabis indicium
esse. Huiusmodi affectio morbi Gallici symptoma plerun-
que est, vbi non tam ex prædictis sit causis, quam ex humo-
rum corruptela: à qua & Alopeciam, & Ophiasim fieri Gal-
existimat. Quo in casu cutis colorem spectare oportet. Nam
si pro naturæ modo albidio sit, pituitæ soboles erit morbus:
sin pallidior, bilis flauæ: sin nigrior, atræ bilis: sin rubicundior,
sanguinis. Sed anteaquam vitam etiam cōsiderabimus prius,

D E C V R A N D. M O R B.

Curatio. tamen scientes, quæ qualem humorem soleant adaugere. *Pi-*
Primò lorum decidentia (nam de veto caluitio hic non agimus) *cu-*
Victus ra- ratur, primùm, si a sanguine fiat, victu refrigerante & exsic-
cio. cante, & sanguinem minuente: si a flaua bile, victu refrige-
 rante & humectante, vt sunt aer frigidus arte paratus, nem-
 pe floribus, herbis, & liquoribus, si naturalis nõ reperiatur:
 cibus sit ptisana hordeacea, lactuca, cucurbita, portulaca,
 & ius pulli refrigeratum, illis vel similibus. Nocent huic ca-
 lida, vt piper, cinnamomum, eruca, cape, & similia. Si fiat a
 pituita, curatur primùm victu calfaciente, & siccante. Qua-
 re exercitatio, & motus præsertim ventriculo vacuo maxi-
 me huic prodest, quemadmodum & vsus rerum calidarum,
 vt sunt piper, crocus, cinnamomum, fœniculus, & similia: fri-
 gida, quæ pituitam augent, nocent: vt pisces, herbæ frigidae,
 & legumina omnia præter cicera. Si ab atra bile fiat, primùm
 curatur victu calfaciente, & humectante, & quiete, & aere
 simili veris, & iure gallinæ, & arietis, cū borragine, vel bu-
 glossa. Quæ atram bilem augent, huic incommoda sunt, vt
 caro bubula, hircina, leporina, & ceruina, caseus antiquus,
 & omnia salsa. In omni tamen pilorum decidentia, quæ hu-
 mores corrumpunt, diligentissime vitanda sunt, vt inordi-
 nata ratio sumendi cibos, veluti si cibus difficilioris conco-
 ctionis præcedat alterum facilioris. Fugienda etiam est ci-
 borum multitudo in eadem mensa, tum cibatio post crudi-
 tatem, necnon exercitatio immodica statim ab esu: lac deni-
 que, & butyrum, si aliis alimentis, præsertim piscibus immi-
 xta comendantur, vitari debent: quoniam maxime humores
 corrumpunt, elephantiasimque efficere solent.

Secundò Deinde curetur decidentia pilorum sanguinea per sectio-
Sectio ve- nem basilicæ dextræ, educaturq; sanguinis quãtitas respon-
na. dens plenitudini: habeaturque ratio præcipua roboris facul-
 tatis, secundò magnitudinis morbi, vt Gal. lib. de rat. curãdi
 per sanguinis missionem docuit: quanquam Hippocrat. 4. de
 rat. vict. in morbis acutis, præter illa duo, ætatem floridam
 addit, & Galenus in commentario quartum considerandum
 esse iudicat, videlicet aeris dispositionem. Hæc tamẽ omnia
 sub duobus primis comprehenditur.

Tertiò Tertiò, post sanguinis missionem euacuetur bilis flaua se-
Purgatio. quenti potione, qua etiam sanguinis feruor, & caliditas im-
 modica remittitur: ℞. medullæ cassiæ fistulæ recens per se-
 tam extractæ, & medullæ tamarindorũ in aqua mentæ prius
 infusorũ, si fuerit ventriculi imbecillitas, an. ʒ. ß. rhabarba-
 ri electi infusi per noctem in aqua endiuia ʒ. j. electuarij de
 suc

succo rosarum. 3. ij. s. decoctionis florum cordialium. q. s. misce, & fiat potio sumenda in aurora.

An vero sumpto medicamento purgante ante opus ince- *De somno*
ptum sit semper dormiendū, discrimen est inter autores: eo- *in portione;*
rum tamen verior pars vult parum esse dormiendū sumpto
medicamento purgante benigno & liquido: diutius tamen
post medicamentum potens & liquidum multò: diutius post
medicamentum medium inter liquidum & solidum, quod à
nostris medicis dicitur bolus. Maxime vero dormiendum e-
rit sumpto medicamento siue benigno, siue potenti, in for-
mam pilularem, quia primum minori calore eget, dum re-
ducitur de potentia ad actum: vltimum verò maiori.

Opere autem incepto semper somnus nocet, nisi sit immo-
deratum opus, egēs restrictione. Post opus sufficiens per ho-
ram ante prandium ad lauandum ventriculum, & intestina,
bibat 3. iij. iuris sine sale, vt noster Valentinus mos est, vel 3. *Valentini;*
iij. decocti hordei cum cortice addēdo 3. j. sacchari: quo de-
cocto Itali vtuntur. In prandio parce comedat, & a prandio *Itali.*
dormiat. Die verò sequenti mundificentur intestina sequen-
ti, vel simili clystere. ℞. decocti foliorum maluarum, viola-
rum, siclæ, surfuris & hordei. 3. xv. olei rosati. 3. iij. sacchari
rubei. 3. ij. salis. 3. j. misce, & fiat clyster: & si opus fuerit, ad-
de diacatholiconis 3. j.

Si fuerit pilorum decidentia à flaua bile, euacuanda est *De conco-*
medicamentis cholagogis, prius tamen facta illius leni conco- *ctione bi-*
coctione. Nolo in præsentia demonstrare, quid sit conco- *lis.*
ctio, neq; quomodo medicorum coctio fieri soleat in duplici
transmutatione, naturali videlicet (quæ circa alimenta ver-
satur, nihil aliud est, quam alteratio nutrimenti ad propriam
qualitatem nutriti) & altera, quæ in putrida substantia ver-
satur, & est alteratio cessare faciens putredinē manente sub-
stantia, autore Galeno vltima parte artis paræ. Nolo etiam
hic ostendere, an omnis humor præter sanguinem corru-
ptus, vel putridus, vel ad nutrimentū ineptus egeat secunda
concoctione: neque libet mihi explicare, an tenuis humor,
qualis est flaua bilis indigeat ea, vt reuera indiget: quæ an
fieri debeat per reductionem ad mediam substantiam in-
crassatione (vt crassus humor concoquitur attenuatione)
non est præsentis instituti. Quidam ex recentioribus volunt
tenuem humorem calidis & attenuantibus medicamentis
concoqui, quibus dedit ansam errandi comment. 24. lib. 1. A-
phor. quo loco Gal. docet concoctionem in morbis acutis (si
necessaria sit) faciendam esse melierato decocti organi,

D E C V R A N D. M O R B.

mentastri, pulegij & similium. Alij volūt tenuem humorem per se nulla cōcoctione egere, contra quos est auctoritas Hippocr. Gal. & aliorum autorum, ratio, & experientia crisis factæ. 7. vel 14. die morborum, qui fiunt a flatu bile: quæ in eorum initio bona esse nō potest propter priuationem concoctionis. Concoctio enim, autore Gal. lib. 1. de crisis, celeritatem, & certitudinē iudicij ostendit. Villanouanus contra Manardū, & contra alios docet nullū humorem corruptum, putridum, & ineptum nutritioni, cōcoqui posse. Hæc omnia in expos. 22. aph. lib. 1. tractanda sunt: nobis tamen hoc loco sufficit, humores neq; a natura, neque ab arte recte euacuari posse nō præcedente concoctione: quæ licet a calore natiuo præcipue fiat, alia tamen multa coadiuant, vt sunt syrapi, decocta, succi, & aquæ, quæ vias aperiendo in obstructione (quæ in omni febre dependente ex putredine humorum inuenitur) vel reducēdo substantiam rei cōcoquendæ ad mediocritatē, vel illius acrimoniam & intemperiem corrumpēdo præparant. Quilibet igitur humor ante vacuationem concoctione eget, crassus tamen difficilius cōcoquitur. Sed vt sit tyronibus omnibus notus catalogus medicamentorum omnium humores concoquentium, quæ sequuntur adiecimus.

*Medicamenta humorem biliosum concoquentia sunt,
quæ sequuntur.*

Primò omnia medicamēta frigida, à primo ordine vsque ad tertium, siue sint in forma decocti, vel succi, vel aquæ: quibus vsi sunt Arabes, & alij multi. Neque quorundam iuniorum ratio de vi perniciosa plumbi, & æris, quibus destillantur aquæ vi ignis, obstat. Cum etiam omnia medicamenta composita fiant illis valis: dum tamen decocta & succi inueniri possint, eis est vtēdum, propter maiorem facultatem. Aquæ omnes fermē præter rosaceam, violaceam & vitis, carent proprio odore, & sapore. Vbi tamen aquis vtendum est propter defectum simplicium, vel ægrotantium gustum, augenda est quantitas earum. Sunt etiam medicamenta hæc in forma melicrati (quo Græci utebātur propter sacchari inopiam, vel in forma syruporum, quibus nos vtimur) propter sacchari copiam, & ægrorum delectationem, præcipue in morbis calidis: nam multi fieri solent syrapi cum melle in

In phar- morbis frigidis. Pestilentes tamen pharmacopolæ, si syrapi
macopolas. frigidos melle vel saccharo rubro conficiant, ægros interficiunt: quos pœna capitali puniendos censeo.

Flauā bi- Simplicia flauam bilem concoquentia (quæ officinarum
tem conco- more scribuntur, ne à pharmacopolis vnum pro alio infirmis
quentia. trib

tribuat) sunt hæc: Endiuiæ, Cichorea, Lactuca, Portulaca, Cucurbita, Vermicularis, Semperuiua, Virga pistoris, Solatrum, Umbilicus Veneris, Nenuphar, & alia similia. Composita, sunt syrupus acetosus. S. syrup. endiuiæ. S. syr. de iuibis, oxyfacchare. S. syr. endiuiæ comp. syr. violarum. syr. rosarum. syr. de succo acetosæ. syr. de agresta. syr. de pomis. syrup. acetositis citri, syrup. acetositis limonum, syrup. de nenuphare. syrup. de papauere: iulep rosarum & violarum.

Simplicia, quæ pituitam concoquere valent calfaciendo, *Pituitam* attenuando, incidendo, & aperiendo meatus, sunt fœniculum, petroselinum, hyssopus, scabiosa, betonica, capillus *concoque-* *venia.* neris, pulegium, calamentum, satireja, menta, serpillum, origanum, melissa, pæonia, mel, & similia.

Composita, sunt syrupus acetosus s. rhodomel, syrup. de bizantiis, oxymel. s. syrup. de liquiritia. syrup. capillorum veneris. syrup. acetosus compos. syrup. de hyssopo. oximel compos. syrup. de stichados. syrup. de eupatorio. syrup. de absinthio. syrup. de prassio, & oximel scilliticum.

Simplicia, quæ atram bilem concoquere valent, sunt borrago, buglossa, lupulus, fumus terræ, scolopendria, ceterac, *Atram bi-* *lem conco-* *quencia.* mariscus, rubea tinctorum, & similia. Composita, sunt syrup. borraginis, syrup. buglossæ, syrup. de pomis, syrup. de fumo terræ, s. & comp. quamuis comp. pro parte sit purgans. Syrup. regis Sabor ex Mesue cap. de melancholia sanguinea. syrup. de epithimo. Cōcoquantur humores calidi & tenues breui tempore: frigidi & crassi longiori: exhibendo semel, vel bis, vel ter in primis humoribus, videlicet tenuibus, qui parua egent cōcoctione. In crassis autē & frigidis, multo tempore. Quare *Error ex-* *hibetium* errant qui in omni morbo perpetuò ter exhibent hæc *syrupos.* camenta, cum quandoq; fieri possit vacuatio ab arte sine cōcoctione ab eadem facta, quando talis à natura perfecta est:

Dosis tamen syruporum vnaquæque est ʒ. j. cum semisse vsque *Dosis syr.* ad duas, & aquarum est trium vnciarum. Carpetani solēt, & *Castella.* optime, tantū dosim vnam syruporum & aquarum præscribere: etsi opus fuerit maiori concoctione, secundam, quandoque tertiam & quartam dosim præscribunt. Nos vero *Valentini.* Valentini tres simul doses describere solemus, quæ morem non laudo, cum sæpe maior sit sufficiens minor concoctione, sæpe maior sit necessaria, vt prædiximus. Galli autem syrupos *Galli.* aquis miscent, addentes sacchari parum, & puluerem aliquem: quam mixtionem lento igne confectam syrupum aromatizatum appellant. Concoquetur bilis flaua Valentino more sic. ℞. syrup. endiuiæ. s. & oxyfaccharæ. s. an. ʒ. iij. misce.

DE CVRAND. MORB.

item ʒ. aquarū cichoreæ, endiuæ & lactucæ an. ʒ. ii). misce. Eodē modo dabitur forma syrporū & aquarum pituitā vel atram bilē concoquentium, quamuis (vt prædiximus) maiori egeant concoctione pituitosi humores, maxima verò atrabiliarij. ¶ His itaque concoctis humoribus fiat eorum vacuatio propriis & necessariis medicamentis, tum simplicibus, tum compositis, quorum catalogum nota.

Purgātia flauam bilem. Simplicia purgātia flauam bilem sunt hæc, rhabarbarum, scammonium, myrobalani citrini, cassia fistula, māna, tamarindi, succus rosarum, aqua casei, & aloë. Composita verò sunt, electuariū de succo rosarū, elect. diaprunis solutiuum, elect. de psyllio, quo non vtuntur Valentini: hiera. s. pilulæ de hiera. s. pilulæ de rhabarbaro, pilulæ aureæ, pilulæ aggregatiuæ, quamuis bilem mixtam cum pituita euacuent, quemadmodum & elect. diaphenicon, cuius vis non transit hepar.

Pituitam. Simplicia medicamenta pituitam purgantia sunt agaricus, turbit, myrobalani chebuli, emblici, bellirici, coloquintida, euphorbium, esula, hermodactyli: Composita, sunt diaphenicon, electuariū indum vtrunque, benedicta hiera. s. & composita, pilulæ de hiera, elephanginæ, aggregatiuæ, de agarico, cochlæ de hermodactylis maiores, lucis fœtida, stomachicæ, sine quibus esse nolo.

Atram bilem. Simplicia purgantia atram bilē, sunt myrobalani indi, lapis armenus, lapis lazuli, sena, epithimum, polypodium, sunt tamē præter iuniores, qui damnant lapidē armenū, quia nō cognoscitur: & lapidē lazuli, propter eius vehementiam. Si tamen bene præparetur lapis lazuli, & lauetur, est medicamentum cardiacū, cum confectio Alchermes Regum hoc lapide etiā bene lauato cōstet. Cōposita, sunt diasene, cōfectio medicaminis, quod scripsit Hamec, Hierā Rufi, pilulæ inde, pilulæ de fumo terræ, de lapide armeno, de lapide lazuli.

Formula purgantium medicamentorum compositorum, quarum tres purgant bilem flauam, tres pituitam, aliæ verò tres atram bilē dictæ sunt: perpetuo tamē non est exhibenda similis quantitas, cum varianda sit secundum naturā ægri & humoris: certa enim rei quātitas neq; calamo scribi potest, neq; lingua proferri: imo quod difficilius est, idem homo in diuersis ætatibus diuersam habet naturā, vt constat ex Hip. aph. 20. secundi lib. quibus iuuenibus alius, &c. Et propterea optime Hip. libello de purgantibus medicamentis docuit, quæ a medico sunt considerata in purgandis humoribus: quibus etiam egeat interrogationibus: vbi etiam docuit alimenta nō recte adhibita morbum efficere, quanto magis medicam

dicamenta, à quibus potentiùs alteratur nostrum corpus.

Prima formula potionis purgantis flauam bilem.

Potio.

℞. medullæ cassiæ fistulæ recens per setam extractæ 3. vj. rhabarbari electi infusi per noctem in aqua endiuicæ 3. j. squinanti ʒ. iij. elect. de succo rosarum 3. iij. syrup. violarum 3. j. decocti florum cordialium, quod S. misce, & fiat potio.

Secunda formula buccellarum (quas bolos appellant) purgantium flauam bilem.

℞. medullæ cassiæ fistulæ recens per setam extractæ, vel *Boli.* loco eius diaprunis simp. 3. ss. elect. de succo rosarum 3. iij. sacchari quod S. misce, & fiant septem bucellæ, & plures, si opus fuerit.

Tertia formula pilularum purgantium eandem bilem flauam.

℞. massæ pilularum aurearum 3. j. diagridij optimi ʒ. iij. *Pilulæ.* fiant cum aqua endiuicæ pilulæ septem, & aurentur, si diues fuerit. Poterit æger, si non potest deglutire pilulas, neq; portionem bibere, aut detinere, ad euacuandâ bilem flauam accipere ʒ. v. vel vij. diagridij optimi cum 3. j. syrup. violati, vel cum 3. j. conseruæ violarum, vel borraginis, vel rosarum, vel cum iure sine sale. Poterit etiam si abhorret à medicaminibus mali saporis, accipere 3. ij. syrup. rosarum alexandrinarum, vel rhodomellis earundem rosarum.

Prima formula potionis purgantis pituitam.

℞. diacatholiconis 3. ss. elect. indi maioris 3. iij. rhodomel *Potio.* lis 3. j. aquæ fœniculi, quod S. misce, & fiat potus.

Secunda formula buccellarum purgantium pituitam.

℞. diaprunis simp. 3. vj. agarici trochiscati 3. j. elect. indi maioris 3. iij. sacchari, q. s. misce, & fiant septem bucellæ, seu boli.

Boli.

Tertia formula pilularum purgantium eandem pituitam.

℞. pilularum de agarico & de hiera simp. an. 3. ss. diagridij ʒ. iij. cum aqua fœnic. fiant pilulæ vij. & aurentur. *Pilulæ.*

Prima formula potus purgantis atram bilem.

℞. medullæ cassiæ recenter per setam extractæ 3. vj. con- *Potio.* fectionis medicaminis Hamec & diasenæ. an. 3. iij. syrup. borraginis 3. j. decocti florum cordialium, addendo 3. ss. epithymi & folliculorum sene, q. s. misce, & fiat potus, fieri potest cum sero caprino decoctum.

Secunda formula bolorum purgantium atram bilem.

℞. medullæ cassiæ fistulæ recens extractæ per setam 3. ss. *Boli.* pulueris epithymi 3. j. cōfectionis medicaminis hamec. 3. iij. & ss. sacchari, q. s. misce, & fiant boli vij. saccharo cooperti,

Tertia formula pilularum purgantium atram bilem.

DE CVRAND. MORB.

Pilule.

24. pilularum de fumo terræ & indarum, an. 3. s. diagridij
 3. iij. cum sero caprino fiant pilulæ vij. & auctur, si nō fue-
 rit pauper. Similibus formulis vti poteris addendo, vel in-
 nuendo quantitatem medicamentorū purgantium tam sim-
 plicium quam cōpositorum, secundum variam quātitatem,
 & naturam humorum, & ægri: vnum est tamen maxime cō-
 siderandū, ne tempore, quo purgare volumus ægrū miscea-
 mus plura medicamenta siue simplicia, siue composita: nam
 tempore breui multorum medicamentorum mixtura non
 potest vnicam temperaturā, & formam acquirere. Actio illa,
 quam medici barbari fermentationem appellant, sufficienti
 & longo tēpore eget, quamuis interdum maiori, interdum
 minori, secundum variam naturam simplicium, temporis, &
 regionis. Quēadmodū theriaca magna ad sui generationē,
 seu fermentationem sex, vt minimum, eget mensibus, antea
 tamen dum recens, & non fermentata esset, somnum indu-
 cit a 3. s. vsque ad j. 3. postea verō corruptis formis & tempe-
 ramentis omnium simplicium, introducēt q; vnica forma, &
 temperatura, calida est in fine secundi ordinis. Compositum
 enim medicamentū purgans si recens fuerit, non potest fa-
 licem & optatum finem inducere: nam prius vnum medica-
 mentum purgabit altero, quandoque vnum impedit opus
 alterius. Quare errant medici nostri in purgandis ægris va-
 ria medicamenta miscentes, cum sufficiat vñ, aut alterum,
 etiam si humor euacuandus sit mixtus, cum inueniri possit
 medicamentum vnicam temperaturam & formam habens,
 quod purgare valeat mixtum humorem. Quēadmodum
 diaphenicon, & pilulæ aggregatiuæ. Sed quia in vsu medi-
 camentorum purgantium timor est, ne maior copia humo-
 ris educatur quam conueniat, ad quā facultas necessariō sol-
 uitur, cum cuiusq; vacuationi sit annexus casus virtutis, a-
 liquando quoq; ab immodica purgatione fiunt alij affectus
 præter naturam, vt febris: Quare perpetuo vacuatio parca
 tutior est immodica: natura enim sæpe vel euacuat, vel resol-
 uit derelictum a medicamento humorem: immodica tamen
 & laboriosa purgatio fere semper fieri solet a medicamentis
 prauam ac venenosam qualitatem habentibus: benigna e-
 nim & salubria, vt cassia fistularis, rhabarbarum, manna, ta-
 marindi, & myrobalani omni tempore, omni ætate, & etiam
 vterum gerentibus audacter tribui possunt.

*Error quo
 vndam.*

Si scire cupis quæ sint benigna, & quæ valētia, & qua hæc
 egeant præparatione & correctione, Mésues suo i. lib. doctis-
 simè tradit, & post ipsum breui epitome Ioannes Tagautius
 duob

duobus libris de purgantibus medicamentis simplicibus, quorum priori vniuersales canones Mesuæ collegit, posteriori vero simplicia omnia medicis summe necessaria quinquaginta quinque capitibus scripsit, & illorum veram cognitionem etiam cum Græcis demonstrat, & aliis paucioribus componuntur omnia ferme medicamenta purgantia, quorum dos in forma elect. raro excedit ʒ. iij. & in forma pilularum ʒ. j. quamuis si clementibus & benignis tantum componantur, dos augeri possit.

Ad integram tamen & veram huius rei cognitionem (præter ea quæ Mesuæ suo antidotario, & Arnaldus de Villanova, & nunc eruditus Fuchsius suo Nicolai Myrepsij opere medicamentorum scripta reliquerunt) notare numerum sequentium medicamentorum purgantium, præcipue eorum, quibus nostræ officinæ, & nos utimur. Hic tamen quantitatem scammonij, esulæ, colocynthidis, hellebori, & simidum potentium, vnciæ vnius electuarii, & drachmæ vnius pilularum demonstrabo, quod non parum necessarium est medico: alioqui tanquam cæcus in foueam caderet. Animaduertendum tamen est ʒ. g. xxiiij. continere, quamuis multi granis. xx. constare velint, apud primos ʒ. constat xxxiiij. ʒ. vel viij. ʒ. scire etiam oportet in construendis electuariis ʒ. iij. puluerum indigere lb. j. mellis, aut sacchari.

Diaphanicon Mesuæ tota compositio constat lib. vj. scammonij quantitas est viginti duarum drachmarum: errant ergo qui duodecim drachmas tantum miscēt. Huius electuarii quælibet vncia constat viginti duobus granis scammonij: propter dactylos tamē eius vis nō trāsīt hepar. Dos eius est a drachmis quatuor & semis vsq; ad drachmas decē & semis. Error nō-
nullorum.

Electuarij rosarum compositio Mes. constat libris tribus, & vnciis octo, scammonij quantitas est duodecim drachmarum: quælibet vncia huius electuarij habet grana decem & nouem scammonij cum dimidio: cuius dosis sunt drachmæ quinque.

Confectionis medicaminis, quod scripsit Hamec Mes. constat libris quinque cōpositio, scammonij quātitas est drachmarum duodecim: quælibet vncia huius electuarij habet grana tredecim cum dimidio scammonij, dosis eius est a drachmis duabus vsque ad quatuor.

Electuarij indi maioris Mes. compositio constat libris sex: habet hæc compositio præter alia potenter purgātia drachmas duodecim scammonij: & eius quælibet vncia habet grana duodecim scammonij: dosis est drachmarum quatuor.

Elect

D E C V R A N D. M O R B.

Electuarij indi minoris cōpositio constat libris quatuor, habetque drachmas duodecim scammonij: quælibet igitur vncia huius electuarij habet grana decem & octo scammonij, dosis est drachmarum quatuor & semis apud Mesuen, licet videatur maior inesse vis huic, quàm electuario indo maiori.

Electuarij diaprunis solutiui Nic. quælibet libra habet drachmas septem scammonij: quare quælibet eius vncia habebit grana triginta octo scammonij: dosis eius est drachmis duabus vsque ad vnciam semis, quamvis Nic. vnus castaneæ quantitatem tribuat.

Electuarij de succo rosarum Nic. compositio libris duabus cōstat, habetque drachmas duodecim scammonij, quare quælibet eius vncia habet triginta sex grana scammonij, dosis est a drachmis duabus vsque ad quatuor. Nicol. tamen castaneæ quantitatem tribuit.

Benedictæ. s. Nic. compositio est trium librarum cum dimidia, habet hoc medicamentum drachmas quinque scammonij, & drachmas decem esulæ: quælibet eius vncia grana octo cum dimidio scammonij habet, & grana decem & septem esulæ, dosis est ad modum castaneæ Nicolao, aliis à drachmis duabus vsque ad vnciam vnam.

Hiera Logodionis Nico. compositio est librarum duarum & octo vnciarum, eius quælibet vncia habet scammonij minùs quam duo grana, & colocynthidis grana triginta sex. Dos is est Nicolao ad modum castaneæ, aliis tamen a drachmis duabus & semis, vsque ad drachmas quatuor: quæ in clysteribus verò datur, vncia vna & semis.

Electuarij Sebesten Mōtagnanæ compositio est trium librarum & trium vnciarum, & eius quælibet vncia habet grana sex cum dimidio scammonij: dos is est drachmarum quinque vel sex.

Electuarij Elefscoph Mes. compositio est libræ vnus cum dimidia, habetque drachmas sex scammonij, & totidē turbit, eius quælibet vncia habet scammonij & turbit an. viginti quatuor grana. Dos is est a drachmis tribus & semis vsque ad quatuor & semis.

Electuarij de psyllio Mes. compositio constat libris quatuor cum dimidia, & eius quælibet vncia habet scammonij grana viginti sex, & tertiam partem grani: dos is est a drachmis tribus vsque ad drachmas quatuor & semis,

Electuarij de psyllio Montagnanæ cōpositio constat libris octo, habetq; eius quælibet vncia scammonij grana viginti quatuor. Dos is est a drachmis quatuor vsque ad quinque.

Pil

Pilularum aurearum Nic.compositio est trium vnciarum, habet scammonij drachmas quinque, habetque drachma earum scammonij grana quindecim: dosi est a drachma vna vsque ad scrupulos quatuor. Nicolaus dat nouem vel vndecim ad magnitudinem ciceris, huius magnitudinis septem habet quaelibet drachma.

Pilularum aggregatiuarum Mesu. compositio est sex vnciarum, & duarum drachmarum: habet scammonij drachmas sex, & quaelibet drachma habet scammonij grana octo & tres quartas grani vnius. Dosi est a drachma vna vsque ad drachmam vnam & semis.

Pilularum fumarie Auicennae compositio est vnciarum trium, & trium drachmarum, habet drachmas quinque scammonij, & earum quaelibet drachma grana tredecim, & tertiam partem grani vnius: dosi est a scrupulis iij. vsque ad drachmas ij.

Pilularum foetidarum Mesu. compositio est vnciarum septem, & drachmarum duarum, habet scammonij drachmas tres, & esulae drachm. duas, & colocynthidis drachmas quinque: quaelibet drachma earum habet scammonij grana tria & tres quartas grani vnius, & esulae grana duo cum dimidio, & colocynthidis grana sex, & quartam grani vnius purgant potenter. Quare errant qui cum Rhase cap. de resolutione dant drachmas duas & ss. cum earum dosi sit a drachma vna vsque ad scrupulos quatuor.

Pilularum mezereon Mesu. compositio est vnciarum duarum, habetque drachmas quinque mezereon, & quaelibet drachma earum grana viginti duo cum dimidio: quare earum vsus est suspectus, nisi in morbis magnis & praesente virium robore: dosi est a scrupulis duobus vsq; ad drachmam vnam. *Error quorundam.*

Pilularum hermodactylorum maiorum Mesu. compositio est vnciarum octo, habet quaelibet drachma earum colocynthidis grana sex, & tres quartas grani, & euphorbij grana tria cum dimidio, & hermodactylorum grana sex & tres quartas grani: dosi est a drachma vna vsque ad drachmas duas.

Pilularum hermodactylorum minorum Mesu. compositio est vnciarum trium, quae habet scammonij drachmas duas & semis, & earum quaelibet drachma scammonij grana septem cum dimidio, & hermodactylorum grana quindecim. dosi est a drachma vna vsque ad drachmas duas.

Pilularum Arabicarum Nic.compositio est vnciarum vndecim, habet scammonij drachmas octo, & quaelibet drachma scammonij grana sex cum dimidio: dosi est ab vncia vna vsque ad vncias duas.

Pil

DE CVRAND. MORB.

Pilularum cochiarum Rhase compositio est vnciarum trium & drachmæ vnius, & quartæ partis drachmæ vnius, habet scammonij drachmas duas & semis, & colocynthidis drachmas tres & quartam drachmæ vnius, & turbit drachmas quinque, & quælibet drachma habet scammonij grana sex, & ferme bis tertiam partē grani vnius, & colocynthidis ferme octo grana, & turbit grana propē quindecim. Quare *Error quæritur* errant qui cum Rhase cap. de cephalalgia drachmas duas & *simulam.* semis dant, cum earum dosis sufficiens sit drachmæ vnius.

Pilularum indarum Mes. compositio est vnciarū septem, & drachmarū quatuor: habet hellebori drachmas quinque, & colocynthidis drachmas quatuor, & eius quælibet drachma hellebori grana sex, & colocynthidis grana quatuor, & quatuor quintas vnius grani: dosis Mes. est a drachmis duabus vsque ad drachmas tres, quamuis drachma vna nostris temporibus sufficiat, vt multis placet.

Pilularum de lapide lazuli Mes. compositio est vnciarum septem, drachmarum quatuor, habet scammonij & hellebori nigri. an. drachmas duas & semis: & earū quælibet drachma scammonij & hellebori. an. grana tria: dosis est drachmarum duarum cum aqua casci, & succedit fœlix vacuatio.

Pilularum de Agarico Mes. compositio est vnciarū trium habet colocynthidis drachmas duas, & turbit drachmas quinque, & earum quælibet drachma colocynthidis grana sex, & turbit grana quindecim: dosis est Mes. drachmarum duarum, alij verò dant scrupulos quatuor tantum.

Pilularum de elaterio Nico. Compositio est sex vnciarum cuius dimidiū est elaterium: quare quælibet drachma habet grana triginta sex elaterij, & ideo potēter purgāt, & nō sunt in vsu. Dos is est ab scrupulo vno vsque ad drachmam vnam.

Pilularum de opopanace Mes. compositio est vnciarum septem & quatuor drachmarum: habet scammonij drachmas duas, & colocynthidis drachmas quinque, & earum quælibet drachma colocynthidis grana sex, & scammonij grana duo, & quintas duas grani: dos is est a drachma vna vsque ad drachmam vnam & semis.

Pilularum de Euphorbio Mes. compositio est duarum vnciarū: habet hellebori & colocynthidis an. drachmas duas, & quælibet earum dragma hellebori & colocynthidis. an. grana octo: dos is est a drachma semis vsque ad vnam.

Pilularum sine quibus esse nolo Nico. cōpositio est vnciarum quatuor: habet scāmonij ferme drachmas tres & semis: & earū quælibet drachma scāmonij grana octo: dos is est Ni-
colao

colio decem, vel tredecim pilulæ ciceribus similes, & est pō-
dus drachmæ vnus, & semis, alius verò est a drachma vna
vsque ad drachmas duas.

Ex his & similibus quæ a doctoribus scribuntur, scire po-
test medicus dosim medicamentorum compositorum pur-
gantium, quamuis simplicium dosim prius oportet cogno-
scere, etiam si talium in compositis propter correctionem,
& alia maior quantitas dari potest: scammonium enim so-
lum & non correctum malo cotoneo raro datur: si quantitas
excedat grana septem, in electuario de succo rosarum, vel
diaprunis solutiuo, passim dantur graua decem & octo, vel
plura, cum dosis eius sit vnciæ semis.

Vnum tamen est maximè considerandum à nobis, ne vta-
mur medicamentis potenter, & violenter purgantibus, vt
sunt scammoniū, colocynthis, helleborus, & similia, nisi ra-
ro, & in magnis morbis, & cum sunt bene correctæ, præser-
tim in febribus, & morbis calidis. Nostri enim temporibus
(quæ in hoc fœliciora sunt) vti possumus semper etiā in vte-
rum gerētibus, & pueris, clementioribus, quæ benedicta di-
cuntur, vt sunt, manna Arabū, cassia fistula, rhabarbarū, my- *Benedicta*
robalani & tamarindi: tēpore tamen Græcorū pruna dama- *medicamē*
scena erāt cognita clemētissima in purgādo, & aloe quoque. *ta.*

Facta iam totius euacuatione siue per sanguinis missionē *Redio ad*
cum oportet, siue per medicamenta purgantia: necesse est e- *curationē.*
uacuare a parte affecta per partes proximas, scilicet per na- *Derinatio.*
res vel palatū, præcipue cum est materia pituitosa: de his ta-
men cap. de apoplexia fiet sermo copiosior. Laborās hoc mor-
bo sæpe post totius euacuationē mādāt sequentē apophleg-
matismū (quod nostri barbari medici masticatorium appel-
lant) præcipue ventriculo vacuo. ℥. pulueris mastichis, si- *Apophleg*
napis, piperis, pyrethri, zinziberis, origani, thymi, pulegij. *matismus*
an. 3. ℥. cum syrupo de stichade fiāt pilulæ ad ciceris magni-
tudinē. Naribus quoq; sæpe tūc admoueat sequēs liquor:
ore tamē pleno aqua: ne descēdat ad vētriculū prædictus li-
quor. Cuius hæc est descriptio. ℥. succorū cyclamini, siclæ,
ceparum, & maioranæ an. 3. ℥. pulueris piperis & castorei an. *Errhinum*
3. j. misce. His iam factis, raso capite & cōfrecto panno lineo
præcipue in causā frigida, vbi maiori opus est frictione, ad-
mouenda sunt parti affectæ olea, vnguenta, & alia medica-
menta, de quibus Gal. primo de cōpositione secūdum locos,
& Aetius 6. sermone c. 55. & Paulus 3. lib. Nos tamē duo tan- *Vnguentū*
tūm vnguenta describemus experta, & optima prius alope- *causæ ca-*
ciæ, quæ fit à causā calida: posterius ei, quæ fit à frigida. ℥. *lidæ.*
pul

DE CVRAND. MORB.

Causæ frigida. pulueris corticum auellandarum, amygdalarum, castanearum & nucum tostorum an. 3. j. pulueris stercoris caprarum. 3. ij. olei laurini, & rutæ an. 3. ij. olei rosarum. 3. j. aceti coclearium. j. ceræ quod s. misce, & fiat vnguentum, quo vtere in defluuio hoc pilorum, quod fit a raritate cutis & penuria materiæ pilos generantis: cui etiam confert mixtura ex oleis lentisci, myrtillorum, & omphacino cum laudano. Alterum vnguentum conferens causæ frigida est sequens, 2℥. pulueris vtriusque hellebori, staphisagriae, sinapis, piperis, stercoris columbi, radicum cannarum, & foliorum ficuum an. 3. j. oleorum euphorbij, castorei & rutæ an. 3. ij. ceræ quod s. misce, & fiat vnguentum, quo sæpe vngatur pars depilata præcedente forti frictione, & incisione aliquarum partium, quæ non est facienda, cum est causa calida.

Postquam de pilorum decidèria egimus, non erit extra præsens institutum in præsentia agere de iis quæ pilos augent, & quæ ipsos aureos efficiunt, & tandem de iis quæ nigros reddunt.

Augmentia pilos. Frequens & assidua frictio, & capitis lotio decocto adianti auget pilos, dicitur tricomenes, quia facit luxuriare capillos, & subnasci, vel polytricum, quia creat capillorum multitudinem: & dicitur etiam callitrichon, quod crines denset, crispet, pulchriorisque reddat, ab aliis ebenetrichon appellatur, præcipue genus nigrum, vox enim ebeni capillum significat nigrum: est officinis capillus veneris. Pectinatio etiam assidua idem efficit: & quæ causas pilorum augent præsertim effectricem, vt vinum, & alimenta omnia calida, & vaporosa.

Idem facit lotio frequens decocti agrimoniae, corticis ulmi, verbenæ, corticis salicis, absinthij, abrotani, seminis lini combusti, & cineris radice arundinum, adde in fine parum lactis caprini. Lotio aquæ vitæ addendo parum aquæ rosarum, vel myrthillorum idem solet efficere.

Aureos reddentia. Aureos efficiunt capillos multa, quorum nostræ fœminæ satis plenam & certam tenent cognitionem: inter ea tamen, quæ maximam habent vim, est aqua (qua aurum ab argento separatur, & dicitur ab illis fortis) caute tamen est admo- uenda, nam si tangat cutim & carnem, corrodet.

Aqua mellis per distillationem facta vitreo instrumento aureos reddit pilos, & sine cutis & carnis nocumento, quamuis ipsos scindat. Decoctum seu lixiuium ex cinere genistæ seu genestæ, (quam spartum seu spartion appellant, & Arabes albahin seu albrachim) capillos aureos sine dubio efficit,

Nigros efficiencia. hoc quotidie nostræ Valentinae experiuntur.

Nigros capillos multa faciunt, vt Dioscorides, Gal. Paul. & Actius

Aetius volūt, de quibus omnib. in praesentia agere esset praeter nostrum institutum: aliqua tamen experta primò simplicia, deinde composita scribemus: semen myrti, semen papaueris nigri, cortex nucis, cortex mori celsi, sumac, alcanā, & lac sicuum, folia cupressi, fumus picis liquidā, fumarīa.

Compositum hoc pilos satis nigros efficit, quorū nigror viginti diebus conseruatur, accipe calcis viuæ integræ (quæ dicitur gleba) libra j. s. infundatur in aqua per diem facta noua infusione quinquies, eiectionis prioribus aquis, postea reiecta aqua adde illi calci lotæ lithargirij puluerizati 3. j. s. horis sex, & tali mixtura vnge pilos nocte ponendo desuper folium brasicæ, vel pannum lini: postea præcedenti eorum leui frictione, seu agitatione lauentur sapone & lixiuio cōmuni clementi: est expertum. Hoc quoque medicamentum ipsos nigros reddit. Accipe lixiuij potentis, quo saponarij vtuntur lib. j. pulueris lithargyrij. 3. j. bulliant simul, donec pili candidi illo liquore nigrescant, facto sæpe & sensim experimento, deinde conseruetur liquor, quo actu calido, cum opus fuerit, poteris nigros facere capillos, interponendo pectinem inter cutim & capillos, quos, cum denigrati fuerint, exsiccari, & aqua callida ablui oportet.

Scholium.

Ecidentia pilorum, quàm caluitiem.) Pili verae partes non sunt, quia vita carent, & vero nutrimento. Cum tamen habeant propriam circumscriptionem in corpore, & partes cor & per se consistere possint: inter partes numerantur à Gal. 2. de temporis dicā. peramentis, vbi inter veras nostri corporis partes, eorum temperamentum inquit: & 14. methodi, vbi pilorum defectum morbum in numero partium deficiente appellat. His pilis (qui in corpore generationem habent necessariam, ex excrementorum euacuatione) abutitur natura ad ornatum & tegumentum: vt in illis, qui in capite, & mento implantantur, videre est. Qui verò in superciliis habentur, humores a capite per frontem defluentes, ne oculos ingrediantur, prohibet: sicut pili palpebrarum exigua corpuscula. Cum ergo decorem inter alia pili in nobis concilient, meritò eorum curam suscipimus, corrigentes affectus, qui in eis præter naturam euenire solent. In pilis consideramus substantiam (hoc est ipsos pilos) in destituitio pilorum, caluitie, Alopecia, & Ophiasis: colorem verò in vitiligine. Destituitio pilorum si largè sumatur, omnia vitia, in quibus pili deficiunt, comprehendit: Quid sit propriè tamen (de quo nunc agimus) tantum significat omnium pilorum defectū. Hic morbus est in numero deficiente, nō quia deficiat vera pars, sed quia deficit pars ad ornatū corporis necessaria: ac proinde, & quorū

DE CVRAND. MORB.

modis su- cum deficit, est restituenda, ac si esset una ex partibus, quæ verè sunt.
natur. Habet morbus hic duas causas. Raritatem cutis unam, & alteram
Causæ de- defectum nutrimenti. Raritatem cutis cognoscemus. 1. Quia pili, qui
flumii pi- exciderunt, eandem quam antea habebant, crassitiem servant, non e-
lorum. nim sunt extenuati, cum alimentum eis non defecerit. 2. ex causa al-

qua, quæ præcessit, rarefaciente cutem: vid. scilicet calido, aut lotione
aliqua calefaciente. Si nutrimenti defectus causa est, cum coliges. 1.
ex tenuitate pilorum, excrementum enim, quod cuti adhaerit, est paucum
& exigue apponitur. 2. ex morbo præcedente: solet enim in plurimum
hoc defluuium febrem ardentem, aut Tabem sequi, de eo enim Gal. 1.
de comp. med. secundum locos cap. 2. sic scribit: consuevit hæc circa pi-
los oblesio, saepe iis qui agrotarunt accidere, raro autem citra morbum.

Quid cal- Caluities defluuium pilorum est, sicut in Sinapite tantum ob cutis
uities, & duritiem, & siccitatem eveniens: proinde qui in præterita hanc cutem ha-
eius causa, beat multum siccam, in senectute calui sunt: unde non recte Arist. cal-
uitiem dixit fieri ob inopiam humoris calidi: neque Hier. ob raritatem
cutis, neque Argenterius ob defectum terre excrementi: reuer. enim
in caluis excrementum non deficit, non potest tamen penetrare ob cutis
densitatem, ac proinde Gal. aliquando caluitiem ad defectum humorum
refert, non quod deficiant, ut diximus: sed quia non possunt penetrare,

Duplex & sic videtur deficere. Atque hæc est caluities ætatis discurfa facta:
Caluities. est enim altera vi morbi in iuuentute etiam eueniens, potissimum mu-
lieribus ex raritate cutis & defectu alimenti. Hanc autem à prima di-
stingues, quia caluities ratione ætatis adueniens, sensim fit, quia sensim
cutis densaturat illa, quæ vi morbi accidit, affatim & repente sauit.

Quid sit Alopecia & Ophiasis sunt casus pilorum capitis, non omnium, sed
alopecia aliquorum, unum in duobus est malum: distinguitur tamè ob figuram,
& ophi- & squammas: nam in ophiassi læsa capitis pars serpenti assimilatur,
sis. squammosaque est. Quæ ab occipite duorum digitorum latitudine non

Causa alo excedens, usque ad aures serpit. At alopecia (quæ à vulpe nomen acce-
pecie & pit) nullam propriam habet figuram: & in ea cutis squammis caret.
ophiasis. utraque affectio fit à vitiosis humoribus per vitiosos humores seu cor-
ruptos non intelliges cum Ronoletio tennes & serosos, sed sanguinem
prauum, biliosum, pit. aut melancholicum: ex eo enim (cum minus rectè

Vitiligo mutetur, & nutriti) non assurgunt excrementa, quæ sunt materia pi-
quid. lorum: possumus etiam per vitiosos humores, aduictos, aut praua qua-
Curatio litate infectos intelligere. Vitiligo est cutis deprauatus color.

defluuii pi Curabis supradictos affectus hoc modo, à defluuiio pilorum incipies.
lorum. hoc. n. cum sit morbus in numero partium deficiente, curabitur restituendo
partem quæ deficit: quæ cum ex excremento tertie concoctionis tanquam
ex materia generetur, oportet alimētum auertere parti, ut ea nutrita,
excrementis abundet. Opus præterea erit cutem roborare, & reducere ad
moderatam densitatem. Hæc commodè præstabimus medicamentis calefa-

ciens

lenibus (sic enim legendum est, & non humectantibus, ut legitur 2. de Corrigitur comp. secundum locos cap. 2.) modice adstringentia permiscetas, calida locus Ga- enim attrahent sanguinem, et sic sua substantia caliditatem cutis (si ali- qui est) temperabit, cum temperatum, aut minus calidum, id quod ma- gis calidum est refrigeret. Iam ergo astate raso capite, & hieme confis- sapillis, frictione utemur leui, ut ex attractio sanguine calida intemperie curata, roboretur cutis, & ad mediocrem densitatem restituatur. Deinde oleis lentissimis, mirrhino, aut nostro hispano, cum ladano ad vnguenti for- mam redactus vngemus caput. Præterea in hoc defluuium pilorum, non est Sanguinis sanguis mittendus ratione affectus: quia neque raritas cutis, neque de- missioni fecius alimenti euacuationem postulant: neque est purgandum, quia non defluuium contingit ex cacochymia, & si in venis vitiosus sit sanguis prædicta exer- pilorum. cebimus remedia: non propter affectum pilorum, sed venarum: ac proinde non videtur audiendus auctor, cum dicit pilorum defluuium à sanguine Reprehen- ortum, curari sanguinis missione: non enim video, quo modo à sanguine, dicitur au- aut alio humore oriri possit.

Etot.

Caluities si ratione ætatis contingat, non potest curari, quia neque cu- Curatio- ratur densitas à siccitate procedens: at caluities in morbo orta, ea ratio- caluitiei- ne, qua alopecia, curari solet.

Alopecia et ophiasis cum ex vitiosis humoribus malè partem nutrien- Alopecie- tibus proueniant, curantur, purgantes peccantem humorem: Quem ex & Ophia- cutis colore cognoscas: cutis enim in qua desideratur pili, humoris redun- sis curatio- dantis admittit colorem. Id etiam deprehendes ex antea acta vita, natura hominis, & anni tempore. Neque omittenda hoc in loco erit sanguinis missio, si affectus venarum posu-let, hoc est sanguis vitiosus. & si obii- Obiectio- cias Gal. hoc remedium omisisse, respondeo, consulto id fecisse, tantum a- gens de partis affectu. Post purgationem ad Apophlegmatismos acce- des: hi enim ex ventriculis cerebri & venis aliquantulum euacuabunt. Atimò administrabis topica, hoc est localia medicamenta. Quæ consta- bunt ex medicamentis discutientibus prauos humores cutis, & attri- hētibz sanguinem. Qualia sunt Thapsia mixta cum cerato ex oleo con- fecto, ut eius calida vis tepescat: synapi etiam, Euphorbium & alia val. le calida, temperata tamen, ne exulcerent. hoc in loco aduertere oportet, nos non agere de pilorum defluuium à morbo Gallico euemente, de quo postea disputaturi sumus.

Colorem in pilo curabimus, remedium applicantes vitiligini quod ali- Curatio vi- mentum cuti adhærens dissipet, & attrahat sanguinem: ut parte recte tian colo- nurriza, excrementum colorem in pilo mutet.

ris in pilo.

An verò sumpto medicamento purgante.) Cum nullum medicamen- tum purgans actu, cognitum extet, nisi forte pilula de chamelea Dios- coridis: sed omne potentia, purgandi facultatem habeat, inde habuit ortum controuersia, qua quæritur: An post assumptionem medicamenti An ab as- purgantis sit dormiendum. Bætius semper, Valentini tantum in solis sumptione

b

med

DE CVRAND. MORB.

medicamē- medicamentis somnum imperant. Ego verò existimo medicamentum si-
ri purgan- ut liquidum sit, siue solidum etiam in vigilia in actum reduci. Nisi ve-
tis sit dor- triculum sit languidus: tunc enim in omnibus medicamentis somnus rei-
miendum. lis est, longior in solidis, breuior verò in liquidis.

Cur post Opere autem incepto semper somnus.) Multis rationibus dormien-
assumptio- dum non est, quando humor attractus à medicamento purgante, incipit
nem medi- expelli. 1. Quia cum excretio per alium sit actio voluntaria, in somno,
camenti (in quo oriatur animalis facultas) non fiat, sequenturque ea incomoda,
purgantis quæ ex humore in ventriculo & intestinis violenter detento sequi solet,
non sit dor- angustia, morsus, cardialgia & similia alia. 2. Quia in somno ex reuo-
miendum. catione sanguinis ad interna, replentur venæ, per quas humor peccans à
 medicamento trahitur. 3. Quia tempore somni calor, reuocans, mutabit

An ab as- medicamentum in familiarem humorem. Consuetudo autem, quam ser-
sumptione uabant auctor & sui temporis medici, ius gallinæ insulsum tribuentes
medicamē- ante prandium, iam aboleta est, & merito: quia reuera ius gallinæ, aut
ri purgan- arietis non extergit: imò impedit purgationem, obtundendo vim medica-
tis sit ali- menti. Medicamentum autem extergendi vim habens à nobis tribui so-
quid exhi- let in die purgationis, aut in sequenti die. Si in die purgationis tribua-
bendum. tur, statim post medicamenti assumptionem id fiat, quando medicamen-
 tum est validum: ut nulla eius portio in ore ventriculi maneat, vel ut
 medicamentum ad fundum ventriculi descendat, in his hominibus qui
 ab amaris sentiunt molestiam, & in his qui facile vomunt. Die sequen-
 ti, quando medicamentum validum est, decoctio hordei cum cruce &
 pauco saccharo, aut alio extergente vimur propter dictam rationem.
 Quod si purgatio diminuta præcessit, clysterem extergentem, & pur-
 gantem, ex diacatholicon, benedicta, aut confectioe hamec insuntes.

Si fuerit pilorum decidentia à flaua bile.) Humores in corpore, qui-
Quid sit dam sunt turgentes, & alii in aliqua parte firmati. Turgentes humores
humor tur dicuntur illi qui in loco putredinis, tantam tenuitatem & acrimoniam
gens. contraxerunt, ut irritata expultrice partium facultate, eos hinc inde
 expellat, unde turgentia duas habet conditiones. Prima, ut humor hinc
 inde moueatur, eo modo quo animal cotum appetens. 2. est, ut pars irri-
 tetur ad expellendum. Ac proinde Hip. Turgentiam aliquando collo-
 cat in humoribus, cum 4. Aph. sent. 1. eos turgere scribit: & aliquan-
 do in parte 3. de fracturis sent. 18. ita ut partem turgere nil aliud sit,

Quid sit quam incitari ad rei molestæ expulsionem. Humores firmati illi sunt,
humor non qui in aliqua quiescunt parte, obstructi, ut in febris: aut inculcati,
turgens. ut in tumoribus præter naturam. Iam si humor turgeat, statim hoc est
 in principio morbi, purgante medicamento educendus est, ex Hip. 2. Aph.
 sent. 22. indicatione sumpta ex eius tenuitate, ob quam nec ab obstru-
Purgatio ctione eius transitus impediunt. Quod non est difficile intellectu illi, qui
humoris non ignorat, obstructionem in vena, aut arteria non claudere omnino
turgentis. meatum: Dices nonne Gal. 1. Aph. com. vltimo in turgentia occasionem
 arrip

arripit propinandi decoctum ex thymo, origano, hyssopo, aut alio simili, quod vehementem extenuandi facultatem habeat? Respondeo, Galenum supradictis vii medicamentis, non propter obstructionem, ut ipsam aperiant ad purgandum, quoniam hoc etiam seruandum est in humoribus non turgentibus: sed quia aliquando, turgente humore in principio non potest purgare, quia medicamentum deficit, tunc accepta hac occasione, exhibes aperientia, ut obstructione aliquantulum aperta, cesset putredo, & cum ipsa turgentia. Si humor sit in parte firmatus, purgandus non est, quin coctio precedat: iuxta præceptum Hippocr. 1. aph. sent. 2. 2. Purgatio ubi concocta medicari (quod est purgare) præcipit, quod semper obser- uandum est etiam in multo humore, cum purgatio concoctionem impe- ris non tur- diat, & coctio quietem requirat. Hæc autem concoctio à natura fit, quæ genis, semiputrem humorem alterat, reducat ad benignum id quod potest: reliquum verò tanquã inuicte expellens, ut in Cr. sibus experimur: quo tempore solam instituiimus victus ratione. Quod si natura non expellit, aut non integrè expellit, tunc debet medicus ei suppetias ferre, & pur- gatione facta eius defectum supplere, aliter sequetur recidua, ut aph. 12. lib. 2. nos docet. ut autem id commodè præstare possimus aduertenda est sententia Hip. 9. lib. 2. aph. quæ sic habet, Corpora quæcunque quis- piam purgare voluerit, oportet fluida facere: quod est, ante assumptio- nem medicamenti purgantis, debet corpus præparari. Quinque autem Quinque modis fieri solet corporis præparatio: prima cum ante assumptionem me- modis præ- dicamenti vomitu, aut deiectione per aluum purgatis, aqua tepida, & paratur lubricantibus medicamentis consuetam reddimus naturam ad tales e- corpus ad- uationes: quam præparationem tanquam notam omissam fuisse ab purgatio- Hippocrate scribit Galen. 4. aph. com. 13. Secundò Præparamus corpus nem, humeflantes ipsum, alimentis, potu, balneo & quiete: quando hellebo- ro purgare volumus 4. aph. sent. 13. ne in violentia motus sequatur con- uulsio, ob consensum, qui est inter orificium ventriculi & cerebrum. 3. Præparatio exercetur, quando humorem crassum attenuamus, sicut 4. cum glutinosum incidimus. Vltima verò nil aliud est, quam meatuum apertio, quæ rilebitur aliquibus coincidere cum 3. & 4. quia incidere glutinosos humores, & attenuare crassos, nil aliud est, quam aperire. reuera tamen res est diuersa: aperimus enim obstructionem, at incidi- mus & attenuamus, etiam si non sit obstructio. Hæc autè corporis præ- paratio varia, non solis medicamentis, sed alimentis etiã & potu exercenda venit: nam quid proderit assumere medicamentum humorem attenuas, si carnem hircinam, vinum crassum, & alia, quæ crassos generare solent humores non omittimus? Ac proinde non mirandum, si medicamentum purgans, etsi optimum, non agat, aut si euacuet, cum torminibus tamen An sit præ- & mala tolerantia. Præter dictas corporis præparationes, quas arte parandus præstamus ad humores comòdè purgandum: nullã aliã à Gal. aut Hip. humor re- legimus scriptã: proinde existimo errare eos medicos, qui humore tenui nui-

DE CVRAND. MORB.

preparant, eum incrassando: quia si humorem crassum attenuamus, ut libere educatur, quæ ratione adducti humorem biliosum, qui ex sua natura tenuis est, incrassabunt? Respondent aliqui, eius præparatione non esse incrassationem, sed acrimoniæ retusionem. Quod falsum esse hinc intelliges, humor biliosus post coctionem debet purgari iuxta sententiam Hipp. lib. 1. aph. 22. & cum in coctione bilis, victa a natura mitior reddatur, ut Galen. lib. 2. de rat. vic. in mo. acutis com. 44. docet, superfluum ergo erit labor eorum, qui temperare conantur bilem, ut eam expulsion præparent. Quid autem debeamus in tenui humore efficere, breui accipe. Si humor tenuis peccat tenuitate, incrassandus est, ut crassior & frigidior factus non peneiret, & hoc numine minorem inferat molestiam, ut in dolore colico à bile facto videre est. Quia bilis si non qualitate, sed quantitate peccet, ita ut corpore educenda sit, varia eget præparatione: si sit in pectore, ut in pleuride contingit, attenuanda erit, consilio Gal. propter eam rationem, quam capite de pleuride videre poteris: si vero humor tenuis in asperis pulmonum arteriis, à capite distillans inclusus maneat, cum in tussi impetu aeris educi debeat, aliquatulum incrassandus est, ne ab aëre ob tenuitatem diuulsus, ibidem immoretur. de his tamen præparationibus humoris tenuis non agimus, quia non fiunt eo consilio, ut humorem medicamento purgante euacuemus: quem si purgare intendimus, nulla procuratione eget, sicut neque aqua in hydrope. Quod si in tertiana & ardenti febre, quæ à bile fiunt, attenuantibus utimur, ea propter humorem crassum, obstruentem præstamus: non enim humor tenuis obstruere potest, ut lib. 2. agentes de febribus explicabimus. Ex dictis intelliges, errare eos, qui syropos, humores concoquere affirmant, cum humoris coctio à sola natura fiat: nisi dicamus concoquere illa medicamenta, quæ seruant naturæ vim, & calidum innatum. Syrupi verò, quos hi concoquentes appellant, corpus præparantes ducendi sunt, ut paulo supra docuimus.

Syrupus duplex. Primò omnia medicamenta frigida.) Medicamentum, quo corpus ad purgationem paramus, syrupus nominatur. Hic duplex est, vnus clarificatus in officinis seruari solitus, qui nil aliud est, quam medicamentum liquidum ex succis, aut aliis plantarum partibus, cum humore aliquo percoctis, & mellitis, aut saccaratis, ad saporis gratiā, aut custodiæ diuturnitatem. Talis est syrupus fumi terre, borraginis, & similes alii, quorum dosis est. ℥. ij. cum duplo decocto aliquarum herbarum. Alter Apozima dicitur, quod medici in ægrorum domibus præscribunt ex decoctis herbarum & radicum cum melle aut saccaro. Paratur etiam ex aquis, An liceat & ex syrupis officinarum, decoctis tamen, permixtisque seminibus aut uti aquis trociscis. Solent multi aquas per alambicum extractis cum saccaro, aut aliquo syrupo clarificatio uti: ut corpus præparent. Qui mos non placet diffillati- Musæ, & aliis scrupulosis hominibus, variis rationibus adductis. Quidā ex eo quod aquæ per alambicum extractæ caliditatem contrahant, ac proinde

proinde in his destillatis aquis, solum concedunt calidarum usum & non frigidarum, nisi frigida aqua seruet odorem rei, à qua destillatur (ut est aqua rosarum) tunc enim concedunt ipsam. Alii harum aquarum usum non probant, existimantes eas ex aere aut plumbo prauam acquirere qualitatem. Horum rationes leues sunt: praedictae enim aquae neque calorem acquirunt, neque qualitatem ex aere aut plumbo. Non acquirunt calorem, quia non uruntur, & ita si calefiunt, statim illa caliditas euanescit: non acquirunt prauam qualitatem, quia neque plumbum, neque aes tunc liquantur. Existimo ego non esse vrendum his aquis stillatiuis, eo quod solum medicamenti tenuem partem continent, cum nos aliquando crassam & roborantem desideremus: tum quia succus potenter agere solet. Verum est, coactos aliquando vti debere stillatiuis aquis, in penuria herbarum, qualem non habemus in hac Valentina ciuitate.

Simplicia flauam bilem) Haec medicamenta neque concoquentia sunt, neque his debemus praeparare corpus ad purgationem bilis: ut ex superioribus didicisti. Adde haec esse frigida, & proinde augere obstructionem.

¶. Pilularum de fumo terrae.) Tria hoc loco animaduertit auctor: Examinandum primum tempore quo purgare volumus, non esse miscenda plura medicamenta purgantia, quia tempore breui non potest fieri fermentatio, ac quae aduerus proinde non poterunt in unam formam venire. Secundum compositum medicamentum recens non posse recte purgare, quia prius unum altero purgabit, & unum impedit opus alterius. Tertium in purgationibus tutiorem esse euacuationem parcam, immodicam. Haec ille. Quae trutinam postulant. Quod primo admonet, non potest constare. Quamuis enim medicamenta composita, in officinis seruata, fermentationem patiantur: potissimum aestatis tempore, quam colligimus ex eorum ebullitione, non gantibus proinde ut eis utamur, expectandum erit, ut fermentatio absoluta sit. Nam in eorum ante ipsam & postea, imò vigente etiam fermentatione, ipsis utimur cum fermenta-felici successu. Neque enim tunc medicamentum vis impedita est. Secunda tione, admonitio etiam est falsa. Galen. enim lib. quos quibus & quando purgare oportet cap. ultimo, agens de mixtione medicamentorum purgantium praecipit, ut medicamenta purgantia, quae miscentur, sint consentientia, ut aequalis fiat purgatio. Est autem aequalis, quando medicamenta simul operantur, aut quando cessante uno ab actione, alterum incipit: ita ut fiat una continua euacuatio. Nam si uno cessante, longo post tempore alterum incipiat agere, est inaequalis euacuatio, ac proinde damnanda, quia vires, quo tempore refici debent, conflentur. Qua in parte admono lectorem, ut in versione Loquillati aduertat ultimum caput quillati libri, Quos, & quando purg. oportet, ita enim male versum est, ut latina versio. lecti contrarium habeat ab iis, quae in graeca continentur. Ultima admonitio auctoris seruanda est. Si autem contingat immodica purgatio, dica purgationem quam ex defectu virtutis colliges: succurrere poteris frictione partium quid extremarum. Offam etiam panis bis cocti, aut regii à nostris dicti in op-faciendum.

DE CVRAND. MORB.

rimo vino inunctam offeres. Eiusdem etiam panis interiora vino ebricata, & cinamomo inspersa, supra ventriculum appones.

De morbo Gallico. CAP. II.

Descriptio morbi Gallici.

Hic morbus Gallicus, quem & Hispanum & Neapolitanum nominant, nostro sanè malo hisce temporibus affectus notissimus, antiquioribus vero ne per totum quidē notus: detestandus tamen perpetuò, qui cum a pudendis incipiat, in linguā terminatur vario & dolorum & pustularum prouentu, ac præcipue noctu corpus discrucians. Fit autem a quatuor humoribus a naturali temperie per exultionem in malignam quandam naturam degenerantibus, a contagio vt plurimum primo affectis. Deprehenditur hoc malum, quia in pudendis a principio pustulæ apparent, crustis obtektæ, siccæ & lactea nonnunquam sanie manantes. Iam & in fronte, & circa radices capillorū pustulæ, seu veriùs dixeris, tubercula diuersi coloris oriuntur, modo citra vilius medicamenti opem desiccata, modò hinc inde frequenter renascētia. In capite summa inest grauitas, in collo, humeris atque adeo omnibus articulis perpetuus cruciatus, dolorificis ibi tumoribus præter naturā obortis: quicū difficile discutiantur, tardēque suppurentur, in nodos sæpe ac durities migrant. Ad extremum fauces palatūque & insuper lingua nigris fœtidisque erumpentibus pustulis turpiter exeduntur.

Victus ratio.

Hic morbus curatur primò victu humectate, & in actiuis temperato, vel parum calido: quæ atram bilē efficiunt, maxime nocent, vt caro leporina, bubula, hircina, & ceruina, caseus antiquus, omnia salsa, & legumina: similiter quæ facile putrescunt, vt pisces, & lac. Conterunt, quæ bonum succum efficiunt, vt panis optimi tritici, pullus gallinaceus, gallina, caro arietina hispanica, vitulina, hœdi, conturnicis & similiū: de quibus libello de bono & malo succo, libris de ruenda valetudine & de facultatibus alimentorū multa a Galeno tradita sunt copiosissime: perpetuò tamen cōsiderandæ sunt vires ægri, & morbi magnitudo. cōsideranda quoque est sententia Hippocratis l. lib. aphor. quibus semel, aut bis, &c. in cibandis omnibus ægris, vtatur, si potest, exercitatione, præsertim vētriculo vacuo, abstineat venere & animi perturbationibus, quæ bilē atrā augent, vt sunt ira, tristitia & similes.

Sanguinis emissio.

Secundò, sanguinis missione, præsertim si fuerit morbus recens: vbi vires sunt maiores secta vena iecoraria, aut communi, vt sanguinis copia respondeat plenitudini, fiatque vacuo

vacuo ventriculo & intestinis, nisi timeatur subita suffocatio, aliquando bis aut ter sanguis est mittendus.

Tertio concoctione per hæc vel similia. ℞. syrupi fumariæ. *Syrupus præparas.* f. & borraginis. an. ℥. vj. syrupi fumariæ comp. & epithymi. *mo an. ℥. ij. misce.* Item. ℞. aquarum fumariæ, borraginis, lupulorū, & quinque radicum. an. ℥. viiij. misce, facta iam concoctione, diebus nouem.

Quarto vacuatione atræ bilis per hoc, vel simile medicamento. *Purgatio.* ℞. medullæ cassiæ fistulæ recens extractæ. ℥. vj. confectionis medicaminis quod scripsit Hamec. ℥. iij. ℞. diachartami. ℥. ij. ℞. syrup. borraginis ℥. j. decocti florum cordialium, quod s. misce, & fiat potus. Vel ℞. pilularum de fumo terræ, & hermodactylorū maiorū an. ℥. ℞. diagridij ḡ. iij. cum aqua buglossæ, fiant pilulæ vij. Deinde per aliquot dies roboretur ventriculus, & partes principes, sanguisque purior efficiatur electuario diarhodon Abbatis, vel conserua borraginis, aut buglossæ cum aqua, aut decocto borraginis, vel buglossæ, vel fumi terræ. Fiat quoque bis, vel ter in mense corporis purgatio, his, aut similibus pilulis. ℞. pilularum de fumo terræ, hermodactylorum maiorum, & indarum. an. ℥. ij. cum aqua buglossæ: fiant pilulæ xv. adde cuilibet earum granum. j. optimi diagridij, doses tres.

Quinto vtatur exercitio forti & balneo, donec sudet copiose bibat tūc per aliquot dies oleū cōmune quantitatis. ℥. iij. cū ℥. j. optimi sacchari. His omnib⁹ solet curari Gallicus morbus, si fuerit recens: qui si habuerit pilorū decidentiam, eget præter iam dicta frequenti capitis ratiōe, frictione & lotionē frequēti decocto pulegij, stichados, origani, saluiæ, roris marini & camomillæ, & similiū. Si his omnibus mederi nō possumus huic morbo, adhibebitur syrupus sequēs. *Exercitatio & balneo.* ℞. Syrupus Corticis ligni indici, seu Guaiaci in minimas partes diuisi. *ex decocto* ℥. viij. Interioris eiusdem similiter incisi. ℥. iij. senæ. ℥. ij. epithymi, polypodij an. ℥. j. fumariæ, borraginis, cichorci, rostri porcini, radicū buglossæ. an. m. ij. florum cordialium an. m. j. liquiritiæ, radicum diureticarū. an. ℥. ℞. fiat decoctum in libris viginti quatuor aquæ optimæ, prius per diem in ea infuso ligno guaiaco ad medietatem secundum artem. Cuius percolati accipe libras decem, & cum quatuor libris sacchari fiat syrupus non perfectē decoctus ad modum mulsæ: cui addes pulueris hermodactylorum. ℥. ij. pulueris diarhodon abbatis ℥. ij. cinnamomi electi ℥. j. Cuius dosi summo mane erunt vncia quinque, vel sex. Hic syrupus in omni tempore etiam *Laus huius* prægnantibus, & febrientibus est exhibendus intrepidè, *ius syrupi.*

DE C V R A N D. M O R B.

& si opus fuerit, dum bibit hunc syrupū æger, euacua ipsum per pilulas superius scriptas, vel per medicamentum hoc, si non possit deuorare pilulas. ℞. cassiæ fistulæ præparatæ &

Altera purgatio. diacatholicon. an. ʒ. j. confectiois medicaminis Hamec, & diasenæ an. ʒ. vj. diachartami & conseruæ buglossæ an. ʒ. iij. syr. borraginis, quod s. misce, & fiat confectio ad modum opiatæ: dosis cochlearia duo semel in hebdomada.

Aquæ ligni guaiaci. Si his peractis semper morbus permanserit, forsan curabitur aquis ligni guaiaci, prima valētiori, quæ bibitur bis in die, in aurora & nocte a cœna parca per quinque horas: & altera clementiori seu debili, quæ sola in prandio & cœna, & inter prandium & cœnam erit potus: quarū formæ sunt hæc, quamuis secundum variam naturā morbi, & ægri, temporis, & regionis possint fieri valētiores, vel clemētiores. ℞. ligni guaiaci lima vel torno in minimas partes diuisi lib. j. aquæ optime lib. xx. maneant per diem simul, deinde decoquantur ad medietatē, cuius colatura, reiecta parte terrestri, seruetur in vase vitreo, quæ erit prima potentior, eius dosis est vnciæ quinque, vel sex. Deinde accipe lignū primæ aquæ, & iterum cum libris triginta aquæ decoquatur: donec quinta pars consumatur, & hæc erit secūda remissior prima. Quibus iam bibitis fiant aliæ duæ eiusdē formæ, vel similis, mutata aliquārum natura earū, si opus fuerit. Et finitis aquis secundæ libræ ligni guaiaci, fiant ex tertia & quarta libra eodē modo, donec æger sanetur. Accipiat qualibet hebdomada tres ex pilulis superius scriptis, vel duo cochlearia cōfectionis purgātis.

Aquæ smylacis asperæ. Fiunt ad idem efficiendum aquæ ex aspera smylace nostri tēporis, & est sarça parrilla, quæ ab India ad Hispaniam aduehitur, forma earum est. Accipe vncias sex dictæ sarçæ parrillæ conquassatæ, & per diem naturalem infunde in libras duodecim optimæ aquæ, deinde decoquatur ad medietatē, cuius colatura in vase vitreo conseruetur, sumenda mane, & vespere, quantitate vnciarum quinque, & hæc est prima valētior. Deinde accipe eandem simlacem asperam prius decoctam, & in libris triginta aquæ decoquito, donec quinta, vel sexta pars consumatur: & hæc erit secunda mitior ad potum in prandio & cœna, & inter prandium & cœnam. Quibus finitis parētur aliæ eiusdem, vel similis formæ, quemadmodum fiunt ex ligno guaiaco. Tempus accipiendis iis com-
Tempus curandi morbum Gallicum, modius est Ver, deinde Autumnus. Aestas vero est vehemēter inepta & aduersa. Hyems accommodatior æstate, & Vere & Autumno deterior. Nostris quoque temporibus reper-
ta est radix chyna, cuius aqua curare solet morbum Gallicū

&

& articularem, de qua liber extat scriptus a doctissimo Ves-
silio. Lege etiam methodum propinandi decoctum huius
radicis apud Amatam Lusitanum centuria 2. curat. 31. rectif-
sime traditam. Viētus ratio (dum bibuntur hæ aquæ) præ-
scripta est iam superius, quamuis in cœna nullæ carnes sunt
exhibendæ, sed panis nauticus, vulgò: bis coctus, vix passæ,
vel radix buglossæ condita, vel cucurbita condita: præcipuè
si fuerint Castellani. Semper tamen est sequenda Hippocra-
tica veritas superius repetita, quibus semel, aut bis, &c.

Curatur quoque morbus hic vsu vini sancti, quāuis bilio- *Vinum*
sis & dispositis ad hecticam minus, quam aqua ligni guaiaci *sanctum.*
cōferat. Eius forma hæc est. ℞. corticis ligni indici lima vel
torno diuisi in partes minimas ℥.ix. interioris eiusdem ℥.iiij.
folliculorum senæ, epithymi, polypodij an. ℥.j. fiat decoctum
in libris viginti quatuor aquæ ad mediētatem, de cuius co-
latura accipe lib. decem, quibus probe calefactis adde vini
generosi lib. quindecim, & omnia simul maneant in vase fi-
ctili, donec calor absūmatur, postea conseruetur mixtura in
vasis vitreis: quibus adde pulueris hermodactylorum vncias
duas: bibat in aurora & vespere libram semis huius vni loco
primæ aquæ potētioris, & fiat ex ligno, & cortice iam prius
decoctis aqua pro potu in prandio & cœna cum libris vigin-
ti quatuor aquæ, donec quarta pars consumatur, qua bibita
& vino fiat secūdo eodem modo, vt dictum est superius, cum
de aqua ligni guaiaci agebamus. Hoc tamen breuius quam
aquæ solæ curare potest etiam antiquum Gallicū morbum.

Si fuerit antiquus, & curatu difficilis, fortiorēque poscat *Antiqui*
curationem, facta iam clementiori medicina nisi morbi & *& diffici-*
symptomatum magnitudo solitum ordinem inuertat (nam *lis morbi*
authore Celso lib. 2. non potest vehementi malo succurrere, *curatio.*
nisi æquē vehemēs auxilium) potentioribus opus erit, inter
quæ a multis expertum est, & a me laudatū medicamentum
ex mercurio, brachijs, & alijs partibus externis ad motū or-
dine cōsueti, cōsistentibus viribus ægri, quia vbi illæ non
adsunt, non oportet laborare: neque facultas ipsius argenti *Facultas*
viui est tunc pertimescenda, cum olim sæpe morbis multis *argenti vi*
leuioribus admoueretur, vt scabiei. Galenus tamen nunquā *ui anti-*
fecit periculum de eo, an interius sumptum, vel exterius ad- *menda.*
motum interficiat.

Expertum à nobis vnguentum hoc. ℞. axungie porcine *Vnguen-*
sine sale ℥.iiij. oleorum laurini, de lilio & rutæ an. ℥.j. *tum.*
cæ magnæ ℥.iiij. rubæ tinctorū ℥.ij. argenti viui ℥.iiij. croci,
cinamomi, an. ℥.j. musci & ambre an. g. iiij. misce & fiat vn-
guen

DE CVRAND. MORB.

guentum. Poterit augeri, vel. minui aucto, aut imminuto mercurio,habita ratione virium ægrotantis, & morbi. Certe rei quantitas neque præfiniri potest, neque scribi, Aliquando sufficit prima vnguenti admotio, aliquando duæ sunt necessariae, aliquando tres, & plures quam sex, quod per sudores,alui excretiones, & oris deprehēdes. Partes quibus admouetur, sunt extremæ, videlicet brachia, tibiæ, ipina, & venter versus inferiores partes.

Quæ partes inungenda.

At cor & vētriculus omnino custodiantur, ne ab illo medicamento lædatur pars nobilis, vel ei, & toti seruiens. Vnguentum cum admouetur, sit actu bene calidum, & habitaculum, & si non sudauerit, ægri pedibus apponantur lateres calidi cum vino: quod si his nō sudauerit, neque oris excretiones, neque alui defectiones habuerit, cum iis vel saltem aliqua ex ipsis euacuationibus soleat hoc medicamentum morbum hunc curare: tunc totius suffitu erit opus dempto capite, ne vis venefica per nares & palatū cordi, & aliis partibus noceat. Quare æger stans vestiatur conopæo, quod vulgò dicitur pauillon, capite solo nudo apparente, & inter illius tibiæ supra prunas spargatur sequens puluis. ℞. cinnabri. ʒ. j. rubear tinctorum. cinnamomi, & croci. an. ʒ. s. misce, & fiat puluis ad primum suffitum, & si opus fuerit, fiant duo vel tres: tunc, in eo etiam tempore vnguenti ex mercurio habeat in ore crystallum, vel aliquem liquorē adstringentem, & repellentem ad detentionem dentium, & oris. Si verò fuerint vlcera, & caliditas, quemadmodum ferme semper esse solēt, lauetur sæpe os sequenti mixtione. ℞. aquæ plātiginis ʒ. iiii. aquæ portulacæ, rosarum, & lactucæ an. ʒ. ij. s. rhodomellis, syrupi rosarum, & oxyfaccharæ. S. an. ʒ. ij. pulueris aluminis vsti, & mastichis. an. ʒ. ij. misce: hoc vel simili medicamento curantur oris vlcera. Aliarum verò partium vlcera omnia, si fuerint sine ossium corruptione solēt curari sine medicamentis externis, facta curatione totius corporis per ea, quæ diximus: ossium tamen corruptio cauterio eget, & propria curatione, quæ ab erudito chirurgus administrabitur. Nonnulli in curatione huius morbi antiquissimi, & fortissimi, præter iam dicta vtūtur pilulis addēdo grana aliqua pulueris Ioannis de Vigo: ego nō auderē vti illo puluere, ne in parua quidem quantitate & correcto: quia est corrodens medicamentum: fit ex argento viuo, & aqua, seu lixiuio forti, & potenti, quo aurifices vtuntur. Illius tamē autor Vigo secunda parte sui operis in peste dat duo grana huius pulueris, quæ (ipso dicente) vomitu & ventris profluuiio violenter purgant,

Puluis Ioannis de Vigo non probatur in pilulis.

in

in colica quoque grana duo eiusdē pulueris cum drachma
 semis philonij Romani laudat tanquam vtile & optimum
 auxilium: eius tamen vis corrodens externis partibus cle- *Puluis*
 mens est, & sine periculo, & pauci doloris: aliquando tamen *Ioannis de*
 opus est miscere parum vnguenti albi, ne dolor magnopere *Vigo extre-*
 intendatur, & ideo vnguento superiori loco argēti viui in- *rius ad mo-*
 dere parum huius pulueris, potentius hoc esset, & tutius, *ius lauda-*
 quam interius assumere. Qui deuorandum esse hunc pulue- *tur.*
 rem censent, aquis frigidis, & cordialibus, & aliis corrigūt.
 Huius pulueris emēdatio, autore Petro Andrea Matthēolo
 Senensi fit. ℥. pulueris præcipitati ex Mercurio (qui fit, vt
 docet idem Matthæolus, libro de ratione curādi morbi Gal *Correctio*
 lici.) ℥. ij. aquarum plantaginis, & acetosæ. an. ℥. ij. macerētur *pulueris.*
 per noctem, & summo mane prioribus aquis eiectionis de inte-
 gro alias eiusdem ponderis super infunde in vase æneo, seu
 testaceo, ad ignem collides, & non cesses agitare ferrea, vel
 lignea spatula, donec in puluerē redigantur, ex quo sic cor-
 recto poteris pilulas, quæ sequuntur, componere, & fiet ma-
 ior correctio. ℥. electuarij cordialis Conciliatoris. ℥. s. mar- *Pilula.*
 garitarum præparatarum, hyacinthorum, pulueris præcipi-
 tati, seu Vigonis an. ḡ. v. pulueris diamusci, & diamargarito
 nis frigidi an. ℥. s. fiant ex his catapotia quinque, quæ sumā-
 tur ante solis ortum. Hæc enim eodem autore breui tempo-
 re Gallici morbi dolores tollunt educendo vomitu & eie-
 ctione pituitam, & atram bilem. Plurima aliorum morbo-
 rum genera idem doctor hoc puluere curauit, addendo di-
 uersa medicamēta, pro ratione diuersorū morborum, quod
 ego quemadmodū dixi, periculosum existimo, etiā si præ-
 ter auctoritatem Pauli, & Arabis Auicenæ, tot experimētis
 sit credendum, & cum Hippocrate extremis morbis extre-
 ma exquisitē remedia optima sint. Laudat similiter hic au-
 tor in hoc, & aliis morbis, qui ex atra bile fiūt, pilulas ex hel-
 leboro, quas Mes. capite de eo ex Haly describit; earum ta-
 men vsus in vere tantum iuuenibus & robustis confert.

De morbo Gallico. CAP. II.

Scholium.

Est morbus Gallicus) variæ ac diuersæ de Morbi Gallici essen- *Variæ sen-*
 tia apud doctores extant sententiæ. Montanus hunc morbum, in *tentiæ de*
 temperiem iecoris calidam & siccam, in certa specie nobis ignotam esse essentiæ
 existimat. Fracastoreus ad humorem pituitosum eum refert: Musa eum morbi Gal
 penenum, & contagionē epydemicalem facit: Hi omnes decipiuntur. Mo- *lici refutā-*
 tanus quia videmus multoties iecur calidum & siccum, & non insicere tur.

omnes

DE CVRAND. MORB.

omnes humores : Fracostoreus, quia homines melancholici sanguinei & biliosi, eo afficiuntur. Musa verò, quia hic morbus caret illis symptomatibus, quæ a veneno contingunt, neque plures interficit, neque causam habet communem. His ergo omnis simul cum ortus, & eius originis investigatione, quia ad curationem non est necessaria, breui eius essentiam hac

Essentia ratione accipe. Morbi, qui nostrum inuadunt corpus, quidam manifesta
morbi gal- qualitate afficiunt, ut qui calidi, frigidi, humidi, & sicci sunt. Alii verò
lici. toto temperamento, ut venena, & quæ contagione inficiunt, inter quos est morbus Gallicus. Qui nil aliud est, quam Morbus totius substantiæ inficiens iecur & humores in eo contentos. In hac definitione, morbus est genus, quo communicat cum aliis morbis: reliquæ partes definitionis differentiæ sunt: Cum dicimus totius substantiæ, separamus hunc morbum ab aliis, qui manifestæ qualitatibus sunt: ultima parte qua cum inficere iecur, & humores in eo contentos diximus, distinguimus, morbum Gallicum, ab aliis morbis etiam totius substantiæ, peste, scabie, ophthalmia,

Modus & aliis qui non agunt in iecur, sed alias respiciunt partes. Modus, quo
quo gene- hic morbus generatur, hic est. Etsi contactu, osculis, poculis, peccinibus,
ratur mor vestibulis, linteis, lactatione infantis factò, hic morbus contrahatur ali-
bus Galli- quando: ut plurimum tamen ex venereo congressu ob coniunctam cōver-
cus. sationem & calorem id contingit. Ex eo enim in pene, aut mulieris pudendo aliqua portio humoris infecti relinquitur, qui aliquando generans vlcer, & aliquando sine vlcere inficit humores proximos, & hi vicinos quo ad iecur concipit illam pravam qualitatem: quam communicat humori cacochoymo, hoc est in massa superfluitate: si talis non reperitur, partem sanguinis inficit, inde sequuntur morbi varii, cum humor infectus non possit gubernari à natura. Hac ratione si sanguis infectionem admittat, fiunt phlegmones, & pustulæ rubræ. Si verò vnus ex aliis humoribus, molestus cum sit ad aliquam partem decumbat, faciet pustulas, tumores, dolores & vlcera distincta tamen pro varia humoris natura. rerum tamen est, tandem in hoc morbo humores crassos generari, & abundare in corpore: si iecur sit frigidum, pituitam, si calidum, atram bilem. Quæ cum non possit gubernari, neque à natura mutari ob pravam qualitatem detinetur & adurit, ita ut perueniens ad partes eas exulceret, non parces etiam ossibus ex sua natura duris. hic morbus antiquis medicis ignotus, nostris temporibus Dei beneficio, ut effrenem hominum libidinem reprimeret, apparuit. Quamvis hoc non placeat Vallesio (viro in medicina studioso & docto) quod. 4. Epy. com. 1. hunc morbum veteribus cognitum fuisse confirmat, ex Hippocrate, qui. 3. Epyd. Sec. 3. sent. 4. morbos recenset, quos in morbo Gallico in dies experimur, vlcera sordida, capitis & menti glabritiem sine febre, & cum exulceratione pudendorum, & faucium, ossa etiam excisa & nulata. Mirandum tamen est de tanto viro, hætenus non animaduertisse in morbo tam populari rem aliquam nouam veteribus incognitam, quam poterat ex contagione, causis, & curatione colligere.

Ex

Vallesius
reprehenditur.

Ex contagione, quia illa antiquorum vlcera alios non inficiebant, at ea qua nunc in hoc apparent morbo, contagiosa sunt, & ex ipsis solet sequi profluvium pilorum. Ex causa, quia apud antiquos pilorum decidetia duas tantum habuit causas, ut in primi capitis scholio docuimus: At morbus Gallicus nam tantum habet eis ignotam, nempe vitium excrementi: Tu adde dolores, qui etsi eos expertos habuerit antiquitas, non tamen illi semper exacerbantur nocte, ut in huius morbi doloribus contingit. Curatio praeterea hunc morbum novum esse demonstrat. Pustulae enim cutis apud illos, purgato corpore cessabant. Quas in hoc morbo nisi totum habitum corporis euacuamus, perseverantes & cum ingratissimo dolore experimur. Dolores apud antiquos anodynus cessabant: at in hoc morbo magis exacerbantur. Et in summa, nisi medicamenta Alexipharmaca, quae oppugnent pravam morbi Gallici qualitatem, adhibeantur, nunquam curabitur perseverante semper humorum infectione. sunt autem Alexipharmaca Similax aspera, indica, lignum Guaiacum & Argentum vivum.

Hic morbus curatur primo victu. male perscribit autor rationem vi Auctoris etus hominibus morbo Gallico affectis, non enim semper debet esse humi lapsus. da, sed aliquando humida, & aliquando sicca. humida cum natura est victus ra sicca, & humor reduntans siccus. Sicca vero in natura humida & hu- tio in mor more humido. Neque etiam debet semper alimentum in actiuis qua- bo Galli- licatibus temperatum assumi, cum enim est infectio in bile, refrigerante co. alimento: cum in pituita, aut melancholia, calfaciente videndum est. Quia si imperamus in his alimenta temperata, prout licebit, debent alterari. In corpore frigido calidis, pipere, borragine: in calido frigidis, lactuca, prysana & similibus.

Secundo sanguinis missione. semper constante virtute in Gallico as- Sanguinis fectu sanguinem mittes, si sit plethora, ut euacues: si cacochimia ob san- missio. guinem vitiosum.

Tertio concoctione. omnem morbum Gallicum in Melancholico hu- Purgatio. more collocat auctor, ac proinde non est mirandum, si syrupi ab praescri- pii eum respiciant. Nos vero qui hunc morbum in omnium etiam alio- rum humorum exuperantiis collocamus, non unum solum, sed eum qui reduntat, praeparare solemus.

Quarto euacuatione atrae bilis. pro vario humore peccante, & pro- Purgatio. inde infecto, vario medicamento purgante utere: neque sequaris aucto- In morbo rem, semper purgando melancholiam, crassissime enim errabis, & cum Gallico va- maximo egrotantis dispendio. rii sunt

Quinto exercitio forti. morbus Gallicus nostri aevi tyrannis, his fa- morbi, & mulis gaudet, pustulis, ulceribus pudendi, bubonibus, gonorrhea, deflu- varia sym- uio pilorum, tumoribus praeter naturam, & tandem doloribus: ex quibus promata. eius tempora colligimus. Principium, cum pudendi vlcera apparent, lo- Tempora quimur enim modo de his, qui cum coitu contraxerunt. Augmentum cum in morbo inguina inflammantur, & maius augmentum, cum iecur & humores Gallico

DE CVRAND. MORB.

in eo contenti inficiuntur, statum verò ex totius corporis infectione, quam ex pustulis, doloribus, tumoribus & pilorum destitutio cognoscimus. ubi advertendum est, hunc affectum, in quocunque tempore conuulsum habere humorem. Nam in principio humor fluit ad vlcus, in augmento ad bubonem, quo tempore in iecore humores iam sunt infecti, in statu omnia

**Curatio pu-
bularum.** mala, quæ in cure apparent, ex humoribus etiam pendent. Quia ratione his omnibus malis succurres, breuiter explicabo. Si pustula in cure appareant, cum oriantur ex humore praua qualitate infecto, ac proinde irritante partes ad sui expulsionem, curandæ sunt, primò sanguinem mittentes in plethora, ut euacuemus, in cacochimia, ob sanguinis vitium: sanguinis autem missio non solum bis aut ter, sed constante virtute, etiam sexies & septies facienda est. Postea purgato humore peccante, tandem ad decoctum ex similace aspera & Guaiaco deueniendum: ut sudoribus habitum corporis euacuemus. Pustulas verò exiccabimus a-

**Curatio vl-
ceris pu-
dendi.** qua forti, aut aqua plantaginis cum alumine decocta. Si vlcus sit in pu-
dendo, cum hoc caliditatem aliquam habeat ex motu & fricatione con-
tractam, prius auferenda erit lotione ex aqua rosacea, nenupharis, aut
alia, quæ frigida sit: deinde sordes (quæ impediunt vlcus consolidatio-
ne) auferes pauco puluere Pionis cum vnguento albo permixto, ut ex-
tersio sit sine morsu. Quod si labia vlcus dura sint, aut vlcus difficiliter
curetur, solo puluere tunc utendum erit: quo & extergimus, & partem
illam callosam consumimus. vlcere mundificato cicatricem induces, mi-
scens alumen, tartarum, & aeruginem, cum vino albo & aqua rosacea, ita ut
aluminis sit maior quantitas, minor Tartari, & adhuc minor aeruginis:
& si difficulter vlcus cicatricem admittit, vnguento ex mercurio vnguenta
sunt vnguenta, & pudendum. Hoc enim exiccat vlcera, corrigit inieperum,

Curatio & extinguit morbi seminarium. Bubonem hoc modo curabis. Cum bubo sit
bubonis. intemperies cum affluxu humoris, habet aliquid factum, & aliquid quod
fit: id quod sit prouidebis, reuultes alio humorem fluentem ad locum affectum.
Reuulsio hæc sanguinis missione exercebitur, secta basilica eiusdem partis,
quæ cum loco affecto rectius lineam seruat. Id verò quod in tumore factum es-
set, curari debet, euacuatione, quæ sectione venæ pedis eiusdem partis com-
mode fit: ultimo applicabis supra bubonem emplastrum diachilonis, puluere
iris inpersum, ut digeratur humor per halitum. Quod si non possit dige-
ri, sed ad suppurationem mutetur, medicamenta suppurantia adhibenda
erunt. Pus autem extrahemus non quemadmodum chirurgi faciunt me-
dicamento caustico, aperiens abscessum, quoniam dolorem excitabimus
magnum, & inde fluxionem ad partem languidam ex sua natura: sed
scalpello sectionem facies, folium myrthi representate, ut puri via pateat
ex Gal. 13. metho. cap. 5. Neque enim hac in parte sequendus est Musa
ante suppurationem aperiens bubonem, ne dolore excitato augeamus af-

Curatio fectum. Gonorrhea sequitur, quæ duplex est, una propria, in qua assidue
gonorrhea. semen emittitur, de qua non agimus modo, altera improprie dicta, cum
per

per pudendum substantia alba fluit, quæ non est semen, sed pus. Quod colligimus, quia semen sine dolore emitti solet, at pus cum dolore, hæc improprie & per similitudinē Gonorrhea est, quæ in morbo Gallico apparet, ex multis enim vlcusculis in parte interna penis ortis pus egreditur, dolorē sentientes nō solum in illa puris excretionē, sed etiā in pudendi erectione, ob parvis ulceratæ tentionē. Curatur hæc sanguinis missione primò, ne ob dolorē attracto humore fiat inflammatio, & ut portio humoris peccantis euacuetur. Quem purgabimus, & ultimò extergemus, cicatricēque inducemus, in vlceribus, decoquētes hordeum cum rosis, eiq; mel rosatum colatum permiscētes. Quo decocto syphone sine piulco sæpe vrinae meatum lauare oportet, aut hoc alio. ℞. aquæ plantaginis ℥. vii. aquæ rosarū ℥. iij. rhodomellis ℥. ii. collyrii albi rhafis ℥. iii. dissoluatur, & misce. Si sit magnus dolor, collyrium sit cum opio: vrinae. n. a. crimonia (quia in trāsitu per vlcuscula mordicationem parit) temperanda erit, bibentes decoctionem maluarum & liquiritiæ cum serapio rosaceo aut violaceo. Et si magnus sit ardor, syrupo de mucilaginibus à Matthæo de Gradi. descripto utemur, quem capite de ardore vrinae à me habes descriptum. Solet aliquando in vlceribus prædictis cum multum durat, caruncula innasci, & impedire transitum vrinae. Quæ curabitur ea ratione, quæ Laguna & Amatus Lusitanus docent. Decidentia Curatio pilorum in morbo Gallico ostendit antiquos medicos eum nō cognouisse: decidentia Ipsi. n. ut in l. habes scholio, à duabus tantum causis defluere pilos scripsit pilorum in rursus, cum in morbo Gallico à nulla ex illis eueniat, sed à prauitate ex morbo Galcrementi. Remedia ad eiusmodi defluuium multa habet Antonius Mulico. Ita in suo lib. de morbo Gallico inscripto. Ego vnum solum describā, quo si utaris, prohibebis ne pili dicidant, & excisi renascantur: quod experitissimum habemus, hoc autem est vnguentum ex Mercurio paratum, quo humeri articulus, vertebrae colli, & retro aures inungere debes, quoad in ore iam incipiant vlcera apparere. Tumores præter naturam cessabunt sanguinis missione, seruata rectitudine, facta purgatione, decocto smylacis, & supra tumorem hoc vtens medicamentum. ℞. emplastrum de ranis & contra durities ana partes æquales, extendantur super alutā ad formā dandā. Dolores in morbo Gallico sine tumore aliquo solent molestiā inferre alicui, aut multis partibus: hi curantur primò sanguinis missione, ut impediamus fluxum humoris ad partem dolentem. 2. humoris peccantis purgatione, & decocto ligni Guaiaci aut smylacis. & si his non cessent, vnguento ex Mercurio partem dolentem ungemus: aut si sit in multis partibus dolor, vniuersalem faciemus unctionem. Præ Modus quæ terea in supradietis affectibus, decoctū ligni Guaiaci & Smylacis, à nō paratur de his propinatum fuit nō solum ut sudorem moueremus, sed ut prauā morbo coctum ex bi qualitatem his medicamentis, quæ illi toto temperamento contrarian. Guaiaco, tur, radicibus (si fieri hoc potest) euelleremus. Solet autem decoctum & smylace variè parari: Aliqui libram ligni in duodecim libris aquæ decoquunt indica.

ad

DE CVRAND. MORB.

ad medietatis consumptionem. Quibus omis-
 ctionem imperent, nos duplex solentis parare decoctum, vnam (quod vul-
 go aqua fort. dicitur) decoquentes vsque ad medietatem: quatuor uncias
 ligni minutatim incisi, & per quatuor horas in duodecim libris aquae
 infusi: secundum illud idem lignum in triginta libris aquae vsque ad ter-
 tiae partis consumptionem igni lento etiam coquentes. Qua eadem ra-
 tione smylacem praeparamus, primo decocto mane & vespere vtimur, vt
 sudorem moueamus: secundo vero in prandio & cana loco aquae consue-
 ra. Quod tertio quoque die faciendum est: vbi aduerte in his decoctis
 recte administrandis naturam, aetatem, & tempus anni esse consideran-
 da. Nam si haec calida sint, in decoctione miscenda, quae temperent cali-
 ditatem horum medicamentorum, qualia sunt borrago, & endiuia: si
 vero frigida, quae aliquantulum augeant calorem, stechadem, maiorana-
 nam & similia misceris. Neque oportet hoc in loco aliquorum consue-
 tudinem sequi, cum syrupis humores praeparantibus misceri senam &
 alia medicamenta purgantia. Ex Hippocrate enim didicimus, coctionem

Quando postulare quietem. Aliquando tamen, quando scilicet hic morbus totum
 liceat in habitum corporis occupauit, possumus cum multis euacuationibus per
 morbo gal cutem, vrinam, & alium praecedente semper purgatione. Qua ratione
 lico multis hoc decocto vtimur aliquando. ℞. polypodii, senae & hermodactylorum
 vii ana. ℥. i. s. radicum diureticarum ℥. ii. & borraginis fumi terrae, cico-
 cuationi- reae, agrimoniae an. mani. ligni sancti minutatim incisi & smylacis a-
 bus. sperae ana. ℥. iii. sena, Polypodium, & hermodactyli ponantur in liga-
 tura, & decoquantur omnia in duodecim libris aquae vsque ad medie-
 tatis consumptionem.

Praeterea cum decoctum propinamus, an victus in principio debeat
 esse tenuis aut crassus, non caret conuersione. Itali (sicut in morbis acutis
 efficere solent) victu vtuntur crasso, vsque ad diem decimum quartum
 gallinas, hepata gallinarum, lactes, haedos & similia concedentes: at
 postea panem biscoctum solum, aut cum vuis passis. Hispani contra vi-
 ctum tenuem laudant in principio, crassum vero procedente morbo, eo-
 que in progressu morbi procurantur multae euacuationes, quas non po-
 terit egrotus inedia viens tollerare. Melius tamen faciet, qui cum di-
 stinctione cibabit: in robustis viens Italorum victu, at Hispanorum in
 his, qui vires habent languidas.

Curatio Si fuerit antiquus & curatu difficilis, Quando tumores & dolores
 per vngue persequantur, ex quibus colligimus morbum iam esse in habitu, deuenien-
 ra. dum est ad iunctiones factas vnguento ex Mercurio, seu argento vniuo
 Pari ar- parato: solet autem argentum vniuum multis modis parari, primo ea ra-
 genti vini tione qua docuit Vigo suum praeparare puluerem: assumentes argentum
 praepara- vniuum, idque in alambico vitro collocantes, cum certa quantitate eius
 tio. aqua, quae aurifices aurum ab argento separant, eo vsque percoquentes,
 donec tota humiditas absumpta sit, & massa remaneat: quae rupto vitro

curat

extracta præcipitatum dicitur. Quo mendum non est in vnguentis, quæ solent ad morbum Gallicum parari, ob eius vehementiam qua exiecat corpus, ita ut febrem inducat hæcticam. Iacobus Sylvius corio præparat: ponit enim argentum vivum in corio, & exprimit, assumitque eam potum, quæ corium penetravit, quia tenuis est: reliquam crassam tanquam inefficacem relinquens. Aliqui præparant coquentes illud cum aceto. Alii ipsam urunt in vitreo vase sine humore aliquo. Mathiolus præparare solet argentum vivum & præcipitatum Vigonis, aqua plantaginis vel solani, quod nonnulli tanquam rem secretam seruant. In hac Valentina civitate præparamus argentum vivum cum axungia porcinæ, quia hæc eius motum retardat, tum quia volumus vere medicamentum, quod sua frigilitate debet agere. Vnguentum ergo huic rei accommodatum non potest describi, quia pro vario affectu natura & tempore, varie solet parari. vsui tantum tamen nobis hoc est. ℞. Mercurii ℥.iii.℞. Vnguentum extinguatur in axungia porcinæ sine sale exactissime, olei Laurini & vul- ex argenti pini ana. ℥.ii. cineris vici ℥.j.℞. theriacæ magnæ ℥.℞. mastichis, & thuris ana. ℥.iii. cerusæ ℥.j.℞. misce, & fiat linimentum ad modum vnguenti: huius compositionis basis est Mercurius, axungia illud extinguit, hoc est facit, ne hinc inde moveatur, & simul temperat ipsum sicut thus & theriaca magnæ: cinis facit ipsum penetrare, & exiccare vlcera, olea discutunt, cerusa vero ob corpulentiam additur, hoc vnguento inungenda est pars, aut articuli. Neque audiendi sunt, qui existimant humorem, qui tumorem in cute generat, per eandem partem esse euacuandis, cum per ipsam impetum faciat nullum enim inuenies medicamentum, quod eius crassitiam attenuet, præter hoc vnguentum. Argentum enim vivum adiutum aliis medicamentis, ex toto corpore euacuat, suâque frigilitate humores ab habitu corporis repellit interius ad loca euacuationi accommodata. Mathiolus (quem multi sequuntur) ex pulcre Vigonis, aqua Pilulæ plantaginis extincto, pilulas construit ex granis quinque istius pulveris, electuario diamargaritonis frigido, confectioe Gentilis contra melancholiam, & syrupo aliquo. Alii solum componunt ex præcipitato & carduæ confectioe. Abstineretamen oportet ab his, neque per os assumenda sunt, eo quod exiccant partes principes, & dysenteriam sæpissime inducunt. Si enim habemus medicamenta, quæ humorem secure purgant, cur purgabimus cum periculo? Aliqui hunc morbum curant suffitu ex cinnabrio vulgò vermello: quo etiam medicamento ob vehementiam per suffitum non recor. Quod si eo utaris, caue ne inspiretur vapor, quia est infectissimus thoraci & nervis.


De vlcerebus capitis manatibus, quæ à Græcis achores, & à iunioribus barbaris tineæ dicuntur. Et de cutatione pediculorum capitis, & aliarum partium.

CAP

DE CVRAND. MORB.

CAPVT III.

*Descriptio
rherum
capitis ma-
narium.
Causæ.*



Vas Græci Achores dicunt, Plinius manantia capitis vlcera appellat. Vulgus, quia vestium tineis simillima sunt, capitis tineas nominauit. Est autē, auctore Paulo, hic morbus affectio quædam capitis tenuissimis foraminibus cutem perforans, quibus glutinosus humor depellitur. Causam habet nitrosam, salsamque pituitam, seu mixtum quendam humorem, qui partim tenuem saniem, ac mordacem, partim vero crassum succum in se habet: unde si qui excernitur humor tenuis sit, biliosam dominari saniem conicimus, sin crassus, atque glutinosus, pituitam. Pediculorum vero generatio, quam pediculationem Latini, Græci phithuriasin nominant, a calidis fit humoribus, crassis tamē, sed cutim subeuntibus, atque in eius profundo pediculos generantibus. Quod plurimum etiam inuat, & immundities, & crassorum ciborum, earumque rerum vsus, quæ excrementa ad cutim detrudunt, vt ficus. Morbus per se patet.

*Curatio.
Vicius.*

Curatur primò hic morbus victu temperato in actiuuis, & humido, & alimentis boni succi: vt pullo gallinaceo, gallina, & similibus. Omnia quæ atram bilem generant, maxime nocent: de quibus capite superiori de curatione morbi Gallici abundè dictum est.

Concoctio.

Secundo materiam apparantibus his, & similibus. ℞. syrupi fumarie. S. borraginis. an. ℥. iij. rhodomellis, syrup. endiuie compositi. an. ℥. ij. misce. Item ℞. decocti borraginis, fumarie, radice buglossæ, & petroselini addendo parum epithymi libram vnā semis.

Purgatio.

Tertiò, vacuantibus per medicamenta conferentia, quæ humorem terrestrem mixtum cum seroso tenui purgant: de quibus superiori cap. disputauimus, vt. ℞. diacatholiconis. ℥. vj. & confectionis medicaminis Hamec. ℥. iij. diacarthami & electuarij de succo rosarum an. ℥. j. syr. buglossæ. ℥. j. aquæ borraginis quod misce, fiat potus. Præter hanc primam purgationem est utilis, & necessaria leuis purgatio, bis saltem in mense, inter quas accipiat electuarium diarhodonis abbat, vel conseruam borraginis cum decocto, vel aqua buglossæ, vel borraginis. Hæc & similia tollunt nocumēta, quæ ventriculo, hepati, cordi, & toti corpori inferre soleat purgatiā medicamēta, fiat leuis purgatio per pilulas has. ℞. pilularum indarum. ℥. iij. agarici trochiscati. ℥. ij. cum aqua buglossæ fiant pilulæ quindecim: adde diagridij. ḡ. decem, & aurentur ad vsū, tres pro dosi. Si non potest deuorare
p

*Iteranda
purgatio,
modo læ-
uis sit.*

pilulas, vtatur hac mixtura. ℞. diacatholicon. & diasenæ.
an. ʒ. j. diacarthami & confectiois medicaminis Hamec.
an. ʒ. ʒ. agarici trochiscati ʒ. ij. syr. borraginis. q. s. misce, &
fiat confectio: dos cochlearia duo.

Quartò, vacuantibus a parte affecta per loca propinqua, *Detractio.*
videlicet, per palatum & per nares: vt si succus sicæ admo-
ueatur naribus, vel puluis piperis, vel mādāt mastichen, vel
alia cōposita: de quibus capite de apoplexia abūde dicemus.

Quintò, repellentibus, & astringentibus, si incipiant a- *Repulsio.*
chores, quod lotione assidua partis affectæ, decocto baccha-
rum myrti, plātaginis, rosarum, portulacæ, & similibus fieri:
vel vngatur bis in die hoc vnguento. ℞. vnguenti albi. ʒ. j. ʒ.
vnguenti rosati santalati. ʒ. ʒ. misce.

Sexto, cum morbus est in augmento, vel vigore, per ea, *Resolutio.*
quæ materiam partis affectæ extrahunt, & dissoluunt: pri-
mò fiat lotio decocto vrticæ, lapathij, sumariæ, fœnugræci,
camomillæ, & similibus, raso prius capite: & vngatur hoc
vnguento. ℞. succi lapathij. ʒ. j. olei camomillæ & laurini, *Vnguentum.*
an. ʒ. j. ʒ. olei rosarum. ʒ. ʒ. aceti cochlearium. j. sulphuris. ʒ. iij.

ij. tuthiæ, spumæ argenti. an. ʒ. j. ceræ quod sufficit, misce. &
fiat vnguentum. In hoc vlcere & aliis capitis affectibus lau-
dantur a Galeno primo de compositione medicamentorum
secundū locos, & a Paulo ʒ. lib. & ab Aetio. 6. sermone mul-
ta medicamenta: semper tamen a clementioribus est inci-
piendum, vt sunt duo superiora. In infantibus tamē omnia *Ab ætate*
sunt suspecta, nisi quæ sequuntur. Primò post rationem vi- *contra in-*
ctus nutricis debitam, capiti infantis sæpe admouentur se- *dicatio.*
men sesami mansum, vel medulla, seu interior pars ossium

mali perfici, vel frictio sæpe fiat carne porcina veteri cum
curi, decocta vino albo. Hæc conferunt ad dolorem, & im-
pediendum incrementum, quamuis omnes ferme cutanei
morbi capitis impediunt epilepsiam futuram in ipsis. Cū
egroti nouem iam, aut decem annos nati sunt, fueritque hic
morbus confirmatus, & factus ab humoribus adustis simili-
ter, & crassis, cuti adeo contumaciter adhærentibus, vt in se
quippiam schirrosam habeant, hi post vacationem egent
medicamenti valentioribus, de quibus Gal. Paulus, & Ae-
tius locis iam dictis satis plene scripserunt. Inter quæ sal,
fæx vini adusta, & arsenicum laudantur, & alia his similia,
sequens tamen medicamentum spectatum & probatum est *Vnguentum*
in tinea, & aliis vetustis vlcereb. ℞. vtriusque hellebori, sul- *præstantis*
phuris viui, atramenti, auripigmenti, calcis viuæ, vitreo- *simum.*
li, aluminis, gallarum, fuliginis, cineris clauellatarum. an. ʒ.

DE CVRAND. MORB.

*Vnguen-
tum, mii.* s. argenti viui extincti, viridis æris. an. 3. ij. fiat ex his puluis,
& cum sequentibus misceatur. ℥. succorum borraginis, sca-
biosæ, fumi terræ, & lapatij acuti an. 3. j. s. bulliant omnia, &
adde facis olei antiqui 3. iij. aceti 3. ij. picis liquidæ 3. ij. ce-
ræ, quod s. misce, & fiat vnguentum quo sine dubio curabi-
tur hic morbus, dummodo post curationem ipsam fiat bis
saltem in anno corporis euacuatio, ne natura assueta emit-
tere a toto ad caput, iterum expellat. Hoc quoque vnguen-
tum est optimum ℥. gallarum 3. iij. seminis cuscutæ 3. ij. ar-
senici rubri, aristolochiæ an. 3. iij. salis armoniaci, fuliginis
furni, sulphuris, amygdalarum amararum, colocynthidis, ra-
dicis papaueris, foliorum fici, foliorum oliuæ, radice arun-
dinis viridis, aluminis, siephimentitæ, mirræ, aloes, oliba-
ni an. 3. j. s. fiat ad formam vnguenti cum aceto ad solem.

Historia. Hoc quoque est probatum, & habet minorem vim, & in-
trepide potest medicus uti eo: ℥. cineris capillorum huma-
norum 3. j. corticum auellandarum combustarum 3. j. s. facis
olei 3. iij. mellis sine spuma 3. iij. mirræ 3. j. s. aloes 3. s. cro-
ci 3. iij. misce, & fiat vnguentum. Primum ex tribus iam di-
ctis est potentius, & eo liberata fuit quædam iuuenis, quæ
quatuordecim annos laborauit hoc morbo.

*Curatio
cum pileis* Curatur etiam hic affectus a multis doctoribus, & a no-
tris fœminis nouem pileis, hac forma. Accipe pannum cœru-
leum laneum, super quem extende picem nigram, & resinam
pini, & impone capiti raso, actu calidum: ibiq; adhæreat no-
uem diebus, deinde violenter extrahatur pileum adeo, ut pil-
li euellantur saltem vulsellis, quas vulgo pinças vocamus,
vel aliis ferreis instrumentis: postea lauetur caput decocto-
rerum dictarum, addendo parum hedere: deinde imponatur
secundum pileum eadem forma: & eodem modo imponatur
tertium, & quartum, vsque ad nonum, seruando eundem or-
dinem, & modum in omnibus. Curabitur dubio procul, &
forfan perpetuo habebit pilorum glabritiem, non secus ac
si esset verum caluitium: semper tamen saltem per annum
ab hac curatione fiat frequens corporis purgatio.

*Curatio
pediculorum
victus
ratio.* Pediculi interficiuntur, & prohibentur ne fiant: primò de-
bita ratione victus per ea, quæ bonum gignunt succum, &
sanguinis corruptionem impediunt, & excrementorum au-
gmentum: quare nimia copia ciborum, & eos immoderatus
sumendi ordo nocet, similiter & ocium, & alia multa: de qui-
bus in libris de tuenda sanitate, & libello de bono & malo
succo agit Galenus. Secundo per sectionem venæ iecora-
ræ, præcipue si sint rubri pediculi, aut corpus sanguineum.

Tertio

Tertiò vacuantibus materiam putrem, a qua fiunt, per me- *Purgatio.*
dicamenta propria humori, præcedenti illius concoctione
per accommodata medicamenta: de quibus omnibus j. cap.
dictum est: semper tamen prius est cognoscenda causa per
sua signa. Quandoque sola vestium mutatio satis idonea est
ad curationem morbi huius. Quartò post vacuationem cu- *Balnea, et*
ratur balneis aque marinæ, vel decocti lapathij, hederæ, ab- *lotiones.*
sinthij, lupinorum, & similium. Quibus si addas parum hel-
lebori & staphisagriæ, maior vis meriti balneo, seu lotioni.

Multa sunt, quæ pediculos necant, vt argentum viuum *Necantia*
mixtum cum sanguine porci, & adnotum scapulis, & parti *pediculos.*
mediæ inter thoracem & ventriculum. Hoc vnguentum po- *Vnguentis*
tenter eos necat, si cum zona imponatur corpori, maxime si
partes multæ corporis eo vngantur: ℞. olei ʒ. iij. Mercurij
extincti ʒ. j. ceræ ʒ. ss. misce, & fiat vnguentum.

De dolore capitis à quacunque causa contingat. CAP. IIII.

Dolor capitis, quæ cephalalgiam Græci vocant, bar- *Descriptio*
bari sodam, affectus est caput infestans, qui si diutur *& diuiso*
nus sit, cephalea appellatur: graue quidem malum *doloris ca-*
est, & quod vel leui occasione vehemētes excitet accessiones, *pius.*
ita vt neq; strepitum, neque vocis vllius vehementiam, neq;
splendorem tolerare possit infirmus: sed obscuritatem, tran-
quilitatēque intra cubiculum quærat, idque ob doloris ve-
hementiam: quippe malleo se nonnulli percuti arbitrantur,
alij caput distendi, alij aliter affliguntur: idque aut media
solum capitis parte, & hemicrania dicitur: aut omnibus si-
mul, atque adeo vel intra caluariam, vel extra, quod inde di-
iudicare poteris. Quibus enim intra caluariam morbus est,
iis ad radices oculorum morbus porrigitur.

Prouenit generatim hoc malum, aut ob nudam intempe- *Causæ ge-*
riem, aut ob succorum redundantiam, aut ob intemperiem *nerales.*
simul, & succorum copiam, nonnunquam per consensum a-
liarum partium: sæpe etiam a causis externis (quas procatar- *Causæ so-*
cticas dicunt) vt vstione, frigore, ictu, & ebrietate, aliisque *lius intem-*
huiusmodi. Si ab intemperie sola acciderit, à frigore qui- *periei.*
dem, atque calore obortus capitis dolor vehementior erit,
ab aliis qualitatibus remissior: aut fortasse nullus, nisi frigo- *Signa so-*
ri aut calori coniungatur. Communem autem notam habe- *lius intem-*
bit a quacunque fiat intemperie, quod nulla aderit grauitas *periei.*

in capite: quæ semper, cum ab humore sit capitis dolor, adesse solet. Si a succorum redundantia contingat dolor capi-

*Causa fan- tis, si quidem a sanguine, causam habet immoderatam vi-
guinei do- ctus ratione in sanguinem generantis, vel quod ab euacua-
loris. tionibus, & exercitiis, aliisque rebus eius copiam minuen-*

*Signa fan- tibus cessauit infirmus: cognoscetur id per has notas, rubor
guinis. in facie adest, & oculis: venæ distenduntur, non maiores tã-
tùm, sed etiam minores adeò, vt quæ præ tenuitate nullam
sui phantasiam præbebant conspicuæ fiant. Pulsus magnus
vehemens ac plenus, vrina subrussa, & crassa, dolor capitis*

*Causa do- grauans. Si a bile, hunc efficere possunt capitis dolorẽ, quæ-
loris biliq- cunque immoderate vniuersum corpus, atque adeò caput
fi. & calfaciunt, & siccant, & bilis insuper copiam coaceruant:*

*cuiusmodi sunt ira, dolor, sollicitudo, vigiliæ, labor, exerci-
tatio, inedia, abstinẽtia, cibi bilem procreantes, ætas vigẽs,
hominis temperamentum biliosum, æstas, atque alia id ge-*

*Signa bi- nus. Qui sic affecti sunt, dolore acriore, magisque pungen-
tiosi dolo- te, quam superiores tentantur: os his amarescit, siccũt, & ge-
ris. neratim omnia quæ bilem generare diximus, pro notis sunt:*

*quin ea quoque, quæ in iis quos calor solis infestat, reperiũ-
tur: accidit autem ipsis morsus interim maior, & pallor fa-*

*Causa do- ciei, siccitasque oculorum, & narium, & linguæ. Si a pituita,
loris à pi- quæcunque pituitam in capite coaceruant, hanc peperisse
uita. affectionem certum est, vt holera, fructus, pisces, lac, aër fri-*

*Signa pi- gidus, vitæque nullis negotiis impedita, ac deses. Quæ o-
mnia considerare oportet, & insuper ægri temperamẽtum,
mua. ætatem, anni tempus, & faciei alborem, vt ab his in morbi*

Quando notitiam deducamur. Demum si a melancholia: causæ, & si-

*est per cõ- gna ex capite de melancholia petenda sunt. Si per consen-
sensum a- sum dolor capitis fiat, a ventriculo, vt plurimum oritur, sæ-
liarum pe etiam ab aliis partibus, vt vtero, hepate, & splene: vbi cõ-*

*partium. sideranda sunt signa, quæ primogeneam affectionem ab ea,
quæ per consensum est, distinguunt: ea sunt, quod pars quæ
per consensum aliam infestat, prior ipsa laborat, & pro mo-
do intensiõis & remissiõis eius morbi, quæ ipsa afficitur.
Illa similiter, aut intentius, aut remissiùs affligitur: adde
quod hæc iugiter, illa quæ per consensum & sympathiam
ægrotat, non necessariò semper, sed per interpollationẽ con-*

*Causæ & dolet. Affectiones verò, causæ, & signa partium, a quibus per
signa dolo- sympathiam caput laborat, ex propriis capitibus desumen-*

*ris capitis da sunt. Si a causis procatarecticis, nempe ab vitiõne, aut ca-
a causis lore. Causas ex sermone laborantis venabimur, cuiusmodi
externis. sunt longior in sole mora, aut in balneo, ira, exercitium, rerũ*

cal

calidarum, odoramenta, & flammæ vicinitas. Indicium laborantium, cute attactu calida, & primo statim manus injecta aridior quam primum elucet. Sic præterea affecti, præsertim qui ob ardorem laborant, rubris admodum sunt oculis. Si ab aliis fiat causis externis dolor capitis, eadem utemur methodo, causas ab ægro exquirêtes. Quibus scitis, morbus proculdubio constabit.

Curatur sex remediorum generibus dolor hic, si à sanguine sit: primo victus ratione frigida, & sicca, videlicet acie (si sanguine naturalis non sit) arte refrigerato herbis, floribus, & aquis *doloris*. cum aceto, ytrofis, myrto, plantagine, violis & similibus. *Ci- Victus*. bus sit frigidus, & qui paucum generet sanguinem, ut sunt, lac amygdalarum dulcium parum tostatum (ne oleum earum noceat capitis) priscina hordeacea cum iure pulli gallinacei, si opus fuerit, lactuca cocta, & postea cum aceto rosato, similiter cucurbita, & cichorea, & similia maximè conueniunt. Quæ sanguinem multum augent, & calefaciunt, nocent, ut caro & oua. Magis etiam quæ vaporosa sunt, ut vinum, eruca, sinapi, cape, & alia: prima mensa iuuant, quæ aluum lubricant, ut pruna damascena, & vux passæ sine granis. Secunda quæ prohibent vaporum ascensum, claudendo ventriculi orificium, ut sunt caro malorum cotoneorum saccharo condita, mala cotonea, & pyra tosta, & coriandrum præparatum.

Secundo, sanguinis missione, præcedenti ventris lenitione per hunc clysterem, vel similem. *Malvarum, foliorum violarum, siclæ, surfuris, mercurialis. an. m. j. fiat decoctum, de quo accipe vncias quindecim, cui adde olei violarum 3. j. olei rosarum 3. ij. cassiæ fistulæ præparatæ & diacatholiconis an. 3. j. salis 3. j. misce, & fiat clyster.* Facta iam ventris vacatione, scindatur, si fuerit plenitudo totius, mediâ vena, quæ rectitudinem habet cum capite, quia ad cephalicam terminatur & ab hepate vacuat per iecorariam, & mittatur sanguis respondens plenitudini. Si verò nō fuerit plenitudo totius, cephalica secetur, nisi ex suppressis mensibus, & hæmorrhoidibus dolor factus fuerit. Tunc enim Tibiæ, vel pedis vena incidenda est, secta vena media primo & secundo humerali, si oportuerit.

Tertio, repellentibus sanguinem fluentem ad caput potestate & actu frigidis, si fuerit in æstate, & æger iuuenis: & in hyeme & sene tantum potestate frigidis, qualia sunt aqua, aut succus rosarum, endiuix, portulacæ, lactucæ, plantaginis, semperuiui, solani, singula per se, vel mixta cum illis, aut

DE CVRAND. MORB.

cum aceto, & oleo rosarum suturæ coronali facta ratione sepe admoueantur, vel ab alto in modum torrentis impellantur ad maiorem penetrationem, quamuis Galenus ea in parte capitis statim sensit citissimam clarissimamque refrigerationem sola infusione rosacei frigidi. Hæc tamen repellentia, astringentia, & roborantia partem affectam, nocent, si fuerit febris. Inhibent enim transpirationem febrilis vaporis, augentque febrim: nocent quoque cum materia iam partem obfederit, quia ibi eam detinent. Denique si fuerit cephalalgia cum catarrho nocent, quia per compressionem eum augent.

Purgatio. Quarto, purgantibus bilem flauam turgentem, aut proximam turgenti medicamentis cholagogis. Pars enim calidior, & tenuior sanguinis in bilem conuertitur. Medicamenta hæc simplicia, & composita multa sunt, de quibus

**Salubria medica-
menta quæ.** capite i. egimus. Vnum tamen est maxime notandum, huic affectui præter naturam non conferre purgantia medicamenta vehementia, quæ malefica & insalubria dicuntur, sed

bona & salubria, vt cassia fistularis, manna Arabum, tamarindi, pruna damascena, rhabarbarum, & myrobalani citrina. Prima enim calefaciunt nimis sanguinem, & eum ad superiora mouent. Altera verò sanguinis feruorem tollunt, bilemque benigne vacuant: vt ℞. cassiæ fistularis recens extractæ, & medullæ tamarindorum, an. ʒ. ss. rhabarbari electi infusi per noctem in aqua endiuia ʒ. j. ℞. decocti florum cordialium, prunorum damascenorum, iuiubarum, & drachmæ vnius corticum myrobalanorum, citrinarum quod sufficit,

Potio. misce, & fiat potus, cui adde syrupi violarum ʒ. j. Si non possit bibere potum, vel amat magis pilulas, accipiat ʒ. j. pilularum de rhabarbaro, vel ʒ. j. pilularum de hiera. S. hæc purgant sine nocumento.

Pilulæ. Quinto, sanguinis missione ex vena frontis vacuante materia sanguineam a parte affecta, & materiam biliosam, & sanguineam in capite fixam digerentibus, seu clementer resoluentibus: qualia sunt foci capitis ex seminibus altheæ, fœnugræci, lini, floribus camomillæ, meliloti, & similibus in sufficienti aqua coctis. Oleum camomillæ, vel de semine lini, vel lumbricorum, si capiti admoueaturn idem faciet. Similiter si pullus gallinaceus, vel paruus canis, vel pulus columborum recens per spinam scissorum, vel pulmo arietis actu calidus.

Topica. Sexto, remediis frigidis sanantibus intemperiem calidam relictam in capite ab humoribus calidis: qualia sunt quæ

Aliatio. dix

diximus in tertio genere. Hoc quoque vnguētum erit optimum inter hæc genera remediorum. ℥ olei rosarum ʒ. j. olei violarū ʒ. ss. mucilaginis psyllij. ʒ. iij. aceti rosati cochlearium. j. ceræ quod s. misce, & fiat vnguentum.

Biliosa cephalalgia eisdem sex præsidiorum generibus cu *Curatio* ratur: primo victu refrigerante, & humectante, prohibente *biliosa.* generationem bilis, aut genitam temperante: qualis est vi- *Victus.* ctus febricitantium febre biliosa, frigidior tamen sit victu laborantium cephalalgia sanguinea.

Secundo, venæ humeralis sectione, præcipue si dolor sit *Reuulsio.* vehemens reuulsionis gratia, ne fiat inflammatio in membranis cerebri, minor tamen copia sanguinis euacuanda est in hac, quam in sanguinea.

Tertio, concoquentibus materiam biliosam medicamen- *Concoctio.* tis annotatis primo cap. & his: ℥ syrupi rosarum ʒ. iij. oxyfaccaræ. S. ʒ. ij. misce. Item ℥. aquarum cichoreæ, endiuia, & acetosæ, an. ʒ. iij. misce, vel ʒ. ix. decocti prædictorum, vel similitum medicamentorum.

Quarto, vacuantibus bilem medicamentis cholagogis, de *Purgatio.* quibus vide caput primum vt hoc. ℥. medullæ calliæ fistularis recens extractæ, & medullæ tamarindorum. an. ʒ. ss. rhabbari electi infusi per noctem in aqua endiuia ʒ. iij. squinantij. ʒ. iij. diaprunis solutij ʒ. iij. ss. syr. violarum ʒ. j. decocti horum cordialium quod s. misce, & fiat potus: vel si abhorret a potu. ℥. pilularum de rhabbaro, & affaiaret. an. ʒ. ss. diagridij. ʒ. iij. cum aqua buglossæ fiant pilulæ septē, & aurentur.

Quinto, & magis tertio post secundum genus repellenti- *Repellen-* bus & refrigerantibus frigidis etiam actu, de quibus dixi- *via.* mus in curatione sanguineæ cephalalgia: quamuis in hac frigidiora conferant.

Sexto, calidam intemperiem alterantibus frigidis, si accipi- *Refrige-* ti raso ex alto infliētis: qualia sunt iam dicta in curatione *rentia.* sanguineæ cephalalgia, & fortiora vsq; ad narcotica & stupefacientia tactū. His tamē caute vttere, ne noceas parti princi *Observa-* pi, & frigida, soporēque altissimū inducas, a quo pauci li- *tiq.* berentur, sed quomodo eis & quando sit vtendum, capite de curanda phrenitide demonstrabitur, & cap. de colico dolore. Naribus quoque sunt ad mouenda frigida, vt aqua rosata, & similia, non nostra camphora, quia calida est.

Pituitosa cephalalgia eisdem sex remediorum generibus *Curatio pi-* curatur. Primo, victu calefaciente, & siccate, vt aere æstiuo, *tuosa.* vel arte facto per ignem, ac suffitu cinnamomi, garyophyl-
lor

DE CVRAND. MORB.

Prædictus. lorum, & similium aromatum, vel anthos, vel calendula, vel aliorum similium. Cibus sit panis fermentatus & salsus, habens parum anisi: vel melanthij, vel saccari, vel sit bis coctus. Carnes sint musculosæ, & auium montanarum, & animalium, quæ exercitio vtuntur, & non sint pituitosa. Piper, & alia aromata maxime conferunt, & omnia calida, nisi vaporosa sint: vt allium, cæpe, & similia: hæc enim nocent, quia caput feriunt, & vapores sursum ferunt. Quare sinapi, eruca, & crocus (nisi in parua quantitate vt medicamenta) lædunt, pisces, herbæ frigida, & legumina, ciceribus demptis, & tandem pituitosa similiter nocent.

Concoquantia. Secundo apparantibus pituitam, attenuantibus, & incidentibus: de quibus. i. cap. vt hoc, vel simili. ℞. rhodomellis ℥.vj. oxymellis. S. ℥.ij. misce. Item. ℞. decocti saluæ, fœniculi & petroselini lib. j. ℞.

Præparanda. Tertiò, vacuantibus pituitam medicamentis phlegmagogis, de quibus cap. i. & hoc. ℞. diacatholiconis ℥.v. agarici trochiscati. ℥.j. diaphaniconis. ℥.ij. rhodomellis ℥.j. aquæ fœniculi. q. s. misce & fiat potus: vel si magis amat pilulas. ℞.

Observatio. pilularum assaiaret, & cochiarum an. ℥.℞. diagridij ꝑ.ij. cum aqua sticados fiant pilulæ septem: & aurentur, si fuerit diues. In hac cephalalgia bis & ter est necessaria purgatio, secunda vehementior prima per pilulas cochias, & tertia vehementior secunda per pilulas cochias, & fœtidas, vel de opoponaco, vel serapino, aut per potum ex electuario indo maiori, & hiera logodionis, & aliis similibus, præcedenti maiori concoctione ante secundam purgationem per syropos de duabus radicibus, & de sticados, & oxymelli compositum, & decoctum rerum calidarum: & ante tertiam purgationem præcedat maxima concoctio per syrupum de quinque radicibus, syrupum de sticados. S. & oximel squilliticum cum decocto rerum intense calidarum: vel aquis, vt sunt saluia, ros marinus, sticados, anethum, origanum, & similia. Et quia hæc cephalalgia diuturna est, præter has tres purgationes magnas, utilis erit, & necessaria purgatio frequens sine custodia, clementior siue per scrupulum vnum pilularum cochiarum factis tribus pilulis, siue per cochlearium electuarij indi maioris, vel huius mixturæ: ℞. diaphaniconis & diacatholiconis an. ℥.j. agarici trochiscati & turbit gumoli an. ℥.ij. electuarij indi maioris ℥.℞. rhodomellis. q. s. misce, & fiat confectio ad modum opiatæ.

Auentoria. Quarto reuellentibus, seu auertentibus deorsum pituitam, quæ sursum per impetum ruit: qualia sunt præterdicta tert

tertio genere, acres clysteres, & balani, seu suppositoria, de quibus capit. de morbo comitiali, & de apoplexia, & partiū extremarum dolorifica vincula, & frictiones valide, & lotio earundem partium decocto rerum capitalium: cuiusmodi sunt ros marinus, salvia, ruta, sticados, & origanum, & similia. Cucurbitulæ ceruici & scapulis affixæ sunt optimæ in hoc genere. Repellentia quoque remisse frigida, & calidis *Repellentia cum a-* astringentibus mixta sunt vtilia: & etiam in lethargo cum *stringentibus.* Galeno 13. methodi: vt ℥. aque rosarum ʒ. vna aceti ʒ. ss. pul-
ueris castorei ʒ. j. misce.

Quinto, particularis euacuatio post prædictas, & post *Deriuat-* primam purgationem est necessaria per loca propinqua par-
ti affectæ, videlicet per palatum & nares: qualia sunt succus siclæ, aut maioranæ naribus instillatus, vel puluis piperis, aut sæpe manducet ex sequentibus apophlegmatismis, seu masticatoriis. ℥. pulueris mastichis ʒ. ij. pyrethri, zinziberis, & galangæ an. ʒ. j. cum syrupo de sticade, aut aqua maioranæ, aut cera fiant globuli ad magnitudinem lupinorum. De his tamen capite de apoplexia copiosius.

Sexto, dissipantibus pituitam capitis, & corroborantibus *Discutien-* ventriculum, & totum corpus, ne iterum tanta copia pitui-
tæ gignatur. Electuarium, rosatæ nouellæ vel aromatici ro-
fati Gabr. vel diacimini multis diebus in aurora in quanti-
tate duarum drachmarum cum decocto, vel aqua, vel syru-
po capitali commendatur, dissipabit enim pituitam capitis. *tia, & ro-*
Idem facit diamusculus dulcis, vel amarus, vel theriaca ma-
gna, vel mithridatum. Hæc mixtura erit optima in hoc ge-
nere. ℥. diamusci dulcis ʒ. j. ss. diambra ʒ. ss. pulueris aroma-
tici rosati Gab. pulueris diagalangæ, & rosatæ nouellæ. an. *borantia.*
ʒ. ij. syr. de sticade q. s. misce & fiat confectio, cui adde theria-
cæ magnæ, & mithridati an. ʒ. j. dosis est cochlearium vnum *Mixtura*
cum aqua saluiæ, vel sticados, vel his simili. Parti dolenti ad-
mouenda sunt & vngueta calida, & forus ex decocto rerum *vilis.*
capitalium. Hoc vnguentum est optimum tunc: ℥. olei rutæ *Topica.*
& lauri an. ʒ. j. pulueris euphorbij, castorei, & sticados an. ʒ. *Inguen-*
ss. ceræ quod s. misce, & fiat vnguentum. In diuturno dolore, *tum.*
ne æger in pessimos cerebri morbos incidat, vel in suffusio-
nem (quam cataractam medici barbari appellant) venæ tē-
porum incidantur, sanguisque copiosè per eas egrediatur: *Auxilium*
hoc tamen auxilium, quanquam multis placet, mihi est sus-
pectum, quia periculosum est, & nostris temporibus inusi-
tatum. Et in eo vtile hoc potentiale causticum, si futuræ co-
ronali admoueatur. ℥. vnguenti rosati ʒ. j. cantharidarum
ʒ. ij.

DE CVRAND. MORB.

Cauteriu. 3.ij. pulueris sinapis, & stercoris colubini an. 3. j. misce. Hunc antiquum dolorem curant multa, & parua actualia cauteria aurium. Alij cauteria actu futura coronali admovent: hæc enim materiam partis dolentis extrahunt. Alij filo lineo, vel argento per cervicem traiecto, quod setale vocant, hunc dolorem antiquum curant. Oleum pyrethri & castorei, si capiti admoveatur, optimum est auxilium. Semen quoque rutæ cum castoreo, si cum vino & oleo decoquantur, & parti laboranti apponantur, erit præsens medicamentum. Idem potest efficere cataplasma ex cetræa, betonica, & branca vrsina, si cum vino & oleo fiat.

Curatio Cephalalgia, quæ fit ab atra bile curatur, quemadmodum *melancholice.* melancholia, de qua cap. 9. huius libri.

Curatio Cephalalgia per consensum totius, ut in febribus, vel partis alicuius, videlicet ventriculi, iecoris, splenis, vel matricis eius, quæ curatur per præcisionem causæ prius curato morbo partis sit per consensum. primò affectæ: nisi symptoma ad se curam trahat: horum tamen suis in locis fiet mentio. Sed quia frequenter fit per consensum ventriculi; tunc si sit multitudo bilis euaporantis, euacuetur. Et comedat panem succo malorum granatorum acidulcium, vel agrestæ, aut acetosæ intinctum, aut cum rob malorum cotoneorum.

Curatio eius, quæ fit ab æstu. Cephalalgia ab æstu curatur eodem modo, quo curantur cephalalgia sanguinea, & biliosa ultimo genere remediorum, Cephalalgia a casu, vel ictu, curatur primò tenui victu, prohibente generationem tumoris præter naturam in parte affecta.

Curatio eius, quæ fit ab ictu. Nutriatur ergo lacte amygdalarum, cucurbita, faccarum, caro condita, vuis passis, pyris, & cotoneis tostis: abstineat a carnibus & vino.

vel casu. Secundo, sanguinis missione per sectionem venæ mediæ, si fuerit plenitudo: vel humeralis, si non fuerit. Si vulnus sit, celsi docti chyrurgum. Si autem tumor fuerit absque vulnere, ab initio parti affectæ oleum rosaceum cum pulvere myrtilorum & rosarum est admouendum: vel mica panis cum aceto, & aqua decocta cum eodē pulvere: post tertium diem hoc medicamentum est necessarium. ¶ emplastri contra conuulsationem, & oxicroci an. partes æquales, extendatur super alutam ad formam datam partis dolentis.

Curatio eius, quæ fit ab ebrietate. Cephalalgia ab ebrietate quandoque in mortem terminatur, aliquando non: quare ea, quæ Arist. tertia parte problematum docet: sunt maxime animaduertenda. Aphorismus quoque sextus quinti libri, & quinquagesimus sexti libri non est tradendus obliuioni, videlicet si ebrius quispiam repente

ob

obmutuerit, &c. & quicumque sani dolore capitis, &c.

Curatur hæc cephalalgia primò tenui, aut tenuissimo vi- *frictus.*
ctu, & prohibente vaporum ascensum. Si vinum in ventricu-
lo sit, ipsum euomere est necessarium frictione, aut titilla- *vomitus.*
tione radicis linguæ, & oris: digitis propriis, aut calamo o-
leo madefacto, vel per potum vnciarum trium syrupi aceto-
si. S. vel per decoctum seminis raphani, aut seminis anethi
cum syrupo acetoso. S. Si per vomitum vinum non egeritur, *Potior*
tunc per vnciam vnam hieræ. S. aut vnciam semis diaphæ-
niconis euacuetur: deinde dormiat, postea balneum ingre-
diatur, & partes extremæ oppositæ vinculis & frictionibus
dolorificis afficiantur, vt ad se trahant atque à parte læsa re-
uellant: & oxyrhodinum hoc capiti sæpe apponatur: *U. a. Oxyrho-*
quæ rosarum ʒ. ij. olei rosarum ʒ. j. aceti ʒ. ss. misce. Brasicæ, *dinum.*
præcipue radix, prohibent futuram ebrietatem, & curant fa-
ctam. Vltimò alatur pullis gallinaceis, cum agresta, vel ace-
tosa decoctis pyris, & malis cotoneis toitis, & in fine mensæ
pulvere coriandri cum saccharo. Potus sit aqua decoctionis
coriandri præparati, aut brasicæ.

In cephalalgia tamen antiqua, siue continua, siue cum in- *Antiquæ*
termissione, necessaria est frequens purgatio per pilulas cle- *cephalal-*
mentes, seu benignas, quales sunt de Hiera. S. Galeni, & assa- *giæ cura-*
iaret & similes a cœna, vt vis earum citius & melius ad ca- *tio.*
put ascendat. Neque hoc pugnat Hippocrati, neq; Gal. licet
Fuchsius in suis paradoxis aliter sentiat: miscuit enim Gal. *Fuchsius.*
succum aliorum cum medicamentis caput purgantibus. Qua-
re Aetius sexto sermone dum minuit croci quantitatem in *Aetius.*
Hiera, quoniam caput purgat, nõ est laudandus, neque cro-
cus (vt ipse vult) caput multum percutit, cum, autore Pli- *Plinius.*
nio, qui crocum prius biberint, crapulam non sentiant.

De dolore capitis. CAP. IIII.

Scholium.

Dolor capitis, quem cephalalgiam.) Nomine capitis eas Caput
partes intelligimus, quæ cerebrum continent, proinde omnes siue quid, &
externæ, siue internæ sunt, considerandæ veniunt. Externæ sunt, Pili, cu- *partia eius*
tis, pinguedo, membrana carnosæ, et perióstion, quod in hac parte Peri- *partes.*
cranium appellari solet. Cranium est pars mediæ. Partes internæ sunt dis-
ta & tenuis meninx, cerebrum, cerebellum, glandula obis cunei. Nervi
orientes a cerebro, mamillares processus, & aliæ. Ex his partibus, quæ-
dam sentiunt, quædam sensu destituuntur. Non sentiunt pinguedo, cra-
nion et cerebrum, reliquæ omnes sentiunt. Quamuis de venis, et arteriis
controversia sit ob locum Gal. qui habetur 16. de usu par. cap. 11. vbi re-

n. 15

DE CVRAND. MORB.

nas & arterias sensu omnino expertes facit: ille tamen locus corruptus tibi apparebit, si legas eiusdem lib. cap. 2. ibi enim partes sentientes eni-
Dolor sym merans non amittit venas, et art. rias, sicut nec in multis aliis locis. Dolor
ptoma est. symptoma est, actio scilicet depravata sensus tactus, quia in eo obiectum
percipimus aliter atque est. Morbus, ad quem sequitur, est soluta conti-
Morbis. nitas, manifesta, aut occulta. Manifesta fit a rebus contudentibus, et
secantibus: occulta verò ab intemperie nuda, aut cum affluxu, dummodo
sit calida, aut frigida, quia humida et sicca medio alio inferunt dolorem:
fit etiam à tensione ab spiritu, aut humore facta. Quas omnes causas ad
duas possumus reducere, externas, & internas. Dolorem capitis Gal. du-
plicem statuit. 3. de loc. affect. cap. 9. distinctum ratione maioris, aut mi-
noris, unum recentem, qui cephalalgia, & alterum inueteratum, qui ce-
cōsideran- phalæa dicitur. In cephalalgia curatione hæc omnia considera. Primum
da in ce- à qua causa fiat dolor, ut ei prospiciamus: 2. an sit parribus externis, an
phalalgia internis. Quia si est in externis, facilius curatur, neque postulat ita re-
curatione. hemencia med. ut dolor à causa interna: præterquam quòd hic dolor re-
quirit ea med. quæ penurent. 3. An dolor sit proprius cap. hoc est exci-
tus à causa existente in cap. an vero sit per consensum: ita ut causa sit ex-
tra cap. in ventriculo, iecore, parte alia, aut toto corpore: hinc enim habe-
bimus cognitam partem, cui med. sunt applicanda. 4. et ultimum cui in-
tentos esse oportet, est: An caput sit laquidum, siue naturæ, siue occasione,
ita ut facile suscipiat causas dolorificas. An vero sit robustum, afficiatur
autem à magnitudine causæ. Hoc enim animaduersio intelligemus, an ca-
Sanguis put sit roborandū necne. Signa causarum doloris capitis in cōtextu leges.
Curatur sex remediorū generibus.) Sanguis si causa est cepha-
Quomodo causa sit lalgia, sua multitudine distendens venas id præstabit. Proinde alimenti
causa sit lalgia, sua multitudine distendens venas id præstabit. Proinde alimenti
cephalal- quantitas minuenda, ut paucus sanguis generetur, unde non video, quæ
g:æ. ratione exhibeat auctor victu frigidum, nisi ratione consuetudinis id fa-
Sanguinis ciat: non enim necessum est, ut plethora intemperies calida sit coniuncta.
missio. Secundo sanguinis missione.) Ante sectionem venæ oportet chy-
stere euacuare intestina, ne à primis venis substantia inutilis attrahatur.
In cephalalgia sanguinea complexus est affectuum, sunt autem affe-
ctus dolor, et plenitudo. Ex his dolor raro urget, ac proinde curatio à cau-
sa, plenitudine scilicet est inchoanda. Plenitudo euacuationem postulat:
cum autem ea quæ euacuant varia sint, inedia, frictio, balneum, purga-
tio, & sanguinis missio: quo ex his utendum sit, deliberamus ex methodo
medendi, quam doctissimè Ludovicus Collado præceptor ex variis Gal. lo-
cis in sua Isagoge ad faciendam medicinam nobis tradidit. Cum ergo ple-
Delibera- thoræ sit affectus magnus, non poterit inedia, frictione, aut balneo eua-
tio sangui- cuari, quia hæc sunt parua remedia: postulat ergo non purgationem,
nis missio- quia hæc cacochymia debetur: sed sanguinis missionem, quæ citò et mul-
tus. tum euacuat sanguinem redundantem: atque hæc est qualitas remedii.
Quantitatem eius ex affectu, anni tempore, ætate, & aliis colligemus.
Occasion

Occasionem ex absentia cruditatis ventriculi, & animi deliqui, quæ impellencia sunt. modum verò videnti (hoc est ex qua vena sanguinem mittere oporteat) colligimus ex loco affecto. Qui cum cerebrum sit, cephalicam secabis. vs. vnde male auctor basilicam incidere iubet. Quasi humeraria no etiam euacuet ex vena cava, ac proinde à toto corpore possumus etiam secare communem, quæ à capite et basilica euacuat. Si dolor capitis ex suppressione mensium, aut hæmorrhoidarum oriatur, distingues. Nam si causa in capite fuerit iam coaceruata, cephalicam secabis: & deinde prædictas menses euacuationes, sedato dolore. Si verò tantum fuerit consensus, ex crure secabis venam. Quod si dolor capitis sit cum mensium fluxione, tunc considera, an hæc euacuatio sufficiat ad plethoram deponendam. Si sufficit, non est secanda vena: si non sufficit, ex cephalica eam quantitatem sanguinis euacuabis, quæ vnà cum illa menstrua euacuatione plenitudinem satisficiat.

Tertiò repellentibus sanguinem.) Et si sanguis possit discutientibus euacuari, id non licet in principio, ne ipsum caliditate attrahamus: euacuabimus ergo medicamentis repellentibus. Si distillatio cum dolore coniuncta sit, considera an sit vrgens: si dolor vrgat, vtere repellentibus, si vrgat distillatio non his, sed frictionibus, ligaturis, & similibus. Repellentia autem bregmati applicantur, vt per suturas penetrant.

Quarto purgantibus.) Si cephalalgia sit à plethora, nulla caco-chimia coniuncta, non erit purgandum.

Secundò venæ humeralis.) Aliqui sentiunt in cephalalgia bilio- In biliosa sa non esse secandam venam: ne agrum ducamus in ebullitionem cholericorum, euacuato sanguine, qui est frenum bilis. Hos omittimus tanquam barbaros, in sanguinis missione non solus sanguis, sed etiam innatans bilis euacuetur. Nisi ergo multa sit quantitas bilis, & exigua sanguinis, na. in hoc affectu sanguinem mittimus, non vt bilem educamus, id enim purgatio præstat, sed vt reuellemus. Quia vna cum sanguine viscosa quantitas bilis effluens minuetur, & contrarium acquireret motum.

Sexto calidam intemperiem.) In biliosa cephalalgia aliquando cogimur importunam vigiliam, & magnum dolorem corrigere, sopientes facultatem animalem. Cauere tamē semper oportet, ne intemperiem contrariam frigidam inducamus: Vtemur ergo decocto lactucæ, & giliam. seminis papaueris, miscentes chamemelum, gariophyllos, aut cinnamomum ob penetrationem: hisque irrigabimus caput. Si hæc non possunt somnum conciliare, ad radices Mandragoræ, & hyoscyamum, aliæque fortiora, deueniemus. Vngemus etiam tempora oleo violaceo, aut papauerino, aut vnguento populeone, additis granis iii. aut iiii. opii, corrigentes opium oleo styracis, chamemelino & aliis.

Pituitosa cephalalgia.) Cum raro vires consent ob frigiditatem In pituitosi humoris, & cum cruditas sit in ventriculo, & habitus corporis: proinde in hac cephalalgia sanguinem non mittimus. Coquenda ergo est cruda lalgia non disas

DE CVRAND. MORB.

mittimus dices primarum venarum rhodomelle, oxymelle simplici, & mulsa, cum sanguine decocto faniuli, capillorum veneris, & siechados in paucā quantitate.

Purgatio. Ea cocta purgabitur pilulis ex hiera, ex hiera etiam & mulsa. Cruditatem vero venae causa fortioribus cocoquimus, syrupis de hysopo, serpillio, sicados: coctione apparente, valentioribus purgabimus, ut docet auctor.

Dolor capitis per consensum. Cephalalgia per consensum.) Dolor capitis aliquando contingit ob consensum totius corporis, qualis est ille, qui in febribus potissimum biliosis excitatur, utilagines enim tenuis facile caput petunt. Distingues ergo de febre, est enim intermitteus, aut continua. In intermittenti dolor capitis in hora accessionis exaceratur. Tuncque non oportet caput irrogare oxyrhodo. Quia eius frigiditas detinebit vapores, qui post accessionem dolorem conservabunt, qui solet rursus cum accessione cessare, ac proinde evacuatione non eget: nisi voluerimus eo perdurante uti fritionibus crurum, & ligaturis. Si febris sit continua, aut habet dolorem criticum, aut symptomaticum. Si dolor est criticus, non est sedandus: si symptomaticus, disingue. Si dolor incipit rursus cum febre, curandus erit sectione venae, & repellentibus, ne dolor attrahat humores ad caput. Si vero dolor non incipiat cum febre, sed post primam aut secundam accessionem: si cessante exacerbatione cessat, non erit curandus: si non cessat, curandus erit ob causam praedictam.

Cephalalgia a casu.) Aliquando in parte interna capitis dolor excitatur ex casu, cui admirabile est medicamentum à Guidone descriptum. Quod ex iure gallinae, aut (si est pauper) decocto intestinorum, aut ventriculorum (vulgo malcuinae) constat. In quo atterendus est panis, fiat cataplasma, cui misce pulverem ex rosis, mirillis, coriandro praeparato, baccis lauri, gariophyllis, cinamomo, loto odorato (vulgo creoul) & alis calidis.

De Phrenitide. CAP. V.

Descriptio & divisio. **P**hrenitis inflammatio est cerebri, aut membranarum eius, cuius tres in universum ponuntur differentiae à Gal. pro numero principum cerebri facultatum.

Sedes cerebri diversitas laediscribit. Prima est, cum sola laeditur imaginatio, quae in priore ventriculo sedem habet. Secunda, cum ratio illaesis aliis corumpitur, quod in medio ventriculo fit. Tertia, cum memoria amittitur manente & imaginatione, & ratione, qui morbus posteriori cerebri parti inest, quae omnia fulsissime à Galeno tractantur iij. de loc. affect.

Actus. Comitatur autem phreniticus per vigiliam: nonnunquam tamen inquietus, & turbulentus quidam somnus ita ut subinde exurgentes exiliant, & vociferentur. Caeterum si sanguinea sit phrenitis ridetes delirant: si biliosa, velut furore quodam perciti sunt. Qui pleniotem signorum notitiam desiderat, adeat Paulum lib. 3.

Oritur

Oritur autem phrenitis, aut à sanguine exuperante, aut à flamma cerebri substantiam, aut meningas eius imbuente. Nonnunquam per consensum à ventriculo fit, aliquando à toto, vt in febribus, & paraphrenitis vocatur.

Morbus igitur hic incipiens quinque auxiliorum generibus curatur: primo victu tenui refrigerante, & astringente, vel aqua hordei, prisana hordeacea, aut succo malorum granatorum, vel limonum, aut lacte amygdalarum tostarum: cucurbita saccharo condita, radice buglossæ condita, pyris, aut malis cotoneis tostis, vel lactuca, aut cichorea cocta, & cum saccharo & aceto preparata. Abstineat omnino a vino, & carnibus, bibat aquam hordei, nisi facultas esset imbecilla, tunc enim ius pulli, aut gallinæ teneræ est necessarium: in declinatione quoque & vinum bene dilutum aqua. Aer si frigidus natura non est, arte refrigeretur & humectetur aqua rosarum, aceto, floribus, & herbis per aream sparsis. Obsecutus quoque sit, diuersi enim colores & figuræ nocent. Astantes blandè eum alloquantur, quandoque tamè acerbius ipsum increpare debent.

Secundo auertentibus, vt cephalica secta, si non fuerit plenitudo: nam si adsit, media aut cubiti vena hepatica est secanda. Aliquando etiam tibiæ, aut pedum venæ sunt secandæ, videlicet si ex suppressis mensibus, aut hæmorrhoidibus genita fuerit phrenitis. Præter primam sanguinis missionem sæpe necessaria est secunda, & tertia, vbi fuerit plenitudo, & morbus post primam & secundam sanguinis missionem augetur. Perpetuo tamen robur virium sit præsens, quo deficientes vel si ætas fuerit ante decimum quartum annum, vel post septuagesimum, sanguis extrahatur per cucurbitulas cum scarificatione inter scapulas appolitas, quamuis præsentem roborem virium extra hanc ætatem possit secari vena. Auertunt quoque cucurbitule sæpe ceruici, scapulis & partibus inferius admotæ. Similiter frictiones, & vincula artuum & partium extremarum, & lotiones tibiæ decocto rerum partim attrahentium, partim inducentium somnum.

Vacuatio quoque per medicamenta cholagoga præcipuè salubria, & benigna auertit: vt hoc. ℞. medullæ cassiæ fistulæ recens extractæ, & medullæ tamarindorum an. ʒ. iij. rhabbarbari electi infusi per noctem in aqua endiuivæ ʒ. iij. syr. violati ʒ. j. decocti florum cordialium, quod s. misce, & fiat potus. Si fuerit magna copia bilis, medicamenta purgantia valentiora, vt (electuariū de succo rosarū, & diaprunis solutiu) erūt necessaria, vt quinto genere auxiliorū dicemus.

DE CVRAND. MORB.

- Repellentia.* Tertio, repellentibus materiam fluentem, qualia sunt oxyrhodinum ex parte vna aceti, duabus olei rosarum, & quatuor aquæ rosarum, & alia: de quibus capite de sanguinea. aut biliosa cephalalgia dictum est. Hæc omnia sincipiti sunt admouenda, vel ab alto infligenda, aut collo pannus lineus madidus liquore repellente est circumponendus, vt impediatur motus, & ascensus humorū. Omnia tamē hæc ante mutanda sunt, quam incalescant. An verò intense frigida actu oporteat esse, an remisse, dictum est capite de cephalalgia sanguinea. Odera frigida naribus adiungatur sæpe, vt aqua rosarum, acetum, violæ, myrtus, nenuphar, santali, & similia.
- Admonitio.*
- Odores.*
- Corrigentia intemperiem.* Quarto, corrigentibus calidam intemperiem a bile, aut sanguine bilioso relictam, & laxitatem viarum per quas ascendit: quæ sunt frigida & astringentia omnia, vt syrupus rosarum, de agresta, granatorum acidorum, & cotoneorum cum duplo aquæ rosarum, aut portulacæ, aut plantaginis, vel solani. Hæc & similia sumantur mane, aut post cœnam, vt petant citius caput cum vaporibus a cibo elatis. Sincipiti quoque & fronti sunt admouenda dicta capite de cephalalgia sanguinea, aut biliosa.
- Digerentia.* Quinto, digerentibus & vacuantibus materiam, quæ in meningibus superest, per ea quæ bilem purgant, si non suffecerit prima & vnica purgatio (de qua in secundo genere diximus) secundo per similia, vel valentiora medicamenta cholagoga fiat vacuatio sumptis prius medicamentis concoquentibus bilem: qualia sunt iam dicta in superiori quarto genere remediorum. Capiti quoque ad materiam euacuandam, resolucendo admoveantur tertia quaque hora pulmo arietis calens naturali calore (si fieri possit) aut pullus gallinaceus, capo, canis paruus, catulus, aut columbus per spinā sectus, & exenteratus, habens tamen calorem aliquem vitalem: etsi supra hæc animalia sic parata apponatur parū pulueris sequentis, erit efficacius remedium, somnūque inducet. ℞. florum camomillæ, & meliloti an. p. ij. rosarum, violarum, & coriandri præparati an. p. s. corticum papaueris albi 3. iij. contundantur omnia. Hæc resoluentia non conferunt, nisi in vigore & declinatione: ante tamē vigorem in ipso incremento est optimum auxilium ex alto in caput instillare lac humanum, aut caprinum actu calidum.
- Topica.*
- Puluis.*
- Admonitio.*
- De curatione symptomatum huius morbi.* Et si vigilie fuerint immodicæ, vt sæpe sunt, præsertim in biliosa phrenitide, ex alto infunde capiti hoc decoctum. ℞. hordei sine cortice ʒ. j. coriandri præparati, & corticum papaueris albi an. ʒ. s. florum camomillæ, rosarum, & violarum an. p. j.

p.j. radicis iuschiami 3.ij. fiat decoctum cum libris tribus aquæ ad dimidium. Quia per vigilias febris & inflammatio *Vigilia.* augentur, facultasque omnis soluitur, summa cura oportet *Decoctio.* somnum conciliare: præter iam dicta primò temporibus, & futuræ coronali admoendum est vnguentum populeonis: secundò in cœna vtetur iure pulli gallinacei, si opus fuerit, cum lacte drachmæ vnius seminis papaueris albi. Tertio naribus sæpe instilla oleum violaceum, aut papauerinum cum granis tribus, aut quinque opij. Quarto admoueatur ano suppositorium mellis cum paucò opio.

Quinto, & vltimo: cum alia iam dicta non suffecerint, & morbus fuerit acutissimus, bibat drachmam semis vsque ad drachmam vnā philonij Romani, dummodo non sit defectus caloris innati: quia ab his & similibus medicamentis narcoticis interiùs sumptis extinguitur paucus calor. Hæc ta- *Narcoti-* men & similia ante annum sunt pessima, & post annum, quo *ca quæ* antiquiora, tanto meliora: vt docet Galenus duodecimo *meliora.* methodi.

Ischuria, seu vrinæ suppressio est alterum symptoma hu- *Suppressio* ius morbi, cuius curatio capite proprio tradetur. Vnctio ta- *vrinæ.* men radicis penis, & pectinis oleo scorpionum cum cuniculi pinguedine, & citillatio eiusdem penis promouet vrinam suppressam. Eandē suppressam mouent parietaria, & apium, & alia diuretica vino cocta pectini admota.

Paraphrenitis est delirium non continuum, sed cum in- *Paraphre-* termissione, symptomaque febris ardentis, & non inflamma *nitidis cu-* tio facta, sed hrens. Hæc febrem nostri medici proprietariam, *ratio.* seu habentem prauam & veneficam qualitatem appellant: cuius symptomatis curatio similis est ferme curationi phrenitidis, cum quæcunque curant morbum factum, curent & fientem mitioribus tamen auxiliis hic affectus indiget. Maior & prior cura est adhibenda febrī tanquam causæ, quam *Febris* affectui: nisi symptoma ad se curam omnē traheret propter *prius cur-* sui magnitudinem. Animaduertendum tamen est, ne victus *randa, si* sit tenuis, vt in phrenitide absoluta, quia hæc febris propter *nil obstat.* malignitatem suam venenatam facultatem, & spiritum vi- *Obserua-* talem resoluit.

Quare maiori copia alimentorum eget, qui enim viriliter comedunt, liberantur melius a peste: nutriatur ergo laboras hoc symptomate iure gallinæ cum aqua carnis & succo agrestæ, aut acetosæ, aut malorum cotoneorum, aut limonum, aut citri. Si fuerit magna imbecillitas, vtilis & necessarius erit hic, aut similis huic clyster nutriens, & refrigerans,

DE CVRAND. MORB.

- Clyster primus.* & purgans. ℞. iuris pulli gallinacei decocti cum hordeo sine cortice lib. i. cassiæ fistularis preparatæ (si sit alius dura) ℥. j. olei violarum ℥. iij. sacchari rubri ℥. j. mucaginis psyllij aqua rosarum extractæ ℥. ss. vitellorum ouorum numero 2. misce. Præter repellentia & reuellentia, siue per sanguinis missionem, siue per purgationem, & alia iam dicta superius: oportet humectare, refrigerare, & mundificare os & linguam primo lacte amygdalarum dulcium, siue saccharo, & coctione: deinde mucagine semini psyllij, & cotoneorum aqua rosarum extracta, his sæpe & similibus os obluatur. Ad totius refrigerationem, & humectationem utile est electuarium diatrium santalorum, aut diarhodonis abbatis, aut diamargaritonis frigidi, si mane cum aqua endiuia aut buglossæ, aut iure pulli gallinacei refrigerato, hordeo sine cortice, aut lactuca, aut alia simili herba frigida sumatur aliquot diebus. Cor omni tempore, etiam ante vacationem (quia non potest obstructione laborare, ut aliæ partes) hoc epithymate refrigeretur sæpe, atque adeo in horas: ℞. aquæ rosarum ℥. iij. aquarum acetosæ & buglossæ an. ℥. ij. aceti albi ℥. ss. pulueris diamargaritonis frigidi & santalorum omnium an. ℥. j. misce. Ad calorem febris remittendum, & corroborandum, & resistendum præuæ qualitati & venenosæ est optima hæc confectio coratilis: ℞. theriacæ de citro ℥. j. ss. confectiois de hyacintho, & requiei magnæ an. ℥. iij. conseruæ acetosæ buglossæ an. ℥. ss. pulueris diamargaritonis frigidi, & coralli rubri preparati an. ℥. j. margaritarum electarum ℥. ss. foliorum auri numero 2. syrup. acetositatis citri. quod s. misce, & fiat confectio. Cuius dosis est cochlearium vnum omni hora cum aqua acetosæ, aut rosarum, aut buglossæ. Si fuerit pauper sola theriaca de citro erit bona. Similiter ad eundem affectum, & ad sitim conferet sæpe, præcipue ventriculo vacuo, bibere aquam decocti hordei cum hac mixtura: ℞. iulep. rosarum ℥. iij. syrupi acetositatis citri ℥. ij. misce. Aut cum hoc condito, ℞. conseruæ rosarum ℥. ij. conseruæ acetosæ, violarum, & nenupharis an. ℥. j. conseruæ borraginis ℥. ss. sacchari, quod satis est, misce, & fiat conditum auro cooperitum.
- Epithy-
ma.*
- Cardiaca
confectio
diuinibus.*
- Pauperi-
bus.*
- Mixtura.*
- Conditum.*

De phrenitide. CAP. V.

Scholium.

Delirium.

Phrenitis inflammatio est cerebri.) Delirium (quod ex primo prærhethico. com. i. insania dicitur) comprehendit sub se delirium in melancholicis, & furentibus, phrenitidem & paraph-

phrenitum, quæ ex consensu aliarum partium fit. Phrenitis, de qua modo disputamus, duobus sumitur modis. Primo largè, ita ut 1 ypho- Phrenitis
 uariam etiam comprehendat, quæ est delirium cum inclinatione in som- duobus mo-
 num. De qua loquitur Hippocrates. 3. Epyd. par. 3. sent. 45. cum sic scri- dis sumi-
 it. Nullus autem phreniticorum vehementer insanit, ut in aliis: sed tur.
 lia quadam veternosa in somnum delatione, capite grauati moriebantur. Eodem etiam loco sent. 62. sic habet, Soriebantur in primis phre-
 nitici, cum enim haberent, ut Galen. ait in comm. caput affectum per se, facile illud suscepit humores crudos, qui tunc abundabant, à calore ad
 psium delatos. Hunc affectum nempe delirium cum inclinatione ad so- Phrenitis
 num vulgò appellamus modorrha, aut modorrilla. De hac phreniti- quid.
 de impropiè, quæ non est inflammatio, non disputamus modo: sed de
 altera quæ proprie phrenitis dicitur. Hæc nil aliud quàm delirium con-
 tinuum cum febre acuta. Delirium genus est, quo communicat cum aliis deliriis, illa dictione continuum, differt phrenitis à paraphrenitide, hoc est à delirio, quod in accessionibus febrium, pleuritide, peripneumonia, & ex vaporibus calidis ab ore ventriculi ad cerebrum ascendentibus contingit. Ultima definitionis parte phrenitis distinguitur à mania, & melancholia. Vallesius 3. epyd. par. 1. comm. ultimo existit- Vallesii
 mat de essentia phrenitidis non esse delirium continuum, quoniam hoc lapsus.
 interruptitur aliquando, neque semper æque sit, quoniam agrotus ad mentem redit. Hoc colligit ex Hippocrate, qui supradictò loco agens de agrote in Dealcis hortio habitanti, quarta inquit die vigilauit, delirauit aliquantulum, quinta non dormiuit, delirauit septima: similiter octaua dormiuit, intelligebat. Hic homo phreniticus erat, & ante solutionem morbi intelligebat, ergo non est necessarium ut phreniticus semper deliret. Ad Galenum autem (qui phrenitum delirium continuum habere scribit) respondet, dici continuum, quia reditus ad mentem non habet certas intermissiones, & statos periodos, certè vir aliqui doctus non rectè considerauit phrenitidis essentiam. Si enim delirium ex inflammatione sequitur, perseverante inflammatione quomodo intermitteret, non erit continuum? Tum si phrenitis non est delirium continuum, quomodo distinguetur à paraphrenitide? Neque id rectè ex Hippocrate deprempsit, nūquam enim Hippocrates intermittere delirium in phrenitide scripsit: & si in illa sententia id voluit, non erat vera phrenitis, sed paraphrenitis. Quod si sit phrenitis illa, de qua loquitur, ut reuera est, non etiam rectè colligit, quia Hippocrates illa dictione (intelligebat) significat agrotum parum delirasse, id colligo ex die. 11. in qua agrotus omnino, aut ut Vallesius vertit, semper mente constituit: si omnino, ergo ante delirium remissum fuit, sed non omnino. Phrenitis symptoma est in actione læsa princeps: Morbus, ad quem sequitur est inflammatio cerebri, aut membranarum an sit morbius: ubi per inflammationem tumorem præter naturam intellige, non bus, an quolibet, sed eum, quem Erysipelas appellamus, in eo enim humor symptoma.

DE CVRAND. MORB.

putrescens cerebrum calefacit, & delirium excitat continuum ob caloris perseverantiam: sic febris ob puridos vapores cordi communicatos.

An cere- Aliqui contendunt cerebrum non posse inflammationem pati, quia est
brum pos- pars rara, sicut & pulmo, carens venis & arteriis. secundo ex Gal. qui
sit tumore tertio de Pres. ex pul. capite 8. pulmonem non posse affici schirrhosis sen-
affici. tit. Contrariam sententiam habemus ex Gal. 4. de Pres. ex pul. c. 8. ubi ce-
rebrum intemperiem cum fluxione & cura fluxionem posse pati scri-
bit. Inflammatio ergo potest esse in cerebro & membrana tenui. Qua
duæ partes adherentes cum sint, affectiones sibi communicant. Quod nō
est dicendum de dura meningē, quæ cum separata sit, sola potest affici,
neque cerebrum ei consentire. Quod si advertisset Vallesius, non scripsis-
set libro 5. epyd. posse esse inflammationem in cerebro sine delirio, ex co
quod in fracturis capitis viderit, inflammatione existente in dura menin-
ge, hominem non delirare. Rationes supradictæ nil concludunt. Prima,
quia pulmones ob raritatem raro Erysipelate afficiuntur: cerebrum ve-
rò, cum sit molle & non rarum, ea frequenter corripitur. Tum suppone-
rem falsam, cerebrum enim arterias & venas habet, sed paucas. Secun-

De phreni da ratione, etiam si ostendat Galenum existimare cerebrum, pulmones
tide ex se- schirrhosis non affici, reuera tamen mos est Galeni, id quod raro fit, contem-
pro trans- nere ac si nunquam contingeret: qua ratione quintanos circuitus non ad-
uerso orta. mittit, sicut neque schirrum in cerebro & pulmone: Cum reuera in his
partibus contingat, ut aliquando vidimus in pulmone arietis: & una
cum Ludouico Collado in hominibus anatome dissectis, raro tamen id e-
uenit, quia schirrhosis ex crasso sanguine generatur, & pulmo nutritur
ex sanguine tenui, & cerebrum ex humido: ac proinde Gal. non scripsit
simpliciter, non posse cerebrum & pulmonem schirrhosis affici: sed fortasse
nō posse affici: dicit quis, Si phrenitis est propria cerebri passio, cur Gal.
4. lib. de can. pul. cap. 14. phrenitim non solum ex tenui meningē, sed &
ex sepro transuerso ortum habere scribit? idem enim ut ipse met docet 5. de
loc. affec. capite 3. veteres septum appellabāt phrenas, quia hac parte in-
flammatione affecta phrenitis sequi solet. Vallesius ad analogiam id re-
fert, quæ est inter septum & cerebrum. Cuius sententiæ falsitas appa-
ret ex varia & distincta natura cerebri & septi, cerebrum enim totum
est spermaticum, at septum multa parte carnosum. Tum quæ similitudo
substantiæ est inter cerebrum & membranam. Quod si similiter id id
faceret, cur eandem non habet pulmo, & pleura, ex quorum inflamma-
tione etiam sequitur delirium? obiectioni ergo hac ratione satisfacere o-
porteret. Cum ea inflammatio quæ in sepro est, respirationem impediat (est
enim septum respirationis instrumentum) calor augetur in Thorace &
corde, sanguisque attenuatur & bile scit, eoque nomine cerebrum ascen-
dens herisypelas in eo generat: vel (quod idem est) phrenitim. Hoc s. de lo-
cis affec. considerans Galen. dicebat delirium factum à sepro, pulmone,
pleura, & orificio ventriculi differre, quod à sepro factum, sit continuum,
quod

Vallesi
lapsus.

quod verò ab aliis partibus excitatur, intermittat. Differt tamen septi-
 phrenitis, ab alia quæ primò in cerebro fit, quòd in hac statim apparet
 delirium: in illa verò, quæ ex septo pendet, primò febris ex inflamma-
 tione, & deinde delirium sequatur. Et ideo Gal. delirium ex septo ortum
 parum à continuo distare affirmat. ubi non negat esse continuum, cum
 eodem continuum faciat: sed parum à continuo distare, hoc est inter
 parum exiguum hoc esse discrimen ut diximus: quod vnum vna cum febre
 incipiat, & alterum parum post febrem. Quo tempore apparens conti-
 nuitatem, sicut & primum seruat. Vnde non est quod Valsius admo-
 neat Galenum, ut sileat illam dictionem parum, quæ (ut ex dictis pa-
 lesius mo-
 ret) necessariò scribi debuit. Causa phrenitidis est fluxio sanguinis biliosi nature se-
 ad cerebrum. Differentiæ phrenitidis tres sunt, quas hac ratione colligo. facit Ga-
 Cum phrenitis delirium sit, & delirium commune sit imaginationi, & leni.
 rationi, meritò vna differentiæ phrenitidis erit, cum delirium in imagi- Causa
 natione, & altera, cum in ratione reperitur, tertia verò, cum vtrique phreniti-
 actio læsa est. Inde colliges præsentì loco duos errores auctoris. Primam, dis & dif-
 cum memoriæ læsam differentiam phrenitidis appellat. Alterum col-ferentiæ.
 locans actiones principes in cerebri vetriculis, quæ in corpore eius sedem Duo læ-
 habent. Temperamentum enim cerebri tanquam animæ instrumentum psus au-
 illas actiones exercet. Etoris.

Morbus igitur hic.) Cum febris acuta in phrenitide sit, & sitis, Potus.
 non est quod aqua hordei maceremus ægrotantem, sed frigida simplici
 utamur. Et cum consuetudo in morbis sit seruanda, vinum bibant, pau-
 cum tamen & bene dilutum. Vtemur etiam carnibus, pullo scilicet gal-
 linæ solo, aut cum hordeo confracto (à nobis dicitur farto) lactuca,
 aut acetosa, quæ oxalis dicitur. In summa requirunt phrenitici victum
 frigidum, & humidum, aut frigidum etsi coniuncta habeat siccitatem,
 quia hæc debilitat agit.

Secundò auertentibus.) Cùm phrenitis sit inflammatio habens Curatio
 aliquid factum, & aliquid fiens, id quod sit, debet prohiberi ne fiat, & phreni-
 factum curari. Quæ omnia commodè in principio præstamus sanguinis dis-
 missione, quæ reuellit humorem aliò, & euacuat ex parte inflammata,
 inanis enim eius renis iterum remigrat humor ad eas. Debet secari
 cephalica, etsi sit plethora, quia rectitudinem seruans cum parte affecta,
 ex ea citam & multam euacuationem facit: hanc autem venam secamus,
 etsi fiat phrenitis ex suppressione mensium: quia ex Galeno reuulsio non
 est faciendâ ex loco, à quo fluit humor, sed ex eo, ad quem fluit. Iubet c-
 tiam auctor bis aut ter esse secandam venam, quando est plethora: qui
 ostendit se ignorare, sanguinis missionem in phrenitide tunc esse sisten-
 dam, quando non fluit iam multus sanguis ad locum affectum.

Vacuatio quoque per medicamenta.) In phrenitide medica-
 mento purgante non est vtendum, ut postea dicemus.

Tertiò repellentibus.) In principio phrenitidis debemus euacua-

DE CVRAND. MORB.

ye humore in parte affecta inclusum. Quod præter sanguinis missionem, præstat etiam medicamentum frigidum: hoc enim, ut auctor est Gal. 5. lib. simp. cap. 4. duplici ratione euacuat, primo, repellendo, secundo una cum calore multam eiacendo humiditatem. Repellimus ergo oxymethodino, (quod ex aqua rosarum, oleo rosarum, & paucis aceto constat) aqua sola cum aceto, succo lactucæ cum aceto, & aliis similibus, in quibus acetum misceamus, quia præter frigiditatem quam habet, sua partium tenuitate alia cum eo mixta medicamenta deducit, per bregmatis suturas, per quas non solum vis medicamenti, sed & eius substantia usque ad cerebrum penetrat.

Humorem Quinto digerentibus.) Materia, quæ in cerebro continetur, non ex cerebro purgatione totius corporis, quæ per aluum, aut vomitum fit, educenda est: non educi sed per proprios cerebri meatus. Quod in declinatione, in qua euacuatio-
ne. nis solius indicatio urget sere ab omnibus observatur, capiti applicantes digerentia. Hoc nos non laudamus, quia ex Galeno humor faciens Erysipelas, tenuis cum sit, facile dissipatur. Aliqui hoc medicamentum utun-

Examina- tur. ℞. capium papaveris numero 2. seminis lactucæ p. i. orticis radi-
tur medi- cis mandragoræ 3. j. florum cordialium 3. ii. chamemeli pug. s. gariophyl-
camerum. lorum numero 6. contundantur, & fiat pulvis: quem immixtum in pul-
monem arietis, aut intra columbum, & bregmati apponunt. Hoc medi-
camentum inutile est in declinatione, optimum tamen in augmento &
statio, cum repellat, somnum conciliet, & leniter digerat, quæ omnia in
statu desiderantur.

Vigiliæ Et si vigiliæ fuerint immodicæ.) In augmento phrenitidis di-
prospicien- bemus ob vigiliam sopire facultatem, quam in lethargo excitamus. Vi-
dum. gilia symptoma est ad se aliquando trahens curam, cum ita est im-
modica, ut deiciat vires: in ea enim ob perpetuum motum ad externa ce-
lidum innatum dissipatur, & una cum ipso spiritus. Decoctio ab auctore
re proposita optima est, adde tamen ei calenulam, gariophyllos, aut
aliud calidum, quod narcoticam vim medicamenti reprimat, & penetra-
re ipsum faciat. Lotio etiam pedum cum decocto soliorum lactucæ, capi-
tum papaveris crasse confusorum & chamemelo. Si hæc non prosint, re-
tere unguentis cap. de capitis dolore scriptis. Hæc etiam potio, quæ fre-
quenter vror, utilis est. ℞. emulsionem 3. j. seminis papaveris in aqua
nenupharis extractam, syrupi papaveris 3. j. s. confectiois de hyacintho
3. ii. cum aqua nenupharis q. s. misce, & fiat potio.

Peraphrenitis. Delirium in accessione febris ardentis à magna
fit caliditate, neque ibi est venenum, ut auctor existimat, cum sympto-
mata veneni absint. An verò caraiaca confectio hoc loco proposita ali-
quid valeat, ex his quæ capite de Syncope à me explicantur, intelliges.

De

LIBER PRIMVS. 29
De Lethargo. CAP. VI.

Lethargus, quem Latinorum nonnulli veterum *Descriptio.*
nominant, affectio est phrenitidi contraria: ab obli-
uione sic dicta, quod ea correptos rerum omnium
obliuio inuadat: vnde marcorem, & inexpugnabilem quan- *Diuisio.*
dam dormiendi necessitatem cum obliuione & alienatione
mentis eam dixeris, Lethargi (autore Aetio) duplex origo
est: quandoque enim a præcordiis, & visceribus per sympa-
tiam oritur: quandoque in cerebro primo incipit: ac qui-
busdam statim ab initio euenit, quibusdam non nisi ex acu-
torum morborum decidentia, præcipue ex phrenitide, vbi
ob medicamentorum stupefacientium vim ea cerebri pars
fuerit refrigerata. Sæpissimè etiam à febre synocha in Le-
thargum inciditur: & a pluribus aliis ægitudinibus, & ge-
neratim ab omnibus, quas ingêtes inanitiones cōsequuntur.
Sed nec obliuisci oportet, quod sæpe in singulis diuturnarū
febrū circuitibus ægrotantes sopor inuadit, quæadmodū in
quotidianis, hemitritæo, & quartanis etiā nōnunquā vsu ve-
nit. Fit hoc malum a putrescente pituita posteriorem cere- *Causæ.*
bri partem imbuente, & refrigerante, in somnos impellente.

Comitatur autem lethargicos lenta quædam febricula, *Signa.*
nec adeo vehemens vt ea, quæ, laborantes caro, præcedere
solet: quia in re lethargus & carus distinguuntur. Pulsus ho-
rum rarus est, magnus, & vndosus, spiratio rara & imbecil-
la. Somnolenti omnes huiusmodi sunt, desidiosi, ignaui in-
terrogantibus ægrè respondent: sunt etiam vsque adeo obli-
uiosi, vt ad meiendum sæpe excitati, porrectam matulā ma-
nutenentes obliuiscantur. Delirant porro, & expergefæcti
clamantes intuentur, sed illico ad somnum reuertuntur. O-
scitant frequenter, & quasi claudēdi oris obliti hiantes per-
sistunt. Supini iacentes ad pedes delabuntur, & increbrescē-
te morbo velut cadauera segnes decumbunt. Quibusdam
alius humidior est, aliis ita sicca, vt nihil reddat. Lotiū præ-
terea quale iumentorum esse solet, emittitur. Ad extremum
stertentes veluti sepulti arctissimo somno tenentur.

Curatur lethargus quinque remediorum generibus. Pri- *Curatio.*
mò, victu tenui calfaciente, & exiccante, vt aere calido arte *Victus.*
facto, si sit hyems, aut autumnus, suffitu rerū calfacientium,
sereno & lucido. Parietes quoque ardeant picturis diuersis
coloribus: nutriaur mulsæ, aut iure cicerū nigrorū, aut ptisa-
na hordeacea, cum decocto fœniculi facta, aut granis pineis
saccharo cōditis (est pygnonada Hispanis) aut cortice citri
cond

*Quæ ali-
menta no-
cant.* condito. Si facultas sit imbecilla, iure columborum & cice-
rum indigebit: semper tamen Aphorismum decimum octa-
uum primi libri sequere, considerando tempus, regionem,
ætatem, & consuetudinem infirmi. Omnia pituitosa alimē-
ta maxime nocent, & vaporosa præter porrorū barbas, quæ
si cum hordeo decoquantur, sunt optimæ. Inter cætera cæ-
parum esus copiosus magis lethargum gignit, vix quoque
recentes hunc morbum efficiunt. Potus sit decoctum cinna-
momi, aut seminis fœniculi, aut aqua mellis potens, videli-
cet constans quatuor partibus aquæ, & vna mellis, & hæc
erit nutrimentū optimum. Vinum maxime nocet, nisi in de-
clinatione, & in ægro imbecillo, & nisi sit debili stomacho.

*Auerten-
tia.* Secundò, auertentibus, vt sectione humeralis, au mediæ,
si sit plenitudo: extrahaturque sanguinis copia respondens
plenitudini & viribus: & quia semper reformidanda est cru-
ditas, ne sanguinis quantitas sit copiosa, diligenter observa-
bitur. Auertūt etiā & clysteres acres, de quibus capite de a-
poplexia, quamuis aliquāto mitioribus indigeat lethargus.
Cucurbitule scapulis admoveantur sæpe, & aliquando cum
sanguinis vacuatione, præsertim si æger fuerit iuuenis, &
sanguineus. Vincula & frictiones dolorificæ partium extre-
marum satis reuellunt. Vomitus sine violētia solius ventri-
culi auertit a capite, siue fiat sola frictione & titillatione o-
ris, & linguæ, siue oxymelle. S. cum decocto seminis rapha-
ni, aut anethi, vel cum syrupo acetoso. S. & eodem, aut simili
decocto. Vacuatio per Hieran. S. aut Agaricū trochiscatum
auertit satis, aut per vnciam semis diaphæniconis.

*Repellen-
tia.* Tertio, repellentibus actu calidis, quæ sint minus frigida
quàm in phrenitide, & primo & secundo die capiti, præci-
pue posteriori parti rasæ admoveatur oxyrhodinum ex ace-
to, oleo, & aqua rosarum: post secundum diem adde oxyrho-
dino pulueris castorei drachmam vnam, & semper iuxta se-
ptimum adde quantitatem eius, & loco olei rosati adhibe
oleum ex lilio, & parum aceti squillitici.

*Vacuan-
tia.* Quarto, vacuantibus materiam a capite per medicamē-
ta purgantia, præcedente prius cōcoctione syrupis, & aquis,
aut decoctis materiæ pituitosæ (de quibus caput primum
vide) videlicet vsu rhodomellis, oxymellis compositi, aut sy-
rupi ex hyssopo, aut ex stachade cum oxymelle squillitico.
Potio. Hoc, aut simili potu fiet vacuatio: ℞. diacatholiconis ʒ. v. e-
lectuarij indi maioris ʒ. iij. s. agarici trochiscati ʒ. j. rhodo-
mellis ʒ. j. decocti communis quod s. misce, & fiat potus. Ale-
xāder Trallianus solebat purgare lethargicos medicamēto:
℞.

℥. castorei ʒ. diagridij ʒ. ij. cum aqua, aut syrupo, vel decocto fiat potus, & post illum omnes termē auctores laudant illud, quamuis nostris temporibus minuēda sit quantitas diagridij, & augenda castorei, vt. ℥. pulueris castorei ʒ. j. diagridij g. vij. cū rhodomelle fiat pilulæ, aut potus. Ex hoc habemus medicamentū purgans bilem flauam, mixtū cum medicamento non purgante, fieri purgans pituitā, vt in superiori mixtura experientia docuit. Similiter purgatorium bilis mixtum cum purgatorio pituitæ purgat pituitam, vt in electuario indo scammonium mixtū cum turbit, & aliis purgat pituitam. Vacuatio quoque per loca proxima, videlicet *Deriuant* per nares & palatū est necessaria: quare sæpe naribus & palato admoueat parum huius decocti: ℥. pulegij, origani, stachados, rutæ an. m. j. sinapis, euphorbij an. ʒ. ij. fiat decoctum cum libra vna aceti ad tertiam partem. Intrudatur puluis hic naribus: ℥. Pulueris hellebori & condisci an. ʒ. ij. misce. Os & palatum sæpe fricentur mithrydato, & theriaca magna, & sale, hæc & similia in forma apophlegmatismi, & errhini vacuant materiam a capite per dicta loca, de his capite de apoplexia sermonem habebimus copiose: sed tamen *Apophle-* oportet scire, lethargum semper omnia remedia desiderare *gmatis-* re minora, tum quia minor est morbus, quam apoplexia, tū *mus.* propter febrem.

Euacuat & resoluit materiam sal cum milio bene tostus, *Observa.* calidus, & admotus capiti raso. Idem fiet hoc cataplasmate: ℥. caricarum p. ij. sinapi p. j. cum aceto fiat cataplasma. Cucurbitulæ bene ignitæ occipiti affixæ idem faciunt. Optimè quoque euacuat castoreum mixtum cum humanis capillis adustis, & aceto admotum capiti raso, & excitat a somno.

Eandem aut saltem parem vim habet hoc medicamentū: *Topica.* ℥. pyrethri, sinapis, scillæ an. ʒ. j. castorei, euphorbij an. ʒ. v. cum succo aphroditillorum, aut sampsuchi fiat cataplasma: si ante appositionem horum pili euellantur cum dolore, erit melius. Si morbus hic diuturnus fiat, ager multis diebus in aurora bibat tria, aut quinque grana castorei cum rhodomelle, aut syrupo de stachade, aut aqua saluiæ, aut sampsuchi: vel accipiat drachmam vnam mithridati, aut theriacæ magnæ, aut diagalangæ, aut diatrium piperum: post hæc & in vigore maxime confert balneum decocti rerum calfacientium, vt pulegij, thymi, roris marini, saluiæ, rutæ, & similiū. *Historia.* Obserua historiam Tralliani, quam Fuchsius lib. i. cap. 13. de *Historia.* morbis curandis refert.

Quinto, per ea, quibus symptomata huius morbi curantur, *Sympto-*

io. Quia in parte duos practicoꝝ errores collige, primū auctoꝝis, Ro- Duo pra-
tolerū & alioꝝum lethargum diuidentium in lethargum morbum, et le- Eticoꝝum
thargum symptoma. Si enim est actio laesa, quomodo erit morbus? secun- errores,
dum auctoꝝis, et alioꝝum etiam, qui ex phrenitide, cum in ea multum re-
frigeramus cerebrum, lethargum fieri dicunt. Si enim somnus ille sit re-
frigeratione cerebri, et non ab edemate, quomodo erit lethargus? Obiciet
nobis aliquis, in lethargo nonne pituita putrescens calorem concipit, quo-
modo ergo inclinationem ad somnum generat? Respondeo, lethargus est
intemperies cum affluxu humoris. Hic autem humor totus non putret, Morbus in
sed aliqua eius pars, reliqua suam seruat naturam. Pars quæ putret, lethargo.
vapores mittit ad cor paucos, & nonnil calidos, indeque ortum habet in
lethargo febris lenta. Reliqua verò pars, quæ non putruit, somnum in-
ducit refrigerando, & humectando cerebrum: hac enim ratione densa-
tur, & spiritus animales incrassantur, quo tempore liberè facultas non
potest alterare, ut ex 13. method. cap. I. colliges.

Secundò auertentibus.) Cum lethargus sit tumor præter natu- Sanguinis
ram, postulat in principio reuulsionem, & euacuationem: quod com- misio.
modè præstat sanguinis misio ex cephalica, quia rectitudinem seruat cum
loco affecto: et hac ratione citò & multum euacuamus. Neque est quod
timeamus cerebri refrigerationem, cum caleat à febre, & ab humore Repellens
putri. medica-

Tertiò repellentibus.) Repellimus in principio eo modo, quo di- mentum
ximus superiori cap. Aliqui diuidunt medicamentum repellens in illud
quod vere repellit, quale est oxyrhodinum, & in illud, quod improprie
repellens ab ipsis nominatur, eo quod unà cum frigiditate habet ali- Refutatur
quam caliditatem, quale est illud, quod cap. de phrenitide descripsimus, quidam.
eo contextu qui habet. Quinto digerentibus, &c. Hæc tamen diuisio ad
libitum est ficta, cum calidum non repellat, adde in principio inflamma-
tionis calorem nullum habere vsum: dices posse nos miscere calida ob pe-
netrationem: neque propter hanc causam licet, cum acetum frigidum e-
xistens id præstet.

Quarto vacuantibus materiam.) Cum medicamentum purgans In lethar-
non educat humorem in tumore inclusum, sed cum qui est in renis omit- go non pur-
tentum est, in declinatione ergo lethargi euacuandus est humor à capite gandum.
discutientibus, quæ aliquantulum vehementia debent esse ob humoris
crassitiem: huiusmodi sunt oleum rutaceum, de spica, unguentum Ara- Discussien-
gon, et Marciar. Vtemur medicamento purganti, quod per nares (errhi- tia.
num dicitur) euacuet attrahendo, ut est euphorbium, helleborum album
& alia mitiora, qualis est succus betæ, aut per os (apophlegmatismus
appellatur) quod præstabitur ungentes palatum hiera simplici: vel
cum ea aliquid ex euphorbio miscentes, medicamentum etiam mastica-
tum vile erit. Capiti pileos applicabimus ex rebus calidis mastiche
satureis, Gargophillis, corticibus citri, ruta, thymo, his pulueratis, &
cum

DE CVRAND. MORB.

cum 3. ii. pliris arctozicon Nicolai permixtis. His enim cerebrum corroboratur, & humor discutitur. Aut sacculos discutientes bregma i appone.

Somnus quid. Quinto per ea. Somnus naturalis à cerebro fit: hoc enim, cum requiescere vult, aut spiritus reficere, somnum inducit animalibus primo de caus. symp. cap. xli. Est ergo somnus naturalis quies facultatis animalis à cerebro inducitur. Quies est non omnimoda, sed per quietem intelligitur Gal. remissionem facultatis, reuera enim tempore somni descendit ad instrumenta sensus, et motus, sed minor. Hæc autem remissio à cerebro efficitur: unde male Arist. humiditatem constituit causam somnum efficiientem, cum ipsa potius sit causa iuuans: hoc superiori loco significauit Gal. Sic enim habet cerebrum cum quiescere vult somnum inducit, præsertim cū alirix in eo facultas humilitate fuerit instaurata. Male etiam Argenterius somnum dixit fieri à reuocatione caloris natiui, eo quod hic est instrumentum commune, cum instrumentum facultatis animalis sit spiritus animalis, & somnus in cerebro fiat. Maiorem videtur habere difficultatem locus Gal. 3. de caus. pul. cap. 9. ubi scribit, somnum fieri cum natiuus calor ad alimentum se conuertit: huic tamen loci satisfacimus, dicentes Gal. in eo non tradere causam somni, quam cerebrum esse docuit: sed tradere id quod in somno contingit, in eo enim fit reuocatio caloris consentiente facultate vitali, facultati animali: ut colligo ex 3. de caus. pul. cap. 8. in somno hoc naturali facultates naturalis, & animalis roborantur: naturalis, quia calor reuocatur, animalis, quia quiescit ab opere. In eo verò somno, qui præter naturam est, cum calidum innatum longo tempore priuatur motus ad exteriora, & perseuerantem seruet motum ad interna, suffocatur. Ac proinde huic symptomati occurrere oportet prætebit. Est autem somnus præter naturam longus, et qui difficilem habet reuocatur naturam ex pergefactionem. Fit autem à frigiditate, & humiditate. Humiditas n. grauat cerebri facultatem. Frigiditas verò, ut diximus, stupidum reddit cerebrum, ipsum condensans: & incrassat spiritus animales, & hac ratione impedit alterationis descensum. Excubamus ergo ex hac frigiditate & humiditate dormientes, calidis & siccis, & attenuantibus pituitam, & discutientibus eam: id præstabis decoquentes saturiam, rutam, thymum & alia cum aceto, & naribus inspirantes vaporem. Bregmati adhibebimus roguentum, ex oleo rutaceo, castorei, succo scilla cum cera constructum. His tamen medicamentis vtare in augmento, non in principio, ne attrahas ad partem affectam.

De Vertigine. CAP. VII.

Descriptio.



Um in morbo obtenebrationes, hebetudinēsq̃ oculis obuersionur, & omnia rotari & circumferri videntur, malum illud est, quod latini vertiginem, Græci verò scothoma appellant. Valeant ergo barbari, qui nodum in scirpo querunt, scotomiam a vertigine differre volen

volentes. Nam si discrimen vllum ponendum sit in affectio-
ne, non in omnibus erit constituendum. Vnde Gal. 4. de rat.
vict. in morbis acutis, commentario 43. differre inter se di-
non, & scodinon autumat: cum enim caput circumagi vide-
tur, dinos id est, vertigo vocatur affectio. Cum autem & præ-
ter id, tenebricosus fuerit aspectus, scotodinos, hoc est tene-
bricosa vertigo dicitur. Fit autem ob inordinatam spiritus *Causa,*
flatuosi motionem, qui vel in capite generatur, vel sursum
ex infernis extollitur partibus. Qui præter ea, quæ dicta
sunt, plura de vertigine volet cognoscere, adeat Gal. loco su-
perius citato, & 3. de loc. affect. nobis enim breuitatem affe-
ctantibus hæc satis sunt.

Curatio non potest esse eadem in omnibus, semper tamen, *Curatio in*
quæ humores, & spiritus immobiles reddunt, conferunt: vt *accessione.*
aër temperatus, aut frigidus, & obscurus, quies, cibus frigi-
dus, & astringens, excepta vertigine, quæ a pituita fit, quæ
calidis indiget cibus. Sit quoque tenuis victus, quia morbos *Victus.*
ex repletionem (cuiusmodi est apoplexia) gignit, nisi ex coitu,
& fame fiat, in quibus cibi boni, & multi sanguinis sunt ne-
cessarij. In omni vertigine nocent alimenta difficilis conco- *Quæ fun-*
ctionis, & vaporosa, & rerum aspectatio, quæ in orbem tor- *gienda.*
quentur, ante quæ celeriter mouentur, despiciere ab alto, &
ambulare per loca periculosa. Ira, tristitia, & timor maxime
nocent. In initio mensæ, quæ aluum molliunt, vt pruna da-
mascena, & passæ vix sine granis, sunt comedenda: in fine,
quæ os ventriculi astringunt, & impediunt assensum vapo-
rum: vt caro malorum cotoneorum cōdita, aut coriandrum
præparatum. Potus sit aqua ex cinnamomo, & aqua mellis,
aut aqua decoctionis coriandri, si fuerit à causa calida. Vinū
non bibat, nisi habeat vētriculum imbecillum, aut sit totius
corporis defectus. In accessione quies est necessaria, & frictio
partium infernarum, & odor rosarum, mirthy, & similium,
quæ spiritum animale quiescere faciunt. Si vero accessio *Remissio.*
fuerit magna, aut longa, vacuatio per acrem clysterem, aut
glandem fiat, de quibus capite de epilepsia, aut apoplexia di-
cemus. Aliquando in ipsa accessione est necessaria sanguinis
missio per venæ sectionem, vel per cucurbitulas cum scarifi-
catione, ne transeat in epilepsiam, aut apoplexiam. Extra ac-
cessionem, quando est ex sanguine præcedenti debita ratio- *curatio ex-*
ne victus iam dicta, fiet sanguinis missio per sectionem venæ *tra accessio*
humeralis aut mediæ, si sit magna plenitudo: deinde conco- *nem ex san-*
quatur bilis per duos, aut tres dies syrupo rosarum cum de- *gssine.*
cocto coriandri. Post hæc euacuetur bilis hoc, aut simili me-
dicam

DE CVRAND. MORB.

Purgatio. dicamento. ℞. medullæ cassiæ fistularis recens extractæ ʒ. ss. rhabarbari electi infusi per noctem in aqua endiuivæ ʒ. j. diaprunis solutivi ʒ. iij. ss. syrupi rosarum ʒ. j. aquæ buglossæ, quod simisce, & fiat potus: vel fiat vacuatio per ʒ. j. pilularum de rhabarbaro: vitimo fiat corporis refrigeratio, & partium corroboratio per electuarium diarhodon. Abbatis cum syrupo rosarum, aut aqua frigida, & altringente: & hepar vngatur ceroto santalato.

Ex bile flava. Quando fit a bile flava, eadem est curatio dempta sanguinis missione, quæ aut non fit, aut si fiat, minor copia sanguinis in hac, quam in sanguinea extrahatur.

Ab atra bile. Ab atra bile rarò, aut nunquam fit: si autem fiat, inquire eius curationem capite de curatione melancholiæ. Quum

Per consensum. est per consensum ventriculi, a quo sæpe nasci solet, vomitus statim est utilis, quem concitat decoctum seminis raphani, aut anethi, aut atriplicis cum syrupo acetoso. S. aut maiori, ubi opus est oxymelle. S. aut cum vncia vna oxymellis scillitici. Rarò in hoc morbo convenit vomitorium potentius,

Euacuatio quia nocet commotio magna. Deinde euacuetur humor, qui est in ventriculo, per propria medicamenta purgantia præcedenti concoctione per rhodomel, aut syrupum de hyssopo, aut oxymel compositum cum decocto, aut aquis conferentibus. Hiera. S. aut pilulæ elephanginæ, aut agaricus trochiscatus, aut diaphænicum, aut pilulæ stomachicæ optime euacuant materiam detentam in ventriculo. Tandem quæ ventriculum corroborant, conferant, siue sint interna, siue externa: de quibus cap. de curatione imbecil. ventriculi satis copiose dicemus. Mica panis cum succo malorum coroneorum sæpe comesta vetriculo vacuo vertiginem tollit.

Si fiet per consensum vteri, aut aliarum partium, suis in locis patefiet curatio.

A pituita. Vitiis. Concoctio. Quando est a pituita (à qua fit sæpe) post victum tenuem & calidum, secundo, decoquatur pituita per medicamenta dicta cap. j. incipiendo a mitioribus: ut est rhodomel, vsque ad valentiora: ut sunt oxymel compositum, syrupus de quinque radicibus, & oxymel scilliticum cum aquis, aut decoctis conferentibus.

Purgatio. Tertiò, vacuantibus pituitam curatur, qualia sunt: agaricus, turbit, Hiera. S. & comp. diaphænicum, electuarium indam, & pilulæ de agarico, & alia multa dicta cap. j. Sed quia hic morbus diuturnus esse solet, multis purgationibus est utendum, sumpto initio a leuioribus ad valentiora, præcedente semper concoctione apta, & debita. Hoc medicamen-

tum

um est medium: ℥. diacatholicon. ʒ. ʒ. Agarici trochiscati
 j. diaphanicon ʒ. ii. ʒ. rhodomellis ʒ. j. decocti saluæ, quod *Pilulæ no-*
 misce, & fiat potus. Hæ pilulæ, sepe deuorentur, sunt ethica- *bilissimæ.*
 es, valentque plurimum ad affectum hunc tollendum, & ra-
 icitus euellendū, caput & omnes sensus confirmant: ℥. nu-
 is muscatæ, cubearum, garyophyllorum, xylo aloes, masti-
 his an. ʒ. j. cardamomi, spicæ, seminis maioranæ, rutæ, pæo-
 iæ, siseleos, zinziberis, asari, piperis an. ʒ. ʒ. agarici electi ʒ.
 ij. colocynthidis ʒ. ii. myrobolanorum chebulorum ʒ. ij. sc-
 apini, hellebori an. ʒ. j. salis gemæ, nitri an. ʒ. ʒ. aloes hepa-
 cæ pondus duplum, fiant pilulæ cum benedicta. Harum
 osis est drachmæ vnus, & in vsu frequenti scrupuli vnus.

Vacuatio per loca propinqua, videlicet per nares, & pa- *Derivatio.*
 utum est necessaria in formis diuersis, de quibus dictum est
 ap. de cephalalgia pituitosa, & cap. de lethargo: copiosius
 amen dicemus de eis cap. de apoplexia, vbi nomina om-
 nium harum formarum, & barbara, & Latina indicabimus.

Vltimò, euacuanda est, & resoluenda materia capitis per *Resolutio,*
 interna, & externa medicamenta, & cerebrum corroboran- *corro-*
 tia: vt ʒ. j. theriacæ magnæ, aut mithridati, aut diatrion pi- *boratio.*
 peron, aut diagalangæ multis diebus sumpta cum ʒ. j. aquæ
 saluæ, aut stichados, aut roris marini, aut similis naturæ ca-
 pitalis in forma aquæ, aut decocti, aut syrupi. *Topica.*
 Cuiusmodi sunt oleo rutæ, aut laurino, aut costino, aut ex casto-
 reo. Emplastrum ex ruta, scilla, serpillio, saturia, & cepa cum
 nelle, & oleo camomillæ confectum capiti raso admotum
 cum lana succida omnem vertiginem tollit. *exemplum,*
 Quorundam experientia probatum auxilium est cauterium *exemplum*
 prædictarum partium. Passus est quidam vertiginem prope- *alterum.*
 modum insanabilem, amisso sere sensu cap. & cum immenso
 stupore ob frigus intensum, & post multa remedia, quæ ni-
 hil profuerunt, cataplasmate ex sola vrtica toti capiti raso
 per noctem admoto curatus est, factis postea multis ampul-
 lis plenis aquosa pituita, a quibus multa emanauit pituita.

De Vertigine. CAP. VIII.

Scholium.



Vm in morbo ob tenebrationes.) Cum visa indicamus Vertigo
 circumuolui, symptoma hoc à Græcis aynos, à latinis vertigo quid.

DE CVRAND. MORB.

di. iur. 4. acut. com. 42. cum autem tenebrosa simul coram oculis appa-
rent cum visus amissione, scotodinos dicitur affecti, a latinis vertigo te-
nebrosa. 4. aphor. com. 17. prædictæ duæ affectiones ratione maioris &
minoris distinguuntur: tenebrosa enim vertigo maiorem causam arguit,
Vertigo duplex. nempe bilem adustam. Vertigo aliquando in febribus euenit. 4. acuto-
rum sent. 12. conante natura humores euacuare, de qua non agimus mo-
do, sed tantum de ea, quæ cura febrem coniungit. Quæ vel fit ex proprio
capitis affectu, vel per consensum. Per proprium affectum fit, cum nu-
mer, qui causa est vertiginis, est in cerebro. Id deprehendes ex eo, quod
nullius partis affectu signum apparet. Per consensum, cum à ventricu-
lo, vtero, alia parte est prima mali origo, ut ex signis affectu partis co-
gnoscere poterimus. Vertigo est symptoma in actione laesa, deprauata sci
symptoma. licet imaginatio, quæ rebus quietam circumuolui indicat. Hoc symptoma
ex alio sequitur, quod est vitium excrementi, cum inæqualiter mouetur,
Lupeius spiritus flatulentus in capite. Unde intelliges non rectè colligere Lu-
reprehendi peccatum ex 4. acut. com. 42. ex sola ventriculi vellicatione fieri vertiginem:
tur. reuera enim illa vellicatio ex humore fit, ex quo excitati vapores verti-
Reprehen- ginis sunt causa. Neque existimandum est, ut fere omnes scribunt, ver-
duntur tiginem tunc fieri, cum spiritus flatulentus in cerebri ventriculis inæ-
alii. qualiter mouetur: sed opus est, ut ille spiritus descendat ad oculum, &
an. e humorem crystallinum motum illum exerceat: aliter enim non ap-
Causa mo- parebunt res in gyrum moueri. Causa istius motus aut est externa, ut
tus spiri- motus in gyrum, & vini potio: aut interna, quæ, ut diximus, vel est in
tus in ver- capite, aut in alia parte. Morbus, ad quem sequitur vertigo, est intem-
tiginis. peries frigida, in qua diminutus calor flatum excitat.
Vertigo à Extra accessionem quando est ex sanguine.) Cum omnis ver-
causa fri- tigo fiat à causa frigida 4. acut. com. 42. quia à calore diminuto spiritus
gula fit. eleuari solent: difficile certe videtur qua ratione plethora vertiginis cau-
sa sit, nisi dicamus id fieri, eo quod à plethora fiant interceptiones vena-
rum, hoc est repletiones, à quibus solet calor obrui, & spiritus non rectè
diffuari. Cum in vertigine sanguinem mittimus, Aetius præcipit euacua-
tionem acervatim non esse faciendam, quia vertiginosi facile concidunt:
quod non erit seruandum, cum sanguinis missio iacete homine exerceatur.

De epilepsia, seu morbo Comitali. c. viii.

Descriptio. **M**Orbus comitalis (quem epilepsiam Græci vocant)
concussio est omnium corporis partium non perpe-
tua, ut in emprostotano, opisthotano, & tetano con-
uulsionis speciebus, sed temporum interuallis accidens: ne-
que hac solum re ab illis differēs, sed mentis quoque, ac sen-
suum oblesione: ut auctor est Gal. lib. iij. de loc. affect. cap. v.
Diuisio. Cuius tres sunt differentie, quarum prima in cerebro per
primariam affectionem fit: secunda per consensum ab ore
ventre

entriculi: tertia, quæ tamen & ipsa raro accidit, cum à parte aliqua incipit affectus, post sentiente ægro ad cerebrum usque ascendit: ut in eo puero accidit, e cuius crure velut frigida quædã aura per coxam, & lumbos in caput tendens quotidie cerebrum afficiebat: visus quoque est (autore Paulo) morbus comitialis ab utero in quadam muliere, quo tempore uterum gerebat, qui post ædito fœtu quieuit. Omnibus tamen his formis commune est, quod cerebrum afficitur. Fit *Causa* utem hic morbus a crasso humore pituitoso, aut melancholico, spiritus animalis meatum, qui in cerebri ventriculis est, obstruente. Cum verò per sympathiam quis laborauerit, si *Causa hum-* nile quiddam cerebrum patitur, ventriculo a re aliqua in- *moris bilio* festato: nam ut singultire hunc cernimus, quoties aut cibum mole grauatur, aut putres humores ipsum infestant, ita *si per sym-* pathiam. *pathiam.* tiam & nervorum principium concuti credibile est, ut a se expellat, quicquid sit, quod a parte primo affecta ad ipsum fertur. Præcedit hunc morbum morositia corporis, atque nimis inconstantia cum motu minime voluntario, eorum, *Signa.* quæ perceperunt, obliuio, insomniorum visiones turbulentiæ, dolor capitis, & faciei pallor: lingua præter hæc, inordinate mouetur, quam etiam nonnulli mordent. Inuadente accessione statim concidunt, conuellunturque, nonnunquam tertunt, & circumaguntur. Præcipuum vero, ac maximum signum est oris spuma: nam cætera cõmunia sunt, & in aliis morbis. Obnoxij huic morbo ante omnes sunt pueri, & inter hos recens in lucem æditi, post hos adolefcẽtes, ab his ætate constantes, omnium minime senes & decrepiti. Hæc affectio proxima est apoplexiæ, cum idem locus utrobique laboret, & idẽ humor in causa sit: verum apoplexia ob omnimodam carentiam illius potentia, quæ ad nervos defluit: morbus autem comitialis, propter motum vitiosum generatur, ut habet Gal. ij. aph. com. xlv.

Morbus comitialis, si hæreditarius fuerit non suscipit *Curatio.* curationem: si non fuerit hæreditarius, & cerebrum primo afficitur, difficilis est curatu: præsertim si æger sit natus xxv. annum, affectusque fuerit ante illam ætatem simili, aut eodem morbo. Infans recens natus (cuius multi fratres in eadem, *Infantium* aut simili ætate perierunt epilepsia) præcedenti prius optima præuisione in victu materno, si ante primam lactationem *curatio præseruās.* parum huius mixturæ acceperit, liberabitur a futura epilepsia: ℞. sacchari optimi bene puluerizati ℥. ij. olei sisamini recentis, aut amygdalarum dulcium quod s. misce, & fiat confectio ad modum loch: quæ non solum ante primam lacta- *Confectio.*

DE CVRAND. MORB.

tionem, sed multis diebus est sumenda, semper tamen ventriculo vacuo. Aliqui loco olei ponunt butyrum recens, purgat hoc medicamentum prauos humores ventriculi, & intestinorum, a quibus prauī vapores ascendunt, epilepsiamque efficiunt. Paulus Aegineta infanti nato ante lac exhibet mel. Nostræ fœminæ Valentinae consilio medicorum ante lac etiam primum exhibent cum melle parum decocto puluerem radicis pœoniæ, & fel testitudinis, aut parum limoniatae smaragdorum.

Duo medicamenta præstantissima.

Ego sequutus multorum experientiam hæc duo medicamenta summopere laudo, primum bis, aut ter in die sumptum, alterum verò semel in hebdomada: hæc enim corroborant cerebrum, neruos, & ventriculum, & purgant ab eisdem partibus: ℞. limoniatae smaragdorum ℥.ij. pulueris radicis pœoniæ maris, & seminis eiusdem an. 3. j. coralli rubri præparati 3. ij. visci quercini, & cranei humani puluerizati an. 3. ij. pulueris vermium rubi, & succi rutæ an. 3. j. corn. cerui viti & vnicorni an. 3. ij. pulueris pullorum hirundinis adustorum 3. ℥. rhodomellis, aut syrupi de hyssopo quod s. misce & fiat confectio: ex qua sæpe accipiat infans quantitatem vnius castanæ. ℞. Hieræ picræ. S. 3. ij. agarici trochiscati 3. iiij. rhodomellis 3. iiij. misce, & fiat confectio. Dosis semel, aut

Clyster in accessione.

bis in hebdomada cochlearium vnum. Aliquando est necessarius hic aut similis clyster præsertim in accessione ipsa: ℞. decocti rutæ, saluiæ, & roris marini an. 3. iiij. s. olei rutæ 3. j. s.

Glandes.

hieræ logodionis 3. iiij. salis 3. j. misce, & fiat clyster. Glandes, seu suppositoria hæc & similia sunt optima: pulueris hieræ picræ. S. 3. iiij. salis gemæ 3. ℥. mellis quod sufficit, misce, & fiant duo suppositoria, aut tria. In ipsa quoque accessione frictiones extremorum, vincula dolorifica & cucurbitulæ scapularum sine scarificatione ante primum annum, & post

Avertentia, & reuellentia in accessione.

cum scarificatione maxime conferunt. Curantur quoque infantes hoc laborantes morbo cauteriis paruis auribus, & superiori parti ceruicis, quam nonnulli nucam appellant, admotis. Radix pœoniæ maris sc̃cta ad modum coronæ collo appensa præseruat ab epilepsia.

Diligentior cura in gratia.

Eandem aut similem vim habet corallium, aut lapis smaragdus, aut hyaspis viridis. At quia infantes, & pueri in nostra vrbe Valentia sæpe laborant hoc morbo, & pereunt, præter dicta in curatione, & præseruatione eorum, his decreui alia non pauca addere. Da infanti summo mane postpositum lacte, saltem iiij. horis, quantitatem vnius cicoris huius mixturæ, & liberabis eum ab epilepsia, Deo fauente: ℞. succi rutæ coch

cochlearium vnum, folia auri numero v. lapidis smaragdi
 preparati ḡ.x. misce. Eandem, aut maiorem habet faculta-
 tem notum Plinij auxilium, quod affert Antonius Cartha-
 ginensis, vermiculorum lanuginosorum in rubo repertorū,
 quorum tres aut quatuor lacte, vel aqua mellissæ simul de-
 coquantur. Prodest mirum in modum infantibus hoc medi-
 camentum, accipe cepe album perforatum, plenum theria-
 ca magna, & croco, decoctum in furno, & ab eo exprimatur
 succus: cochlearia tria bibat infans, reliquum in forma em-
 plastri vētriculo impone. Confert quoque multum huic in-
 fantili morbo 3.j. frequenter sumpta hieræ. S. cum decocto *Syrupus.*
 roris marini, aut saluæ. Summè prodest huic morbo puero-
 rum, ventriculo mundificato cochlearium vnū huius syru-
 pi. ℥. florum buglossæ, horraginis, rosarum, radicum, & se-
 minum pæoniæ, gentianæ, limaturæ eboris, vsnæ an. 3. ss.
 cranei humani 3. ij. croci. ḡ.x. fiat decoctum in libris iij. a-
 quæ ad medietatem, de quo colatō accipe libram vnā, &
 cum saccharo sufficienti fiat syrupus.

Si morbus comitialis fiat ex lacte in vētriculo infantium *Si ex lacte*
 coagulato, à quo symptomata veneni generantur, hoc cata- *coagulato*
 plasma ventriculo bis aut ter admotum deicit ventriculi *in ventri-*
 repletionem: ℥. foliorum vlmi p. iij. decoquantur in vrina *culo.*
 puerorum, & cum vnciis duabus butyri fiat cataplasma: pa-
 ris, aut maioris facultatis est hoc, ℥. foliorum maluarum,
 absinthij, & vlmi an. p. j. decoquantur in vrina hominis, &
 cum vnciis duabus butyri, & fermēti, & 3. j. olei nardini fiat
 cataplasma: quod ter admoueatur ventriculo ante, & retro.
 Sal cum melle deicit ventriculi repletionem, siue sit ex la- *Sal cum*
 cte coagulato, siue corrupto, vel ab alia causa, autore Gal. *melle.*
 v. de sanit. tuenda, & iij. de facultatibus alimētorum, cap. 14.
 Si mel & sal lacti misceantur, ipsius in ventriculo coagula-
 tionem impediunt: fallitur ergo Auicenna sen. 6. lib. 4. tr. 2. c. *Error A-*
 21. de congelatione in stomacho, dicens sal ita lactis coagu- *uicenna.*
 lationem, vel (vt ita dicam) caseationem efficere.

Si superioribus non euacuatur lac concretum in ventri-
 culo, neque eius symptomata finiuntur, præbe infanti 3. ss. *Potiones.*
 coaguli hœdi, aut leporis, cum aqua pauca calamenti. Aut
 da, præsertim grandioribus hanc potionem. ℥. Pulueris ca-
 lamenti 3. j. theriacæ magnæ, & coaguli hœdi an. 3. ss. aquæ
 rubeæ tinctorum 3. j. syrupi acetosi. S. 3. ss. misce. Hæc coagu-
 la, quamuis lac coagulatum non sit, id coagulant, coagula-
 tum verò dissolunt, & per inferiora, aut per vomitum de-
 pellunt, quemadmodum theriaca magna veneno affectos

e 3 curat,

DE CURAND. MORB.

- curat, & sanos veneno afficit. Hæc tamen theriaca magna sola (teste Gal. in libello de theriaca ad Pisonem) nocet pueris, præsertim calidis: quia superat vires caloris naturalis, & spiritus infantium, & multum lætificat, & cordis spiritus dissoluit: mixta tamen cū aliis, & eius parua quantitas dari solet audacter, præsertim in hoc morbo mortē denuntiante.
- Fœminæ* Valentina fœminæ ad decipiendam ventriculi infantium plenitudinem, & cruditatem exhibent mixturam seminis sinapis, milij, & sesami cum rhodomelle, & oxyfaccara composita, has non damno. Aliæ eis dant puluerem contra indigestionem, qui vulgò dicitur, la Pellejana, quia eius inuentrix fuit fœmina Valentina dicta Pellejana: constat medicamentis calidis, & ferri fece, quare has minus laudo. Aliæ præbent eis succum bursæ pastoris, quæ a Valentinis nominatur paxeripeu, hoc medicamentum restringit, & non purgat, nisi per accidens, ideoque has damno. Aliæ homicidæ imprudentes infantibus exhibent cerusam, aut argentum viuum, aut minium, quod medicamentum Betici vulgato prouerbio derident. Aliqui pharmacopolæ eos interficiunt medicamentis valenter purgatis, quos summe reprehendo, & pœna capitali dignos censeo. Aliquando infantes afficiuntur capitis vlceribus manantibus, & tumoribus aurium, & mandibularum: & aliquando per nares, & palatum mucorem, & excrementa pituitosa depellunt: per has enim vias cerebrum, & nerui deponunt excrementa, quæ retenta parere solent morbum comitiale. Quare errant imperiti medici, & fœminæ, dum hæc curare nituntur. Possem ego in præsentia exempla aliquot adducere, sed breuitatis causa prætereo.
- Grandio- rum cura- tio.* Si fuerit æger gravior iam factus, in ipsa accessione summo studio oportet statim eū excitare, ne pereat subito, aut in apoplexiam incidat: semper tamen considerandum est, an fiat per cōsensum ventriculi, aut aliarum partium: ut medicus possit iis partibus prius medicinā facere, de quibus suis locis dicemus. Quæ vero solent laborantē ex accessione excitare, & liberare, sunt vincula extremorū dolorifica, frictiones etiam illarū partium cū sale, & aceto, clysteres acres, & suppositoria valentiora, de quibus cap. de apoplexia loquemur: voces & strepitus magni excitat, quāvis maximī & repentini soni extra accessionem eam inuadere possint, & aliquando mortē inferre, ut cōtigit filio Matthæi de Gradi. repentino tubarum clangore. Conserunt quoq; in ipsa accessione in conspectū ægri litta magna lumine subito capite,

&

& corpore egri erectis, & apertis palpebris. Si vinciantur do-
 orifice testes ægroti fiet dubio procul, vt ab epilepsia exci-
 etur. Hoc quoque medicamentum sæpe naribus admotum
 dem efficere solet: ℞. succi Cyclamini, pulueris seminis ru- *deriuantia*
 æ, & coaguli leporis an. 3. ij. mouet enim sternutationem, &
 excitat: sed prius scindenda est vtraque humeralis, vel inter
 scapulas per cucurbitulas cum scarificatione sanguis est
 mittendus. Quod si prædictis non liberatur ab accessione,
 naribus impone sæpe parum huius pulueris: ℞. hellebori 3.
 j. castorei euphorbij, condisi an. 3. ss. misce, & fiat puluis.

Ioannes Agricola in lib. quem de Herbis inscripsit, cuius-
 dam aquæ meminit ex cerasæis, quam etiam multi experti *Aqua ce-*
 sunt, ipsius verba subiiciã. Ex cerasæis distillata aqua certissi- *raforum.*
 mum statim affert remedium, cum primùm in os epileptici
 iam paroxysmo correpti inditur. Vnde illicò reuiuiscit, & eo
 dem temporis puncto surgit liberatus, neq; vllò spasmo am-
 plius conuellitur, donec per cremētum noua materia aucta,
 vt fieri solet, alius paroxysmus oriatur. Elicitur hac arte in
 vas extillationi accommodū, imponuntur cerasa non multo
 ante decerpta, adhuc succi plena, fiat humoris intra cerasa
 contenti ex igne mediocri eliquatio, quem diligēter, vt rem-
 pretiosam, atque ære multo redimendam, curabis asseruan-
 dum, de quo in os epileptici paroxysmo laborantis coeffun-
 das 3. iij. aut plures, & statim inhibebis impetum violenti
 morbi. Considerabis tamen ex tribus crassorum generibus,
 ea esse ad hanc distillationem eligenda, quæ Valentinis di-
 cuntur reginals, dulcia quidem illa plus quam alia duo ge-
 nera, quorum alterū magis rubrum, alterum magis nigrum.

Extra accessionem si fiat a pituita, a qua fere semper de- *Extra ac-*
 pendet, curatur quinque auxiliorum generibus. Primò vi- *cessionem.*
 ctu calfaciente, & exsiccante, vt aere, natura, aut arte para-
 to, zinzibere, cinnamomo, gariophyllis, rore marino, itæca- *Vicius.*
 de, & similibus igni apposis, dum modo hæc non moueant,
 & detegant epilepsiam, qualia sunt pellis caprina, odor he- *Monemia*
 patis caprini, & suffitus cornu illius, lapis gagates ignitus *epilepsiam*
 naribus subiectus conuulsionem concitat. Hoc quoque facit
 suffitus sulphuris, apium, vt multorum est sententia, quibus
 videtur Plinius assentire, epilepsiam detegit. Contrarium
 scribit Gal. libello de puero patiente morbum comitalem,
 si Galeni sit. Suffitus ex galbano, & odor myrrhæ epilepsiam
 mouent, præsertim corpore non euacuato, quamuis non-
 nullis displiceat, cum apud eos maxime huic morbo conse-
 rant, præsertim in declinatione. Dioscorides tamen sentit

DE CVRAND. MORB.

myrrham calfacere, astringere, glutinare, exsiccare, & sopire: nonnulli sunt, qui affirmant prædicta & similia medicamenta in accessione ipsa conferre, & intermissione nocere, & detegere, vt dictū est initio huius capituli de theriaca magna, & de coagulo in lactis coagulatione. Cibus sit, qui bonum, & paucum, & calidum sanguinē efficiat, vt est ius pulorum columborum agrestium cum ciceribus nigris, & paucopipere: & quia solet esse diuturnus hic morbus, & eget multis euacuationibus, maiori nutritione & liberaliore opus est. Utatur ergo turture, perdice, pullo gallinaceo, gallina tenera, lepore paruo, & cuniculo: semper tamē parum piperis, aut cinnamomi, aut zinziberis addatur: aut cruca, aut sinapi melle conditum. Carnes arietinæ sunt bonæ, præsertim in Hispania: capita tamen arietum & hircorum pessima sunt, reperitur in eis succus putridus male olens, a quo forsitan fiet epilepsia. Coturnix noxia est in hoc morbo, & forsitan Arabes loco eius perdicem scripserunt, quāquam apud eos æquē perdix & coturnix nocent, quia solent laborare epilepsia. Similiter anguilla, pisces, legumina omnia præter cicera, herbæ frigida, lacticinia, & omnia vaporosa, & cepæ, allium, & quæ sunt difficilia cōcoctu maxime obsunt. Cōna sit minor prandio. Potus erit aqua mellis, aut cinnamomi. Si verò habuerit ventriculi imbecillitatem, bibat vinum optimum bene aqua dilutum per horā saltem ante potum. Immodica agitatio, & motus nocet præsertim a cibo, coitus quoque & animi perturbationes.

Remissio. Secundo, sanguinis missione (præsertim si sint signa sanguinis cum pituita) per sectionem duarum simul humeralium, & extrahatur sanguis respondens plenitudini. Si ætas & virium robur absint, extrahatur sanguis per cucurbitas cum scarificatione ex scapulis. Si ex suppressis mensibus, aut hemorrhoidibus genitus est hic morbus, venæ tibiarum, aut pedum sunt secandæ, in vere tamen magis conuenit sanguinis missio ad præseruationem.

Præseruatio. cum scarificatione ex scapulis. Si ex suppressis mensibus, aut hemorrhoidibus genitus est hic morbus, venæ tibiarum, aut pedum sunt secandæ, in vere tamen magis conuenit sanguinis missio ad præseruationem.

Concoctio. Tertiò, concoquentibus pituitam, vt rhodomelle, oxymelle. S. & comp. syrupo de hyssopo, de stachade, de duabus radicibus, oxymelle scilicetico, cum aquis, aut decocto capitali: videlicet, saluæ, pæoniæ, stachados, & roris marini, & similia. Hæc materia per multos dies est apparāda, primò mitioribus, secūdò post primam purgationē mediis, tertiò post secundam purgationē valentioribus, & si opus fuerit, quarto & quinto.

Purgatio. Quarto, phlegmagogis, de quibus primo capite diximus,

vt drachma vna hierę. S. cū drachma vna agarici trochiscati
facto potu cum decocto, aut aqua capitali, pilulæ elephan-
ginæ, de agarico, Hiera composita, benedicta, pilulæ masti-
chinæ, diaphænicon, electuarium vtrunque indum: pilulæ
cochiæ optime euacuant pituitam. His pilulis sine magna
custodia vti poterit: ℥. pilularum cochiarum, agarici tro- *Pilulæ ad*
chiscati, & pilularum assuariet an. ℥. ij. optimi diagridij. ḡ. *vsu.*
xv. cum aqua pæoniæ fiant pilulæ xv. & aurentur: ad vsum
tres pro dosi: aut si magis amat aliam formam: ℥. diacathe-
licon. ℥. j. ḡ. diaphænicon ℥. j. agarici trochiscati ℥. ij. electua-
rij indi maioris ℥. iij. pulueris rosarę nouellæ ℥. ij. rhodomel-
lis, quod sufficit, misce, & fiat confectio. Dosis semel in heb- *Confectio.*
domada cochlearium vnum.

Quintò, resoluentibus materiam reliquam, & cerebrum *Resolutio.*
calfacientibus, & siccantibus, & roborantibus, ne postea si-
mitem materiam generet: qualia sunt theriaca magna, mi-
thrydatum, & diamusculus dulcis, & pliris arcoticon, & con-
serua acori veri: quorum drachma vna multis diebus sum-
mo mane cum vinciis duabus aquæ, aut decocti, aut syrupi
capitalis sumatur, post primam & alias purgationes maxi-
mum in hoc genere auxilium erit.

Sequens quoque confectio est optima in hoc genere om- *Confectio*
ni hora sumpta, præsertim mane: ℥. limoniaræ sinaragdo- *optima.*
rum ℥. j. ḡ. diamusci vtriusque an. ℥. j. ḡ. theriacæ magnæ ℥. ij.
pulueris galangæ, calami aromatici, & radicis pæoniæ an. *Electua-*
℥. iij. cranei humani ℥. j. syrupi de stæchade quod satis est, mi- *rium mi-*
sce, & fiat confectio. Hoc electuarium est mirabile: ℥. pulue- *rabile.*
ris rosatæ nouellæ, & aromatici rosati an. ℥. j. ḡ. pulueris ca-
lami aromatici, & galangæ an. ℥. ij. pulueris cranei humani,
& coralli rubri præparati an. ℥. j. sacchari dissoluti in aqua
pæoniæ quod s. misce, & fiat electuarium in tabulis. Cura-
tur hic morbus radice eryngij cum melle condita, si multis
diebus comedatur: aut sequenti conferua: carnis radicis pæo-
niæ, & eryngij prius bene decoctæ lib. i. mellis quod s. misce,
& fiat conferua: adde pulueris galangæ, & calami aromati- *Radix e-*
ci, & cinnamomi an. ℥. iij. Nicolaus Florentinus vir magni *ringii.*
nominis nostris temporibus curauit nobilem quandam xl. *Conserua.*
annos natam, quæ ab infantia affecta fuit eodem morbo
(quod Gordonius tanquam difficile non credit) hoc medi-
camento: ℥. herbæ sancti Pauli, seu paralefis (hæc dicitur à
Gattinaria costus, seu pipella. & à Dioscoride Phlomis, &
est verbasculum) m. iij. & cum iusta mellis parte fiat confer- *Observa.*
ua, cuius cuilibet libræ adde pulueris gariophyllorum, py-
reth

D E C V R A N D. M O R B.

rethri, & radice pæoniæ an. 3. iij. Dosis est vnciæ s. cum aqua aut syrupo capitali. Vncia vna & semis aque herbe prædictæ cum paucis saccharo, si triginta diebus bibatur, curat hunc morbum. Eandem habet vim oleum terebinthinæ, si in quantitate medij cochlearij sumatur. Drachma vna frequentis pulueris est eiusdem ferme facultatis. ʒ. cinnamomi electi, galangæ, spicæ nardi an. 3. s. pulueris cranei humani. 3. j. s. misce.

- Cauteria laudantur.* Laudatum & expertum remedium in hoc sunt cauteria actualia, & potentialia sururæ coronali admota, euacuant à parte affecta. Probatum est aliquos epilepticos vulneribus capitis affectos, curatis vulneribus nūquam in morbum comitiale recidisse. Medicamentum ex scilla est in hoc morbo summum remedium, præcedenti tamen prius euacuatione cōsentanea, autore Gal. in libello de puero morbo comitali laborante, quod omnes post Galen. experti sunt. Accipe cæpe narcissi diuisum in partes minimas, ponaturque in vase vitreo, in quo prius mel conseruatum fuerit, luto, aut aut alia re bene obturato, & per quadraginta dies caniculares soli exponatur, & singulis quibusque diebus multum moueatur, & agitetur: quo tempore exacto, accipe liquorem ex scilla expressum, & cum sufficienti mellis quantitate fiat confectio. Cuius dosi in iuuenibus, & senibus sit cochlearium vnum in singulos dies: Puerorum verò dosi a quarto anno vsque ad decimum quartum erit dimidium cochlearij. Infantibus recens natis vsque ad quartum, & quintum annum minimè conuenit: illorum enim ætas non fert huius medicamenti valentem facultatem: neq; potest vacuationes necessarias prius tollerare. In periculosis remediis non laudo audaces medicos: hoc enim auxilio infantem, & canem recens natos subito mori vidimus.

De Epilepsia, seu morbo Comitiali.

C A P V T V I I I.

Scholium.

Duos modis fit Epilepsia. Vallesii lapsus. **M**ORBUS comitalis.) Cum Galenus Epilepsiam appellat conuulsionem, nomine conuulsionis motum conuulsuum intelligit. Epilepsia duobus modis fit: primo, proprio cerebri affectu, secundo per consensum: Vallesius lib. 3. de loc. affect. Omnem Epilepsiam ait fieri ab humore crasso obstruente cerebri ventriculos, ac proinde miratur qua ratione possit fieri per consensum. Non animaduertens solam Epilepsiam, quæ est propria cerebri passio, à diuersis humoribus fieri,

fieri, eam vero quæ per cōsensum fit à vapore, aut alteratione ad cerebrum ascendente, ipsamque irritate ad eius expulsionē. Est tamen aduer-
tendum epilepsia fieri ab humore crasso obstruente cerebri ventriculos, li qui ob-
non omnes, sed secundum aut tertium: nunquā enim fit, ab obstru-
ne anteriorum ventriculorum: ratio est, quia in epilepsia debet impediri in epile-
transitus spiritus animalis, quod in obstru-
rum non cōingit. Ex his multorū errores effugies. Primò Rōdoletii, qui Rōdolet-
epilepsia sentit fieri ex obstru-
bri ventriculis pituitā ad glandulā huic rei dicatā expurgans. Quoniam tur in duo-
eisi demus talem obstru-
detentā, cum non sit prohibitus transitus spiritus ad principium spinalis
medullæ, non sequetur Epilepsia. Secundus error est eiusdem existiman-
tis obstru-
fieri: reuera enim hoc repugnat naturæ humoris tenuis, qui penetrare
potest, & nō obstruere. Tum hoc etiā repugnat curationi eius epilepsie,
quæ est propria cerebri passio ab obstru-
nuantibus crassos humores, & incidentibus glutinosos perficitur, quorū
nullum humori tenui conuenit. Tertius error adhuc maior est Ioannis Langii er-
Langii, qui sentit Epilepsiam aliquando fieri ab obstru-
crasso orta. Quæ enim ratione vapor impedit transitum spirituum? E-
pilepsia proximè accedit ad apoplexiam, eo quod obstru-
le poterit crasso humore addito perfici. Aduenit hæc frequenter pueris, Epilepsia
cum septimestres sunt, & persuerat usque ad annos pubertatis. 2. aph. accedit ad
sent. 45. lib. 5. sent. 7. pueris aduenit frequenter ob voracitatem, & ro-
bur facultatis expultricis. Cessat autem in pubertate ob magnam mu-
tationem, quæ viris ab ætate et coitu contingit, mulieribus verò ex men-
strua purgatione. Post pueros frequenter hoc malum adolescentibus e-
uenit, omnia minime senibus, quia cum languidam habeant expu-
ltricem facultatem, non facile mouetur ad expellendum rei al cuius mo-
lestiam, quod Lupeius non animaduertit.

Morbus comitialis si hæreditarius. Cum sani homines sanos, Hæredita-
& agri agros generent. Epilepsia hæreditaria erit, cū patre, aut matre ria epile-
ea affectis, filius imbecillitatem capitis contrahit: hæc (quamvis ab psia.
autore incurabilis fiat) curari potest roborato capite, & optimo victu.
Præseruantur ab ea pueri, quorum fratres simili malo perierunt, mel-
le cum pauci fœniculo cocto & destumato, & postea permixto cum tio.
oleo amygdalarum dulcium. Mel enim cum fœniculo attenuat crassos
humores, & eos concoquit: oleum verò amygdalinum fluidā alium ser-
uat. Præterea ex medicamentis, quæ laudantur ab autore, primum ex-
hibendum nō est: quia si pueri exiguum alimentum, & si familiare non
possunt ferre in ventriculo, quæ ratione medicamentum ex tam variis
& multis inuicibilis rebus commixtum ferre poterunt? præsertim cum
supradictum ex melle medicamentum id efficiat. Tum si in effusis
nab

DE CVRAND. MORB.

habemus paratos syropos pituitam incidentes, & melancholiam attenuantes, ad quid cranium humanū, smaragdus pulvis vermium rubi, & similia? Certē hic, & similes viri, cū ad manum habeant medicamenta, vt admirationi sint, ad ea quæ difficulter parantur, & cum minori utilitate, ne dicam incommodo confugiunt. Secundum medicamentum auctoris, si in ventriculo non sit pituitosus humor collectus, optimū est. Tertium verò, quod incipit. *℞. succi rutæ, est omittendum: in eo enim auri folia inutilia, & smaragdus maxime lædens obstruendo, & incrassando humorem ingrediuntur, omittere etiam oportet Plinii me-*

Epilepsia dicamentum. Et in summa qui existimant aliqua esse medicamenta, quæ non habet epilepsiam curant occulta vi, decipiuntur maxime. Quia hic morbus manifestus est, nempe obstructio, aut res cerebro contraria: siue sit alterata toto tem-
cio, siue vapor, remedia ergo erunt etiam manifesta agētia, qualia sunt peramen-
illa, quæ morbo contrariantur.

to opesantia. Si morbus comitialis fiat ex lacte.) Epilepsiam ex lactis corruptione curabis, prius interdicendo lac, deinde purgando ventriculum puluere hieræ picræ, & rhodomelle, si validus puer sit, ita vt sit ʒ. aut ʒ. j. & s. pulueris, & rhodomellis ʒ. s. cum decocto fœniculi: in gran-
Epilepsia ex lactis corruptione. coriis puluere prædicto & terebentina ʒ. ii. cum decocto prædicto. Suppositorio reuellere poteris à ventriculo, ex ʒ. j. pul. hieræ. ʒ. Gal. faciens duo suppositoria in sufficiēti quantitate mellis, et addendo rnicique, si opus fuerit, salis gemmæ. ʒ. ii. Neq; opus erit vii coagulatis, cū habeamus oximel, Rhodomel, & alia similia lac coagulatum dissoluentia.

Plenitudo ventriculi. Valentinae fœminæ.) Hanc plenitudinem commodè deponemus hoc medicamento. *℞. hieræ. ʒ. Gal. ʒ. j. oxizacari ʒ. ʒ. j. decocti hordei, quod s. misce, & fiat potio.*

Extra accessionem si fiat.) ~~Omnia calida & euaporantia, quia calefaciunt cerebrum, & vapore illud replent, fugienda sunt.~~ Sanguis mittendus est ex cephalica, vt reuellamus à capite, & euacuemus ex cerebri ventriculis, venæ enim cerebri inanitate humorem attrahent ex eius ventriculis.

Euaporantia fugienda. Quintò, resoluentibus materiam.) Nullum præstantius remedium curat Epilepsiam, quā sit optima victus ratio, et locus etiam siccus. Quod si aliquis habeat Epilepsiam, cuius curationis nulla sit spes, huic opus erit tēpore veris sanguinē mittere ex parte longinquiori, ex pede scilicet vt reuellamus: tunc enim nullus est adhuc in capite affectus postulans euacuationem. purgatione etiā et optimo victu vrentes, accessio epilepsie, non ita frequenter, vt solebat, neq; cū tāta molestia apprehender.

De melancholia. CAP. IX.

Descriptio.

Melancholia quædam est mentis alienatio citra febrem ab humore melâcholico proueniens, qui mentis sedem, quæ cerebrum est, occupat, & eius temper

periem immutat. Trifariam ea fit, vt autor est Gal. Interdū *Causæ & diuifio.* enim vniuerso, qui in venis continetur, sanguine melācho-
lico affecto, cerebrum ipsum communem etiam totius cor-
poris noxam sentiens ob generale vitium afficitur: nonnun-
quam verò reliquo sanguine naturam seruante, & innocuo
existente, solus is qui in cerebro inuenitur, dignus est, qui
notetur, cū in melancholicam naturā sit alteratus. Quod
bifariam contingit: aut enim aliunde in ipsum deriuatur,
aut in ipsomet genitus est, cū videlicet internus calor, aut
bilem, aut crassum, atrūque sanguinē superassauerit. Quæ
sanē distinctio non parum ad curationem conducit. Si qui-
dem vbi vniuersus corporis sanguis melancholicus extite-
rit, auspicari curationem à sanguinis missione conuenit: vbi
verò solum is, qui in cerebro continetur: infirmus (quātum
ad hanc attinet dispositionem) secta vena non indiget, quā-
uis ob aliam causam secari possit, quod aut propter pletho-
riam erit faciendum, aut præseruationis gratia, vt Aetius
opinatur.

Est præterea tertium melancholiæ genus, quod à ventri-
culo oritur, medicis plerisq; hypochondriacum flatuosūm-
que nominatum, propter a scendentem in cerebrum melan-
cholicam quandam exhalationem similem ei, quæ oculorū
suffusiones inducit.

Opere prætium autem erit, communes primū notas re- *Signa com-*
censere, post ad peculiare deuenire. Sunt verò communes *munia.*
notæ, metus, tristitia, hominū odium & auersio. Variæ præ-
terea sunt melancholicorū imaginationes, alij se fictilia va-
sa arbitrantur esse, alij animalia bruta, alij mortem experūt,
quam sibi non rarò conseriscunt: simul etiam & perhorre-
scunt eandem, atque abominantur, quod admiratione ma-
gis dignum est. Nonnulli semper rident, Democritum imi-
tati. alij Heraclitum referentes, in perpetuo sunt luctu. Sunt
qui se Deo plenos, & cœlesti numine afflatos opinentur, fu-
turāque prædicere posse. Sed longum esset omnes horum i-
maginationes recensere, & longius multo omnium causis
reddere, cū hæc vna res ex earum genere sit, quæ fieri non
possunt. Verū si quis exercere se in hac contēplatione vo-
let, licebit sanē illi per me, verū ea lege, vt philosophiæ con-
uenientia dicat, verbi gratia siccitatem, in eo qui se testam
esse credebat, causam explicabit: in eo verò, qui se caput nō
habere arbitrabatur, & leuitatem, quam spiritus eleuatus
præstabat. In cuius curationem, præter alia dicitur excogi-
tasse Philotimus pileum plumbeum, cuius pondere oppres-
sus

DE CVRAND. MORB.

Signa par
iculata. sus caput se habere intelligeret: Iam ad peculiare notas ac cedamus. Eos qui per consensum, totius corporis melancholici sunt, hæc sequuntur, graciles sunt, macilentique, venas habent latas, hirti sunt, squalent, duri, nigri, aliquando rufi, nonnūquam flauī, denique vndiquaque & ex toto melancholici apparēt, idque aut propria natura, aut propter vigiliās, solitudines, iras, mœrorem, ciborum vsum & antea-ctam victus rationem, quæ ad torrendum sanguinem, & in melancholicum conuertēdum aptissima est. Quæ postquam optime consideraueris, cubiti insuper venam iecato, certissimam enim hinc coniecturam facies: secabis autem mediam, quod si emanans sanguis melancholicus sit, pro laborantis viribus educatur, si purus & syncerus, nequaquam: sumpto hinc argumēto, quod solum is, qui cerebrum occupat, sit melancholicus: qui aliter est, educendus. Hypochondriaca melācholia sic dignoscitur. Primo enim stomachi accidentia emergunt, flatus inquā, gurgulationes, cruditates, eructationes acide, & alui deliccatio, & ab egestionibus, vomitu, & eructatione percepta leuitas, & quod æger omnes molestias circa hypochondria versantes percipiat.

Pictus va-
rio. Initio quinque auxiliorum generibus sanatur, nam confirmata ægre, aut omnino nunquam curari potest. Primo, victu humectante, & in actiuis temperato, vt est ius arietis, & gallinæ cum borragine, aut buglossa alteratum. Bibat vinū buglossatum, id est, habens radicem buglossæ, rubrum, medium in ætate, & substantia, bene dilutum aqua. Quæ atram bilem gignunt, maxime nocēt, vt salsa omnia, caro ceruina, hircina, bubula & leporina, nisi hæc tria animalia essent propinqua ortui: tunc ratione humoris optimi sunt alimēti. Legumina quoq; nocent, & multum calida, qualia sunt eruca, sinapi, piper, zingiber, & similia. Animi perturbationes, & coitus immodicus satis nocent, aliquando tamē prodest, si moderatus sit, præsertim si ex semine detēto, & corrupto profectus fuerit hic morbus. Blandē iis inseruiendū est, aliquando tamen acerbius sunt increpandi & tractandi, sed perpetuò caute. Nam aliqui sunt obiurgandi, verberandi & vinciendi, ne manus violentas medico, aut aliis inferant. Sæpe oportet obseruare melancholici phantasiā: & imaginationem. Si quis enim eorum mente sua informet & fingat, in ventre se habere ranas, aut serpentes (vt quidam melancholici iam figurarunt) promittat medicus se animalia illa facile expulsurum, & post purgantis medicamenti effectum ea animalia deiectionibus immixta viua agroto ostē-

stendat. Si æger cibum, potumque fastidiat, ei omnia ferme genera alimentorum, vt licebit, sunt offerenda, vt possit gratum sibi accipere. Si vero nihil, aut parum comederit, hoc nutriatur clystere: ℞. iuris gallinæ, decoctionis florum cordialium lib. j. oleorum violarum & amigdalorum dulcium an. ʒ. ij. butyri recentis, & cassiæ fistularis præparatæ an. ʒ. j. vitellorum ouorum nu. 2. misce, & fiat clyster. Nutriatur quoque bonis odoribus, præcipue hac mixtura sæpe naribus admota: ℞. succi pomorum redolentium lib. j. aquæ rosarum ʒ. ij. vini albi optimi, & bene olentis ʒ. j. s. misce. Somnus conciliandus est iis, quia longa est eorum vigilia, & maxime eis nocet. Quod si lactuca, & lac seminis papaueris non possint somnum inducere, tibiæ, & pedes sæpe lauentur decocto lactucæ, violarum, foliorum salicis, & arundinum, corticum papaueris albi, & iuschiæ. Naribus quoque & fronti, aut temporibus ad mouenda sunt olea violarum, aut papaueris, aut vnguentum populeon. *Clyster nu- triens. Somnum inducens. Topica somni- fera.*

Secundo, apparantibus atram bilem syrupo de pomis, de buglossa, de borragine, de fumaria. S. & comp. de epithymo cum duplo aquarum, aut decocti buglossæ, borraginis, fumaricæ, lupulorum, scolopædriæ. Hæc tamen multis diebus sunt bibenda, quia terrestris est, & admodum resistit atrabilis. *Præparatio.*

Tertiò, vacuantibus melancholiam, quæ si sit sanguinea, aut cum præsentia sanguinis: & si fiat per consensum totius, statim a legitima & iusta victus ratione est vena media seu communis secanda, autore Gal. iij. de loc. affect. cap. vj. sanguinisque tantum extrahendum est, quantum respondeat plenitudini, cum ex repressis mensibus, aut hæmorrhoidibus inhibitis nascitur, venæ tibiarum, aut pedum sunt incidendæ, & in confirmata iam & veteri frontis, vena aperienda erit. Vacuanda quoque erit lenibus & clementibus, quæ lia sunt epithymus, & aqua casei, & myrobalani indi: vt pulueris epithymi ʒ. ij. aquæ casei ʒ. iij. misce: vel epithymi ʒ. s. corticum myrobalanorum indorum ʒ. j. s. fiat decoctum in vnciis sex feri caprini, donec vnciæ duæ consumantur. Deinde valentioribus, vt folliculis sene, diasene, confectio- *Vacuatio. Sectio veng- Quæ vena secanda. Purgatio lenis.*

ne medicaminis quod scripsit Hamec, pilulis indis, & de fumo terræ. Multi quoque lapidem armæum, & lapidem stellatum, seu lazuli laudant in purgando hoc humore, sed ego his non auderem vti simplicibus, neque in compositione, quia primus incognitus est, secundus verò est malignus, nisi fuerit benè electus, & præparatus lapis stellatus, in die tamen purgationis per pilulas ab opere bibat æger decoctum *Decoctum fruct*

DE CVRAND. MORB.

- die purga-* fructuum, & florū humectantium: vt sunt vix passæ sine gra-
tionis su- nis pruna damascena, violæ, borrago, & similia: ne intempe-
rendum. ries sicca à medicamento sicco multum intendatur. Quia
 morbus hic est diuturnus, necessaria est vacuatio frequens,
Confectio. quæ fiet optime hac confectione: ℥. cassiæ fistulæ præpara-
 tæ. ʒ. ij. confectionis medicaminis Hamec, & diasenæ an. ʒ. j.
 conseruæ borraginis ʒ. ʒ. pulueris diarhodon abbatis ʒ. ij.
 syr. buglossæ, q. s. m. & fiat confectio. dosis est cochlearia duo
Puluis sa- semel in hebdomada. Puluis hic optimus & ferme diuinus
luberrimus. est, expertusq; à multis grauissimis medicis, & eo multi me-
Landes hu- mi, agarici trochiscati an. ʒ. ij. scammoni. ʒ. j. gariophyllorū
ins pulue- numero 20. misce, & da ʒ. ij. cum sero ouino, aut caprino, aut
ris. aqua borraginis, aut buglossæ: hoc medicamentum dilige,
 & eo vtere, si vis salutem aëris restituere, & honores asse-
 qui. Dicitur à quibusdam puluis benedictus.
Auersio. Quarto auertētibus à cerebro & corde ad ignobiles par-
 tes: vt partium extremarum frictionibus, vinculis, foru ex
 decocto rerum parum calidarum, cucurbitulis, balneis, &
Clyster. clysteribus: vt hoc: ℥. maluarum, tumariæ, borraginis, lupu-
 lorum an. m. j. epithymi, senæ an. ʒ. ij. fiat decoctum, de quo
 accipe lib. j. cassiæ fistularis præparatæ ʒ. j. olei violarum &
 sesaminis an. ʒ. ij. salis ʒ. ij. misce, & fiat clyster.
Discutien- Quinto, reliquias resoluentibus, & corroborantibus ca-
tia, corro- put & cor, & tandem humectantibus, & intemperiem capi-
borantia, tis & totius siccam sanantibus primum fit per diamuscum
& altera- dulce, & amarum, per electuarium de gemmis, per electua-
ria. rium lætificās Rhasis in quantitate drachmarum duarum,
 cum aqua buglossæ. Fit etiam resolutio, & illarum partium
Confectio. principum corroboratio per hanc confectionem. ℥. margari-
 tarum ʒ. ʒ. hyacinthorum, zaphirorum, sinaragdorū, v-
 triusque corallij an. ʒ. ʒ. cinnamomi, macis, galangæ, nucis
 muscatæ an. ʒ. j. gariophyllorum, piperis longi, cubearum,
 ligni aloes, storacis, calamithæ, leminis basiliconis an. ʒ. ʒ.
 croci. ʒ. j. musci, ambre an. ʒ. iij. sacchari candi, carniū v-
 uarum passerū an. ʒ. j. conseruæ borraginis, & buglossæ an. ʒ.
 j. aquæ rosarū, muscatæ ʒ. j. sacchari optimi, quod sit est, mi-
 sce, & fiat confectio: dosis quolibet mane drachmarū trium
Simplicia cum vnciis tribus aquæ buglossæ. Corroborant etiam caput
roborantia auellanæ & amygdalæ rostæ à cibo, & coriandrum præpara-
caput. tum, & sequēs pileum, ℥. coriandri præparati ʒ. ij. rosarum,
Pileū cor- florum borraginis, buglossæ, & violarum an. ʒ. ʒ. cubearū,
roborans. nucis muscatæ, stachados, maioranæ, anthos an. ʒ. j. corticū

papaueris albi 3.iiij.in puluerē redigātur omnia, & fiat pileū.

Intemperies sicca curatur balneo totius capitis ex mal-
is, violis, althea, lactucis, borragine & buglossa, capitibus *Alteratio.*
& intestinis veruecum. Capiti rasō admoueatut butyrū re-
ens, & farina hordei, vel hoc vnguētum, quod spinæ etiam
dmouendum est ad totius humectationem. ℞. olei amygd *Vnguentū*
rum dulcium 3.ij. olei violarum, & papaueris an. 3. j. s. bu- *humectās.*
yri recentis 3. j. mucilaginis altheæ & fœnugræci an. 3. ij. a-
ungix galliæ 3. iiij. ceræ quod s. misce, & fiat vnguentum.

Si sit per consensum partium circa hypochondria, ha- *Hypochon-*
ita ratione victus iam dicta superius, cui addes in hac & *driacæ cu-*
n omni carnem accipitris, cum succo maioranæ, quæ ha- *ratio.*

et miram facultatem in curanda melancholia, & pulli no-
tuæ. Est etiam experta in curatione eius aqua per distil- *Accipitris*
ationem ex muribus boni pastus cum gallina & aquis cor- *& muriū*
ialibus facta: forsan est in muribus vis, & natura curandi *vis.*

unc morbum, quemadmodum in accipitre, qui accipiter
utritur muribus. In præcedenti quoque euacuatione, & a-
is multis remediis præter sanguinis missionem, quia raro
n hac contert, summopere est resoluendus flatuosus spiri-
us, quod primo & præcipue fiet per clysterem hunc, & si- *Clyster fla-*
tilem, tertio quoque die iniectum: ℞. blitis, matricariæ, cu- *sus discu-*
cuthæ, melisæ maioranæ an. m. s. polypodij, senæ carthami *tiens.*
n. 3. j. epithymi, thimi an. 3. s. ameos, seminis anethi, seminis

eniculi & carui an. 3. ij. fiat decoctū, de quo accipe lib. i. cui
dde diasenæ, hieræ logodionis, & cōfectionis medicaminis
famec. an. 3. s. olei camomillæ, & de lilio an. 3. ij. salis. 3. ij. *Topica.*

misce. Spiritus flatuosus dissipatur fotu ex camomilla, meli-
oto, calêdula, rore marino, radicibus quinq; diureticis, semi-
ibus anethi, fœniculi, cymini, ameos, carui, & baccis lauri
entriculo semper vacuo, saltem bis in die, & post fotū quo- *Fotus.*

idie, ad dissipandum flatum venter vngatur hoc vnguento:

℞. olei anethi, de lilio, laurini & rutæ an. 3. j. pulueris rosatæ
ouellæ & diacymini an. 3. ij. ceræ quod sufficit, misce & fiat

nguentum. Si ante cibum comedat cochlearium vnum hu *Vnguen-*
us pulueris, flatu valēter dissipatur: ℞. coriandri præpara- *tum.*

i 3. j. pulueris radicis buglossæ 3. s. cinnamomi electi, cortici *Puluis.*

itri, seminis fœniculi, anisi, & carui, an. 3. iiij. origani 3. ij. li-

gni aloes 3. j. sacchari 3. iiij. misce, & fiat puluis. Syrupus se- *Syrupus*

uens est ad flatum dissipandum accommodatissimus, & ca- *dissipans*

out cum corde corroborandum: ℞. serici crudi 3. ij. seminis *flatus,* &

basiliconis, gariophyllorum, foliorū citri an. 3. j. corticū mali *firmans*

idonei & corticum citri an. 3. iiij. radicum buglossæ, num. 7. *caput.*

f

fol

foliorum buglossæ m. iij. fiat decoctu in quantitate debita aquæ, de qua accipe quantitatem conuenientem ad lib. iij. optimi sacchari, & fiat syrupus, aromatizetur hoc puluere mastichis, zinziberis, galangæ zedoariæ, spicæ an. ʒ. ij. lign aloes, gariophyllorum, nucis muscatæ an. ʒ. j. musci, ambra an. ʒ. j. Dolis. ʒ. ij. Pauperes tamen loco eius, & diuites si uelint vtantur electuario rosatæ nouellæ, aromatico rosato diacymino, & similibus. Si melancholia fiat per consensum hepatis, aut splenis, aut uteri, aut aliarum partium curatis illis facilis erit curatio huius morbi, de quibus suis in locis agemus.

De melancholia. CAP. IX.

Scholium.

Quid melancholia.

Melancholia quædam est. Melancholia hoc in loco, non humorum, sed affectum ex causa nomen assumens significat. Est enim delirium sine febre cum metu & tristitia, in hac definitione delirium est genus, quo communicat cum phrenitide & mania. Reliquis vero partibus melancholia ab eis distinguitur, quia phrenitis est cum febre, mania sine metu & tristitia. Pars affecta est cerebrum, ut constat ex actione eius læsa. In ea. n. imaginatio est deprauata, multipliciter tamen 2. de caus. symp. cap. ultim. 3. ut stultorum infinitus sit numerus. Morbus ad quem sequitur (loquentes de ea quæ proprius affectus) est intemperies frigida, & sicca cerebri ex melancholico humore orta. Humor melancholicus, cum non solum habeat generationem ex hepate frigido, sed ex caliditate sanguinis tenuem partem consumens, proinde non est mirandum, si per febriles morbos multi melancholici fiant. Melancholia hæc aut sit per proprium affectum, aut per consensum. Per proprium affectum euenit quando humor melancholicus in ipso cerebro continetur. Quod bisariam contingit, primo cum melancholia ibi generatur, secundo cum aliunde fluit. In cerebro generatur à caliditate sanguinem excitante, eundemque melancholicum efficiente, unde corriges locum Corrigitur lib. 3. de loc. affec. c. 6. qui sic habet, In cerebro (hoc enim subaudiendum Gal. locus. est) melancholicus humor genitus est, cum uidelicet internus calor, aut flauam bilem, aut crassum atrumque sanguinem assauit. Delendum enim est totum hoc (aut flauam bilem, aut) quia flaua bilis assata fit atrabilis, non autem melancholia. Aliunde fluit melancholicus humor, cum lien (a quo expurgatur) minus recte ipsum attrahit. Aut, iecur multam generat melancholiam, aut, cum ab alia causa in venis coaceruatur, tunc enim in cerebro, languidum si sit, colligitur. Per consensum excitatur melancholia, quando ex hypochondriis ortum habet, quam solent medici hypochondriacam nominare. Hanc melancholia morbi diuisionem consider

Morbus in epilepsia.

Duplex melancholia.

Corrigitur Gal. locus.

sideramus propter curationē: quia si in toto corpore contineatur sanguis melancholicus, secabimus venam, ut reuellemus à cerebro. Si vero in hoc affectu solus sanguinis, qui est in cerebro melancholicus sit, abstinendum erit à venæ sectione, euacuemus optimū sanguinem, & qui necessarius est ad coctionē melancholici humoris: nisi ipsum eduxeris ratione plethoræ.

Est præterea tertium melancholiæ genus.) Melancholia per Melancholiam consensum hæc est. Quæ fit à vaporibus melancholicis ex venis ventriculi per co-
ascensu lentibus ad caput, etiamsi non sint acres: unde hac in parte errauit sensum.
Iacorius. Hic autem melancholicus humor in venis ventriculi detentus, & obstructionem faciens aliquando putrescit, & aliquando non. Si putrescit, calorem in illis venis generat, quem intellexit nomine inflammationis Diocles non autem phlegmonem, ut multi male voluerunt, erit. que cum sit. Quod si hæc putredo effatu digna sit, Melancholia habebit febrem adiunctam. Si humor in venis prædictis non putrescat, ichores melancholici ad ventriculum descendentes facient acidum ructum, ledentque eius coctionem: cumque error primæ coctionis non possit emendari in secunda, corpus male nutritum gracilescet.

Melancholiæ signa communia sunt metus, & mæstitia, si multum Melancholia persuerent. 6. aph. sent. 23. adde tamen sine causa manifestata: signa communia hæc dicuntur, quia conueniunt melancholiæ, quæ est proprius affectus, & illi quæ per consensum accidunt. Causa tristitiæ & timoris est cerebri, & spiritus animalis (qui ex sua natura debet esse lucidus) obtenebratio. Hæc autem, in ea quæ fit per proprium affectum, ab humore, at in illa, quæ lege consortii accidit, à vapore nigro pendet. Quod autem hæc sit optima causa Gal. 2. de caus. symp. cap. ultimo, exemplo ostendit: si enim tenebræ externæ timorem & mæstitiam inducunt, nonne melius id efficiunt illæ, quæ internæ sunt? dices non ne metus, & mæstitia sunt cordis passionēs? cur ergo causam earum in cerebro colligamus? Respondeo ex opinione mali ortum habere prædictas passionēs, spiritum autem denigratum deprauare imaginationem, ita ut excitet opinionem mali præsentis & futuri, & hac ratione inuere timorem & tristitiam.

Quinto, reliquias resoluentibus.) Si in melancholia, quæ proprius est cerebri affectus, intemperiem frigidam & siccam habemus in cerebro, debemus ergo cerebrum humectare, & ex eo humorem euacuare, quod commode præstat balneum, caput etiam unguentum lauabimus decocto ex capite arietino, chamemello, violis, samigreo, & floribus buglosi. Male autem Hinc videbis errorem auctoris, & aliorum practitorum caput roborantem & rium in hoc affectu confectione per os assumpta, longa quidem, & ex re- alios præbus siccis constituta. Si enim cerebrum humectandum est, quæ ratione hi id etiam in exsiccant? tum si ex capite debemus euacuare humorem, topici id præmelancholiam standum erit, & non internis? Debet præterea medicus in melancholia explicatienem roborare, ut attrahat melancholicum succum, quod præstabit oleum tamen proprium de absinthio & aliis.

f 2

Si

DE CVRAND. MORB.

Lapsus au Si sit per consensum partium.) Ea quæ dicit auctor de carne
etoris. accipitis, muribus, & pullis noctuæ, falsa cum sint omittantur: quia
Curatio me hypochondriaca hæc affectio ratione cognoscitur, ac proinde remedia ra-
lancholiæ tione inuenta, & non experientia admittet. Curabitur ergo victus ratio-
hypocon- ne humectante, secundo humor obstructionem in venis ventriculi efficiens
driacæ. præparabitur syrupis, in prima melancholia ab auctore propositis: ita ut
Purgatio. illa, in qua puredinem habet humor (quam ex siti colligemus) miscea-
 mus syrupum endiuie compositum cum decocto endiuie, borraginis, &
 aliorum, quæ aliquantulum refrigerant. Tertio, hoc medicamento pur-
 gabimus. ℞. pul. hieræ picræ. ʒ. iii. aut iiii. confectiois hamec. ʒ. ii. dissol-
 uantur in decoctione hordei q. s. & fiat potio. Hamech melancholiam e-
 ducit, at hiera serosos & tenues humores in ventriculo contentos, & si-
 mul ipsum roborat, ne eos recipiat, poteritque frequenter vii hoc medi-
Unguenta camento. ℞. pul. hieræ. ʒ. Gal. ʒ. iiii. rhodomellis. ʒ. j. cum aqua faniculi
ad lienem. q. s. duobus tamen aut tribus diebus præassumpta decoctione ex hordeo
 cum cortice, & faniculo parata. Liem ungatur hoc unguento, quod cor-
Ad animi roborat ipsum & attenuat humorem melancholicum. ℞. olei absinthii,
deliquium. de capparibus, tamaricis & ircos. ana. ʒ. j. ʒ. ammoniaci dissoluti in a-
 ceto ʒ. iii. pul. brionie ʒ. iii. massæ emplas tri de meliloto loco ceræ q. s. fiat
 unguentum. Et cum aliquando ex flatu in hac affectione fiat animi de-
 liquium utenitur hoc medicamento. ℞. confectiois Gentilis contra me-
 lancholiam ʒ. ii. confervæ borraginis ʒ. j. misce: hæc cum aqua melisse ac-
 cipienda est. Cui, si vigiliis moleste tur æger, adde syrupi papaveris ʒ. j.

De Incubone. C A P. X.

Descriptio. **I**ncubo, vel incubus, quem Græci ephialtem appel-
 lant: sumpta quidem appellatione vel ab huius no-
 minis viro, aut quod magis credibile est, a vocis si-
 gnificatione, cum hoc morbo correpti inuadi se
 ab alio opinentur: porro & Themisone pnigamon, aut pni-
 galion dicitur: quod præfocari ægrotantes videantur. Ut ut
 tamen nominetur, malum est, ubi aliquis in somno opprimi
 se, & incumbente quadam mole, teneri arbitratur. Ceterum
 oritur is morbus a crapula potissimum, & iugi in ventriculo
 cruditate, vaporibus nimirum inde in cerebrum ascendenti-
 bus, qui & ipsum obruant, & iter spiribus animalibus aut
Signa. facultati animali per nervos occludant. Qui sic affecti sunt,
 tardè admodum difficilèque mouentur, torpent in somno,
 cum in corpus cerebri facultas nō defluat, suppressam vocē
 aut frustra conantur rumpere, aut incertam, inarticulatā-
 que reddunt. Ad hæc suffocari se imaginantur, & ab ingruen-
 te aliquo detineri, denique ea omnia, quæ vigilantes epilep-
 tici perpetiuntur, hæc eadem per quietem perferunt, qui hæc

iac molestantur affectione. Cum summa tandem anxietate tenuiori facto spiritu, & in halitu digesto discussione, & reseratis cerebri meatibus subito expergeant. Succurrendum huic malo est incipienti, si enim semel inualuerit, graues & de affectiones parit, epilepsiam scilicet, Maniam, & Apoplexiam, cum horum velut præludium quoddam sit, autore Aetio. Hic tamen si inter somnum, & vigiliam superuenierit, malus est, deterior verò si cum sudore frigido.

Curatio eius similis est curationi morbi comitialis, quam *Curatio.* mitior, semper tamen ager a somno excitetur violenter, & cum increpatione, saepe quoque fiat in eo vacuatio per Hieram. S. Galeni, & agaricum trochiscatum.

De Incubone. C A P. X.

Scholium.

Incubo vel incubus.) In incubone cerebrum laesum esse confirmant medici ex actionibus eius laesis, quæ sunt, imaginatio sensus & motus. Imaginationem laesam colligunt, quia aliquorum qui hoc malo desinentur, existimant quiddam sibi incumbere. Quamuis de incubo id Rondoletius & alii ad plenitudinem venarum thoracis referant, Senne. sus etiam laesus est, quia ut aiunt, is in somno torpidus est, sicut et motus voluntatis difficilis. Ex his aliqua falsa sunt: imprimis, quod ait Rondoletius stare non potest, quia si plenitudo est in thorace, sensum gravitatis tatur. inducit in vigilia, non autem in somno, in quo mens alio intenta est. Adde hanc plethoram non ledere imaginationem. Falsum etiam est, id quod ii Refutant, in incubone scilicet actiones sensus et motus laedi: dicere enim esse sensum in hoc malo affectis, cum dormiunt, torpidum, nonne ridiculum est? quasi in aliis dormientibus sit acutus? Quod autem motus laesus non sit, constat ex eo, quod brachia & crura mouent, respirant etiam. Unde dicendum est, Incubonem esse symptoma, in actione laesa principe. Est enim imaginatio deprauata, quæ contigit ex speciebus rei alicuius suffocantis, & opprimentis, in cerebro motis. Tunc enim existimant se esse oppressos, ita ut, si velint loqui, quasi detineantur. Dices cur in vigilia non contigit? Respondeo, non esse necessum, ut quæ in somno, eadem in vigilia afficiant: somniamus enim dormientes, & non vigilantes. Videamus modo, quem morbum sequatur hoc symptoma. Aliqui existimant, Morbum morbum esse obstructionem ventriculorum cerebri: & hi differunt, quia ad quem multi existimant obstructionem hanc esse, in anterioribus ventriculis, sequitur, aut in principio spinalis medullæ ab humore factam. Alii sequuntur Posidonium à vaporibus frigidis et crassis spiritus animales per nervos ferri prohibentibus, eam fieri sentiunt. Qui omnes errant maximè: nam si tanta est obstructio, ut impediatur transitus spirituum, fiet ergo caros epilepsia, aut apoplexia. Tum si obstructio est incubus, cerebrum afficitur,

D E C V R A N D. M O R B.

non ut similis pars, sed ut instrumentaria, ut Alcomarius ex Aetio probat: qua ergo ratione erit laesa imaginatio? Sententia Posidonii nulla ratione potest admitti, non enim potest ratio capere modum, quo vapor possit impedire transitum alicuius substantiae, cum sit tenuis, & sicut aer facile cedens. His omnis dicimus, in incubo, si cerebrum afficiatur proprio affectu, morbum esse intemperiem frigidam & siccam, si vero per consensum, morbum esse, aut in via: si vapor, ex obstructione ventrum ventriculi ascendat: aut tumorem praeter naturam, si scyrrum lenis sequatur.

Inde colliges errorem multorum medicorum sentientium hunc affectum fieri à Dæmone, ducti in hanc sententiam ex eo, quod quidam Dæmones appellantur à theologis incubi. Hi enim etiam si hoc nomine appellantur, non quia hunc affectum efficiant: sed a coitu, quia assumentes aerea corpora, sub virorum forma mulieribus incubent: sicut & succubi appellantur illi Dæmones, qui femina mentientes, viris succumbunt. Et ex horum coitu natos fuisse gygantes, multi ex Theologis affirmarunt. Ex supradictis intelligis, quam male omnes causam istius morbi ad crapulam & cruditates referant, cum hæc nunquam imaginationem lædant.

Curabitur hic morbus ea ratione, qua melancholia.

De iis qui amore insaniunt. CAP. XI.

EX amore posse aliquos insanire argumento est Anthiocus Seleuci filius, qui Stratonicam nouercam misere deperit, atque alij quam plurimi, quorum frequens est in historiis mentio, & in poetarum monumentis non rara, quamvis sub fabularum inuolucro. Est vero (ut Ovidius cecinit, amor res plena solliciti timoris) sollicitudo autem, ut ait Paul. Aegmet, animi quædam affectio, cum videlicet ratiocinatio in vehementi, ac laborioso quodam motu constituitur. Occasionem huic morbo exhibet res ipsa amata. Deprehenditur malum, quia oculi concaui fiunt, lachrymas nullas effundunt, sed voluptate quasi perpetua perfusi apparent, agitantur & subsiliunt identidem palpebræ, & aliis omnibus corporis partibus illæsis ac consistentibus, solum hi amantibus concidunt. Pulsus peculiaris huic morbo nullus est, quod medicorum aliqui sunt opinati, sed quales solent esse illorum, qui multis sollicitudinibus sunt impliciti. Erasistrati denique arte oportet uti, ut morbus ex toto detegatur. Præcipua huius morbi curatio tradita est capite decuratione melancholiæ, præter illa, duo sunt maxima remedia eorum, qui amore insaniunt, primum & firmissimum dare ei, quam diligit. Cum hoc non suppetat, alterum est necessarium, & primo stude, ne fiat melancholicus, per ea quæ dixim

imus cap.9. nam ij imaginationem laſam habent, & alio-
 ties rationem, quare ſtatim fugiat: abſentia enim & alia-
 m rerum occupatio eſt ſummum remedium, autore Oui- *Auerſio.*
 o libello de remedio amoris.

Ocia ſi tollas, periſcere Cupidinis arcus,

Da vacuæ menti, quo teneatur opus.

Conſule igitur Poetam eo in libro. Neceſſariæ ergo ſunt
 enationes, piſcationes, ludi, instrumenta muſicæ, ambula-
 o per loca viridia, & iucunda, vbi aues & philomelæ reſo-
 ant, communicatio, & frequens cum amicis, & conſangu-
 eis cõfabulatio prodeſt: & tandem opitulatur multum pro-
 ectio ad longinquas regiones, præcipue ad inſignes vrbes,
 t Valentiam & Barchinonam apud Hiſpanos: Lutetiam
 Pariſiorum apud Gallos, & Romam Chriſtianorum caput,
 quod ſi hæc non ſatis ſint cum Ouidio.

Hortor vt & pariter binas habeatis amicas,

Fortior eſt plures ſi quis habere poteſt.

Et poſt hæc omnia ſic ſinit curationem Ouidius.

Quid moror exemplis, quorum me turba fatigat?

Succellere nouo vincitur omnis amor.

(modicis.

Aliquando curatur hæc infania ebrietate, & coitu non im-

De Apoplexia. CAP. XI.

Scholium.

A Ttonitum morbum Græci.) Malè video ferè omnes me- *Error mul*
 dicos apoplexiam definiētes, priuationem ſenſus & motus in *torū circa*
 toto corpore, hac enim ratione, qui vulneratus uſque ad cere- *essentiam*
 bri ventres repente concidit ſine ſenſu, & motu, tum & phlegmonode ce- *apoplexiæ.*
 rebri diſpoſitione affectus, apoplexiam habebit. Quod, quam falſum ſit,
 optima eius definitio oſtendet. Eſt apoplexia ſenſus, & motus amiſſio in *Apoplexiæ*
 toto corpore, ob impeditum tranſitum ſpiritus animalium facta. Pri- *definitio.*
 ma parte definitionis, apoplexia cum paralyſi conuenit: Secunda verò ab
 ea diſtinguitur, cum paralyſis non habeat ſenſus et motus defectū in to-
 to corpore. Vltima verò parte ſeparamus apoplexiam ab ea ſenſus et mo-
 tus priuatione, quæ eſt in toto corpore fiat, euenit tamen ex diſſipatione,
 ſpiritus animalium: qualis eſt illa, de qua loquitur Gal.7. de placitis,
 quæ ſequitur cerebri vulnus uſq; ad ventriculos pene:rans: ab ea etiam,
 quæ ſit ex repletione venarum & arteriarum cerebri, quæ contingit ex
 cõſumptione ſpiritus animalium cerebri, eueniente ex eo, quod ſpiritus
 vitales ex arteriis non poſſint ad cerebri ventriculos deſcendere. Causa *Causa*
 apoplexiæ eſt, quicquid replet cerebri ventres, ita vt non poſſit animalis *apoplexiæ.*
 ſpiritus permeare, hæc autē repletio, aut ſi maior obſtructio, ſit ab humo-
 re craſſo puriſſa ſcilicet, aut melancholia, aut a phlegmone maxima tenuis

DE CVRAND. MORB.

meningis, ita ut eius magnitudo internum cerebri meatum repleat. Quæ
Lapsus vera cum sint, non est quod sequaris *Vallesii* sententiam lib. 7. epid. com.
Vallesii. 85. scriptam: quæ sentit ab omni humore fieri apoplexiam, et quod peius
est, quædam apoplecticas passionis à crasso flatu admitti: quia bilis fla-
Cur in apo uia tenuis cum sit, permeabit per meatum, non autem obstruet. Quod an-
plexia dica tem non obstruat vapor, superiori scholio diximus. Obstructio (quæ mor-
tur corpus bus est in via) in apoplexia magna est, ac proinde Gal. lib. 3. de loc. affect.
cerebri la- in apoplexia corpus cerebri magis laxi, quam ventriculos scribit, quæsi-
sum. dicat, cerebrum, ut est instrumentum, laxi, quia totus ventriculus est re-
pletus: cum enim totus non repletur, ut in epilepsia cecidit, tunc laesos ven-
triculos appellat Gal. et non corpus cerebri laxum. Et quamvis Gal. ali-
Lapsus quando per corpus cerebri eius substantiam similem intelligat, male
Vallesii. *Vallesii.* 5. epid. com. 47. explicat, quid sit vergere humore ad corpus, aut
ad animam: non enim vergere ad corpus cerebri, est vergere ad eius su-
perficiem externam et vergere ad animam ad internam: cum pars externa
et interna cerebri, idem habeant temperamentum, in quo animam consti-
differentiæ tuit Gal. & nos animæ instrumentum. In apoplexia aliquando servatur
apoplexiæ respiratio, aliquando non, et inde oriæ sunt differentiæ apoplexiæ, à Gal.
unde oriæ traditæ 2. lib. aph. com. 42. ex quibus tres sunt apoplexiæ illius, quæ for-
tur. tis dicitur: quarta debilis est. Prima differentia ea est, in qua prohibita
est respiratio, quæ curationem non admittit, sed cito interficit, tamdiu in
ea viventes agros, quandiu illi qui præfocati moriuntur. Secunda diffi-
rentia apoplexiæ est, cum violenter respirant. Tertia in qua non est vio-
explicatur lenta respiratio, in aqualis tamen & inordinata. *Vallesii* (quam debilem
Gal. appellavimus) cum respiratio aliquam servat ordinem. Et hæc, inquit
Gal. si debite fiant necessaria, curatur. Quod cum sit contra aphorism.
in quo Hippoc. debilem apoplexiam non facile curari scribit, proinde ubi
est citò legendum est, forte, ex græco codice. Vel si servemus lectionem per
Apoplexia citò curari, intelligemus, statim in paralysem transire. Hic transitus eue-
transit in nit humore penetrante nervorum substantiam, et hoc nomine impediente
paralysem facultatis alterationem. Quod in epilepsia non contingit, quia humor eam
non epile- generans ita crassus est, ut non possit pervadere nervos. Obiiciet Galen.
psia. 4. lib. de ratione victus in acutis com. 27. Epilepsiam in paralysem finiri
scripsisse. Respondeo verum hoc esse, sed raro evenire: id autem quod ra-
rum est, cum contemnat Galenus ac si non esset, ideo in lib. 4. de locis af-
fect. cap. 2. epilepsiam nunquam in paralysem finiri existimavit.
Sanguinea apoplexia.) Sanguineæ apoplexiæ meminit, cuius hæ-
tenus manifeste saltem non fecit mentionem. Nos vero ex his quæ dixi-
Apoplexiæ mus, vario modo curandam apoplexiam intelligemus. Si apoplexia fiat
curatio. ex phlegmone tenuis meningis, curabimus eam primò sanguinem mitten-
tes, & applicantes capiti repellentia: & ut summam dicamus, ea præ-
stabitur, quæ cap. de phrenitide diximus, utentes tamen digerentibus in
declinatione, quia humor non habet eam tenuitatem, ut possit sine his ex-
halare

halare. Aduertendum tamen est, praefticos in sanguinis missione in qua-
libet apoplexia facta hunc seruire ordinem. primo secant venam saphi- Reptehen-
nam aut poplitis, quia amplior est, deinde cephalicam, & tertio venam datur pra-
frontis: vel ut Rondoleius, Hollerius, & alii facere iubent, venam iugu- Etici in san-
larem, ita ut fiat exigua plaga ob haemorrhagiae metum. Caterum miran guinis mis-
dum est de his hominibus, rationem curandi non aduertentibus: Si enim sione.
est affectus in cerebro, quam relicitudinem seruat cum ipso vena pe-
dis? Praeterea quis ausus erit venam iugularem secare, si legat Gal. lib. Vera sen-
s. methodi, magnarum venarum sectionem formidantem propter pericu- tentia de
lum, quod imminet: quia in harum sectione sanguis aut non potest, aut sanguinis
difficile saltem supprimitur: ita ut immineat periculum transuersae se- missione in
ctionis in vena. Adde in sectione venae semper imperandam esse ma- apoplexia.
gnam plagam, ne sanguis tenuis relicto crasso effluat. Vltimò id quod
de sectione venae frontis & linguae imperant, in angina, dolore capitis
diuturno, & similibus locum habet: non autem in apoplexia, in qua ob
breuitatem haec remedia carent occasione. Nos sequuti Galeni doctri-
nam semper secamus cephalicam, & meruò, quia hac ratione ex loco
affecto cito, & multum euacuamus.

Pituitosa apoplexia.) Ut plurimum fit apoplexia ex pituita, quae
multa solet in cerebro frigido ex natura abundare. In cuius curatione
auctor nullam fecit mentionem sanguinis missionis, sentiens cum multis
barbaris, hanc inutilem esse, cum abundet pituita, & absit plethora:
quasi solum in plethora sit sanguis mittendus. Solet autem communiter Reptehen-
medici, apoplexiam hanc curare clysteribus acerbis, medicamentis ro- ditur cura
micum cientibus, & purgatione. Acerbis vtuntur clysteribus, existit- tin apople-
mantes eos a toto corpore purgari. Quod possunt probare ex 4. lib. acut. xij. pitui-
com. 20. ubi ait Gal. autorem illius lib. in dicta sententia in Angina cly- tose.
sterem purgatorium exhibere, non ut, solum alimenti excrementa, sed
& ut passum locum euacuaret. Vomitu vtuntur, ut deponant plenitu-
dinem ventriculi: purgatione verò, ut pituita, quae morbi causa est, eua-
cuetur: haec est illorum sententia vndique peccans. Primo in acri-
bus clysteribus, ex valide purgantibus constructis: Hi enim solum eua-
cuant ex intestinis, et primis renis, non ex toto corpore: quod ratione con-
firmamus, & auctoritate. Ratio haec est, medicamentum, purgans ut a-
gat, debet in actum reduci: Sed per clysterem injectum non potest redu- Clysteres
ci in actum, ergo neque purgare. Maior manifesta est ex eo, quod medi- non eua-
camentum purgans potestate tale est. Minorem confirmamus ex natu- cuat ex to-
ra acris medicamenti, quod statim irritat intestina, & proinde expelli- to corpore.
tur. Auctoritas, qua hoc ipsum probamus, ex Gal. desumpta est. 4. lib.
aph. com. 2. ubi propositis medicamentis errhina & apophlegmatisma
appellatis, quae ex parte nempe cerebro euacuunt: addit, clysterem quo-
que ex hoc genere feceris. Si ergo clyster ex parte euacuatur, intestinis sci-
licet & primis renis, qua ratione in apoplexia: Hoc primo vtuntur me-
dic

dicamēto, quod neque affectum, neque eius causam respicit: Ad id quod ex 4. acut. adferunt satisfacimus, dicentes Galenum solum scribere id, quod instituit auctor illius lib. (qui non est Hippocrates) non autem hoc approbare, potissimum cum sit contra rationem. Errant secundo supradicti medici in medicamentis vomitoriis, quia cum hæc solum ventriculum euacuent, non curabunt apoplexiam, quæ est cerebri affectus. Kli-

In princi- pio apople- xia, est in accessione apoplexiæ, non poterit purgans medicamentum degluti- xig, non est re. Si post accessionem, iam non est apoplexia, cum terminata sit in para- purgandū, lysim. Dices purgari tunc humorem pituitosum: si hoc affirmas, non etiam effugies: nam aut ille humor est in venis, aut in ventriculis cerebri. Si est solum in venis, iam non curas affectum urgentem, morbum scilicet, qui est obstructio cerebri. Si verò humor est in cerebri ventriculis, cum extra venas diffusus sit in parte contentus, per proprios meatus partis debet euacuari. Adde humorem esse firmatum in parte, ac proinde post coctionem esse euacuandum. Quæ cum ita sint, inde videbitis quantum erret ille, qui non curans à bono præceptore methodum curandi perdisce- re, ad eos libros, quos practicos vocant, confugit: hic enim præterquam quod decipitur passim, multos interficiet. Curabitur ergo apoplexia ex humore crasso facta hoc modo, methodo rationali. Apoplexia est sympto-

ma, actio scilicet abolita sensus & motus. Morbus, ad quem sequitur, est ex humore obstructio ventriculorum cerebri, tertii vel quarti. Causa istius morbi crasso fa- est humor pituitosus, ex venis ad ventres cerebri descendens. Sunt ergo Ele vera tres affectus complicati in hac apoplexia, symptoma, morbus, & causa curatio. morbi: ex his affectibus actio laesa cum habet suam essentiam in fieri, &

ab alio dependentem, non poterit curari contrariis. Oportebit ergo rr- gentiori succurrere, nempe obstructioni, & si possumus, non negligentes causam. Hæc commode præstabit sanguinis missio ex cephalica vena, quæ (præterquam quod potest exerceri in accessione et post accessionem) reuellit & euacuat ex loco affectio: reuellit enim humorem fluentem ad cerebrum, euacuat autem ex cerebri ventriculis: venæ enim tenuis me-

Dubium. ningis & cerebri inania attrahent ex ventriculis humorem: dubitabis, si ventriculus est plenus, nonne à sanguinis missione abstinerebis, cum eam impediatur, ne cruclius humor feratur ad venas? Respondeo, nos sanguinem mittere propter urgentem affectum, noxa enim illa, quæ ex cruditate se- quetur, deinde poterit emendari: quod quamvis ex Galeni methodo cu- randi colligamus, habemus tamen Gaunariam auctorem ex Arabum familia subscriptorem, qui cap. de phrenitide in principio (inquit) secan-

Finita apo- da vena est etiam ventriculo pleno. Finita accessione apoplexia, quam'o plexia in iam terminata est in paralyfim, considerabimus, an æger habeat incli- paralyfim nationem ad somnum, quam si habeat, etiam sanguinem mitemus, non quid sa- ratione paralyfis, quæ morbus longus est, sed ratione apoplexiæ, non ciendum. præsentis, sed omis, quæ futura timeatur: oportet enim magis inanire re-

as cerebri, ne ex ipsis fluat pituita, quod simul cucurbitulis & frictio-
 libus præstabimus. Quo tempore clysterem parabimus acrem, ut eua-
 uentur pituitosa excrementa a b intestinis & primis renis. ℞. centau-
 æ minoris. m. j. furfuris, fœniculi, anethi, seminis lini ana pug. j. deco-
 quantur in sufficienti quantitate aquæ, de colatura sume lib. 2. in quam
 dissolue, hieræ logodionis ʒ. j. benedictæ ʒ. ss. olei rutæ æci ʒ. iii.

De Apoplexia.

CAPVT XII.

Atonitum morbum Græci apoplexiam nominant, *Descriptio.*
 est autem apoplexia animalium functionum in v-
 niuerso corpore subita cessatio, cum videlicet om-
 nes pariter nerui, tum sentiendi, tum mouendi vim amise-
 runt propter noxam communi neruorum origini cerebro
 inquam illatam. Hæc eadem cum alterutrâ tantum partem
 intestauerit, dextram nempe, aut sinistram, Hemiplexia &
 paralyfis Græce resolutio Latine dicitur, de qua sequenti ca-
 pite sumus dicturi. Initium huic morbo dare procatacticæ *Causæ.*
 causæ sæpenumero consueuere, cum videlicet caput alicui-
 us, aut casu, aut vehementi aliquo ictu vulneratum est, aut
 aliqua alia re percussum. Tunc enim ad eam partem humo-
 res confluunt, ut quæ propter ingentem cerebri concussio-
 nem eos ad se venire permittat. Aeris quoque admodum fri-
 gidi occurfus eandem solet noxam cerebro inferre. Nam &
 caput, spongiæ instar velut manibus apprehensum cōstrin-
 git: & illius humores, atque excrementa in internos cerebri
 meatus cumulati retrudit. Magna tamen ex parte a causis
 internis prouenit, nempe a copiosa pituita, quæ nihil aliud
 est, quam frigidus quidam, crassus atq; viscidus humor, qui
 cerebri ventriculos cōfertim & semel impletos ita obturat,
 ut animalibus spiritibus nequaquam peruios esse patiatur.
 Quod si, unde generatus sit hic humor, quæseris, meminif-
 se debes, quæ superius cum de cephalalgia agebamus, dicta
 sunt, & quod nimix cruditates, crebræque potissimum e-
 brietates huiusmodi succos peperere.

Porro tam grauis hæc affectio est, ut probè de ea scripse-
 rit veræ medicinæ vetustissimus autor Hippocr. Apoplexiã
 fortem soluere est impossibile, debilem vero non facile, cum
 illa statim interficiat, hæc verò in paralyfim transiens nõ ni-
 si longo tempore curetur. Interficit autè propter respiratio-
 nis læsionem, a qua etiam hoc habet, ut vel fortis, vel debilis
 dicatur. Nã si prohibita sit penitus transpiratio, maxima est

&c

D E C V R A N D. M O R B.

& acutissima apoplexia, sicut omnium maxime debilis, quæ parum habet in anhelitu impediti, quæ inter has duas interiacent, pro ut magis ad alterutram accedunt, fortiores aut debiliores dicentur. Læditur vero maxime anhelitus, cū priuatur: quando vero respiramus, sed magna cum vi læsus sane est, & tunc anhelitus, sed minus, minus etiam cum neque intentus, neque violētus est: inæqualis tamen atque inordinatus. Præter hæc etiam intermissus æditur, omnium tamen minime cum aliquem seruat ordinem. Et mirari quidem subit, quomodo musculis omnibus feriat, & motus carētibus in apoplexiis illi, qui respirationi inseruiunt, quāuis difficulter moueantur, tamē plerunque. Videtur autem hoc fieri propter respirandi necessitatem, quæ neruorū vim excitat ad operationem. Præcedit hunc morbū (autore Paulo) capitis confectus, & acutus dolor, venarum, quæ in iugulo sunt elatio, vertigo oculorum incerti & discurretes lucis splēdores, extremarum partium sine causa refrigerationes, dentium stridores, in somno lotium emittitur atrum, pau-

*Note præ
sentis mor-
bi.*

Signa.

Curatio

sanguineæ.

Remissio.

Derivatio.

Alteratio.

Sanguinea apoplexia tribus remediorum generibus curatur. Primo reuellentibus, ut secta vena basilica primum, si magna est plenitudo, aut vtraque cephalica simul: quia seruata rectitudine in morbo breuissimo, & fortissimo cephalicæ sectio est vtilior. Frictionibus totius corporis, præcipue partium infernarum, & earundem ligaturis dolorificis, lotionibus calidis, cucurbitulis, sine scarificatione primò, deinde cum scarificatione, clysteribus, & glandibus acribus, minus tamen potentibus quam in pituitosa.

Secundo, vacuantibus materiam cerebri, & ventriculorū eius iterum secta vna, aut duabus cephalicis, post vena frōtis. Deinceps fiat vacuatio per hoc, vel simile medicamentū: ℞. hieræ picræ. S. ʒ. j. pilularū de rhabarbaro ʒ. j. rhodomellis ʒ. j. aquæ cichoreæ. q. s. misce, & fiat potus.

Tertiò, alterantibus intemperiem calidam a sanguine relictam: ut oleo & aceto rosatis, & similibus: quæ initio non conducunt (quamuis repellant) propter obstructionem. Ele-

ctuar

tuarium diarhodon.abbatis est in hoc genere optimum.

Pituitosa apoplexia, quæ ferè semper fit, curatur quatuor *Pituitosa.*
auxiliorum generibus, primo, victu tenuissimo, præsertim *Victus.*
primis tribus diebus, deinde solo iure pullorum columbi cū
iceribus nigris, & pipere nutriatur, & aqua mellis, & nu-
cleis pineis saccharo conditis.

Secundo auertentibus, vt acris clysteribus caput & pi- *Auertiendi*
uitam vacuantibus, qualis est hic: ℞. vtriusque cyclamini,
mentaureæ minoris, hellebori albi, colocynthidis in ligatu-
ra positæ an. m. j. fiat decoctum in libr. tribus aquæ ad con-
sumptionem duarum, cuius ℥. vj. in anum mittantur, & si ci-
o ab ano elabuntur, rursus repetantur, & infundantur, do-
nec humorū copia vna cum clystere deiiciatur, sequens cly-
ster est optimus, & potens: ℞. saluæ, roris marini, stecha-
los, rutæ, hyssopi, & pulegij an. p. j. fiat decoctum, de quo ac-
cipe libram vnā, cui adde hieræ logodionis ℥. j. pilularum
cochiarum ℥. j. olei rutæ & de lilio an. ℥. ij. salis gemmæ ℥. j.
℥. misce, & fiat clyster. Glandes acres quoque auertunt, & e-
iacuant, & maxime sunt necessariae, præcipuè cū clyster
accipi, aut retineri non potest, quales sunt hæ: ℞. pulueris
hieræ logodionis ℥. v. salis gemmæ, colocynthidis, & helle-
bori an. ℥. j. mellis quod sufficit, misce, & fiant tria supposi-
toria filo appensa.

Tertio, vacuantibus pituitam crudam (quia hic morbus *Purgatio*
est acutissimus, dependens à materia fixa in membro princi- *sine præpa-*
pe, & ideo quodammodo turgida, quare moram, & tempus *ratione hu-*
apparandi nō concedit) etiam valentibus, & largioribus me *moris.*
licamentis purgantibus: virtus enim expultrix in iis est so-
pita, & meatus angusti, vt sanguis & spiritus per ipsos per-
neare non possint. Huiusmodi sunt pilulæ cochiae, pilulæ
ætidæ, pilulæ de sarcocolla & euphorbio, dissolutæ ℥. j. ℥.
earum cum ℥. ij. aquæ stechados, & ℥. j. syrupi de hyssopo: aut *Potus.*
fiat vacuatio per hunc aut similem potum: ℞. electuarij in-
di maioris ℥. iij. agarici trochiscati ℥. j. rhodomellis ℥. j. a-
quæ saluæ quod sufficit, misce, & fiat potus. Deinde fiat va- *Derivatio.*
cuatio per loca propinqua gargarizatu, vulgò gargarisma
dicitur, & errhinis (quæ dicuntur à medicis & pharmacopo-
is barbaris nasalia, aut caputpurgia) & sternutamentis &
apophlegmatismis, quæ à nostris dicuntur masticatoria. Hæc, *Aduerte.*
quia magnam agitationem propè affectam partem efficiunt,
nocent ante vacuationem vniuersalem, aut totius corporis,
nisi in maxima necessitate, vbi timeretur subito mors.

Errhina, seu caputpurgia medicamēta, quæ sternutamē- *Errhina.*

DE CVRAND. MORB.

ta efficiunt, aut sunt.

Mitiora, vt { Aquæ capitales destillatæ, anagallidis v-
triusque succus, ceparū succus, cyclamini
succus, brassicæ succus, succus siclæ, succus
foliorum enulæ campanæ. Aut,

Valentiora, vt { Ireos succus, marrubij succus, radicis ni-
gellæ succus, hellebori succus, radicis agre-
stis, cucumeris succus, castoreum, piper, hel-
leborum album, euphorbium.

Apophle- Apophlegmatismi (vocant nostri masticatoria) aut sunt.

gmatisimi. Mitiores, vt { Hyssopus, origanum, thymus, pulegium,
cappares:

Valētiore, vt { Synapi, mastix, radix acori, zinziber, pi-
per, pyrethrum.

Hoc schemate continetur cognitio medicamentorum à capite purgantium per proxima loca, tam habētium facultatem mitem, & clementem, quam eorum, quæ sunt valenti facultate prædita: quorum formas tyronibus in hunc modū describemus. Gargarizatus clemētis formula: ℞. maioranæ, origani, saluiæ, roris marini, stachados an. p. j. fiat decoctum in lib. ij. aquæ, donec tertia pars absumatur, cuius collaturæ adde rhodomellis, oxymellis cōpositi an. ʒ. iij. misce, & fiat gargarizatus. Valentioris formula est: ℞. aquarum saluiæ, stachados, betonicæ, roris marini an. ʒ. iij. aque vitæ ʒ. j. hieræ. S. ʒ. j. mithridati, & theriacæ magnæ an. ʒ. ij. oxymellis scillitici ʒ. ij. syrupi acetosi S. & rhodomellis an. ʒ. iij. misce, & fiat gargarizatus, quo sæpe os & palatum abluatur. Formula errhini solidi mitioris est hæc: ℞. pulueris maioranæ, saluiæ, piperis, gariophyllorum & nucis muscatæ an. ʒ. j. the-rebinthinæ & ceræ, quod s. misce, & fiant errhinā, seu nasālia effigiem pyramidis referentia. Valentioris errhini formula hæc est: ℞. pulueris pyrethri, piperis longi, hellebo-ri, castorei an. ʒ. j. terebinthinæ & ceræ an. q. s. misce, & fiant errhina, seu nasālia forma pyramidis, quæ naribus impo-nantur.

Formulæ Forma errhini liquidi, seu caputpurgij mitioris: ℞. succi
omniū. betæ, brassicæ, & ciclamyni an. ʒ. iij. misce. Valentioris for-mula hæc est: ℞. succi ireos, marrubij & cucumeris sylue-
stris an. ʒ. ij. pulueris nigellæ, & piperis an. ʒ. j. pulueris helle-
bori & euphorbij an. ʒ. ss. misce, & huius parum naribus in-
dilletur. Forma pulueris hæc medicamenta naribus inamif-
sa sternutamenta efficiunt, & caput purgant.

Forma apophlegmatismi, seu masticatorij mitioris hæc
est:

est: ℥. pulueris piperis, mastichis, zinziberis & galangæ an. 3. s. origani, thymi, pulegij an. 3. j. cum oxymelle. S. & pauca cera, fiant formulæ ad magnitudinem lupinorum. Valentioris formula hæc est: ℥. pulueris sinapis, stasifagriæ, piperis, & pyrethri an. 3. j. s. hellebori 3. j. cum oxymelle scillitico & cera, fiant formulæ ad magnitudinem lupinorum, quorum vnus in ore detineatur semper & manducetur.

Post hæc capiti raso admoueat^{Topica.}ur hoc vnguentum, seu sinapismum: ℥. olei costini, castorei, & de euphorbio an. 3. j. pulueris sinapis, euphorbij, & serapini an. 3. j. aceti cochlearium vnum, ceræ quod sufficit, misce, & fiat vnguētum. Demum frixorium ferreum, seu candentē sartaginē tantopere oportet capiti admo^{Observa-}ueri, vt capilli ægri cōburi videātur.

Et quia ab hac apoplexia, quæ debilis vocatur multi euadunt, non omnes (Galeno teste) quibus signa lethalia sunt, moriuntur: multi etiam citra expectationem vllam sanātur, quia accidunt monstra in rerum natura: ad cognoscendum viuat ne, an mortuus sit æger, cū sit simillimus mortuis, obseruanda erunt hæc signa, quæ a respiratione colliguntur, priusquam operi manum admoueamus, ne vsu veniat nobis, quod aliquibus medicis, qui in mortui aluum clysterem infuderunt, & venam cadaueris iusserunt secari. Si lana carpta, aut gossipium carptum naribus, aut ori admota, vel candela accensa, aut cyathus aquæ plenus pectori etiam appositus moueantur, vitæ certissimum est indicium. Speculum quoque tersissimum ori & naribus admotum, si maculetur, respirationē & vitam testatur: & quamuis nulla indicia vitæ appareant, si fuerit æger imbecillus, aut suapte natura frigidus, non est sepeliendus nisi post tres dies. Illo enim spatio mouentur omnes corporis humores, & extra illud, aut mortis aut vitæ euident demonstrabit signū: & ideo Eangelium secundum de Lazaro, inquit, fœter, quia quatruiduanus est: primis tribus diebus aliqui corde frigidi visi sunt reuixisse.

De paralyfi, quam Latini resolutionem dicunt. CAP. XIII.

Dictum superiori capite iam est, paralyfim tunc fieri, cum alterius lateris nervi dextri scilicet, aut sinistri motu pariter ac sensu priuantur, quibus si pauca quædam adiecerimus, nihil (vt reor) quod ad naturā morbi spectat, desiderabitur. Est ergo paralyfis alterius lateris mollificatio cum priuatione sensus & motus. Animaduer

uertere tamen oportet, quod nō semper integrum latus resoluitur: nam & tota manus, & totum crus interdum (vt inquit Galenus) resoluitur, atq; solus in crure pes, & quæ sub genu sunt, & vt verbo rem complectar, sæpenumero vnus tantum membri sensus deperditur, ac motus, vt linguæ, oris, vesicæ, & aliarum corporis partium. Porro cum in paralyfi nunc motus, nūc sensus, sæpe vero vterque simul pereat, resolutio potissimum tunc dicitur (autore Gal.) cum motus amissus est. Nam cum sensus tantum eripitur, expertem sensus particulam magis dicimus, quam resolutam, quamuis id etiam in vsu sit, vt resolutam appellemus. Vnde tamē id accidat, vt perduto sensu particulæ seruetur motus, & contrarij & quare etiam ambo simul intereant, cōsulere quintum caput oportet quarti libri de morbo. & symptomate: nunc illud nouisse satis erit, propter horum amissionem paralyfium fieri. Sequitur hic morbus frequenter apoplexiam, & (Galeno autore quarto de victu acutorum, commētatio vigesimo octauo) paraplexia priuatim dicitur. Quare generalius nomen erit paralyfis, omnem resolutionem complectens, siue ea apoplexiam sequatur, siue aliunde proueniat. A quacunque fiat occasione, humorem frigidum, crassum, & lentum causam habet, qui neruos obstruens, spiritibus motum ac sensum deferentibus viam præcludit. Morbus cuius ex amisso sensu, ac motu facile patet: monere tamen interim cōuenit imperitiores huius artis in faciei resolutione, quando alterius partis nerui resoluti sunt, vt in ea affectione (quam Græci caninam conuulsionem appellāt, vulgus medicorum oris torturam dicit) malum non in ea parte cōsistere, in quā altera inclinata est, sed in illa, quæ seipsam declinat, & in cōtrarium trahitur: cui etiam medicamenta sunt admouenda,

Causæ.

Notæ.

*Pars de-
lapsa labo-
rat.*

*In quo dis-
ferant pa-
ralyfis &
stupor.*

quod ad curationem non paruum affert momentum. Sed quando oris tortura fit à conuulsione, ægra pars trahit ad se sanam, vt docet Gal. lib. 2. de causis morborum, cap. 7. & lib. 3. & 4. de locis affectis. Errant ergo Auicenna, & Gentilis calumniantes Galenum optimum veritatis indagatorem. Cognosces torturam fieri a conuulsione, dolore, tentione, & duritie quadam. Contraria sunt, quando fit à resolutione.

Differt verò hic morbus ab stupore, quamuis sub eodem genere vterque contineatur, magnitudine: cum enim incipit affectio, stupor fit: postquam verò consummata fuerit, resolutio: vnde Galenus libro 2. de locis affectis cap. 1. mediam quandam dispositionem stuporem facit inter resolutionem, & integram valetudinem.

Cur

uratio resolutionis quinque remediorum generibus con-
 uratio. primo, victu calefaciente, siccante, & pituitę generatio-
 m prohibente, vt aere arte parato, suffitu rerum calfacien-
 im, si opus fuerit, initio tamen, dum fluit materia, & ante *victus,*
 acuationē, calfactio fiat remissa, ne si maior fiat, humores
 lesiant, & augeatur fluxus. Panis sit bis coctus, & aniso in-
 erfus, vel semine melanthij, vt est mos Agarenorum, ab il-
 dicitur xenuz. Carnes sint auium montanarū, quales sunt
 rdices, turtures, colūbi syluestres, & similes iis. Bibat aquā
 nnamoini, aut aquā mellis, quia vinum nocet neruis, tum
 od in acetum in iis conuertitur, tum etiam quod ad ipsos
 emittit humores: quamuis in medicamētis cum melle, aut
 ccharo non noceat acetum, vt in oximelle. S. & similibus.

Secundo concoquentibus pituitam incidendo, tenuando *Præpara-*
 tergendo eam clementioribus, primo per v. aut vj. dies: vt *tio.*

℞. rhodomellis ℥. x. Item ℞. aquarum saluæ & fœniculi an.
 vij. misce. Secundo, valentioribus, vt sunt syrapi de hyssō-
 o, de stachade cum oxymelle. S. & comp. Tertiō, valentissi-
 us, vt sunt syrapi de v. radicibus, oxymel compos. & scillici-
 um, & syrupus de stachade. His omnibus simul, aut aliqui-
 us cum dupla quantitate aquarum, aut decocti rerum ca-
 italium paratur pituita, perpetuo tamen sit quantitas ma-
 or syruporū sine aceto, quia, vt dixi, maxime neruis nocet.

Tertiō, vacuantibus pituitam primō clementioribus, vt *Purgatio.*
 unt Hiera. S. agaricus trochiscatus, pilulæ elephanginæ &
 fluaret. Secundo & tertiō valentioribus, vt sunt pilulæ de
 garico, pilulæ cochix, fetidæ, de sarcocolla, de euphorbio,
 & similes: electuarium indum vtrunque, post ergo primam
 concoctionem clementem fiat vacuatio sic: ℞. pilularum de
 hiera. S. & agarici trochiscati an. ℥. ij. fiant pilulæ vij. aut
 ℞. diacatholicon. ℥. ℞. agarici trochiscati ℥. j. electuarij indi-
 maioris ℥. iij. ℞. rhodomellis ℥. j. aquæ fœniculi. q. s. misce, &
 fiat potus. Post secundam concoctionem fiat per hoc, aut si-
 nile medicamentum vacuatio: ℞. pilularum de agarico, &
 cochiarum an. ℥. ℞. cum aqua saluæ fiant pilulæ vij. aut ℞.
 agarici trochiscati, & turbit electi an. ℥. ℞. electuarij indi-
 maioris ℥. iij. rhodomellis ℥. j. aquæ saluæ quod s. misce, & fiat
 potus. Tertiō, & quarto, si opus fuerit, fiet vacuatio per pilu-
 las fetidas, aut de sarcocolla, quamuis inusitatae sint hæc de
 sarcocolla, vel ℥. ℞. electuarij indi maioris, vel diachartami
 facto potu cum aqua, aut decocto capitali addendo ℥. j. rho-
 domellis: quia pilulæ diutius in ventriculo detinentur in iis
 & similibus morbis, qui a ventre longo intervallo distant.

DE CVRAND. MORB.

Laudantur magis, fitque per eas melior & maior euacuatio.

Auersio. Quarto, auertentibus materiam in partem contrariam, ne fluat ad spinalem medullam: quod fiet per medicamēta purgantia: de quibus tertio genere diximus, per clysteres & suppositoria dicta cap. precedenti. Auerti etiam potest materia errhims, sternutatoriis, apophlegmatismis, & gargarismatis, de quibus in extremo cap. superiori abunde diximus. Huic tamen mitiora, & illi valentiora conueniunt, quia apoplexia maximus & acutissimus est morbus.

Resolutio, & correctio. Quinto, dissipantibus & resoluentibus materiam partium affectarum, & cerebrum, & ipsas roborantibus, perpetuo tamen est diligenter animaduertenda sententia Gale. aurea i. locorum affectorum illius, cui ex casu e curru digiti resoluti erant, quem sanauerat admoto emplastro spinali medullæ:

Observatio. qua parte affecta nerui ab ea ad digitos progredientes obstructi erant: ab aliis imperitis medicis medicamēta tantum digitis imponebantur. ʒ. j. theriacæ magnæ, aut mithridati cum aqua, aut syrupo calido capitali multis diebus sumpta hæc omnia efficit. ʒ. ij. diamusci dulcis eandem habent vim, si multis diebus deuorentur, radix acori condita, aut eryngij est optima. Hæc cōfectio habet quoque eandem, aut similem facultatem: ℥. diamusci dulcis ʒ. ij. acori conditi ʒ. j. conseruæ anthos, & stechados, an. ʒ. iij. theriacæ magnæ, & mithridati an. ʒ. ij. pulueris galangæ, piperis, cassiæ lignæ, calami aromatici an. ʒ. j. syrapi de stechade, quod satis est, misce, & fiat cōfectio: Dosis ʒ. ij. cum ʒ. ij. aquæ, aut decocti, aut syrapi capitalis. Partem resolutam, & spinalem medullam, iuxta

Confectio. vertebra, per quas oriuntur nerui, quibus sensus & motus illi parti datur, vnge bis in die hoc vngueto: ℥. olei euphorbij, castorei, rutæ, & de lilio an. ʒ. j. vnguenti aragon & dialtheæ compositæ an. ʒ. ss. ceræ quod satis est, misce, & fiat vnguentum. Aliquando præsertim præcedenti hac vnctione, & existente humore in profundo cucurbitulæ admotæ parti resolutæ materiam dissoluunt. Balnea potentia calida & sicca naturalia, & artificiosa, sunt optima, vt sunt sulphurea, & quæ fiunt ex decocto roris marini, camomillæ, saluiæ, rutæ,

Vnguentum. origani, & similium. Quidam affectus diuturna resolutione post cōsentaneas vacuationes curatus fuit hoc medicamento: Accipe lapidem molarem ignitū, quem sparge vino maluatico, cuius suffitu & euaporatione pars resoluta calefiat bis in die, post vaporē vngatur hoc vnguento: ℥. olei de euphorbio ʒ. iij. olei rutæ ʒ. j. castorei, pyrethri, trionpiperon an. ʒ. j. pulueris rosarum ʒ. j. ss. cere. q. s. misce, & fiat vnguent.

Hæ

Hæ pilulæ sunt maximè efficaces in hoc genere: ℞. castorei, assæ fœtidæ an. ℥. j. ligni aloes electi ℥. ij. cum mithridatæ pilulæ xij. fiant: quarum dosis sunt tres tertio quoque die mandæ ante solis ortum per horam. Si multis diebus bibat ℥. iij. aquæ roris marini cum granis tribus pyrethri, erit ad hæc optimum remedium.

In resolutione, quæ fit cerebro primo affecto, cauterium *Aquæ roris marini.* stuale in initio colli iuxta nucam, vulgò ita dictam, est efficacissimum remedium, & alterum post ultimam vertebra, sed eo- *In paralyse* im penetratio debet esse non magna. Si verò sit particula- *per prima-* ris, cauterium fiat in parte affecta, sed providendum est, ne *riam affe-* is, aliisque remediis calidis pars resoluta inflammetur, ut *etionem ob-* sepe fieri solet ab imperitis medicis. *servatio.*

Si resolutione laboret aliquis, propterea quòd ex alto ceciderit, aut propter inflictum vulnus, desperatus est ille æ- *In paraly-* ter, præsertim si tumor induruerit, a quo obstruantur nervi, si ex casu, tandem resoluantur. Si verò ab aliquarum vertebrarum *aut ictu,* luxatione resolutio genita sit, per reductionem vertebrarum *&c.* in suum locum curabitur. Post reductionem ad dissoluen- um humorem, si sit in nervis, hoc medicamentum affectæ arti semel in die admoveatur: ℞. farinæ fenugreci, bdellij, rmoniæ an. ℥. j. piperis albi, seminis been an. ℥. ij. axungie natis ℥. iij. olei de lilio ℥. j. semis, misce, & fiat ex his secun- um artem cataplasma, seu emplastrum, quòd parti resolu- *emplastru* æ, & origini nervorum admoveatur. *restituito*

De Paralyfi, quam Latini resolutionem dicunt.

CAP. XIII.


Scholium.

Ictum superiori capite.) Paralyfis aut est exquisita, in *Dividitur* qua sensus & motus deficiunt, aut non exquisita, quando al- *paralyfis.* terum eorum servatur: quæcumque sit, aut est in medio corpo- e, aut in vna tantum parte. Si medium occupat corpus, morbus erit in cerebro, aut in principio spinalis medullæ: quod distingues ex dimidia apitis parte affecta, aut non affecta. Si paralyfis vnius tantum partis Paralyfis est, tunc in peruo illius partis quærendus est morbus, ac proinde exortus quid sit. nervorum sunt intelligendi, lege lib. 2. de caus. symp. cap. 5. Paralyfis est Morbus in symptoma, actio scilicet abolita. Morbus, ad quem sequitur, est obstru- paralyfi. tio ab humore crasso, aut tumore facta. Dices, si nervi non sunt cani, quo modo obstruuntur? Respondeo Gal. obstructionem appellare. 2. libro de Obiectio. caus. symp. Omne illud, quod impedit transitu humoris, aut alterationis.

D E C V R A N D. M O R B.

Practici taxantur. Quamvis tamen hæc sententia probabilis appareat, existimo tamen in paralyfi morbum esse in numero additum, est enim additus humor impediens actionem; neque poterit dici humor ille obstructio, si proprie loquamur: quia nervus caret cavitate, & hac ratione suffusio etiam diceretur obstructio. In curatione paralyfis revellunt practici humorem ab spinali medulla purgatione, omittentes sanguinis missionem, male tamen, cum hæc sola revellat humorem a parte affecta, quod non poterit recte prestare purgatio carens in principio occasione, humore existente crudo, & non sequace. Si obicias humorem esse frigidum in paralyfi, & ideo non esse mittendum sanguinem: Respondebo, aut humorem frigidum esse multum ei secretum a sanguine, aut habere satis insignem quantitatem sanguinis admixtam. Si multus est, & secretus a sanguine, tunc non mittemus sanguinem, quia non constant vires: si vero multum sanguinem habeat permixtum, sanguinis missio exercenda erit. 6. epy. par. 4. com. 43. non ratione morbi, quia cum fiat ex pituita, purgationem postulat: sed Sanguinis ratione affectus venarum, hoc est sanguinis vitiosi. Sanguine, ut decet, missio in misso & humore purgato, distinguemus in parte inclusum topicis medicamentis, ita ut in principio sint lenia, ut totum evacuent humorem, aliter enim evacuata parte tenui reliquum indurabit, & incurabilem efficiet affectum. Deinde hoc veteris unguento. ℞. olei laurini et vulpini an. ʒ. ii. ℞. unguis visci ʒ. i. ℞. sagapeni, opoponacis ana. ʒ. ii. unguenti marciaron ʒ. i. ℞. ceræ parum, & fiat unguentum, quo caput, aut principium spinalis medulla, aut principium nervi, si sit paralyfis particularis unges.

De convulsione. C A P. X I I I.

Descriptio.  Onuulsio, quam Græci spasmon appellant (auctore Gal. vj. aph. com. 39.) affectio est involuntaria ad similem venientibus nervosis partibus dispositionem quam etiam in motibus voluntariis assumunt. Unde & ab eodem recte dictum est lib. 5. de morbo & symptomate, convulsionem esse, quæ nervos musculosque ad eundem cogit affectum, in quem ipsi ab animali facultate, cum habitum naturalem servarent, ducebantur. Quæ si ita sunt, constabit sane convulsionem in convulsis partibus factam hac sola ratione a motu naturali differre, quod præter voluntatem nostram convulsio fiat, cum in ea non ab arbitrio, sed a morbi imperio nervi in suam originem convellantur: quæ sola in parte dissimiles sunt naturalis motus, quem voluntarium dicimus, & iis qui in convulsionibus reperitur, cætera similes sunt fere. Quod rem ipsam consideranti, & Galeni insuper librum tertium de locis affectis, & quintum de morbo, & symptomate legenti, facile constabit.

Eod

eodem enim modo fiunt : nam & volūtarius motus interim
 intentis versus principium musculis, interim ab irruente spi-
 ritu impletis perficitur, ita conuulsio eodem modo accidere
 solet. Nam & spiritus intra ipsos generantur, qui eos inflare
 possint, & cōplures etiam affectus, qui illos intēdere queant:
 cuiusmodi est phlegmone : quos omnes Galenus ex Hippo- *Diasio.*
 e in duo capita reuocauit, plenitudinem, & inanitionem.
 Phlegmone plenitudinem parit, ardentissimæ & aridissimæ
 febres inanitionem. Porro quod neruosa corpora omnia tē-
 li possunt, siue oppleta ea sint, siue inanita, argumento sunt
 nulla instrumenta: etenim rumpuntur eorum chordæ, siue
 in humido, vaporosōque, siue in arido & squallēti cubiculo
 intentis etiamnum chordis collocentur. Quod cum intelli- *species.*
 gant huius rei haud ignari artifices, eas antequam reponūt,
 laxare solent. Conuulsionis in vniuersum tres species tradū-
 tur Græcis appellatæ nominibus, quarū prima emprostho-
 tonus dicitur, id est, tensio ad anteriora, & fit quoties caput,
 ceruix reliquūque corpus in pectus contrahitur. Secunda
 opisthotonus, id est, tensio ad posteriora, acciditque cū ca-
 put in dorsum conuellitur, scapulisq; velut annectitur. Ter-
 tia ex vtrāque composita, tetanus appellatur, Latinis tensio,
 Celso rigo : qua affectione qui laborant, recta ceruice velut
 frigore concreti rigent ita, vt neque in hanc neque in illam
 partem flecti possint : sed quasi ab vtrāque impediuntur, in
 neutram inclinant. Quæ sane species aut differētia conuul-
 sionis reliquis periculosior est, autore Hippocr. Quicunque *5. lib. apho-
ris. 6.*
 tetano corripuntur, in quatuor diebus pereunt, si vero hos
 effugerint, salui fiunt: peracutus enim morbus est: vnde & iu-
 dicationem fieri oportet in primo circuitu dierum critico-
 rum, non tolleranti natura longiori tempore tentationis labo-
 rem. Et contingit sane per has differentias interdum vniuer-
 sum corpus conuulsione tentari, interdum vnā partem,
 proinde ac in paralyfi quoque fieri diximus. Conuulsio verò *Simile.*
 vniuerso corpore (vt omnes quidem autumant) talē quan-
 tiam partem effici necesse est : quæ vt in arbore caudex ra-
 morum, sic ipsa sit omnium neruorum communis origo: aut
 quoties vel crus, vel altera tantum manus cōuellitur, illius
 membri conuulsio neruorum, qui ad ipsum perueniunt, ori-
 ginem affectam fuisse declarat rami cuiuspiam exemplo in
 arbore. Atque huius quidem conuulsionis, quæ scilicet par-
 ticulare aliquod membrum afficit, multæ sunt differentię:
 quippe si quis violenti aliquo dentium stridore vexetur, ma-
 xillares musculi conuulsione laborant, per inuersiones verò

Causa. & strabisinos conuelluntur oculorum muscoli. Iam & gonorrhæa cōuulsionis species censetur, verum distinctione adhibita: si enim rigido pene semen effluat, veluti conuulsio quædam est: si non rigeat penis, ad retentricis facultatis imbecillitatem referri debet. Sed longum esset omnes differentias recensere. Causas huius morbi, tametsi superius obiter eas attigimus, clarioris tamen & vberioris institutionis causa accuratius repetemus. Duæ ab Hippocrate in vniuersum ponuntur plenitudo, & inanitio: oppletis siquidem, aut vehementer exinanitis neruosis partibus cōuulsiones accidunt, quemadmodum euenire in lyricis fidibus antea dictum est:

Aduerte. & in tergoribus, quoque ac loris accidere Gal. ait: verum tertium eis adicere conuenit, nempe consensum aliarum partium, a quibus conuulsio non raro excitatur, quam conuulsionis differetiam, qui Arabum sequuntur placita, spasmus non proportionatum ad materiam appellant, quod scilicet non contingat propter materiæ multitudinem neruos implentis, neque propter eiusdem inopiam eos inanientis, atque exsiccantis: fit autem quoties aliquid à parte primò affecta ad cerebrum ascendit, quod vt excutiat, vehementer & inquiete concutitur. Solet autem per consensum infestare neruorum originem, ita vt ad ipsam aliquid ascendat, quod hanc conuulsionem inuehat, vel impactus neruosis partibus erodens aliquis humor, vt in eo qui propter eruginem in ventriculo contentam conuulsionem patiebatur, vt videre est v. aph. com. j. aut venefica aliqua qualitas, aut spiritualis substantia in cerebrum elata, vt de puero refert Gal. qui quotidie in epylepsiam incidebat, propter nescio quid, quod à crure in cerebrum ascēdebat simile illi, quod ab scorpione, & ab aliis venenatis seris iniecta parte relinquitur, quod cum mole minimum sit, facultate maximū est. Iam & neruorum punctura hoc ipsum efficere potest (quod Galen. confirmauit tertia parte artis medicinalis) quoniam ea pars cerebro continuatur, promptaque est ad cōuulsionem excitandam: & vniuersim, id omne quod propter illatum parti nocumentum cerebrum ita afficit, vt ipsum ad expulsionem rei noxiæ per huiusmodi motus excitet, hoc genus conuulsionis efficere potest.

Notæ. Notis, quibus morbus dignoscatur, non est opus: satis enim per se patet, a qua tamen fiat causa, sic deprehenditur. Conuulsio, quæ à plenitudine fit, sanum corripit subito eueniens, aut saltem nō multo post morbi initia: quæ verò propter inanitionem accidit, nō similiter euenit, sed post ardentes febres, plurimāsque euacuationes, siue persudores, vomitum, diarræ-

iectiones infernas, sanguinis profusionem, siue aliquo alio modo factæ fuerint. Hæc enim omnia, atque alia his similia cum corpus exhauriant, conuulsionem inaniendo inducunt. Tertiam illam differentiam quæ per consensum est, ab ægrotantis, aut assidentium sermonibus oportet exquirere.

Conuulsio ex repletione pituitosa (a qua frequentius fit) curatur sex remediorum generibus. Primo calfaciente, & occante victu simili resolutorum victui, de quo præced. cap.

Secundo, pituitam concoquentibus, primo clementibus, *Curatio pi*
secundo valentioribus, tertio valentissimis: de quibus cap. *pituitosæ.*
superiori abunde diximus, nisi doloris vehementia, & ma- *Victus.*
gnitudo ordinem peruerteret, tunc oportet vacuare mate-
riam, etiam si non sit turgida, ne pereat æger. Ante conco- *Purgatio*
ctionem etiam per medicamenta valenter purgantia, quo- *sine præpa*
rum formas capite superiori docuimus, & sequenti etiam *ratione.*
genere trademus. *Purgatio.*

Tertio, purgantibus materiam paratam, si intermissionem fecerit dolor, aut crudâ, si vehemens & magnus fuerit. Quales sunt pilulæ de agarico, de hiera composita, cochix, scetidæ de sarcocolla, & de serapino, & opopanace; quamuis tres ultimæ non sint deuorandæ, nisi ægri vires validæ sint, & morbus magnus, & alia minus valenter purgantia medicamenta non satis idonea sint. Electuarium etiam indum purgat pituitam, & alia de quibus i. cap. & capitibus de cephalalgia pituitosa, de apoplexia, & de resolutione satis copiose diximus. Primum ergo propter tyrones post primam mitigationem concoctionem, sequentibus pilulis fiat vacuatio: *℞. pi- Vacuatio*
lularum cochiarum, & agarici trochiscati an. ʒ. ʒ. cum aqua *secunda*
saluæ fiant pilulæ viij. aut hoc: *℞. diacatholicon. ʒ. ʒ. electua- validior.*
vij. indi maioris ʒ. iiij. ʒ. agarici trochiscati ʒ. j. rhodomellis
ʒ. j. aquæ præoniæ q. s. misce, & fiat potus. Secundo, post secundam valentem concoctionem his pilulis euacua. *℞. pi-*
lularum cochiarum, de agarico scetidarum an. ʒ. j. diagridij *Tertia.*
ʒ. iiij. cum aqua saluæ fiant viij. pilulæ: aut *℞. electuarij* indi
maioris ʒ. iiij. ʒ. agarici trochiscati, & turbit electi an. ʒ. ʒ. sa-
lis ʒ. ʒ. Rhodomellis ʒ. j. ʒ. aquæ stachadis q. s. misce, & fiat
potus. Tertio, post tertiam valentio rem concoctionem fiat
his pilulis vacuatio: *℞. pilularum scetidarum ʒ. iiij. pilularum*
cochiarum ʒ. j. diagridij. ʒ. iiij. cum aqua roris marini fiant
pilulæ viij. Aut *℞. agarici trochiscati, & turbit electi an. ʒ. ʒ.*
diachartami, & electuarij indi maioris an. ʒ. iiij. rhodomellis
ʒ. j. ʒ. aquæ roris marini, quod satis est, misce, & fiat potus.

Quarto, auertentibus ad inferiora materiam, vt clysteribus *Auersio.*

DE CVRAND. MORB.

actibus, & glandibus, frictionibus, & vinculis dolorificis in parte contraria, errhinis, apophlegmatismis, gargarisatu, & similibus, quorum copiolam tractationem vide cap. xij. de euacuatione apoplexiæ.

Discutio.

Quinto, digerentibus, seu resoluentibus materiam nervis amixtam internis, & externis, ut vsu longo diamusci v-

Confectio.

triusque, mithridati, aut theriacæ magnæ, confectionis anacardinæ, & similibus. Acorus conditus est etiam in hoc utilis cum aqua, aut decocto, aut syrupo capitali. Hæc mixtura conterit multum in hoc genere: ℞. diamusci dulcis ʒ. j. diagalangæ ʒ. ss. pulueris diacymini, & aromatici rosati an. ʒ. ij. pulueris calami aromatici, galangæ, & radices præoniæ an. ʒ. j. ss. radices acori conditæ ʒ. iij. syrupi de stæchade. q. s.

Topica.

miscæ, & fiat confectio: Dosis est cochlearium vnum cum aqua roris marini, aut alia simili. Vnctio ex oleo de lilio, vulpino, de semine lini, rutaceo, de castoreo, & de euphorbio, & similibus est optima: Admouere etiam parti conuulsæ pulmones arietum, aut animalia parua bruta recēs per dorsum incisa est quoque optimum remedium ad resoluendum, ut sunt pulli gallinacei, columborū, parui canes, & catuli. Cōfert quoque manum, aut partem conuulsam in bouem, aut aliud animal recens cælum immittere, & ibi, dum caleseat, tenere. In vinum nouum feruens immittere manum est vtile.

Balnea.

Probatissima sunt in hoc morbo balnea, præsertim naturalia, ut sulphurea, aluminosa, & salsa, aut a nobis parentur ex sulphure, sale, alumine, & herbis, & floribus capitalibus incoctis. Suffitus, & vapor prædicti decocti per lapides ignitos in cacabum iniectos, si toto corpore, aut parte resoluta (si totum non fuerit) sub conopæo, ne expiret vapor exceptus maxime conducit: post quem aut balnea vnctio melior erit, & validior oleis iam dictis, & hoc vnguento: ℞. olei rutæ, & de lilio an. ʒ. j. ss. olei de euphorbio & laurini an. ʒ. j.

Vnguentum.

dialthæ compos. & vnguenti aragon. an. ʒ. ss. pulueris castorei, & diacymini an. ʒ. j. ss. ceræ. q. s. miscæ, & fiat vnguentum.

Limimentum.

Præstantissimū quoque est remedium partes conuulsæ oblinere adipe anseris pinguis, exenterati, & cati parui minutatim concisi, & lardo veteri, myrrha, thymo, terebinthina abietis, farti, & consuri, & tosti. Accipiatur adeps non primus, sed secundus decedens, & distillans in vas fere plenum aceto. Post perfectam tosturam anser in paruas partes diuisus eodem aceto percoquatur, a quo fuit adeps extractus, & alio, si non sufficiat primum vsque ad separationem ossium, & iterū colligatur adeps supernatās, qui mixtus cum priori

val

alentiori referuetur ad idem hoc, quod supra diximus, efficiendum. Sequens quoque vnguentum est optimum: ℥. olei atæ, lumbricorum, & de lilio an. ʒ. j. s. olei castorei, & costi-
i an. ʒ. j. agrippæ, dialtheæ, & marciaton an. vnciam s. ceræ *Unguentum.*
quod satis est, misce, & fiat vnguentum: quo pars conuulsa
ngatur, & vertebræ, per quas nerui oriuntur illi parti sen-
um & motum tribuentes, aut ceruix, & tota spina, si fuerit
niuersalis conuulsio.

Sexto, corrigentibus symptomata, præcipue dolorem, qui *Sympto-*
liquando solet esse tam intensus, & intolerabilis, vt vix æ-*matu cora*
er possit illum ferre. Balneum olei communis est bonū me-*rectio per*
iocriter calidum: melius si sit cum decocto seminis lini, scæ-*ropica.*
iugræci, lumbricorum, foliorum maluæ, violarum, & camo-
millæ: optimum erit balneum ex oleo vulpino, sed hoc ma-
ori prætio emitur. Dolorem hunc lenit oleum rosaceum cū
uorum vitellis aliquot. Eiusdem, aut maioris etiam facul-
tis panis calidus est, cū e furno educitur, cum lacte ca-
prino. Oleorum camomillæ, lumbricorum, & terebinthinæ
mixture pari facultate pollet, aut maiori sæpe. Aliquando
præcipue in maximo dolore, & alius iam expertis est neces-
sarium hoc, aut simile medicamentum narcoticum. ℥. olei
rosati ʒ. iij. thebaici ʒ. s. iusquiami, papaueris albi ana. ʒ. ij.
corticum mandragoræ ʒ. j. aceti ʒ. ij. misce, & fiat instor vn-
guenti. Aut ℥. medullæ panis tritici. p. ij. lactis q. s. vitella o-
iorum numero iij. opij. ʒ. s. misce, & fiat cataplasma, adde
croci in puluerem redacti ʒ. s.

Si ex sanguine sit conuulsio, à quo rarò dependet, vena sc- *Sanguis-*
canda est contraria, vt si brachium dextrum conuellatur ba- *nea.*
silica sinistra, & vicissim: si verò tibia, basilica eiusdē partis: si *Sectio ve-*
torum, basilica dextra, aut vtraque simul, si sit magna pleni- *na.*
tudo. In omni parce sanguis extrahatur, ne vires dissoluan-
tur, quod docet Aetius serm. vj. c. 18. agens de sanguinis mis-
sione in resolutione, quæ parem expescit curationem. Opor-
et autem moderate detrahare sanguinem, ne refrigeretur.

Si sit conuulsio a bile flaua, aut ab atra bile, vacuetur sta- *Biliose &*
tin, præcedenti tamen iusta concoctione, præcipue quæ gi- *atrabilia-*
gnitur ab atra bile, per propria medicamēta, de quibus c. ix. *ris.*

Si est ab inanitione & siccitate, curatur humectantibus a- *Eius quæ*
imentis, & medicamentis, vt cap. de hectica, lib. 2. longius est à sicc-
demonstrabitur, videlicet iure gallinarum pinguium, cap- *tate.*
um, perdicū, vituli, arietis, suis teneri, & similibus animan-
cium cum herbis, aut rebus humectantibus, vt est cremor *Pictus hu-*
mordei. Pus etiam aut aqua testudinum, limacū, & ranarum *mectans.*

D E C V R A N D. M O R B.

Vnguentum. in salubribus aquis degentium confert, lac humanum primo, secundo alinum, tertio caprinum alimentum salutare est in hac conuulsione. Vinum generosum, dilutum potenter humectat. Balneum ex foliis maluarum, violarum, radicum althææ, caricarum, passularum enucleatarum, capiti & pedum arietinorum est optimum ad humectandum. Partes conuulsæ, & tota spina vngatur hoc vnguento: ℞. oleorum sesamini, amygdalarum dulcium, & violarum an. ʒ. ij. mulcilaginis seminis lini, & fœnugræci an. ʒ. j. ʒ. axungia gallinæ ʒ. ij. ceræ, quod satis est, misce, & fiat vnguentum.


Eius quæ est ab ictu venenatorum. Si conuulsio est ab ictu animalium venenatorum, extrahe venenum admoto parti affectæ ano galli gallinacei, aut gallinæ glabro, scabiosa pertrita, & cum vitello oui instar cataplasmatitis apposita venenum educit, ideoque carbunculis pestiferis imponitur. Cape crudum, vel coctum, admotum parti læsæ, eiusdemque succus venenum expellit. Idem efficit eductio. theriaca magna applicita (quanquam utilior est interius assumpta) cucurbitula cum scarificatione parti punctæ affixa est adiumento.

Eius quæ est a casu & percussione. Si a casu, aut percussione aliqua conuulsio sequatur, post victum tenuem, & sanguinis missionem, & euacuationem per clysteres, parti affectæ, quæ parum emolliant, dolorē sedent, & moderate resoluant, sunt admouenda, vt est hoc: ℞. hordei decorticati, camomillæ, farinæ fœnugræci, foliorum maluarum an. p. ij. omnia decoquantur, & cum oleo camomillæ, rosarum, & terebinthine fiat cataplasma.

Eius quæ fit ex punctura neruorum. Si ex punctura non penetrante nerui est, scindatur neruus, aut perforetur: melius enim est viuere parte vna priuata sensu, & motu, quam mori. Deinde apponantur quæ resoluant, & exsiccet humorem in neruis inculcatū, & aperiatur venter os, vt possit optime & liberè pus effundi, & ideò oleum pypericum, sulphur, euphorbium cum oleis lumbricorum & rosarum, & pauca terebinthina erit optima mixtura in hac conuulsione.

De conuulsione. C A P. X I I I I.

Scholium.

Conuulsio quid.  Onuulsio quam Græci.) Conuulsio est motus deprauatus partium nervosarum, quo versus suum principium retrahuntur. Prima parte huius definitionis communicat conuulsio cum *Pars nervosa.* palpitatione, tremore, & aliis motibus deprauatis: reliqua parte ab illis distinguitur. Per partes nervosas cum Gal. 5. lib. aphor. com. intelligi-

gimus nervos, ligamenta, fibras musculorum, & tendones. Principium Partium
 arum partium varium est, nam principium nervi est cerebrum, aut nervosarū
 finalis medulla, ligamenti, os, tendonis, finis musculi: fibrarum muscu- principii.
 eius caput. Harū partū omniū, aut vnius retractione conuulsio appel-
 lur. Quod si Gal. aliquādo Conuulsionem appellat retractionem muscu-
 orum versus suum principium, id facit, quia musculus est instrumen-
 tum motus voluntarii. Aduerte tamen hanc definitionem esse conuulsio- Explica-
 tis, cum sit, nam conuulsio facta motus est abolitus. Causæ conuulsionis tur Gal.
 ius, omnia quæ prædictorum corporum longitudinem abbreviare pos-
 unt, quæ ad duo capita reuocat Hippocr. lib. 6. aphor. sent. 29. repletio- Causa cō-
 tem videlicet, et inanitionem exemplo cordarum vsus. Quod si aliquan- uulsionis.
 lo frigiditatem causam conuulsionis scribat, de causa externa loquitur.
 Auctor tertiam causam conuulsionis addit consensum aliarum par- Auctoris
 ium, decipitur tamen, quia per aliarum partium consensum non fit cō- lapsus.
 uulsio, sed motus conuulsivus, qui cerebri est affectus, aut principii
 pinalis medullæ, & non nervorum. Neque etiam sequendus est, cum
 licet nervos in conuulsione ab spiritu posse contrahi, nam hæc contra-
 ctio non perdurat, ut ostendit ea affectio, quam vulgò rampa appella-
 mus: tum Galenus 2. de caus. symp. ex sententia pneumaticorum loqui- Obiectio.
 tur. Differentias conuulsionis lege apud auctorem: Difficile tamen a-
 licui videbitur, conuulsionem ex repletione nervi fieri sine sensus & mo-
 tus læsione, quia si nervus repletur, non poterit alteratio facultatis per-
 meare. Respondeo in conuulsione repleti nervi inæqualiter, ita ut quæ-
 dam nervi partes libere sint, & per ipsas alterationem descendere.

Conuulsio ex repletione.) In curatione conuulsionis eius causas
 aduerte quia ea pro varia causa variatur. Si fiat ab humore pituitoso
 (ex eo enim ut implurimū euenire solet) auctor purgat, auertit, & topi-
 ca adhibet medicamenta, recte quidem: Omittit tamen vnum remedium Sanguinis
 maximè necessarium, quod reuellit & euacuat humorem, quod est san- nissio.
 guinis missio. Hac in principio imperanda est, ita tamen exerceatur, ut
 non citius quam quantum postulat morbus, quia aliquid omittendum est pro-
 pter symptoma, nempe dolorem qui ob rigilias & sudorem vires deii-
 cit: aduerte etiam sanguinem solum esse mittendum in hoc affectu cum
 pituita satis insignem quantitatem sanguinis habuerit admixtam. St
 a sanguine fiat conuulsio, etiam venam secabis. Conuulsio nunquam Lapsus
 a bile ortum habet, quia, ut diximus, tenuis est, & proinde non po- auctoris.
 test replere corpora nervosa, ac ideo ne sequaris auctorem. Cum conuul-
 sio fiat ab humoribus frigidis, & crassis, aliqui inter quos est Fega,
 sequuntur Cornelium Celsum contendunt, ad eius curationem nobis licere An in cō-
 excitare febrem, ut humores attenuati euacuentur, & eorum frigiditas uulsionem li-
 corrigatur. Quam sententiam possumus auctoritatibus corroborare: pri- ceat nobis
 ma est Hip. qui 4. aph. sen. 57. sic scribit. Qui à conuulsione, id est opisto- excitare fe-
 rono, & emprostotono, aut distentione nervorum, hoc est tetano tenentur, brem.


febr

D E C V R A N D. M O R B.

febre superueniente liberamur. ubi Gal. in commentario, duas (inquit) habet medicamentum intentiones in conuulsione, superfluum solvere humiditatem, & calefacere frigiditatem, quas duas s. febris complet. Præterea 2. aphor. sent. 26. Febrem (ait) conuulsioni superuenire melius est, quam contra. Tertiò Hippocrates 6. epid. par. 6. sen. 7. Si prius (inquit) epilepsia capiantur aliqui, & quartana superueniat liberatur. & quatuor hæc loca videantur ostendere licere nobis in hoc affectu febrem excitare: multò clariùs idem Hippocr. 2. epy. sec. 5. statim post principium, id visus fuit docere, si puerperis (inquit) conuulsio fiat, igne excitato: ex quo loco multi colligunt non solum posse nos excitare febrem, sed & putridam, cum Hipp. semper per ignem intelligat magnam febrem. Ceterum existimo non licere ad curandam conuulsionem febre excitare, quia in ea non possumus deliberare, de quantitate, occasione, & modo utendi quæ sunt remedii conditores. Rationes propositæ ex auctoritate desumptæ nihil persuadent: nam omnes, quæ in aphorismis & lib. 6. epy. habentur, tantum docent, febrem, quæ conuulsionem & epilepsiam sequitur, eas sanare, aut melius esse febrem sequi conuulsionem quam contra: quia si febris sequitur conuulsionem ex repletionem ortam, calore immutabit. Maiorem vim videtur habere locus qui habetur lib. 2. epy. ex quo aliqui ex nomine ignis persuasi, colligunt debere nos magnam febrem, hoc est putredinem excitare, nam diaria non est magna febris. Hi maxime decipiuntur, non enim est in nostra manu febrem mouere putredinem, imò si Hippocratis animus fuit, excitandam esse, febrem, nomine ignis diariam intelligit, si aduertamus dictionem, excitato, quia nos calefacientibus medicamentis & alimentis, solum hanc generare possumus. Et quamuis hoc ita sit, censeo, Hippocratem non voluisse excitare febrem, sed nobis præcepisse, ut medicamentis calidis, ex quibus illa oriri potest, utamur, quibus curare solemus conuulsionem: vel dicere possumus Hippocratem in epydimiis partitularia exempla scribere, non tamen artem vniuersalem constituere: quam cum in aphorismis proposuerit, proinde in ipsis aliter, ac in epydimiis de febre in conuulsione loqui.

De Tremore. C A P. X V.

Descriptio.



Remor (vt auctor est Gal. v. de morbo & sympto-
mate) contrarius quidam motus est ex contrario-
rum in se motuum successione proueniens. Cum
enim facultas imbecillior reddita membrum in su-
blime tollit, ipsa verò grauitas deorsum trahit, pugna quæ-
dam fit inter facultatem, & membri grauitatem non permit-
tente facultate deorsum ferri membrum, vt in resolutione
membrorum solet, neque grauitate concedente, vt facultas
ipsum sublime seruet, vt consueuerat, dum valebat. Itaque
vicissim facultas nunc vincitur, nunc vincit, atque hinc na-

citur tremor ex duobus scilicet motibus cōtrariis compos-
 itus motus, altero, dum membrum sursum a facultate fer-
 ur, altero, dum ob grauitatem, & morbum deorsum premi-
 ur. Fit autem in vniuersum tremor ex imbecillitate neruo- *Causa.*
 ū, quod palam senectus ipsa (vt Paulus ait) testatur, in qua
 est incurabilis tremor, specialiter verò id omne, quod morri-
 tem facultatem imbecillio- reddidit, huiusmodi solet sym-
 ptomata inducere: cuiusmodi est frigidius naturæ tempera-
 nentum, frigida aquæ potus non in tempore sumptus, pi-
 tuitosi humoris abundantia, vini multi, præsertim meracio-
 ris immoderatio- vsus, senectus, & animi affectiones, vt ti-
 mor. Vnde his, qui per prærupta ingrediuntur, crura tremunt,
 & qui incurrentem in se feram videntes fugiunt, tremuli e-
 uadunt, neque nō toto corpore tremunt, quibus coram ter-
 ribili aliquo magistratu negotium est, quippe loqui iussi ne
 vocem quidem citra tremorem reddere poterunt. Signa ex *Nota.*
 ægri temperamento, & sermonibus patebunt: si iis enim a-
 nimum aduertat, proculdubio non solum notas, sed & cau-
 sas quoque intelliges.

Tremor curatur abscissa causa eius: sed quia fermè sem- *Curatio*
 per fit à pituita, vt resolutio, & conuulsio ex plenitudine, su- *per reme-*
 peruacaneum esset in præsentia eandem rem iterum tracta- *dia mitio-*
 re, postquam satis abunde cap. duobus præcedentibus de ea *ra.*
 dictum est, mitioribus tamen remediis indiget hic affectus,
 quam resolutio, & conuulsio ex repletione pituitosa, quia à
 minori fit causa.

De Ophthalmia. CAP. XVI.

Ophthalmiam medici aliqui duplicem faciunt, veram *Diuisio.*
 & non veram: non veram cōturbationem oculi, seu
 vacillationem apellant, & ab externa aliqua occa-
 sione fit, verbi gratia: sole, igne, fumo, puluere, ictu aliisque
 id genus, & a Græcis taraxis dicitur, hoc est, lucis perturba-
 tio, vt apud Paulum videre est, qui sic eam nominat, & velut
 genus quoddā facit eius (quæ vera dicitur) ophthalmiæ. Por-
 ro tam facilis curatu hæc est, vt vel cognita tantum causa,
 ac separata discutiatur, modo id in principio fiat, alioqui
 neglecta in veram sæpe ophthalmiam transit. Est autem vera *Definitio.*
 appellata ophthalmia, quam Latini lippitudinem nominant,
 adnatæ membranæ, seu (vt barbari dicunt) coniuncti-
 uæ inflammatio. Fit hoc genus morbi (de vltima, quæ dicitur ve- *Causa.*
 ra loquor) aut ob plenitudinem vniuersi corporis, ob quam
 adnata quoque humoribus plena distenditur, vel propter
 acrim

DE CVRAND. MORB.

acrimoniam humoris in oculum influentis, vel propter cras-
forum humorum, aut flatulenti spiritus tensionem.

Notæ.

Notæ sunt adnatæ, rubor, ex oculis lachrymæ manantes,
& in maioribus oculi angulis, qui ad nasum sunt, sordes quæ-
dam acruatæ, & vniuersim omnia, quæ in inflammationi-
bus reperiuntur externis: quia perpetuo internas sequitur fe-
bris, symptoma necessarium: ab hac tamen febris non pro-
creatur, nisi sit dolor ingēs, & corpus paratissimum ad eam.

Curatio.

Curatur vera ophtalmia sex remediorum generibus, pri-
mo, victu refrigerante, vt aëre natura frigido, vel industria

Victus.

nostra sparsa aqua, floribus & foliis refrigerantibus: &
aere obscuro, quia lumen resoluit spiritus, humoresque com-
mouet: & victu tenui, quo partes inanitæ retineant tenacius
humores ne ad oculum confluant. Carnes, oua, vinum, quæ
sanguinem augent interdicta sunt: somnus, & quies laudan-
tur: his enim oculus quiescit, & humores.

Remissio.

Secundo, auertentibus sanguinem fluentem, vt sectione
cephalicæ eiusdem partis, si nō fuerit magna plenitudo: tunc
enim media, aut iecoraria est secanda. Si vero in utroque o-
culo fuerit ophtalmia, vtraque cephalica est secanda, aut v-

*Sectio ve-
næ.*

traque media. Sanguinis copia, & numerus sectionis vena-
rum respondeat plenitudini, magnitudini morbi, & viribus

Aduerte.

ægri. Sed si hæc, aut alia quæuis inflammatio a mētribus, aut

Auersio.

hemorrhoidibus detentis proficiatur, vena tibiarum, aut
pedum est secanda. Fit quoque auersio in hoc morbo per cly-
steres parum acres ex cassia præparata, diacatholicon, & si-
milibus: per frictiones partium extremarum, per ligaturas
dolorificas, per cucurbitulas sine scarificatione, & cū scar-
ificatione in scapulis, & per fotū ex aqua calida partium ex-
tremarum, & per purgationem hanc, aut simile factam medi-
camentis benignis, & salubribus: vt ℞. medullæ cassiæ fistu-
læ, recēs extractæ, & medullæ tamarindorum an. ʒ. ʒ. rhabar-
bari electi infusi per noctem in aqua endiuivæ. ʒ. j. syr. rosa-
rum ʒ. j. aquæ buglossæ quod sufficit, misce, & fiat potus.

*Repellentia
topica.*

Tertiò, repellentibus materiam fluentem fronti admo-
tis, si fluxio sit per venas, & arterias extra cranium, vt sæpe
accidit: quia hæc tunica a pericranio producitur: qualia sunt
aquæ rosarum, plantaginis, portulacæ, solani, albumen oui,
acetum, cortices granatorum, balauftiæ, & bolus Armenus
præparatus aqua frigida maceratus. Si vero per venas & ar-
terias intra craniū materia fluat, nocent hæc repellentia ca-

*Topica o-
culis apta.*

piti, & fronti admotæ, cū materiam versus neruos opticos
impingant: tunc enim naribus & oculis sunt repellentia ad-
mou

remouenda. Ipsi oculo, aut oculis immittimus sepe aquam roseam albumini oui, permixtā, aut lac cum e mamma emulgemus, aut hanc mixturā: ℞. aquæ rosarū ʒ. iij. collyrij albi rhabdis sine opio ʒ. ij. tuthiæ præparatæ ʒ. j. sarcocollæ nutritæ ʒ. ss. misce, & fiat collyriū, adde corallij rubri præparati ʒ. j.unica panis lacte caprino cocta & oculis admota, est etiā optima ad repellendū, & dolorē sedandū. Sed si his dolor non vincatur, adde emulsionē seminis papaueris, & mucaginē psyllij, & in summo dolore sit collyrium albū rhabdis cū opio: *Admonitio.* hoc tamen medicamentū, & simile narcoticum nō est oculis admouendum, nisi in vehementissimis doloribus, & quando alia mitiora, & securiora nō sufficiunt, quia spiritus crassos reddūt, & vidēdi facultatē infirmant, lege com. 31. 6. lib. aph. in maximis tamē doloribus, & vigiliis, vbi etiam mors timeatur, necessaria sunt hæc medicamenta narcotica. Vide historiam de quadā nobili, cap. de ophthalmia doctoris Gatinariæ.

Quando dolor est remissior, alia priora absque narcoticis satis sunt, vt in non vera, quæ sepe curatur sola absente causa externa, seu primitiua, & aliis leuioribus, quæ superius diximus: vel decocto seminis fœnugræci, & seminis psyllij, aqua rosarum, facto. Pomum quoq; putre coctum cum aqua rosarum, & oculis calēs admotum, optimum remedium est.

Quarto apparantibus bilem non naturalē, & crassam syrupo acetoso. S. & rhodomelle, aut syrupo malorum granatorum, & endiuæ comp. cum syrupo rosarum, cum aquis fœniculi rosarum, & plantaginis, & similibus. *Preparatio.*

Quinto, materiam concoctam euacuantibus, vt rhabbaro, myrobalanis citreis, agarico trochiscato, & pilulis de rhabbaro, aut aggregatiuis, & aliis pari facultate præditis, vt hoc est: ℞. diacatholicon. ʒ. v. rhabbari electi infusi per noctem in aqua endiuæ ʒ. j. ss. electuarij de succo rosarū ʒ. iij. diaphænicon. ʒ. j. ss. syrupi rosarum ʒ. j. decocti florū cordialium. q. s. misce, & fiat potus. Sanguinis missio ex cephalica eiusdem partis euacuat omnes humores, a parte affecta, & ab aliis proximis. *Purgatio.*

Sexto, reliquias materiæ ex oculo vacuantibus, & resoluentibus: vt admoto decocto seminis fœnugræci, seminis fœniculi, & camomillæ, spongia, aut molli lintheo. Balneum, & vini potus cum Hippocr. 6. Aphor. potenter resoluunt. Idem Topica. efficit ouum ita coctum, vt cōcretum & induratum sit, oculis impositum. Pari vi pollebit drachma. j. aloes cum vncia j. aquæ fœniculi, si oculo applicentur. Hoc medicamentum oculos roborat, reliquias siccatur, & absumit. Idem præteritio. *Resolutio.* *Corroboratio.* *Præteritio.*

stat

stat sarcocolla, aqua rosarum, vel potius lacte muliebri nutrita, & soluta.

- Ophthalmie antiquæ curatio.** Si antiqua fuerit ophthalmia, & intermittens præcedenti debita victus ratione, & humoris cōcoctione syrupo rosarū, & rhodomelle, cum aqua, aut decocto seminis fœniculi, purgabis 3. j. pilularum lucis ma. aut sine quibus esse nolo, aut de agarico semel in hebdomada. Iterum purgabis 3. j. prædictarum, aut similium pilularum: & oculis non sunt admo- uenda repellentia intense frigida, imò iis semper adde parū aquæ fœniculi, aut rutæ, ne fiat albugo, aut suffusio oculorū hanc tamen & vlcera oculorum gigni prohibet filum collo traiectum per tres digitos sub nuca, prius tamen apprehen- de forcipi cutem, donec sensus tactus abeat, & post acui in- certo filo crasso tacto ex pilis caudæ equinæ, vel (ne tantus dolor excitetur) seta, vel lino perforamus, vt in vulnere. Acu ablata filum maneat, quod vlcus diu apertum seruet, vt per id puris multitudo euacuetur. Diuitibus aureū annulū im- mittunt, loco fili acu ablata. Quotidie remouent dictum fi- lum, vel annulum, & mane, vesperique tergunt teriam. Hoc auxilio reuellente & vacuante multis oculi acies ferme a- missa fuit in pristinam sanitatem restituta, vt ego sæpe ex- pertus sum in plerisque, & in filio meo nato octo menses.
- Cautio.**
- Cervix filo traiecitur.**
- Historia.**

De Ophthalmia. CAP. XVI.

Scholium.

Instrumenta animalia. Phtalmiam medici.) *Instrumenta animalia, i. de loc. affec. cap. ult. aliunde, hoc est a principio (quod cerebrum est) ne- dia commu- dio neruo, facultatem accipiunt: proinde euenit, in his ali- nicata ha- quan. w. tacti actionem morbo nō in ipsis, sed in principio, aut parte, quæ bent facul- defert facultatem, existente. Præterea in his instrumentis vna pars si- tatem. milaris est, quæ operatur, reliquæ vero ei præbent vsum, & vico in a- Vna pars ctione coram lafa, morbus aut erit in parte, quæ operatur, aut in aliis. similaris Quod in oculo verum esse deprehēdes, hic enim à cerebro per neruum o- agit in m- pticum facultatem accipit, pars autem quæ in ipso videt, est tunica ara- strumento. cnoides, vna cum humore cristallino, reliquæ oculi partes ei præbent v- Visionis sum. Dices nonne Gal. humorem cristallinum, visionis instrumentum ap- instrumen- pellat? Respondeo, nomine humoris cristallini Galenum, etiam mem- branā intelligere, vt late in libris de symptomate & morbo explicatum habeo. Oculi actio (quæ visio est) inter alios morbos solet lædi ab ophthal- mia quid. mia, quam Latini lippitudin. m. appellant, hæc nihil aliud est quam in- Causa oph- flammatio adnatæ membranæ: nomine inflammationis intelligentes in- talinæ. morem præter naturam, qui in hac membrana, ob multas, quas habet venas, solet accidere. Causa ophthalmiæ aut est externa, aut interna: Ex-*

ma sol, fumus, & alia quæ dolorem, aut calorem in oculo excitando
 actionem mouent. Interna causa est fluxio sanguinis, quæ fit a plenitu-
 dine corporis, aut venarum capitis, aut ab humoris acris fluxione. Qua
 parte nobis non placet sententia Montani & Iacotii, existimantium Montanum
 ophthalmiam fieri etiam per essentiam sensim collecto excremento in mem et Iacotius
 na adnata: nam ex Galeno, ex his excrementis sensim collectis fit a- erram.
 tima & non tumor, qui ex eius sententia semper fluxionem sequitur.
 de etiam multi ophthalmiam à statu fieri sentiunt, hic enim bene pote-
 ob tensionem dolorem generare, non autem ophthalmiam, quæ est in-
 natio. Præterea sententia auctoris, quæ diuidit ophthalmiam in re- Auctoris
 r, & non veram, sequenda non est: quia à quacumque causa fiat lapsus.
 ophthalmia, est dicta membrana inflammatio. Altomarius ophthalmiam
 bum compositum ex intemperie, tumore, & soluta continuitate, ap- Altomari
 are solet. Decipitur tamen, quia tumor, si non læsit actionem, non erit decipitur.
 bum, sed symptoma, sicut & soluta unitas. Est ergo ophthalmia intem-
 pes membrana adnata, tam fluxione humoris, quæ si actionem vitiat
 etum generando in humore cristallino, erit causa morbi, aliter verò
 bum. Tumor & soluta unitas symptomatica sunt, quæ ad intemperiem
 affluxu sequuntur, sicut & dolor, qui in hac parte membranosa, ac practicorū
 inde multum sensibili ita maximus aliquando esse solet, ut ad se cura- error circa
 em attrahat, cum fiat causa argens affectionem, nempe tumorem. misionem
 Secundo auertentibus sanguinem fluentem.) Auctor et alii sanguinis.
 Elici in ophthalmia, si plethora sit in corpore, secant basilicam: si vero
 pressio mēsum, secant venam pedis. Qui quantum errent intelliget,
 ex Galen. dicit, reuulsionem faciendam esse ex parte, ad quam fluit An in prin-
 tor, & ex vena, quæ cum loco affecto se aperit. Secunda ergo erit ob cipio oph-
 las causas in hoc affectu cephalica eiusdem partis, quæ cito & mul- talmia li-
 euacuat ex oculo affecto. Purgatione etiam auctor in principio re- ceat pur-
 tit, sequutus fortasse Gale. qui 13. metho. cap. 11. phlegmonem oculi in- gare.
 nem sola purgatione vno die se curasse scribit. Hoc poterimus refel-
 eo quod humor in ophthalmia non turgescit, tum quia in principio in-
 mationis, non solum reuellere, sed ex parte affecta debemus euac-
 re, quod non poterit præstare medicamentum purgans. Aliqui re-
 dent verum esse in ophthalmia solum in principio sanguinem esse mit-
 tum, aliquando tamen, cum vires non sufficiunt ad eam euacuatio-
 n, posse nos purgare, cum purgatio minores postulet vires, quam san-
 nis missio, atque hoc considerando Gal. 13. metho. faciendo id, quod po-
 t, purgasse. Alii satisfaciunt, contendentes etiam in principio ophthal-
 e semper esse secandam venam, neque id violasse Gal. 13. method. nam
 non purgauit in tumore præter naturam, sed in phlegmone oculi, hoc
 ardore, id enim existimant intelligere Galenum per phlegmenem.
 rum sententia nobis non placet, quia non semper in principio ophthal-
 e debemus sanguinem mittere, licet enim aliquando purgare, et si

DE CVRAND. MORB.

Obiectio. fiat ophthalmia à bile, de qua loquitur Gal. 13 method. tunc enim purgatione vitetur, quæ ex venis euacuantes bilem, reuellimus à loco affecto. Dices est inflammatio, debemus ergo ex parte euacuare? Respondeo, hanc inflammationem esse exiguan, & ex humore tenui factam, qui citò exhalat, ac proinde non egere euacuatione, quæ fit per sanguinis missionem, verum est posse sanguinem mittere, si sanguis sit prauus. Obicies iterum humor est sumatus, debet ergo prius concoqui, & postea euacuari: respondeo, hoc intelligendum esse in morbis venarum, & non in aliis.

Repellentibus. Tercio repellentibus. In principio ophthalmiæ cum humor extra in primas venas fluxerit, opus est ipsum ex ea parte euacuare, non calidis, quia accipio ophthalmiam trahent humorem, sed repellentibus, quæ adstringentia sunt. Deliberata ophthalmiæ. re autem debemus de his inter alia naturam partis considerantes: hæc enim cum sit membrana, ac proinde multum sensibilis, non feret medicamenta multum frigida, & adstringentia: quia ipsam contrahunt, et exasperabunt. Applicabimus ergo oculis, & non naribus, ut male vult auctor, ea quæ moderate percipiunt, qualia sunt rosa, & albumen oui contractum. Supra frontem tamen bene possumus, valide repellentibus

Extergentibus, albumine oui cum aceto, bolo armeno, aut sanguine draconis. Præterea semper terea cum inflammatio sit in parte, quæ non tegitur cute dura & crassa in ophthalmia, semper ex ipsa aliqua humoris portio refudat, & ideo cum repellentibus sicut tibus digerentia semper miscere oportebit: huiusmodi sunt, collyrium album, Rhasis sine opio cum aqua rosacea, aut plantaginis. Applicata autem Quomodo tamen medicamenta oculis instillando ipsa, aut pannum lincum, vel tenuem applicandam stupam madefac, & sic vitare, dummodò non permittas ea exsiccari, aut dum medicamentum calefieri: instillamus, aut lineo panno vitur, quia pars non potest ferre camentum graua & ponderosa medicamenta, in qua re auctor errat simul cum oculis, micam panis, aut pomum applicans: non sinimus ea exsiccari, quia adhærebit, & deinde extrahetur cum dolore, à quo augebitur affectus.

Dolor in ophthalmia. in non sinimus calefieri, ne attrahant. Dolor in hoc affectu ob rechetiam aliquando ad se attrahit curationem, quo tempore vitare opiatum medicamentis, collyrio albo rhasis, cum opio, aut oui albumine agitato cum decocto papaueris albi. Rarissime tamen contingit, ut ad hæc veniamus mi-

In augmento. In augmento morbi repellentia cum digerentibus misce his, ita tamen ut repellentium facultas vincat, quia fluxio augetur. Coque ergo mirrhos, aut resas cum semine lini: aut fenugrecum cum aqua plantaginis, aut (quod est elegantissimum remedium) albumen oui, & aquam rosaceam cum paucis vino miscebis. In statu equaliter miscenda sunt digerentia & repellentia.

Quarto, apparantibus bilem. Bilem præparat, et purgat, quasi ophthalmia à sola bile oriatur, & non à sanguine optimo, melancholico etiam, aut pituitoso. Dices, est ne purgandum in hoc affectu? Respondeo, purgandum esse sine aliqua præparatione in principio, si ophthalmia à bile

fiat: at si ab humore crasso eueniat, apparentibus signis concoctionis arguimus ipsum.

Sexto reliquias materiae.) In declinatione cum nil fluat ad oculo- In decli-
digerentibus solis euacuanda est materia. natione.

Si antiqua fuerit ophthalmia.) In antiqua ophthalmia filo per col- Antiqua
m traiecto sub nuca vitur, de quo remedio hoc modo deliberabis. In ophthalmia.
antiqua ophthalmia fluxio perseverat, haec reuelli debet euacuacione ali- Delibera-
a: & cum sanguinis missio, purgatio, inedia, cucurbitulae, & aliae si- tio remedii
iles non prosunt: deueniendum ergo erit ad duo remedia, quorum unum
cauterium, & alterum filum per collum traiectum: & cum caute-
um multum dolorem inferat, & vlcus ex ipso relictum non ita facile
sit apertum seruari, proinde ad filum deuenimus: atque haec est qua-
tis deliberatio. Quantitatem colligimus ex vlcere, quod magnum
n debet fieri: occasione ex euacuatiombus totius corporis praecedenti-
s: modum vrendi ex loco affecto, qui cum sit oculus, ut ab eo reuelli-
is, & euacuemus, parti contrariae, et proximae remedium applicamus,
alis est ceruicis superior pars. Remedia in ophthalmia supradicta no-
significare visus fuit Hip. 6. aph. sent. 31. ubi sic scribit: dolores oculo- explicatur
m, meri potio, aut balneum, aut fomentum, ut venae sectio, aut medi- aph. Hipp.
mentum epotum soluit. Si non sit plethora, & dolor fiat a sanguine 31. lib. 6.
isso venae adnatæ membranæ repleve, à vini potione soluitur: quia
um fundit humorem, & suo motu ipsum educit. Quod idem 7. aphor.
n. 48. habet Galen. Si dolor a bile acris oritur, dummodo absit pletho-
, balneum vile est, quia ab eo bilis acrimonia temperatur. Si ophthal-
ia sit in declinatione, cum ad partem affectam nil influat, fomento ca-
o, quod humorem dissipat, uti oportebit: sicut venae sectione in princi-
, & purgatione in principio, aut postea, ut supra docuimus.

De imbecillo aspectu. CAP. XIX.

Oculorum visus, ut aliarum partium operatio, tri-
pliciter leditur (autore Gal. cap. 80. artis medica-
lis) aut quia vix, aut quia vitiose, aut quia nullo mo-
o cernimus: de vltimis duobus in presentia non agimus, cu-
is in sequentibus capitibus, & aliis locis verba facturi si-
us. De prima igitur latione hoc loco sermonem institui- Descriptio
us, quæ est affectio oculorum, qua minus ager videt. Cu- cause.
s variae sunt causæ externæ, & internæ iuxta illud carmen:

Allia, vira, venus, puluis, ventus, faba, fumus,

Ista nocent oculis, sed vigile m. agis.

Ex his, aut aliis fit hic affectus, aut per consensum totius,
in hectica, aut aliarum partium, de quibus suis locis, vel
ulis primariis affectis. Quorum omnium causæ, & notæ. Nota.

fatis ex ægri dictis, & per se patebunt.

Curatio. Quando vitium proprium est in oculo ab humore largiori, curatur quinque generibus remediorum: primo, victu tenui exsiccante, dum modo sit cibus facilis concoctu, ob-

Victus. ferueturque ordo traditus a Gal. in lib. de alimentorum facultatibus, & de sanitate tuenda, circa ordinē, horam, quantitatem, & qualitatem ciborum. A cibo comedenda sunt, quæ vapores prohibent ad caput ferri, vt panis tostus, coriander tostus: aut conditus, caro cydoniorum, vel ipsa cydonia tosta, aut pyra, addendo parum sacchari, & seminis feniculi, hoc enim oculos roborat, vt in serpentibus, & buf-

Vis vaporum. fonibus experientia demonstrat. Rapæ si bene concoquantur, sua proprietate visum roborant. Viperarum carnes bene apparatus similiter aciem oculorum confirmant. Eius præparatio cap. de elephantia si demonstratur. Auis pica, & hepar hirci tota substantia corroborant aspectum. Similiter & lentium frequens vsus, si ab humiditate nascatur imbeci-

Noxia oculis. litas. Quæ vero huic affectui maxime nocent, sunt cruditas, coicus immodicus, & somnus diurnus.

Præparatio. Secundo, apparatus materiam, primo melle rosato colato, & oximelite. S. cum aquis aut decocto feniculi, hyssopi, saluæ, & similibus. Secundo syrupo de hyssopo, de itæchade, oximelle compos. cum decocto, aut aquis superius dictis, & similibus.

Purgatio. Tertio, materiam concoctam vacuantibus, primum pilulis ex Hiera. S. elephanginis, mastichinis, agarico trochiscato, aut Hiera. S. Secundo pilulis de agarico, sine quibus esse nolo, & lucis. m. Ultimo si opus fuerit valentibus pilulis cochis, aut fortidis. Dosis omnium horum medicamentorum ex dictis primo capite, & ex doctrina Mes. & Nicolai in eorum antidotarius est satis cognita.

Auersio. Quarto auertentibus ad infernas partes, aut posteriores, vt clyteribus, glandibus, ligaturis brachiorum, & crurum frictionibus, fomento, & lotionē ex decocto rerum capitalium, multo pexu versus occipitium reuersi capitis, apophlegmatismus, errhinis, cauterio post aures aut in coronali commissura, vel filo collo affixo, de quo dictum est in fine 16. cap.

Roboratio, & resolutio. Quinto, roborantibus partem affectam, & resoluentibus reliquias materiæ: vt nuce muscata quotidie sumpta visus recuperatur: myrobalani quoque cepuæ, si autē bis in hebdomada, aut ter sumantur, visum reficiunt. Item præstant acorus conditus, theriaca magna, mithridatum, diamuscu-

pliris arcoticon, si multis diebus in quantitate 3. j. vsque *Acuement*
 3. ij.umat eger. Hoc quoque auxilium valide visum cor- *visum.*
 borat: ʒ. succi fœniculi depurati 3. vj. succi rutæ depurati
 iij. mellis 3. j. sacchari 3. ʒ. foliorum auri num. iij. misce, &
 per duos, aut tres dies æstatis insolentur omnia, facta sæpe
 permutatione ab vno vase in aliud, vt omne excrementum
 excrucietur. Eandem, & maiorem habet vim hæc aqua oculis
 epe admota: ʒ. chelidonie fœniculi, rutæ, fileris montani,
 euphrasie, verbenæ, rosarum rubrarum an. lib. ʒ. pulueris
 gariophyllorum, & piperis an. 3. ij. ex his fiat aqua per distil-
 lationem instrumento vitreo & igne pauco. Puluis auis pi-
 æ, si oculis admouetur, ipsos vehementer iuuat. Idem præ-
 paratur succus, aut puluis hepatis hircini assi: cui si addas pa-
 rum pulueris gariophyllorum, & piperis erit efficacior. Hoc
 medicamentum visum maxime confirmat: ʒ. tuthie Ale-
 andrinæ quinquies incensæ, & extinctæ vrina puerorum,
 iterum toties incensæ & extinctæ aqua rosarum 3. ʒ. bal-
 sami optimi 3. iij. vini albi odoriferi 3. j. misce. Serpentes ve-
 neroses abscissis capitibus, & caudis, si coquantur vino al-
 bo, & fœniculo, donec caro ab ossibus separetur, visum mi-
 nis modis tuentur. Hoc medicamentum est omnium in hac *Medicamē*
 e nobilissimum: ʒ. fileris montani, maioranæ, euphrasie, *tū nobile.*
 rutæ, chelidonie fœniculi, an. 3. iij. zinziberis, spicæ, piperis
 longi, gariophyllorum, tuthie incensæ & post restinctæ, vt
 liximus sarcocollæ nutritæ lacte asinæ, ligni aloes an. 3. i. fel-
 is vnius anguillæ, & vnius accipitris, & vnius hirci monta-
 ni, si possimus nancisci, balsami 3. ʒ. mellis rosati col. ti 3. iij.
 Omnia simul mixta, & redacta in puluerem, quæ possunt
 edigi, vase vitreo, bene obturato insolentur in æstate per
 3. dies, & in hyeme sub stercore quolibet die bis, vel ter agi-
 tur illud vas, postea conseruetur liquor vase vitreo, qui o-
 culis admotus sæpe visum corroborat, & auget etiam. In sc-
 ribus tantam vim habet hoc medicamentum, vt aliquibus
 visum sit nullum medicamentum huic, simile, aut par hæc-
 nus extitisse, quorum summam veritatem ego felicissimo
 successu sæpe expertus sum.

De imbecillo aspectu. CAP. XVII.

Scholium.



Culorum visus.) Confusè cetè procedit auctor in hoc cap.
 quod intelliges, si legas cap. 2. de cau. symp. ubi inquit Galen.
 causas læsæ visionis. Si ergo rectè voluerimus curare, hoc mo-

D E C V R A N D. M O R B.

Practico- rā error. do procedendum erit. Imbecillus aspectus est symptoma, morbus ad quem sequitur, aut est intemperies, aut morbus in irumētarius, aut communis, qui soluta unitas dicitur: morbo intellecto contrarius ipsum curabimus. Præterea quæ multi ex practico scribe de medicamentis tota substantia corroborantibus affectum, qualia sunt auis pica, hepar hirci, rapa, & similia, falsa sunt, & fictitia: quia morbi actionem videndi hebetantes manifesti sunt, ac proinde contrarius medicamentis, etiam auferendi. Neque obiciat feniculum. Hoc enim caliditate sua digerendo humiditatem conferi: quia eadem ratione opus erit curare affectum, de quo loquitur auctor in hoc capite, & similia mittere auribus, hirci hepar, tuiam incensam & extinctam in urina pueri, & alias compositiones ab ipso propositas, cum aliqua inutilia, & multa simplicia unus facultatis contineant, quod maximum vitium est.

De curatione albuginis oculorum.

C A P V T X V I I I.


Diuisio. **A**lbuginum oculorum duæ sunt differentiæ, quædam enim in summa corneæ superficie consistunt, & Græcis nephelia, atque vla, Latinis vero nubecula, caliginelque & tenues albugines nominantur: quæ vero in interiori parte sunt, & ut Paulus ait, alterius radices egerunt, hæ leucomata Græcis, Latinis albugines crassæ dicuntur.

Descriptio. Vtraque autem, cicatrices sunt, ac maculæ in cornea post vulnorum curationes relictæ: sic autem appellantur, quod oui albumen referant: omnes enim cicatrices (autore Aetio) in nigro oculo candidæ videntur: densata enim cornea tunica subiectus cæruleus color non amplius pellucet. Eminentes præcipue albescunt, planæ minus caniscent, cauiiores parti nigræ oculorum quodammodo assimilantur. Hæc Aetius. Morbus intuenti patet non est igitur opus signis.

Causæ. Albugo in senibus est incurabilis, præsertim antiqua, in iuuenibus difficilis curatu, in pueris & infantibus facilior, semper tamen est similis curatio præcedenti, in victus ratione, vacatione auertentibus, præsertim per filum, de quo cap. 16. His omnibus iam factis, & ad motis oculis medicamentis dictis in quinto genere auxiliorum præcedentis capituli, præter illa, frequens fotsus ex decocto seminis fœniculi, fœnugræci, camomillæ, rutæ & raparum est utilis, & necessarius: post quem potentius medicamenta poterunt albuginem dissipare, & omnino abstergere. Mel, & eius aqua bene eam tollit, similiter & aqua distillationis ex rhodomelle. Pulvis sacchari candi habet eandem vim, & maiorem, si addas parum

in pulueris ossis sepiæ. Sequens aqua optima est in hoc, & me in meo filio probata, qui natus erat octo menses: ℞. feculi m. ij. rutæ chelidonæ an. m. j. mellis optimi ℥. iij. fac-
iari candi, & rhodomellis an. ℥. j. ruriæ Alexandrinæ, & Aqua pro
cocollæ nutritæ an. ℥. ij. vini albi optimi cochlearia duo, *bata.*
misce, & fiat ex his aqua per distillationem igne paucio.

De suffusione. CAP. XIX.

 Vod Latinis suffusio sonat, hoc Græcis hypochyma, *Definitio.*
& hypochysis, barbaris verò cataracta dicitur, & nihil aliud est, quàm frigidi, crassi, & lenti humoris, & glaciei instar cōgelati inter ceratoidē tunicam, id est, cor-
neam & crytalloidem, seu mauius humorem tenuem effusio.
Causæ iam dictæ sunt, nempe humores crassi per nimias cru-
ritates iuxta pupillam inter corneam, & crytalloidem acer-
ati: præter hæc etiam violentus vomitus, & ictus, & ventri-
culi affectiones. Notæ ab Aetio hæc referuntur. Inchoante *Signa.*
suffusione pusilli culices, & caliginosa quædam corpuscula
assidue oculis occurfare solēt quibusdam veluti lanarum fi-
amenta, & telæ araneorum, quibusdam circa lucernas cir-
culi offeruntur: quæ cum apparere incipiunt, pupilla minus
accurate spectantibus interdum pura videtur, interdum co-
lorem pelagi præ se ferre. Sed incrementum ægritudine acci-
dentia quoque increbescunt, quæ ubi ad summum peruene-
rint ægri excæcantur, & pupilla ad candidum colorem sine
ullo penitus splendore mutatur. Quamuis in variis suffusio-
nibus varij colores conspici solent: quædam enim aeris co-
lorem, quædam vitri imitatur, quædam subalbescit, quædam
ad cæruleum vergit, quædam glaucescit, quædam insanabi-
lis est: hæc Aetius. Porro tunc cognoscitur, nam sanabilis sit
suffusio, quoties altero oculo clauso pupilla eius oculi, in quo
est suffusio, & clarior apparet, & dilatatur, vt docet Galen. 4.
de morbo & symptomate, cap. 2. Si culpa neutrius oculi ac-
cidat suffusio, in utroq; oculo, & non in altero tantum, id fit,
& per intervalla quoque, & prius aliquid in ventriculo præ- *Curatio.*
sentitur.

Suffusio curatur quinque remediorum generibus, quem-
admodum imbecilla visio, & albugo, sed valentioribus. Quæ
absoluta est, & confirmata, accuratur: eget tamē viro docto,
& probato: si verò absoluta nondum fuerit, curatur primo
victu calido, & sicco (quia materia est vaporosa, & aquosa)
de quo diximus cap. 16. Sed si aer conueniens desit, vt in hye- *Victus.*
me, arte oportet moliri, igne, scilicet, & suffitu. Abstinencia

DE CVRAND. MORB.

quoque, & ieiunium huic morbo diuturno plurimum est salubre. Cæna sit lenis, si semel comedisse his non sufficit, vino, iusculis, & pituitosis alimentis minime vtendum est: semper enim sunt eligenda calida & sicca.

Preparatio, & vacuatio. Secundo & tertio concoquentibus materiam aquosam, & vacuantibus per ea, quæ diximus cap. 10. & alia similia, sed toties est coquenda materia, & vacuanda, donec in totum sit affectus curatus, non solum semel, sed bis, ter, quater.

Auxilio. Quarto, succulentibus, vt acris clysteribus, balanis, frictionibus, totibus partium extremarum, & aliis omnibus, de quibus dictum est satis, cap. 16.

Resolutio. Quinto, resoluentibus, & dissipantibus reliquias materie primo, interius sumptis, vt ʒ. j. theriacæ magnæ, aut mithridati, aut ij. ʒ. diuini dulcis multis diebus cum syrupo, aut aqua capitali sumptis tempore capiendi somni, vt cum sibi vapore eorum vis rapiatur in cerebrum. Si sæpe accipiantur ʒ. ij. confectionis Hæ nec Mesp. cap. de imbecillitate visus valenter & optime dissipabitur materia. Admonenda sunt oculis aliqua præter dicta duobus superioribus capitibus, quæ possint resoluerè, & tergere maculâ, albuginè & suffusionem non confirmatam: semper tamen optima præcedat corporis euacuatio, alias fieret attractio vaporis, & aquæ ad oculos.

Tergentia. Inter ea quæ potenter omnem albuginè, & suffusionem non confirmatam tergent, est sagapenum mixtum aqua sceniculi, & aqua mellis, & saccharo concreto. Idem præstat pulvis capiti hircini, si cum aqua distillationis vrinæ puerorum, & sceniculi oculis sæpe admoueat, post hæc valentiora conferunt, vt sunt genera fellis seu prius oportet experiri ante dicta, & aqua distillationis corticum fabarum. Hæc

Aqua efficacissima. quoque aqua est optima, & efficacissima, ℥. vini albi ʒ. ij. succi sceniculi sine sedimento ʒ. ij. camphoræ ʒ. j. tuthiæ Alexandrinæ ʒ. j. ʒ. zinziberis ʒ. ʒ. mellis ʒ. iij. omnia simul in vase æneo ix. diebus in umbra conferuentur, postea per filtrum fiat distillatio, cuius aquæ duæ guttæ mane, & sero oculis instillantur: vltimò vero, & cum alia non sufficiant, sunt admo uenda fella, prius mitiora, videlicet piscium, suum, agnorum, gallinarum, & perdicum: deinde acriora, vt accipitris, falconum, & aquilæ. Vltimò verò est admo uendum fel viperæ: sed quia est venenosum, eo non esse vtendum censeo, sed in eius vñu oportet os plenum esse aqua, & theriaca magna, ne aliquid venenosum, in ventriculum, aut thoracem descendat: fel tamen tauri, & apri est viperæ tutius & satis potens.

De

De suffusione. CAP. XIX.

Scholium.

QUod Latinis suffusio.) Suffusio non est morbus in via, ut *Quid suffusio?*
voluit Vega: quia nullam obstruit cavitatem. Sed ex Gale-
 no est morbus in numero addito: est enim in oculo additus hu-
 mor ad eius actionem non necessarius, imò eam impediens. Hic humor,
 concretus in humore aqueo continetur, prohibens quo minus species reru
 farum ad humorem cristallinum perveniant. Vel quod verius appa-
 ret, est ipsemet humor aqueus concretus ex alimento crasso, à quo nutri-
 rit. Causa istius morbi, est affluxus crassi humoris, qui vel à capite pro- *Causa suff-*
 nit, præsertim si imbecillitatem habuerit nativam à frigiditate sola, *suffusionis.*
 et cum humiditate coniuncta, pendentem: vel à toto corpore, cum ob præ-
 mæ rationem humor crassius augetur. Solet curari suffusio, si in- *Curatio.*
 via (quia inveterata solam aciem postulat) considerantes fluxionis cau-
 sam, si à capite fluat humor, eius intemperiem corrigemus, euacuatio prius
 humore purganti medicamento: si à toto corpore fluat, sanguinem mitte-
 mus, ob sanguinem primum, & deinde purgabimus, & ultimo ad To-
 ta deveniemus, quæ sensim digerant humorem in oculo concretum: qua-
 si sunt decoctum feniculi in vino albo, aqua etiam chelidonii, aut jani-
 ci, aut ruta, cum iusticia & similia. Hæc curatio communiter solet exer-
 ri. Si tamen voluerimus rem penitus considerare, intelligemus, hanc *Refutatur*
 esse optimam curationem, quia suffusio incipiens, ut experientia lon- *prædicta.*
 ge docere tibi poterit, nunquam dictis medicamentis curatur, quia hu- *curatio.*
 mor sub membranis inclusus ea contemnit. Melius ergo erit omittere su-
 perficiam curationem: quæ impedit perfectam humoris concretionem,
 hoc nomine veram curationem: quæ exercebitur, si statim viamur, ex-
 ercitibus animalium, eorundem cerebris, & alio ritu in crassante,
 humor concreseat, & durior fiat: & hac ratione possit acu, à pupillæ
 regione in oculi angulum mutari, atque hæc est curatio eius suffusionis,
 ut proprius est affectus.

De dolore aurium. CAP. XX.

AURES perinde, ac aliæ quoque partes nostri corpo- *Dolor quid*
 ris dolore infestantur, & vehementi, plurimo enim sit ex lib.
 sensu pollent. Dolent autem nonnunquam propter *de sympto.*
 causas externas, cuiusmodi sunt refrigeratio in peregrina- *causis.*
 tione à ventis frigidis proveniens: interdum propter intro-
 missum humorem in balneis aquarum frigidarum, aut insi-
 ni aliqua qualitate præditarum. Oritur etiam & ex cau- *Causæ.*
 sa calida, à quacunque occasione accidat, ut sole, igne, ven-
 to, balneis, atque aliis id genus. Præterea & ex ictu, vulnere,
 contusione, acri aliquo medicamento, aut vermi in aurem in-
 gres-

DE CVRAND. MORB.

No. e.

gresso. Internæ quoque causæ multæ sunt, vt intemperies aliqua, aut nuda, aut cum humoris affluxu, inflammatio, flatulentus spiritus, vlcus, ac vermes intra aures geniti. Signa causarum externarum ex ægri sermonibus colligi possunt.

Internarum verò notas sic exquires: si nuda fuerit intemperies, nulla adest grauitas, sed si calida fuerit, ardor, & maius acumen doloris: si frigida, obtusior quodammodo dolor est, & frigus sentitur. Idem de reliquis est iudicandum. Si verò præter qualitatem humor quoque infestat, præter iam dicta grauitas inest, ac pondus quoddam. Omni autem intemperiei, seu nuda fuerit, seu cum humore, hoc est commune, vt à similibus lædatur, iuuetur autē moderato contrariorum vsu. Si sit inflammatio, adest febris, grauitas, pulsatio, & dolor intolerabilis: si flatulentus spiritus, tentio, & tinnitus in aure sentiuntur: si vermes, interiorem motum quendam æger sentit, & in splēdido aliquo loco cerni possunt, vel ex iis aliquis foras prodit. Si vlcus, pus inde promanat.

Curatio si Curatur quinque remediorum generibus, primò, victu
ab intem- tenui, & refrigerante: quare a carnibus & vino abstinendum
perie cali- est. Sit eorum cibus lac amygdalarum, cremor hordei, len-
da. res, cichorea, lactuca, pyra, & mala cydonia assa, & potus a-
qua hordei.

Reuulsio. Secundo, auertentibus secta vena humerali eiusdem par-
tis, si non fuerit plenitudo: vel media, existente plenitudine. Mittatur sanguis respondens dolori, & plenitudini semel, bis, & ter, si opus fuerit. Si ætas, & vires non ferant sanguinis missionem per sectionem venæ, per cucurbitulas, & scarificationes inter scapulas sanguis extrahatur, fiatque debita reuulsio. Clysteres refrigerantes, & parum acres, cucurbitulæ, ligaturæ, & frictiones partium extremarum, & foci

Auersio. quoque auertunt, & maxime conferunt. Vacuatio per medicamenta benigna similiter auertit, & est necessaria, vt per hoc, aut simile, ℞. rhabarbari electi infusi per noctem in aqua endiuia 3. j. ℞. medullæ cassiæ fistularis recens extractæ 3. vj. syrupi violarum 3. j. aquæ buglossæ q. s. misce, & fiat potus. Si magis amat pilulas (quamuis vtilior sit potus) 3. j. pilularum de rhabarbaro fieri potest euacuatio, aut aliis pilulis, quæ bilem purgant.

Topica repellentia. Tertiò, repellētibus, vt in oxyrhodino, aut lacte humano, vel caprino, vel ouino. Hæc, & similia parum calida sunt auribus instillanda. Aut oleo de portulaca, aut violato, aut de nenuphare, aut de papauere. Oleum rosaceum & terebinthina simul mixta dolorem aurium tollunt, & repellunt, si
ol

leum rosaceum sit in magna quantitate, & terebinthina in parua. Sed si dolor fuerit vehemens (qui autore Galeno com. Sympt. 8. primi prælagiorum facultates destruit) ad se trahit curationem, egétque narcoticis medicamentis, quæ non abscissa causa ipsum dolorem curant. De his Galenus 3. de compositione medicamentorum secundum locos satis abundè: inter alia tamen laudat mixturam ex lacte humano cum albumine oui, & paucio opio: laudat quoque Galenus castoreum cum opio æquo pondere vtrunque, aut si dupla portio castorei: vel vicissim, si maior & vehementior fuerit dolor. Hæc nixtura est etiam optima in hoc genere: ℞. micæ panis, aut farinæ hordei lib. ℞. s. s. quod sufficit, misce, & fiat cataplasma: adde castorei ℥. s. s. opij & croci an. ʒ. ij. Hæc tamen narcotica non sunt adinouenda, nisi cum alia non possunt curare, Curatio. tunc in maximis doloribus aliis non conferentibus.

Quartò, dissipantibus, & resoluentibus reliquias materiarum, ut oleo lumbricorum, camomillæ, amygdalarum dulcium, sesamino, terebinthina sola, & decocto camomillæ, fœnugræci, & seminis lini, althææ, & similibus. Resolutio.

Quintò, frigidis sanantibus intemperiem calidam in auribus relictam, qualia sunt oxyrhodinum, & alia dicta tertio genere, & oleum rosaceum cum mucagine seminis psyllij. Alteratio.

Si inflammatio in suppurationem terminetur (quod per doloris, & febris remissionem post augmentum cognoscitur) pus per incisionem instrumento ferreo factâ extrahendum est, aut vocibus, & sternutamentis, aut medicamentis parum acerbis, si non appareat pars suppurata: deinde abstergentibus, & mundantibus, & postremo glutinantibus, & exsiccantibus curabitur. In his tamen consule chirurgum doctum.

Dolor ab intemperie frigida, præcedenti debita vacuatione: si fuerit cum materia, curabitur oleo camomillæ, nardino, ex lilio, laurino, rutaceo, & costino, capæ tostæ etiam curat illum dolorem. Succus rutæ cum sanguine anguillæ statim mitigat omnem aurium dolorem. Succus roris marini cum oleo rosaceo, & sapone Gallico vetustissimos aurium dolores curat: adeps pulmonis vulpis auribus admotus, est optimum præsidium in dolore aurium. Idem præstat spolum serpentis decoctum oleo, aut succo conuenienti calido, aut frigido habita ratione causæ: pili Naqueræ facultate prædicti sunt à tota substantia curandi omnem aurium dolorem. Pili Naqueræ.

De

DE CVRAND. MORB.

De dolore aurium. CAP. XX.

Scholium.

*Dolor au-
ris.*

AVres perinde.) Dolor auris symptoma est. Morbus ad quem sequitur, est soluta unitas, aut manifesta, quæ fit ab icu, contusione, & aliis, aut occulta, quæ ab intemperie calida, vel frigida, aut à re distendente provenit.

Curatur quinque remediorum.) In hoc capite relictis aliis causis solum curat auctor dolorem a phlegmone ortum, ubi significare voluit phlegmonem sola caliditate dolorem generare, cum reuera tersionem in ea considerare debuisset.

*Que vena
secunda.
Purgatio.*

Secundo, auertentibus.) Semper secunda est cephalica, ob causam multoties repetita. Quod si in vena sit cacochimia, purgabis etiam non cassia, & rhabarbaro, quæ clementer id efficiunt, neque eorum vis multum se diffundit: sed aliis fortioribus, diapruni, electuario de succo rosarum, & similibus.

Topica.

Tertio, repellentibus.) Cum repellentibus misce acetum, ut penetrat, neque acetum lædet, si partem consideremus, quæ sicca cum sit, ac etiam medicamenta sustinet. Oleo ergo rosaceo, & paucio aceto rteris: Omiste autem terebinthinam, quæ ab auctore proponitur: quia præter caliditatem, impedit penetrationem medicamenti. Aduertere tamen hæc tene non curasse dolorem, sed eius causam, nempe phlegmonem. Tunc autem eum curabimus, cum neglecta phlegmone, solius symptomatici habebimus rationem. Si ergo dolor urget, stuporem inducenti medicamento rteris, quale hoc est: ℞. olei rosarum ℥. j. opii ℥. iiii. aceti parum r: penetrat. Quæ in parte omiste medicamentum ex mica panis, & sapa constructum, quoniam quæ ipsum componunt, opii vim infringent, neque etiam parti affectæ cataplasma applicatur, quæ in parte interiori recodita est.

*Rondole-
tius & au-
tor labi-
um.*

Quæ Rondoletius scribit de cocleis, de medulla cruris porci salini, & auctor de pilis Naquere, & aliis tota substantia sedantibus dolorem, etiam labi-um omittantur, ac si non essent scripta: quia causam doloris cognoscimus, & ideo remediis manifesta qualitate operantibus curabitur.

Quinto frigidis.) Non est, quod hæc frigida applicemus, quia si intemperies ex humore calido orta fuit, dissipato humore non remanebit.

De sanguinis è naribus profluuiio.

CAPVT XXI.

Causæ.

Sanguinis è naribus profluuij, quod Græci hæmorrhagiam appellat, multæ sunt causæ, partim internæ, partim etiam externæ, eas autem omnes breuitatis gratia iuxta Galeni placita s. method. medend. in tria capita reducimus: fluit enim sanguis a venis, arteriisve nasi, vel reseratis illarum orificiis, vel tunicis ruptis, diuisisque, vel

el sudoris instar transcolatus. Porro referatur arteriarum, enarumque ora, aut propter nimiam sanguinis multitudinem, quæ vel in toto sit corpore, vel capite, vel hepate, liene: vel vtero, præsertim si non probè fluant menses, vt ex Aph. 3. sectionis 5. deprehenditur: in caput enim tunc fertur, atque inde per nares vi erumpit: nonnunquam & citra plenitudinem propter vasorum imbecillitatē hoc ipsum accidit, aut ob acrem aliquam qualitatē in humoribus repertam. Diuiditur autem tunica ex vulneratione, cōtusione, ruptione, & erosione velut sudor transmittitur, aut tunica ipsa rarefacta, aut sanguine tenuiore facto, quod multis de causis contingit: aut quia plus æquo exercitationibus homo sit vsus, aut medicamentis calidis sanguinem tenuantibus, aut victus ratione, qui sanguinem biliosiores reddiderit. Notæ tum ex *Notæ* ægri sermonibus, tum ex eius intemperamento, aut antea-cta vita colliguntur, quamobrem omnes eas recensere non erit opus, hoc tamen animaduertere oportet, cum à capite sanguis per nares profluit, in eo summā adesse grauitatem: cum ab hepate, in hypochondrio dextro: cum ab splene, in sinistro: cum a matrice, circa vmbilicum dolores, ac tensiones quasdam sentiri: cum per crism sanguinis profluuium fit, ea signa accidunt, quæ ab Hippocr. numerantur 3. Prognostico- *Aduerit* rum 33. prognostico, & a Galeno in libris de crisibus, atque alibi frequenter.

Sanguinis profluuium, à quacunque fuerit parte ortum si *Curatio* vires non deficient, non est sistendum, quia eo multis liberamur morbis, vt in libris de iudiciis Galenus testatur. Non criticum, vero quatuor remediorum generibus sistetur, primò, victu refrigerante, & astringente meatus, per quos sanguis fertur, vt aere arte parato per acetum, aquam rosarum, lactucæ, plantaginis, folia salicis, myrti lactucæ, nymphææ, & similia. Cibis ex succo acidulcium granatorum, limonum, *Victus* aranciorum, acetosæ, & similia paratis, qui, si glutinosi fuerint, magis laudantur, quales sunt pedes, & capita vituli, arietis, hœdi, & aliorum animalium, amygdum, farina orizæ, caseus recens pinguis, oua dura, quia paucum, & crassum sanguinem gignunt, præsertim albumina. Initio cum facultas nō est imbecilla, abstine a vino, carnibus, & ouis sorbilibus, & tremulis, largiorem, & liquidiorē sanguinem generantibus. Potus sit aqua chalybeara, tandem animi & corporis quies est necessaria illis, & silentium.

Secundò, auertentibus, in quibus præcipua spes curationis versatur, vt crurum, & brachiorum dolorificis ligaturis, *Antisid.* frict

DE CVRAND. MORB.

friktionibus, fotibus ex aqua actu & potestate calente, cucu-
bitulis sine scarificatione hypochondrio appositis & regione
naris, à qua sanguis effluit, & inter scapulas cum scarifica-
tione, vbi vena scindi non possit ad virium defectum, aut æ-

Sectio ve- tatem puerilem, quamvis sanguinis missio per venæ sectio-
ne reuellit. nem sit remedium efficacissimum ad reuocandum impetum
floris in contrarium: secunda est vena media eiusdem par-
tis, si sit totius plenitudo, vel humeralis, si non sit plenitudo:
quod si ab vtraque nare fluat sanguis, vtraque media, aut hu-
meralis simul scindatur. Post primam sanguinis missionem,
si secunda fuerit necessaria, & tertia, semper secunda est hu-
meralis eiusdem partis: aliquando tamen prius est facienda
sanguinis missio, per sectionem venæ pedum, aut tibiærum,

Admoni- videlicet cum ex detentis mensibus, aut hæmorrhoidibus na-
tio. scitur hoc profluuium, præsertim si natura tétauerit per in-
fernas partes sanguinem vacuare, & hæc sit vniuersalis re-
gula Hippocr. Gal. rationi & experientiæ accomodata. Duo
quoque sunt, quæ maxime auertunt subito reuocando san-
guinem, calorem, & spiritum, timor incussus, & aqua frigida
iniecta in faciem ægri incogitantis: sed videndum ne sit æ-

Consilium. ger maxime imbecillus, aut morbo comitiali obnoxius, quia
hæc duo epilepsiam efficerent, aut subito interficerent. Liga-
tura arcta testium, vel eorum ablutio aqua frigida, si subito
fiat, potenter auertit.

Sumenda Tertio, sistentibus, & cohibentibus sanguinem, & gluti-
Et admo- nantibus sumptis, vel admotis, vt lactuca, portulaca, & aliis
uenda. alimentis dictis initio huius cap. syrupo rosarum, cydonio-
rum, malorum granatorum, de acetositate limonum, & ci-
tri, præcipue vbi sanguis est biliosus, & nimis tenuis, & con-
serua rosarum, acetosæ & nenupharis ℞.ij. aut 3.j. trochisco-
rum de terra sigillata, aut de carabe cum 3.ij. aquæ planta-
Repellen- ginis, aut portulacæ, aut similium cohibent sanguinem. Na-
tia. ribus, collo, & fronti sunt admouenda quæ refrigerant, &
impellunt inchoando à mitioribus ad valentiora. Prima mi-
xtura bona est ex aqua rosarum, albumine oui, & aceto, cui
si addas puluerem astringentem, vnientem, & obstruentem,
erit efficacissima: qualis est ex rosis, balaustis, gallis, sumac,
farina moletrinarum, mastiche, aloë, & myrrha, thure, & pi-
lis leporis, & similibus.

Ex his omnibus, aut aliquibus accipe ij. 5. cum aqua, aut
succo astringente, naribus impone, & collo, & fronti: sed si
supra venas ruptas apponatur medicamentum, citius sistet
sanguinem. Gypsum cum albumine oui, aut aqua, aut aceto

nar

naribus admotum videmus potenter sanguinem sistere.

Puluis limacum cum crusta tostorum sistit sanguinem, & *Sistencia*
puluis ranarum combustarum. Aliqua sanguinem sistunt ita *sanguinem*
tim a tota substantia, seu proprietate, vt stercus asininum, vr- *à tota sub-*
tica, porrum, ocimum, seu basilicon. Hæc enim recentia, tri- *stantia.*
ta, & in nares immissa, aut illorum succus possunt sangui-
nem inhibere. Acetum potens cum gossypio, aut panno li-
neo sæpe fronti, aut collo applicitum illico sanguinem sistit.

Quædam vetula Monspeſulana sola menta naribus impo- *Vetula cu-*
ſita curauit sanguinis profluuium è naribus trium dierum. *ratrix.*

Cinis panni linei prius atramento tincti aceto mixtus, &
cum gossypio naribus immisſus cõſilio cuiusdam viri sapien-
tis curauit hoc profluuium. Medicamentum ex puluere cor-
ticum ouorum, & gypſi cum albumine oui, naribus & fronti
adiunctum citò, reprimit sanguinem. Idem fit mixtura luti
reperi in mola fabrorum, & bolo armeno cum albumine o-
ui. Cauteria actu, & medicamēta ſcarotica, quæ vrendo ſcha-
ras, & crustam gignunt, potentissime sanguinem, & subito
inhibent, sed si ſchara deciderit, maior & periculofior hæ-
morrhagia fiet. Quare eis nõ est vtendum, nisi cum alia iam
ſcripta, & ſimilia non ſuffecerint. Quando ſalus deplorata *De narco-*
est, & victa a morbo facultas omnium prædictorum, narco- *ticis.*
ticis curatur, quæ sanguinem glaciant, & membra ſtupefa-
ciunt, vt athanaſia recenti, & requie magna a ſcrupulis duo-
bus vſque ad ſcrupulos quatuor, & philonio antiquo Perſi-
co, aut Romano a drachma ſemis vſque ad 3. j. Hæc ſomnum
conciliant, & hoc etiam modo fluorem ſedant, ſed hæc & ſi-
milia narcotica partibus externis admota, tutiora ſunt, vt
cap. 5. de curatione phrenitidis docuimus.

Quartò, auferentibus cauſam hæmorrhagiæ, vt medica- *Purgatio.*
mentis cholagogis, ſi bilioſus fuerit ſanguis, qualia ſunt rha-
barbarũ, myrobalani citrinæ, & tamarindus, & hæc mixtu-
ra vel ſimilis. ℞. medullæ tamarindorũ 3. vj. rhabarbari ele-
cti & corticum myrobalanorum citrinarum an. 3. j. ſyrupi ro-
ſarum 3. j. aquæ bugloſſæ, quod ſ. miſce, & fiat potus. Si verò *Concoctio.*
ſanguis fuerit pituitofus, præcedēti coctiōe per rhodomel, *pituitæ.*
& aquam baſiliconis, plegmagogis curatur, vt ℞. diacatho- *Potio.*
licon. 3. vj. corticum myrobalanorum Kēbulorum & agarici
trochiſcati an. 3. j. ſyr. de mēta 3. j. aquæ bugloſſæ, quod ſ. mi-
ſce, & fiat potus.


De ſanguinis è naribus profluuiō.

C A P V T X X I.

ſſeol

Scholium.

Quæ san-
guinis ex-
cretio sit
toto genere
præter na-
turam.



Anguinis e naribus.) Sanguinis excretio fere semper est toto genere præter naturam: Addit Galenus illam dictionem, fere, propter eam sanguinis euacuationem, quæ singulis mensibus mulieribus per viæm contingit: hæc enim, cum non sequatur affectum morbosum, toto genere præter naturam non est. Aliarum partium sanguinis euacuationes toto genere præter naturam dicuntur, quia semper sequuntur aliquem morbum, unde male Fucius, & alii existimant, sanguinis euacuationem dici toto genere præter naturam, quia id quod euacuatur, est sanguis nobis familiaris, inde enim sequeretur euacuationem eam sanguinis, quæ per viæm singulis mensibus accidit, esse toto genere præter naturam, in ea enim optimus sanguis excerni solet. Sanguinis profluvium sit à causis externis, & internis. Externæ sunt duæ lib. 3. de caus. symp. cap. 2. vulnus, & ruptio: vulnus a re vulnerante, ruptio vero a tensione sit. Convulsio additur ab aliquibus, male tamen, cum hæc media rupture, aut medio vulnere sanguinis profluvium efficiat. Causæ internæ sunt tres ex eodem Gal. Prima in facultate consistit, cum scilicet retentrix vasorum fuerit imbecilla, aut expultrix immodicè irritata: Secunda est sanguinis vitium, cum peccat quantitate, aut qualitate: Tertia causa est vasorum noxa: quæ tripliciter contingit, primò cum vas est tenue, secundò cum molle: & tertio cum durum, ab his enim tribus facile rumpuntur vasa. Obiiciet Gal. lib. 5. methodi, alias Galenus à causis, nempe ruptionem, erosionem, & apertionem proposuisse: Respondet deo has causas sanguinis profluvii 5. lib. method. propositas, à superiori- bus non distingui, quia ruptio à plethora fit, erosio a sanguine bilioso, a- pertio vero à vitio facultatis, aut à plethora. Quid de diapedesi? Respondet deo, non esse profluvium sanguinis, sed cruenti feri, ut 3. de caus. symp. docet Galenus: vel si concedamus, diapedesim esse sanguinis euacuationem, aut anastomosim erit reducenda, quia ex lib. 5. method. cap. 2. diapedesis duobus modis fit, primò attenuato sanguine, & tunica vasorum rarefacta, secundò apertis orificiis exiguorum vasorum. Ex dictis habemus causas profluvii sanguinis in genere, ac proinde eius, quod per nares sit, de quo præsentis capite.

Criticum Sanguinis profluvium.) Sanguinis per nares profluvium aut est profluvium criticum, aut symptomaticum. Criticum praevideri potest signis traditis sanguinis. ab Hippocr. 3. prog. sent. 33. Primum est dolor capitis, non quilibet, sed gravis, pulsans, & calidus, potissimum si perseveret circa frontem, & tempora com. 11. eiusdem lib. Secundum visio hebes a copia sanguinis impedi- tio transitu spiritus animalis ad oculos: Tertium fulgoris motus circa oculos, ex splendore sanguinis proveniens: Quartum, tensio in hypochondrio sine dolore: Quintum colli dolor, & temporum gravitas: Sextum rubor oculorum, maxillarum, & narium: Septimum lachryma oculorum:

quor

orum signorum rationem lib. 3. criseon habemus explicatam. Symptoma- Symptoma
ticum profluvium cognoscitur ex eo, quod non soluit morbum, et præ- ticum.
dente cruditate eueniat. Criticum profluvium non est sistendum, quia
eo inutile expellitur, et fit proinde cum commodo animalis: symptoma-
um verò sistere oportet, quia fit à natura irritata, et cum incommodo.

Secundo, auertentibus.) Symptoma hoc, quod in excretis toto ge- Symptoma
re præter naturam consistit, cum urgeat, ad se trahit curationem: quod curatur.
æstabimus, à naribus auertentes sanguinem, primò sanguinis missio-
, quæ ex cephalica, basilica, aut si magis volumus renellere, ex vena
dis fieri potest: cum enim nullus sit affectus particularis euacuationem
stulans, non seruamus rectitudinem, sed loci distantiam. Inde colliges, Lapsus at-
n rectè auctorem in solo sanguinis profluvio, quod fit ex retentis men- Etoris. Ant
us, aut hæmorrhoidibus, secare venam pedis. Neque hoc etiam in loco maduersio
imaduersio Hollerii, & Rondoletii locum habet, quæ præcipiunt in Rondoletii
ofluvio sanguinis in vena exiguum sectionem faciendam esse, tunc e- & hollerii
n tenuiori sanguinis portione euacuata exigua fieret reuulsio, quæ in non admit
tione magna commodè præstabitur tota massa euacuata: nunquam tunc.
im fiet optima reuulsio sine sanguinis motu. Sanguine missio cucurbi- Cucurbitu
lis utemur affixis hypochondrio, quod rectitudinem seruet cum nare: à læ supra
ia fluit sanguis, ita ut si ex nare dextra fluat, supra iecur, si ex sini- hypocōdriū
ra, supra lienem apponantur. Causam huius rei intelligemus ex dupli- & cur:
rectitudine: vna enim est naturæ, seu loci, quam partes dextræ cum
xtris, & sinistræ cum sinistris admittunt, quæ natura dicitur, quia
um semper cum commodo animalis videmus naturam seruare, ita ut si
fecta sit pars dextra, per dextram, & si sinistra, per sinistram rem
ilectam euacuet. Altera rectitudo vasorum est, quæ non ex parte eo
odo quo diximus, sed ex vena, quæ cum loco affecto se aperit, desumi-
r: quæ ratione vtrunque basilicam cum iecore rectitudinem habere di-
mus. Ex his facile causam habebis, ob quam in profluvio sanguinis per
ares, hypochondrio supradicto cucurbitula applicanda sit, causa enim
duplex rectitudo, quæ tunc seruatur. Auertit etiam auctor sangui-
m frigida aqua inspersa in faciem ægri incogitantis; tu etiam ægroto
ente poteris uti hoc remedio, quia aqua sua frigilitate operatur, &
n propter animi pathema.

Tertiò, sistentibus.) Quæ de medicamentis toto temperamento Aduerte
nguinem sistentibus scribis; non laudo, quia morbus, ex quo profluit de medica-
nguis, ratione cognoscitur, et proinde curabitur remediis ratione etiam mentis to-
uestigatis. Si obiicias Gal. qui lib. 9. simpl. cap. 8. scribit lapidem repe- to tempe-
ri contactu solo sanguinem cohibentem: respondeo illum lapidem siste- ramento
solum illud sanguinis profluvium, quod à causa nobis occulta excita- cientibus
m fuit, quale est illud, quod hæmorrhoids serpens inducit. sanguine.


Quarto, auferentibus.) Curato symptomate (nempe sanguinis Curatio
ofluvio) quod urgebat, ad curandum morbum descendere oportet, con- morbi.
i
fid

D E C V R A N D. M O R B.

viderantes an causa præsens sit, necne, quia si sit præsens, auferenda erit. Si ergo profluat sanguis ex anastomosi, emplastica, & adstringentia utilia erunt: si ex erosione magna, caustica, dummodo adstringentia sint, & præsint applicari, conducent. Si magna non est, aqua plantaginis, & alia adstringentia sufficient, quæ simul humorem contemperabunt, & vlcus vniunt. Si vero à vulnere contingat prædicta sanguinis euacuatio, glutinantibus vlcus vtendum esse nemo dubitat.

De rubedine faciei. C A P. X X I I.

Causa.



Vbedo faciei malum est nulli non manifestum, cum oculata fide cognoscatur. Quare superuacaneum erit in enarratione causarum, & signorum immorari, hoc tantum dixisse sat erit, prouenire eam affectionem sæpe à causis exterioribus, vt verbi gratia a sole, sæpissime vero propter calidam hepatis temperaturam immodicam, à qua sanguis biliosus fit, aptiorque est ad ascensum.

Victus.

Curatur primò faciei rubedo & macula, a sanguine bilioso nascens, victu refrigerante, de quo cap. v. de curatione phrenitidis.

Remissio.

Secundò, auertentibus, vt sanguinis missione per sectionem venæ mediæ, si fuerit plenitudo, aut humeralis dextræ, si desit ipsa plenitudo: euacuato sanguine secundum naturam, & plenitudinem ægri, frictionibus, ligaturis, & fotibus partium infernarum, & cucurbitulis cum scarificatione, & sine scarificatione, & filo collo traiecto, præcipue si antiqua, aut magna fuerit macula rubra.

Præparatio.

Tertio, parantibus humorem biliosum per medicamenta utilia, qualia sunt syrupus rosarum, oxysacchara. S. syrupus acetosus. S. syrupus de acetositate citri, & limonum, cum decocto, aut aqua endiuia, plantaginis, portulacæ, acetosæ, & similia.

Purgatio.

Quartò, vacuatione per medicamenta, qualia sunt rhabarbarum, myrobalani citrinæ, cassia fistularis, & tamarindi, diaprunis solutium, & electuarium de succo rosarum, & similia: ℞. medullæ tamarindorum, & medullæ cassiæ fistulæ recens extractæ an. ʒ. iij. rhabarbari electi infusi per noctem in aqua endiuia ʒ. j. diaprunis solutiui ʒ. iij. syrupi violarum ʒ. j. aquæ cichorei, quod. s. misce, & fiat potus.

Alteratio.

Quintò, refrigerantibus hepar, & prohibentibus bilis, & sanguinis calefactionem: vt electuario diatrion fantalorum, diarhodon. Abbatris, & diamargariton frigidi, cum aquis, aut syrupis refrigerantibus, de quibus tertio genere remedium est dictum: aut cum infusione ʒ. j. rhabarbari in lb. j. aquæ

aquæ endiuia, & ceroto santalato hepatis admoto.

Sexto, vacuantibus clementer & resoluentibus materiam partis affectæ, & repellentibus, & inducentibus albedinem: vt lacte humano, caprino, aut ouino, vnguento citrino, lacte, seu emulsione quatuor seminum frigidorum mundatorum, & lacte seminis papaueris, & lacte virginali, quod fit ex *Lac virgi-* duplici aqua satis tenui, & dissimili lacti, sed ambæ simul *neum,* mixtæ substantiam lacti similem constituunt, modus faciendi hic est: ℞. aceti ex vino albißimo facti lb. β. lithargyri dealbati ℥. β. misce, & postea per elychnium distilletur aqua ex vno vase in aliud. Item ℞. aquæ fontanæ lb. β. salis armoniaci ℥. iij. infunde per noctem, deinde distilletur per elychnium aqua ab vno vase in aliud: cōseruentur in vasis vitreis, & postea vtriusque aquæ guttis duabus mistis sæpe laua faciem: habet hoc lac magnam vim corrumpendi rubedinem, & albedinem inducendi faciei. Ego expertus sum sæpe, & hoc lacte curantur ij, qui facie leprosa videntur esse, & dicuntur a Gallis coporrosc. Aqua ex lacte caprino & albus *Aquæ fa-* minibus ouorum vitreo vase per distillationem facta, *ciem tercio* faciem candidam, & pulchram reddit. Eandem vim habet *rem, et can* qua limacum, seu cochlearum. Simili facultate valet aqua *didio-* ex floribus typhæ. Aqua quæ fit ex vna gallina secta in *reddentes,* duas partes, & ℥. ij. sacchari, & ℥. j. chrysocollæ (boracem vocant) faciei omnes maculas detergit. Idem fit mixtura pinguedinis renum hœdi, sacchari, & chrysocollæ noctu faciei admota, dummodò die sequenti facies lauetur aqua raphani, aut alia simili. Aqua aut succus qui ex raphano diuiso in partes, & melle, aut saccharo fit, potenter tergit, & tollit omnes faciei maculas. Hęc mixtura (quæ ab Hispanis muda dicitur & a rhase quinto ad Almanforem cap. 17. gumeta) faciem pulchriorem reddit, eiûsque labes detergit, si initio noctis apponatur, & mane aqua raphani aut alia lauetur. ℞. radicis lilij albi, raphani, amygdalarum amararum an. ℥. j. mellis. q. s. misce, & fiat ad modum opiata, aut cōfectionis. Idem aut par efficere potest mixtura ex semine brasicæ, amygdalis amaris, & melle. Decoctum lupinorum aqua pluuia factum abstergit næuos faciei, interiora nucleorum persicorum, eorumdémque oleum eandem habet facultatem. Aqua radicis lilij albi tergit faciei omnes maculas, & rugas illius tollit. Sanguis leporinus non dissimilis est superioribus facultate in delendis labeculis oris: similem vim affert in his aqua vitæ, qua vtuntur Germanæ in abluenda facie. Aqua per distillationem ex sanguine leporis & vino omnes faciei

D E C V R A N D. M O R B.

Historia. maculas eruit, faciēque formosam efficit. Idem præstat aqua ex floribus fabarum, stercus columborum cum aceto, si in forma vnguenti factum fuerit, faciem emaculat, quo nobilis quædam fœmina septem diebus, curata fuit. Hæc aqua est optima, & ferme diuina ad maculas faciei: imò etiam ad vestigia exanthematū & papularum remouenda. ℥. florū fabarū p. iij. stercoreis columborum ℥. j. aceti ℥. iij. aque vitę ℥. iij. sanguinis leporis ad pondus omnium, misce, ex his fiat aqua instrumento vitreo, & igne paruo. Hæc aqua similiter omnes maculas faciei tergit, etiam illas, quæ dicuntur panis, & barro vulgo: ℥. florū fabarū lb. ss. terebinthinæ optimæ decies lothe ℥. j. aloes ℥. j. lactis caprarum lb. j. misce, & fiat aqua igne paruo, & instrumēto vitreo: adde in fine extra ignē chrysocollæ ℥. ij. camphoræ ℥. j. sed postea sæpe moue vas.

Aduerte.

Ad tergendos tumores paruos faciei, qui dicuntur Latinis vari, nobis barros, mane & vespere laua faciem mixtura ex albumine oui, & aqua rosarum benè mixtis, & post ad cutem defendēdam vnge eam adipe hœdi parato more Valentino.

Habet similem facultatem hæc aqua: ℥. centupedes, animalcula sunt, quæ dicuntur porcelletes a Valentinis nu. 12. sacchari candi ℥. ij. succi limonum lb. j. ex his fiat aqua, quæ est optima in hoc. Hæc aqua similiter multam efficientiam habet, & experta est quemadmodū & aliæ: ℥. cucurbitulam vnā absq; cortice diuisam in partes minimas, xij. oua sine vitellis, & cum corticibus, boracis, sacchari cādi an. ℥. j. lactis capræ lb. ss. terebinthinæ abietis decies lotæ ℥. ij. ex his fiat aqua instrumento vitreo, & igne paruo. Inter alia maximè laudata medicamenta hanc aquam probabis in hac re. Oleum myrrhę est optimum & expertum ad omnes faciei maculas abstergendas, fit hoc modo: Accipe myrrham in puluerem redactam positam in vase terreo, & sæpe iuxta ignem moue illud vas, & à myrrha egredietur oleum cōpressa panno lineo, quemadmodum fit oleum amygdalarum, aut sesaminum. Hæc aqua faciem candidissimam, & pulcherrimam efficit sine detrimento vllō, & ea sæpe nobiles fœminæ Valentinæ suas abluunt facies: ℥. sublimati pellucidi puluerizati ℥. ss. aquæ fluuiatilis lb. iij. in vase vitreo, & diu violento motu misce, & postea adde tria albumina ouorum benè prius agitata, ita vt ab eis spuma separetur, & deinde omnia sæpe moue, sicque post tres dies hac aqua vtere.

De dolore dentium, & de ipsis denigratis,
& mobilibus. C A P. X X I I I.

Den

Dentium dolores partim à causis externis excitantur, partim ab internis. Externæ causæ sunt casus, percussio, & vsus rerū immoderate calidarum, vel frigidarum. Res etiam duras & contumaces vel mādissæ, vel dentibus diuissæ, & in vniuersum, id omne, quod eos, aut alterare potest, aut commouere. Internæ autem causæ erūt intemperies aliqua, vel nuda, vel cum humore, aut frigido, aut calido: abscessus porro existens vel in ipsismet dētibus, vel in neruo, qui illorum radici inseritur: vel in gingiuis, propter quas etiam contingit dentes dolere. Sæpe ab stomacho malū ascēdit propter sublato vapores: frequentissimè tamen prouenit propter humorū defluxum (quem rheuma appellant.) Imbibitus enim ille humor calidus nonnunquam, nonnunquā frigidus, sæpe etiam falsus, vel in gingiuis, vel in neruo, vel in ipsis dentibus dolores, & vehementes parit. Signa causarum externarum ex sermonibus ægri sunt petenda. Internarum verò hæc sunt, si intemperies fuerit nuda, quæ in capite fit, & per consensum dentes afficiat, non est dolor aggrauans, quemadmodum esse solet, vbi humor quoque infestat. Quod si fuerit calida intemperies, acutior est dolor, quam si frigida. Si abscessus fuerit, in dente ipso dolor sentitur, quo etiam auulso sedatur dolor. Si in neruo, in intimis partibus dolor dis cruciat. Si in gingiuis, circa ipsas erit, & præter id, tumor quoq; in ipsis cernitur. Si fuerit fluxus humoris a capite per frontē, & tempora sentiente egrotò, in mandibulas, & dentes humor descēdit, qui si sanguis fuerit pulsatio quædam adest, tumor, ac calor. Si bilis, acutus est dolor, ac pungens, ac vix tolerabilis. Si pituita, dolor est remissus, & candidant in ore partes omnes, & multa insuper est saliuæ copia. Si melancholia, liuent & gingiuæ, & dentes: nec dolor tantum infestat, & aliquando duræ apparent gingiuæ. Porro si à ventriculo dolor hic nascatur, quod fieri posse diximus, prius in ipso & dolor, & quædam conturbatio sentiuntur.

Dentium dolor, si sit à sola intemperie profectus, alterantibus contrariis absque euacuatione curatur, de quibus dicemus vbi de curatione doloris, qui fit à materia post illius euacuationem agendum erit. Cum est à sanguine, curatur primò victu refrigerante, & abstinencia vini, carniū, & ouorum, & omnium quæ nocent dentibus in omni fermè causa vt potus actu frigidus, præsertim à cibo, vel potu actu calido, lac, dactyli, & ventriculi cruditas.

Secundò, sanguinis missione per sectionem mediæ venæ eiusdem partis, si sit plenitudo in toto corpore, & dolor in

*Causæ.**Notæ.**Curatio.**Victus.**Remissio.*

DE CVRAND. MORB.

altera parte dētiū: si verò in omnibus, scindatur media dextra: cū verò non est plenitudo, humeralis est secanda ita, vt sanguinis copia respōdeat ex equo naturæ ægroti, & morbi.

Preparatio. Tertiò, parantibus bilem, vt syrupo rosarum, endiviæ S. granatorum, & similibus cum aquis, aut decocto cichoreæ, endiviæ, lactucæ & portulacæ.

Purgatio. Quartò, purgantibus bilem per medicamenta cholagoga, vt sunt rhabarbarum, myrobalani citreæ, cassiæ fistulæ, electuarium diaprunis solutiui, & de succo rosarum, pilulæ de rhabarbaro, & similia, quorum formulæ notæ sunt ex dictis præcipue cap. j.

Quinto, refrigerantibus moderatè, quia frigidum omne inimicum est ossibus, ex Hippocr. v. aph. vt decocto hordei, lacte humano, aut ouino, aut caprino parum calidis, aut lacte amygdalarum dulcium, aut aqua rosarum, aut mirtyllorum, & similia.

Alteratio. Si sit à bile dolor dentium, similis est fermè facienda medicina ei, quæ cephalalgicæ biliosæ adhibebatur. Si verò à pituita, curatio fermè talis erit, qualis pituitosæ cephalalgicæ, non secus fiet, si sit ab atra bile.

Si verò dolor dentium fuerit ab inflammatione gingivarum, curatur vt phrenitis, aut angina.

A calore. Cū est dolor dentium à distillatione humoris à capite, obserua quæ dicenda sunt cap. xxv. quia hæc curatio similis est illi: in omni tamen quæ sit a causa calida per distillationem post vacuationem, & corroborationem partis primo affectæ, a qua fluit humor, est optimū hoc auxilium: ℞. balaustiarum, rosarum, mirtyllorū, sanguinis draconis, mastichis, sandaracæ Arabū, hypocistidos, spodij an. ʒ. iij. fiat decoctum in lb. ij. aquæ ad dimidium, de quo percolato accipe ʒ. ix. cui adde syrupi rosarum ʒ. iij. rhodomellis & oxysaccharæ. S. an. ʒ. j. misce, & fiat mixtura, qua sæpe abluantur os, & dentes.

A vermibus. Quando dolor est a vermibus, curatur rebus amaris, & acris quæ habēt facultatem interficiendi ipsos, qualia sunt absinthium, myrrha, aloe, lupini, colocynthis, & tithymalus. Ex his fiat decoctum, quo laua sæpe os. Suffitus ex semine porri, & iusquiami ipsos enecat, & etiam sensum omnem eripiendo dolorē curat: hoc tamen & alia narcotica (vt philonium) non sunt ad mouenda, nisi in maximis doloribus, & cū alia non iuuerint. Si dolor fiat a corruptione dentiū, ipsorum extractio est necessaria, & sufficiens cura, quæ ab experto viro fiet instrumentis ad hoc necessariis, & sine magno dolore. Aliqui eos medicamentis euellunt, sed cū maiori dolore,

quam

namuis tithymali lac cum farina mixtum dentes (vt quondam est opinio) sine dolore extrahit. Quando dolor dentium est ab vlceribus prauis, & corrodentibus, consule chirurgum doctum, & interim vttere hoc liquore sepe: ℞. aquarum plantaginis, & foliorum oleastri an. ℥.iiij. syr. acetosi. S. ℥.j. ℞. rhodomellis ℥.j. aceti scillitici ℥.℞. pulueris aluminis vti 3.ij. misce. Vlcera tamen oris parua, & superficiem carnis tantum occupantia (quibus pueri & infantes laborant, dicuntur à Græcis apthæ, & ab Arabibus alcola) curantur hoc auxilio: ℞. aquæ plantaginis ℥.iiij. aquarum lactucæ, & portulacæ an. ℥.j. ℞. rhodomellis, & syr. rosarum an. ℥.ij. syr. acetosi. S. 3. j. misce.

Vnum hoc est maximè animaduertendum, exuuias, seu senectam serpentis omnem dentium dolorem curare à tota substantia, siue per suffitum, siue alio modo. Quare in dolore dentium infantium, cum oriuntur solent multi fieri tunc morbi, autore Hippocrat. 3. Aphorism. videlicet febris, ventris profluuium, & conuulsio: hæc enim curantur aut prohibentur fieri, si gingiua theriaca magna perfricetur, aut lacte canis, aut puluere cerebri leporis. Suffitus spoliij serpentis est in hoc optimus, & lotio facta illius decocto: hæc enim facilem efficiunt exitum dentium, & sine magno dolore. Si dentes liueant, aut nigricent, corpore euacuato sæpe perfricentur hoc puluere: ℞. salis ℥.j. pulueris ossis sepiæ & pumicis an. ℥.℞. misce, & fiat puluis: adde pulueris aluminis 3.ij. Aqua vitæ dentes cādidos reddit si sæpe ea os abluatur, excrementa pituitosa purgat, & gingiuas corroborat. Rhodomet etiam tergit dentes, & decoctum lupinorum, myrrhæ, & mastichis cum melle ad modum mulsæ est optimum. Puluis hic est optimum dentifricium ad mobiles dentes fulciedos, & gingiuarum carnem augendam: ℞. mastichis, sanguinis draconis, thuris, sandaracæ Arabum, ossium omnium myrobalanorum, nucum cupressi an. 3. iiij. santalorum omnium, succi liquiritiæ an. 3. ij. seminis portulacæ, rosarū, corallij rubri præparati an. 3. j. ℞. foliorum myrthi, baccarum myrthi, psidiæ an. 3. j. spodij, cinnamomi, gariophyllorum, nucis muscatæ an. 3. ℞. boli Armenici aqua rosarum abluti, amydi, gummi Arabici, dragaganti an. 3. j. grani tinctorum 3. v. lapidis hæmaticis 3. ℞. misce, & fiat puluis, quo sæpe fricentur dentes. Vinum album decoctionis rerum astringentium, qualia sunt superius dicta, & similia, est præstantissimum dentifricium.

Dolores dentium sedantur.

Cura in ortu dentium.

Quando luent & mouentur.

Dentifricium.

DE CVRAND. MORB.
De dolore dentium, & de ipsis denigratis,
& mobilibus. CAP. XXIII.

Scholium.

Dentium dolores.) Dolor dentium symptoma est, quod sequitur solutam unitatem: hæc autem est occulta, aut manifesta: occulta ab intemperie calida, aut frigida, siue sit nuda, siue cum affluxu humoris, manifesta verò a rebus vlcus generantibus, ortum habet. Curabimus ergo hunc dolorem, si urgeat narcoticis medicamentis, si non urgeat, his, quæ causæ contraria sunt, omittentes ea medicamenta, quæ ab autore, & aliis toto temperamento hunc dolorem curantia describuntur, non enim extant.

De Angina. CAP. XXIII.

Descriptio.

S

ynanche, vel cynanche (quam Latini Anginā vocant) autore Gal. 4. de locis affectis, nil aliud est, quam spirandi difficultas, nullo existente vitio, neque in pectore, neque in pulmone: unde omnes affectus, qui gutturi accidunt, quos spirandi difficultas comitatur, Hippocrates, atque alij veteres anginæ nomine appellabāt, ut ex 3. Prognosticorum est colligere. Definitur etiam angina a Galeno 4. de ratione victus in morbis acutis, partium, quæ in gutture sunt, phlegmone. Cuius quatuor traduntur genera ab eodem 4. de locis affectis cap. 5. his verbis: Atque hæc sunt quatuor earum genera, primum ubi fauces inflammantur, fauces voco internum oris locum, ad quem simul conueniunt & gulæ, & gutturis partes extremæ: Alterum, cum neque reliquæ oris partes, neque etiam externarum partium vlla inflammata videtur: laborans tamen suffocationis periculum in gutture sentit: Tertium, ubi extrinsecus circa fauces inflammatio apparet: Quartum, ubi gutturis partes tum externæ, tum internæ similiter affectæ sunt: hæcenus Galenus. Quem locū si paulo inferius legas, quiutum etiam genus vidēbis positum ex vertebrarum cervicis luxatione. Recentiores medici inter quos Aetius & Paulus nominantur, sic de Anginæ differentiis disputant, ut multum interesse putent inter synanchen, & parasyanchen, & cynanchen, & paracynanchen: sic enim de illis sentit Paulus lib. 3. Inflammatis faucium interioribus musculis ea oris affectio fit, quæ Græcis synanche dicitur: exterioribus verò phlegmonē infestatis, parasyanche. Pari quoque modo & in gutture, cuius inflammatis interioribus quidem musculis, cynanche: exterioribus verò, paracynanche nascitur. Quæ

lan

nè nominum curiosa distinctio, tametsi alias non videatur
se improbanda, vt 4.aphor.commento 34.aperte: tamen à
Galenò damnatur. 3.Prognost.comm.18.& 4.de locis affect.
p.5. quippe (vt eo loco dicit Galenus) tunc primùm homi-
nes res ipsas neglexerunt, cum nimio studio nomina quære-
re inciperent. Oritur hic morbus propter nimiam sanguinis *Causa.*
aut copiam, aut efferuescētiam, qui in partes iam dictas im-
petu ruit, & oborta inflammatione respirandi angustiam pa-
t. Omnibus ferme, vt ait Paulus, eadem euenta sunt: verbi *Nota.*
ratia non nisi recta ceruice, & difficulter spirant, dolor ad-
t, & aliquando febris, ruborque semper tum vultus, tū col-
atque tumor quoque. Quibusdam os perpetuò hiat, didu-
umque est, & deglutire omnino sic affecti non possunt, at-
que dolore afficiuntur, idque præcipue, cum potus eis per
ares effluit.

Angina, quia morbus acutissimus est statim initio ante *Curatio.*
quam absoluta fiat, sex generibus remediorum curatur. Pri- *Victus.*
mò, victu tenui & refrigerate prohibente phlegmonē auge-
re: vt aere frigido, & inedia vnus vel duorum dierum, si vi-
res poterunt ferre, vel saltem sola ptisana hordei, vel amylo
recte amygdalarum parato, aut lacte amygdalarum, aut iu-
p rosarum, aut succo malorum granatorum, aut cichorea
octa, aut cucurbita saccharo cōdita, aut cydoneis tostis, aut
yris: liquida tamē facilius deglutiuntur. Potus sit aqua hor-
dei, vini enim, ouorum & carniū abstinētia est summe ne-
cessaria: quia hæc sanguinem augent, & calefaciunt.

Secundò, auertētibus impetum sanguinis fluentis ad par- *Remissio.*
tem affectam, & prohibentibus augmentum inflammatio-
nis: vt sanguinis missione vsque ad animi deliquium, si vires
erunt: eam tamen partiri est tutius. Secatur cephalica sta-
tim propter necessitatem subitam euacuationis, & etiā ma-
gister meus Falco doctor Monspessulanus, vir magnę doctri-
næ, & experientiæ id faciebat: & hæc aliquādo bis, & ter est
recanda, dum fluit humor. Si vires, & ætas nō ferunt sangui-
nis missionem per sectionem venæ, auersio fiet per cucurbi-
ulas cum scarificatione inter scapulas: cum verò sistit flu-
io, vena sub lingua scinditur. Auertunt etiam purgationes *Cucurbi-*
per clemētia medicamenta factæ, cum sanguis est depraua- *tula.*
us qualitate aliqua, aut in alios humores est conuersus vt *Derivatio.*
hoc medicamento, aut simili: ℞. medullæ cassiæ fistularis re- *Purgatio.*
ens extractæ, & medullæ tamarindorum an. ℥. ss. rhabarbari
lecti infusi per noctem in aqua endiuia ℥. iij. syr. violarum
j. decocti florum cordialium q. s. misce, & fiat potus. Auer- *Auersio.*
tim

D E C V R A N D. M O R B.

timus quoque clysteribus clementioribus, cum est inflammatio à sanguine, aut bile: si verò fuerit à pituita, valentioribus. Reuellunt etiam cucurbitulæ scapulis affixæ. Frictiones & ligaturæ partium extremarum quoque auertunt, & fots carundem ex aqua calida.

Repellentia sumpta & ad mota. Tertio, repellentibus materiam, & prohibentibus cynanchen augeri, qualia sunt frigida, & astringentia leuiter gargarizata, relicta, donec incalescant in vltimis faucibus: hæc enim partem affectā roborando, & vias, per quas materia fluit contrahendo optime inflammationis huius incrementū prohibent. Quorum aliqua sunt simplicia, & alia composita, vt aqua, & succi rosarum, plantaginis, portulacæ, lactucæ, acetosæ, solani, granatorum, nucum viridium, mororum, & acetum. Ex his & similibus fieri possunt multa composita medicamenta: vt ℞. hordei decorticati, & lentium an. p. j. plantaginis, lactucæ, & solani an. m. j. fiat decoctum, de quo accipe lib. j. dianucū, & diamoron an. ℥. ij. oxysaccharæ rosarum an. ℥. j. s. misce, & fiat gargarisma hoc, & simile.

Indicatio a temporibus morbi sumenda. Absolutè repellentibus vti oportet initio: vbi verò habenda ratio etiam est materiæ, quæ fluxit simul, & fluentis, minus scenda sunt medicamenta, dissipantia, & resoluētia, cum repellentibus, eorum tamen vis æqualis, aut inæqualis respondere debet proportioni materiæ delapsæ, & fluentis: vbi tamen intentio repellendi excedit dissipandi necessitatem. duplo, fiat hic, aut similis gargarismus: ℞. hordei decorticati p. j. lactucæ, & plantaginis an. m. ij. liquiritiæ rasæ ℥. s. ficus numero x. camomillæ, p. s. fiat decoctum, de quo colo transfuso accipe ℥. x. diamoron, & dianucum an. ℥. ij. rhodomellis ℥. ij. s. syrup. de liquiritia, & oxysacchara, S. an. ℥. j. misce, & fiat gargarismus.

Præparatio. Quarto, apparantibus pituitam, aut materiam mixtam, vt melle rosato colato, oxymelle. S. syr. de liquiritia, & de hyssopo cum decocto, aut aqua liquiritiæ, absinthij, & similibus.

Purgatio. Quinto, vacuantibus materiam hanc per medicamenta mixta, vt est diaphenicon, pilulæ aggregatiuæ, & similia, aut hoc potu: ℞. diacatholicon. ℥. s. agarici trochiscati ℥. j. diaphenicon. ℥. iij. rhodomellis ℥. j. aque buglossæ, quod satis est, misce, & fiat potus.

Resoluentia. Externa. Sexto, dissipantibus, & resoluentibus materiam externis, & internis: vt oleo camomillæ, amygdalarum dulcium, sesamino, de semine lini de lilio, laurino, rutæ, & similibus. Hoc medicamentum, seu cataplasma collo admotum potentissime, & optime resoluit: ℞. farinæ fœnugræci, seminis lini, &

camomillę an. p. j. pulueris vnius nidi hirundinum: omnia
 ul cum ſapa decoquantur, & in fine adde olei de lilio, &
 thi an. ʒ. j. ſ. croci puluerizati ʒ. j. miſce, & fiat cataplaſ-
 . Filum laneum purpura tinctum, & quo poſtea vipera eſt
 angulata, collo appenſum curat anginam. Cataplaſma ex
 ina hordei, & de ſucco apij potenter diſſipat, & reſoluit
 teriam anginę: Expertum a multis, & à me eſt. Hic gar-
 riſmus diſſipat, & reſoluit materiam ſatis: ʒ. camomillę.
 da ctylorum, vuarum paſſarũ ana. p. j. ſ. ſcœnugræci. p. ſ. fi-
 . x. numero, fiat decoctum, de quo colo tranſuſo accipe ʒ.
 j. diamorun ex maturis moris, & ſapę an. ʒ. j. rhodomellis,
 oxymellis compoſ. an. ʒ. j. ſ. miſce, & fiat gargarifmus. *Ster Interna.*
 s canis album cribratum cum melle mixtum inſtar loch,
 eglutiat, eſt præſtantiffimum remedium ad reſoluen-
 m. Eandem, aut ſimilem habet vim puluis hirundinum v-
 rum ſolum, aut cum melle. Hęc, & ſimilia in vigore, aut *A tempo-*
 clinatione tantum conferunt. Si verò angina nequeat re- *re.*
 ui, quę curandi ratio aptior eſt, ſed in ſuppuratione ten-
 t, quod febris & doloris intenſio demonſtrant, ſuppuran- *Curatio*
 bus curatur, vt gargarifmo, & emplastro ex rebus, quę pus *anginę*
 gnunt: qualia ſunt ſcœnugræcum, ſemen lini, malua, radix *ſuppuran-*
 cheę, radix lilij, oleaginea & pinguis. Facto pure abſcef- *de.*
 s rumpatur inſtrumento ferreo, ſi videri poſſit, aut manſo
 glutito pane duriori, vel digito altiùs immiſſo, aut candē
 caput tamen inclinetur, ne pus deſcēdat in thoracem. *De- Ruptio*
 de vlcus eſt abſtergendum rhodomelle, & decocto hordei, *abſceſſus,*
 ſimilibus: poſtremò verò eſt glutinandum maſtiche, thu-
 , boloarmino, ſanguine draconis, & ſimilibus.

De Angina. CAP. XXIIII.

Scholium.

SYnanche, vel Cynanche.) De nomine, differentiis, & cau Anginę
 ſis anginę, lege auctorem: aduerte tamen Anginam eſſe mor- morbus eſt
 bum acutum, ex quo imminet periculum, non ob partis, quę acutus.
 diur præſtantiam, ſed ob ſitum, quia huius partis tumor ſtatim re-
 irationem lædit. Dices, cur in angina maiorem dolorem ſentimus de-
 uientes res liquidas, & paucas, quàm ſolidas, & maiores? Reſpōdeo, Dubitatio.
 prouenit ex maiori muſculorum contractione.

Secundo, auertentibus.) In Angina (quę eſt tumor præter na-
 rā a quocunque humore procedens) duplex eſt morbus: vnus intempe- Morbi in
 s, & alter tumoris magnitudo deglutitionem, & aeris ingreſſum im- Angina.
 diens. Curabitur ea ratione, quā alij tumores in principio ſanguinis Curatio.

miß

D E C V R A N D. M O R B.

missione, ut reuellamus, & ex cephalica, ut simul euacuemus ex par-
affecta. Neque hoc in loco recte præcipit Vega, in Angina ex suppressi-
mensibus secandam esse venam malleoli. cum enim Angina sit affectu
urgens, ab ea incipienda est curatio, & deinde veniendum est ad mens-
mouendos, adde reuulsionem non esse faciendam ex loco, à quo fluit hu-
mor, sed à loco, ad quem fluit. Quæ dicit auctor de purgatione, an ver-
sint, inferius videbis.

**Repellen-
tia,**

**In Angi-
na vsus
extergen-
tium.**

Tertio, repellentibus.) Humor extra venas effusus, faciens tu-
morem præter naturam in faucibus, statim in principio, cum adhuc ser-
uet suam naturam, euacuandus est, non calidis, quia hæc magis attra-
hent, sed aliis remediis, quorum vnum fuit sanguinis missio, quæ eua-
cuans venas partis causam dedit, ut humores iterum remigrarent ad ve-
nas. Alterum verò est frigidum, & adstringens, interius gargarisatum
quod humores ad venas repellit. Aduerte tamen neque ad morbi decli-
nationem semper esse miscendum extergens aliquod, sicut in omnibus in-
flammationibus, quæ teguntur cute tenui, per quam semper aliquid re-
sudat. In principio ergo veteris decocto hordei cum cortice, & aceto, & si-
milibus. In augmenti principio, cum extergentibus, & adstringentibus
pauca digerentia miscebis, decoquens cum hordeo paucum glycyrrizæ, ad-
dis deinde aceto, aut diamorone. In incrementi secunda parte, quæ pri-
mam partem flatus comprehendit, extergentia cum æquali quantitate
digerentium, & adstringentium permiscenda sunt. Decoquemus ergo
croci & myrrhæ an. ʒ. j. in lib. i. aquæ ad medietatis consumptionem, ei
addentes diamoronis ʒ. vj. In declinatione verò solis vtere digerentibus,
decocto glycyrrizæ, aut hyssopi, & similibus. Semper tamen aduerte, re-
pellentia maiora, aut minora esse permiscenda pro affectu maiori aut
minori.

Purgatio.

Quarto, apparantibus.) In Angina non est, quod vtamur medi-
camento purganti, eius enim nulla est occasio, nisi sit cacochimia, ex qua
fluat humor ad partem affectam.

**Quæ ap-
plicanda
parti exter-
næ.**

**Medica-
mentum
ex nido hi-
rundinum
reiciuntur.**

Sexto, dissipantibus & resoluentibus.) Parti externæ in collo
non sunt applicanda repellentia sola, neque cum calidis mixta, ne humor
ad interiora recurrens affectum augeat, & ideo medicamentum ex ni-
do hirundinum compositum omittatur, quia etsi in eo sit stercus digerens,
est tamen terra repellens: neque tempus conteras in medicamentis collo
appensis, quæ tota substantia operari creduntur, non enim reperiuntur
ob causam multoties repetitam: veteris ergo externis calidis, quæ vim ha-
bent leuiter digerendi, & attrahendi, oleo communi, aut camemellino,
& lana succida. Atque hæc est curatio Anginæ, quæ resolutione ter-
minatur: est enim altera illius, quæ coctione finitur suppurato humore,
de qua lege auctorem.

De coriza, catarrho, raucedine, & tussi.

CAP.

Orizæ, catarrhi, raucedinis, ac tussis eadem propè *Descriptio.*
 est natura: omnes enim hæ affectiones fiunt ab hu-
 more excrementoso a capite in subiectas partes de-
 scendente: quiquidem humor, si in nares fuerit destillatus,
 que eas aggrauet, coriza Græcis malum dicitur, Latinis
 raucedo. Si vero humor fluat in os, palatum, & fauces catar- *Diuisio.*
 rhus simpliciter appellatur: quæ sanè vox Latinis distillatio- *Grædo*
 in sonat. Si verò idem humor descendens, in fauces, & gut *ad nares.*
 & asperam arteriam cadat, & interiorum eius membra- *Catarrhus*
 in asperiore, atque inæqualem reddat, raucam tunc vo- *ad fauces.*
 ca fieri necesse est, & morbus nascitur branchus Græcorum *Raucedo*
 comate dictus, raucedo verò Latine. Ex his etiam collige- *ad asperam*
 possumus, raucedinem esse catarrhum, non tamen graue- *arteriam.*
 nem, quod Galenus 3. de symptomatum causis cap. 11. & 2.
 agnoscitur commentario 49. docet. Idem Paulus con-
 firmat 3. lib. cap. 28. & Aetius serm. 8. cap. 53. Quare decipi-
 tur doctissimus Brassauolus, credens catarrhum esse vocabu- *Brassauo-*
 lum commune ad omnes defluxus humorum, quod barbari *lus.*
 medici rheumati tribuunt, iuxta illud,

Si fluit ad pectus, dicitur rheuma catarrhus.

Ad fauces branchus, ad nares dico corizam.

Porro eius humoris, qui sic a capite descendit, causa est
 rebrum, seu quod a frigore in frigidam intemperiem de-
 ductum sit, seu quod ab æstu calefiat, atq; repleatur. Vinum *Causæ.*
 quoque, si ultra modum haustum sit, caput replet, & balnea
 calidiora, & largior perfusio capitis ex aqua calida, maximè
 si alia calidius caput existat, & cibus sane, qui in ventre in-
 ductus per inferiorem partem non excernitur in caput im-
 petum facit: quod sic repletum in partes se inferiores eo mo-
 do, quo dictum est, demittit excrementa. Atque hæ sunt ge-
 nerales harum affectionum causæ, particulares verò multæ
 sunt. Et coriza sane non ob aliam causam videtur fieri, quàm
 humoris descensum: Raucedo verò non ob hanc solam
 causam, sed à vehementioris quâdoque atque altioris vociferationis
 conatu, & egelidi aeris, spiritusve ingressu. Tussis
 autem multæ sunt causæ, quas Paulus Aegineta lib. 3. sic col-
 ligit. Cæterum ex aliis quoque occasionibus tussis fit, sæpius
 videm ex distemperantia, quandoque calidiori, ceu in fe-
 brilibus, nonnunquam frigidiori, quemadmodum in tempe-
 ratibus Aquilonis, quæ aridior est plerunque. Quin & tuf-
 ses aliorum sæpenumero morborum symptoma est, morbi

f. d

D E C V R A N D. M O R B.

scilicet lateralis, peripneumonix, inflammationis iocinoris
phtisis, & aliorum similium.

Notæ.

Notæ hæ sunt, quicunque aliqua ex dictis affectionibus
laborant, si à calore ea nascatur, hi circum partes affectas
loris nonnihil sentiunt, fluxio quædam acrium humorum
ac tenuium cum per nares, tum maxime per os defluit. Ru-
bor partes faciei nariumque inficit. Quibus contra ex frigi-
re, partium circa caput, & frontem fit distentio, meatuum
que, qui a percolandi adminiculo isthmoides vocantur, ob-
turatio, ita, ut resonare vox deorsum per nares nequeat.

Longiore illis tempore permanent, & accidunt tusses, pi-
tuitæque excretiones, nunc quidem crudæ, nunc vero liqui-
dæ, interdum virides. Nonnullis febris oboritur nihil eos in-
uans, qui ab æstu inuaduntur: eos autem, qui ab algore, plu-
rimum, cum ad concoctionem promoueat.

Quando tussis aliorum morborum symptoma est, ex aliis
capitibus notæ sunt petendæ: omnis tamen distillatio siue ad
nares, siue ad os & eius partes, est à materia calida, aut frigi-
da, aut mixta ex iis, & vtræque cū causa effectrice simili, aut
dissimili, ut cum materia est calida, a frigore comprimente
distillans, aut frigida materia à calore liquante. Cum ambæ
causæ sunt similes, eadem remedia requirunt, si vero causæ
sint contrariæ, remedia postulant contraria, sed maior habenda
est ratio vrgentioris causæ, altera tamen non neglecta.

*Curatio
distillatio-
nis à causa
frigida.*

Distillatio à capite ad nares, aut os a materia frigida, à
qua sæpius fit, & aere frigido facta sex remediorum generi-
bus curatur: primo victu calfaciente moderate, ea tamē, quæ
caput offendunt, nocēt, ut vinum, sinapis, allia, cæpe, coitus,
& somnus diurnus, præsertim a cibo, & similia.

*Præpara-
tio.*

Secundo, materiam frigidam apparantibus, ut rhodomel-
le, syr. de liquiritia, syr. capillorum veneris, de hyssopo, & o-
xymelle. S. cum aquis, aut decocto liquiritiæ, hyssopi, passu-
larum, fœniculi, & similium: oportet tamen miscere quæ mo-

Consilium.

tum, & fluxum humoris impediunt, ut est syrupus rosarum,
& decoctum coriandri: quamuis in materia calida frigidio-
ribus uti oportet, ut est syrupus de papauere.

Purgatio.

Tertio, purgātibus materiam pituitosam, ut agarico, tur-
bit, pilulis de agarico, diaphænicon, electuario indo mai. pi-
lulis cochiis, & similibus. Sed quia morbus hic aliquādo est
diuturnus, multis egens vacuationibus, post primam his pi-
lulis uti poterit: ℞. Agarici trochiscati ʒ. j. pilularum assaia-
ret & cochiarum an. ʒ. ss. optimi diagridij ḡ. xij. cum aqua
itachados, fiant pilulæ quindecim. Utatur his. Dosis erunt

tres

es quaque hebdomada.

Quartò, auertentibus, vt ligaturis, frictionibus extremo- *Auerti-*
um, & fotibus, cucurbitulis in naribus, & scapulis, & clyste-
bus acribus, vacuatione per loca propinqua, videlicet per
nares, si humor ad partes oris fluat, errhinis & sternutamē-
tis clementioribus: de quibus capite de apoplexia. Si verò ad
nares distillat humor per palatum, & os, facienda est vacua-
tio reuulsoria, vt mastiche, aqua mellis cum puluere hyssopi,
& aliis clementioribus apophlegmatismis. In diuturna & *Deriuatio*
flueta distillatione, præcipue à materia calida, filum cerui-
ci traiectum est optimum remedium ad auertendū: de quo au-
gustinus cap. 16. & 17. dictum est. Multi vtuntur, & bene ad reuel-
lendum, cauterio in sutura coronali, aut post aures: per vlcus
nim a cauterio factum materia diu, & salubriter euacuatur.

Quintò, sistentibus fluxum, vt mastiche deglutita, & thu- *Sistentia*
re, spica, gummi iuniperi, succo liquiritiæ, & similibus: hoc fluxum.
tamen genus auxiliorum magis confert distillationi, quæ fit
à materia calida mobili: hæc enim indiget incrassatione, vt *Admoni-*
sacculo armeno, saccharo rosato, syrupo rosarum, syr. de papa-
tione, & aliis etiam narcoticis, vt trochiscis de spodido, de ca-
stabe, & de terra sigillata, ne fiat vlcus in naribus, aut in par-
tibus oris, & aspera arteria, & tandem in thorace. Vltimò v-
tendum est pilulis de cynoglossa Mes. cum alia non sufficiunt,
& distillatio est maxima.

Sextò, corroborantibus caput, quæ est pars primò affecta, *Corroborat*
& à qua materia descendit, vt puluere ex coriandro, gario-
phyllis, mastiche, & similibus, aut hoc sacculo: ℞. coriandri *soluentia.*
præparati 3. iij. rosarum, mastichis, thuris, gariophyllorum *Externa,*
anthos, stachados & macis, an. 3. j. fiat ex his sacculus ad ma-
gnitudinē manus, qui capite rasō coronali commissuræ ad-
moueatur. Capitis lotio ex decocto rerum capitalium lau- *Interna.*
datur in hoc genere. Diamusculus dulcis, theriaca magna, mi-
thridatum, electuarium aromaticum rosatum, & similia cum
aqua, decocto, aut syrupo capitali valenter corroborant ca-
put, & dissipant materiam eius.

Distillatio, quæ fit à materia, & causa omni calida, sex e- *A causa*
tiam remediorum generibus curatur contrariis, vltimo ta- *calida.*
men genere oportet aliquādo curare vlcera narium, & oris,
quæ solent succedere: in his tamen curandis consule doctum
chirurgum.

Tussis, multas habet causas, vt diximus, aut fit à sola in- *Tussis*
temperie, aut ab vlcere, vt in tabe: aut à tumore ventris, vt in *causis.*
hydropē, aut à morbo laterali, aut inflammatione iecoris, aut
a mat

DE C V R A N D. M O R B.

- Curatio* à materia frigida, quæ à capite distillat, à qua sæpe fieri so-
rhysis à let. Quare de curatione huius in præsentia agam. Huic sex
causa frigi remediorum generibus mederi possumus: primo, victu cal-
da. faciente, & exsiccante, de quo dictum initio huius capituli: sal,
Victus. & acetum maximè nocent huic, quia mouent tussim, quam-
 uis cum melle, aut saccharo sit vtile, & necessarium ad pur-
 gandum pectus, & attenuandam materiam crassam.
- Prepara-* Secundo, apparantibus materiam ad fluendum paratam,
tio. crassam attenuantibus, & lentam incidentibus & tergenti-
 bus, vt rhodomelle, oxymelite. S. syr. capillorū veneris, de li-
 quiritia, de hyssopo, de prassio, & oxymelite cōpos. cum de-
 cocto pectorali, simul & capitali.
- Purgatio.* Tertio, vacuantibus materiam hanc frigidam, pilulis de
 agarico, cochiis, de benedicta, hiera cōposita, electuario in-
 do maiori: sed quia hic affectus diuturnus aliquando est, &
 eget post primam euacuationem aliis, vsus harū pilularum
Pilulæ. est vtilis & necessarius: ℞. pilularum de hiera simplici, & co-
 chiarum an. ʒ. ʒ. pilularum de Agarico ʒ. j. cum aqua hyssopi
Confectio. fiāt pilulæ duodecim. Tres pro dosi qualibet hebdomada.
 Si a pilulis alienus est, hoc medicamento vacuatio facienda
 est: ℞. diacatholicon. ʒ. j. ʒ. diaphanicon, & electuarij indi-
 maioris an. ʒ. ʒ. agarici trochiscati ʒ. ij. rhodomellis, quod sa-
 tis est, misce, & fiat cōfectio. Dosis singulis hebdomadis a co-
 chleario vno vsque ad duo.
- Auersio.* Quarto, auertentibus omnibus dictis superius hoc capi-
 te, vbi de curatione distillationis ad nares, aut os agebamus
 quarto genere remediorum.
- Eductio* Quinto, cōceptam pulmonibus materiam facilem ad ex-
materia. puendum reddentibus, in quo pars præcipua curationis cō-
 sistit, vt eclegmate seu loch sano & experto, aut de pino, aut
 de pulmone vulpis, aut electuario Diairis, surupis pectora-
Loch. libus, aut hoc loch: ℞. loch sani & experti, loch de cauli-
 bus an. ʒ. j. pulueris Diairis ʒ. ʒ. sacchari candi, & penidiarum
 an. ʒ. j. succi liquiritiæ ʒ. ij. syr. de hyssopo quod satis est, mi-
 sce, & fiat loch: adde ad corroborandum, pulmones, pulue-
 ris pulmonis vulpis ʒ. ij. quo & aliis omnibus vtendum est
 sæpe, & omni hora paulatim deglutendo, vt ab vna via in
Topica. aliam medicamentum possit per poros penetrare. In hoc ge-
 nere confert multum foris admouere emplastrū filij Zacha-
 riæ, & de meliloto an. æquales partes super alutā ad formam
 & magnitudinem thoracis, vel bis in die hoc vnguento, il-
 linere: ℞. olei sesamini, & amygdalarum dulcium, & de lilio
 an. ʒ. j. mucilaginis scœnugræci ʒ. ʒ. croci puluerizati ʒ. j. cere,
 q. s.

Amisce, & fiat vnguentum.

Sexto, materiam reliquam resoluentibus, & digerentibus, *Resolutio.*
 suffitu sulphuris, & trochiscorum & aliorum, de quibus
 p. sequenti de asthma, & etiam omnibus auxiliis dictis
 to genere remediorum distillationis, de quo superius.

De coriza, catarrho, raucedine, & tussi.

CAPVT XXIIII.

Scholium.

Corizæ catarrhi.) Catarrhos Græcis fluxio est Latinis, cum Catarrhos.
 a capite, ad subiecta membra excrementum descendit. Hæc flu-
 xio, ut auctor est Galen. 3. de caus. symp. cap. 4. aliquando habet
 proprium nomen, aliquando et caret. Proprium habet nomen ea, quæ ad Nomina
 res, os (quæ nomen generis seruat) fauces, gurgulionem, & ad oris eius.
 indulas ferunt. Proprio caret nomine ea quæ sit ad ventriculum, &
 peram ar. etiam, quæ multorum malorum causa est: quia ex ventriculi
 actione, vitata eius concoctione, crudi humores generantur, ex quibus
 structiones sine febre, & aliquando cum febre, apoplexie, & alia ce-
 bri frigidi morbi oriri solent. Sicut ex ea distillatione, quæ asperam oc- Noxæ ex
 pat arteriam, aliquando asthma, cum excrementum crassum est, & distillatio-
 quando phthisis, si tenue & calidum sit. Distillatio symptomæ est in ex- ne ad ven-
 eius: Morbus, ad quem sequitur, aut est similis aut instrumentarius triculii, et
 us. Similis intemperies calida, aut frigida cerebri, diuerso tamen asperam
 odo hæ distillationem generant: nam calida intemperies attrahendo, arteriam.
 ut fundendo humorem eam efficit. Frigida verò refrigerando cerebrum, Distillatio
 hac ratione multa coaceruando excrementa, aut ipsum comprimendo, quis affe-
 modo, quo nos manibus spongiæ. Morbus instrumentarius est reple- tus sit.
 venarum, & ventriculorum cerebri, quæ solet etiam fieri à toto cor-
 ore: hæc tamen repletio, exigua cum sit, neque carum, neque apople-
 am, neque epilepsiam efficere potest. Signa pete ex auctore.
 Tussis etiam si in vniuersum fiat ab his, quæ interceptunt respiratio-
 em, hæc tamen omnia ad quinque causas reducere possumus cum Ga-
 no: Prima est humor distillans à capite. Secunda humor collectus in
 spera arteria, in pleuritide, & peripneumonia: Tertia compressio septi
 transuersi: Quarta magna asperitas faucium: Quinta intemperies fri-
 da inæqualis partium respiratori seruientium.
 Secundo, materiam frigidam apparantibus.) Hinc discas quæ Tussis
 alè curant hi, qui tempora, hoc est doctrinam Auicennæ consequuti causa.
 iant: auctor enim iam secundo præparat humorem ad purgandum, non
 illicius de symptomate. Proinde eius curatione omissa, hac ratione cu- Curatio di-
 abis. Si distillatio, hoc est fluxio excrementi urgeat (quod continget, si stillationis
 ad ventriculum, asperam arteriam, aut partem principem firmentur)

h

tunc

DE CVRAND. MORB.

tunc relicto morbo, ei prospiciendum est: primo sanguinem mittentes, cundo medicamentis per os assumptis, & capiti applicatis, fluxionem dantes, & ea sedata morbo prospicientes quæ omnia ea ratione, quæ cemus, præstabis.

**Sanguinis
missio.**

Quarto, auertentibus) In distillatione facta ab intemperie frigida cerebri non audent prælici venam secare, opus autem est, ut aunda fiant, potissimum in remedio adeo vili. Mittendus ergo sanguis est, reuellamus huiusmodi ad partem fluentem, & simul ex cerebro aliqui excrementi euacuentur: quod commodè præstabis secta communia in brachio, quæ caput, & partes inferiores respicit. Auertes etiam modis ab auctore propositis: quod si diuturna sit distillatio, duo cauteria in singulo brachio valiter experieris.

**Sistentia
fluxum.**

Quinto, sistentibus fluxum.) Sive humor à cerebro distillans causa calida proveniat, sive frigida, sistendus est statim, si urgeat. Quæ præstabis ore tenentes medicamentum, quod incrasset humorem, eum ineptum ad fluxionem reddat, quale est hoc: ℞. mastichis ʒ. ii. pithri ʒ. i. cum mucilagine dragagani, fiant trochisci ad magnitudinem lupini, quorum unum teneat in ore. Eo etiam tempore, quo æger dorm

**Cerati ex
thapsia
duæ forme**

voluerit, assumat ʒ. iii. electuarii de papauere cum paucis syrupo papueris. Capiti etiam, ut dolore attrahatur humor ad cuius, ceratum thapsie valissimè apponetur, siue fiat in forma solida, siue in liquida. solida forma paratur hoc modo: ℞. ceræ ʒ. viii. cerebentina q. s. misce ad ignem, donec ad emplastrum substantiam perveniant, in sine misce pulveris radicis thapsie, si recens sit. ʒ. iii. si inueterata ʒ. iiii. cuius sufficiens accipe quantitatem, & super alutam extende ad formam mediæ cuculæ, quam bregmati rasò appone. Liquidum fiet ceratum forma unguenti, liquantes ʒ. v. ceræ cum oleo, quoad formam unguenti accipiant, & deinde miscentes ʒ. ii. pulveris ex thapsia. Quo unguenti unges bregma, quo utendum est, quia melius, & cuius vesiculas in cute excitat, quam ceratum solidum, quo multoties usus sum sine usu aliquo. Adverte tamen, apparentibus vesiculis in cute, cessandum esse ab operatione, ne ob dolorem fiat, attractio sanguinis, phlogiston. Quod si ceratum non potes efficere, sinapismum construes ea ratione, quæ docent Pauli & Aetii.

**Sacculus
bregmati
applican-
dus.**

Sexto, corroborantibus caput.) In hac distillatione sedato symptomate, ad morbum deveniendum est, nempe ad intemperiem frigidam cerebri, quam auferre debemus, & simul excrementa cerebri frigida auertere, bregmati, ubi multæ sunt sucursæ, hoc medicamentum applicantes: ℞. pul. rosarum & coriandri præparati ana. ʒ. i. gummi juniperi ʒ. iii. salis tostii ʒ. ii. gariophyllorum ʒ. i. fiat omnium pulvis, ex quo fiat sacculus, ad trianguli figuram. Et si in corpore sit pituitosa cacochymia ea præparata purganda erit.


Distillatio, quæ fit à materia.) Si à causa calida distillatio provenia

ueniat, sanguinem mittes, fluxionem inhibebis, assumptis per os: nō enim applicare oportet ceratum ex thapsia, ne augeamus intemperiem. Deinde curabis morbum, nempe intemperiem calidam, lauans caput aqua tepida, permiscens cum ea parum aceti, vt penetret: & postea unge bregma oleo omphacino, rosaceo, aut alio quod frigidum sit.

Tussis multas habet causas.) Tussis symptoma est in motu de- Curatio
pranato facultatis expultricis: hæc à diuersis morbis ortum habet, ac tussis,
proinde non vno modo, sed variis curanda erit. Si à distillatione oriatur,
curabitur ea ratione, quæ docuimus. Si à secunda causa eueniat, medica-
menti attenuantibus, et incidentibus. Si à tertia, curare oportebit schir-
rum, aut iecoris inflammationem, aut hydropem, si ex ea pendeat. Si tan-
dem à quinta procedat causa, cohibita respiratione sedabitur.

De Orthopnæa, Asthmate, Dyspnæa.

CAPVT XXVI.



Ria sunt nomina apud Græcos, quæ eandem rem
ferme significare videntur, videlicet dyspnæa,
asthma, & orthopnæa, quæ omnia suspiriosos, &
anhelosos significant, de quibus Celsus lib. 4. cap.
4. abunde egit. Proprie a Græcis dicitur dyspnæa difficultas
anhelitus modica, quamuis Paulus 3. lib. cap. 26. velit esse dif-
ficultatem spiritus & animæ, & commune accidens alia plu-
rima præter hæc comitās. Asthma Græcis est difficultas an-
helitus vehementior, & cum eger non potest spirare sine an-
helatione. Orthopnæa verò est, cum respirare non potest, nisi
recta ceruice spiritus trahatur: sūt hæc affectiones (vt inquit
Acrius) cum aut crassiorum & tenuium humorū multitudo
pulmonis bronchia obstruxit, aut tumor quispiam abscessui
similis in ipso consistit. Similiter autem difficiliter spirant,
quibus aspera arteria multa distillatione madet, repletaque
est. Ab aliis quoque fit causis, vt ab vlcere pulmonum: que om-
nia sic docet distinguere Aet. Distillatio etiam sanis ex ma-
nifesta causa repente accidit, in totum verò citra febrem co-
mitantibus etiam propriis distillationis signis. Si verò tu-
mor abscessui similis in pulmone fiat, necessariò febris sequi-
tur, neque ita post inflammationem in pus conuersa, pus rei-
citur cum tussi. Qui autem proprie orthopnoici, & difficul-
ter spirantes appellantur, in totum febrem non ferunt, gra-
uitatis autem sensus eis contingit, neque quippiam purulen-
tum per sputum reieciunt. Cum igitur asthma fieri possit à
sanguine extra venas, eius curatio cap. 28. de sanguinis puto
describetur, aut ab inflammatione pulmonum, de qua cap.
27. de peripneumonia: aut ab vlcere pulmonū, de qua ca. 29.

Causæ.

Notæ.

Curatio.

DE CVRAND. MORB.

de phitisi, aut à luxatis vertebrais spinæ, cuius curatio in reductione eius in proprium sitū consistit: aut fit à materia crassa pituitosa pulmones obstruente, & ab hac vltima causa fere semper pendet. Quare in præsentia de curatione eius agen-

Curatio à dum est: prius tamen oportet scire, an æger sit in ipsa accessione, an in quiete. Quia morbus hic, quemadmodum comitialis, & articularis, habet accessiones aliquando ordinatas, aliquando inordinatas. In ipsa accessione curatio fit per solas frictions, ligaturas & cucurbitulas extremorum ad reu-

Sectione uel, & dormiat parum, & non in die, quies summe necessaria est. Quare tunc vacuatio per medicamenta purgantia, &

Curatio per sanguinis missionem maxime nocet, mouens humores, cent, nisi & augēs fluxum ad pulmones & tracheas arterias. Si tamen longa sit ipsa accessio fuerit magna, & longa, subitam suffocationem accersio. indicans, indiget vacuatione per clysteres acres, & per sanguinis missionem secta vena, aut per cucurbitulas inter scapulas. In tempore quietis curatur asthma pituitosum sex

Curatio remediorum generibus: primo victu calido & sicco vt aere extra accessione. estatis, aut arte parato, rore marino, saluia, stachade, & aliis calidis medicamentis, vt cibo, pane scilicet furfuraceo, & sal-

Victus. lito, & bene fermentato: carnibus auium montanarum, & animalium concoctu faciliū, & non humidorum, assis, aut tostis, non neruosis, nec pinguibus: vt potu parco in pastu, & post pastum nullo, qui sit aqua cinnamomi, vel decoctionis anisi, vel seminis fœniculi: eorum tamen fitis vehemens est ob calorem cordis refrigeratum minus quam res exigit. Tunc enim laua os ægri lacte caprino, vel ex amygdalis dulcibus expresso sine saccharo, aut aqua frigida, aut mucagine seminis psyllij, vel cydoniorum. Sed quia potus comprimit septam transversum ventriculo distento & difficultatem respirandi auget, quoniam ventriculus concoquit cibum, donec ab eo egressus sit potus, maxime nocet.

Preparatio. Secundo apparantibus materiam collectā in cerebro pulmone, vel aliis partibus, transmittentibus, qualia sunt calfacientia, incidentia, tenuantia, & tergentia: initio clementiora, ne resolutio tenui crassum ineptum expuitioni relinquantur.

Syrupi clementes. Cōueniunt primo syrupus de liquiritia, syr. capillorum Vene. oximel. S. cū decocto pectorali, aut aquis capillorum Syrupi re Ve. & liquiritiæ. Secundo post primam vacuationem concedunt syrupus de hyslopo, de prassio, & oxymel compositum res. cum aquis, aut decocto hyslopi, prassij, fœniculi, dactylorū, & vuarum passerarum. Tercio post secundam vacuationē prosunt ad

ad concoquendum syr. de quinque radicibus cum oxymelle *Rehemen-*
 cōpos. & scillitico cum decocto aut aquis prasij, hyssopi, ra- *tissimi syr.*
 dicis lilij sicca: quia succus eius valenter purgat in pama
 quantitate: inter has tamen coctiones & purgationes inter-
 taceant dies aliquot, vt natura quiescat. Et quia hic affectus
 chronicus est, necessaria medicamentorum omnium ferme
 frequens permutatio, ne natura longa consuetudine iis simi-
 lis fiat, ac proinde reluctetur, aut ab eis nihil patiatur. Præ- *Consilium.*
 terea ob occultam quandam proprietatem, seu familiarem
 quasi amicitiam quædam magis amat nostrum corpus, & a-
 lia refugit propter inimicitiam, quod sola experientia de-
 monstrare potest.

Tertiò, purgātibus materiam, si multa est in pulmonibus, *Purgatio.*
 aut etiam non multa in toto. Nam si pauca fuerit in pulmo-
 nibus vt per sputa expelli possit, nō opus est purgatione: pri- *Prima.*
 ma ergo purgatio fiet per 3.j. pilularum de agarico, aut per
 potum 3.j. diacatholiconis, & 3.j. agarici trochiscati cum de-
 cocto pectorali, aut aqua capillorum Veneris. Secunda pur- *Secunda.*
 gatio fiet per has pilulas: ℞. pilularum cochiarum, & de aga-
 rico an. 3. s. diagridij. ʒ. iij. cum aqua hyssopi fiant pilulæ viij.
 & aurentur si opus fuerit: vel fiat per hunc potum. ℞. dia-
 phaniconis 3. iij. electuarij indi maioris 3. ij. agarici trochi-
 scati 3. j. diacatholiconis 3. v. rhodomellis. 3. j. decocti pecto-
 ralis. q. s. misce, & fiat potus. Tertiò, si opus fuerit, fiat purga- *Tertia.*
 tio per 3. j. pilularum cochiarum, aut fœtidarum, aut de far-
 cocolla, vel per hunc potum: ℞. electuarij indi maioris 3. iij.
 agarici trochiscati, & turbit electi an. 3. s. rhodomel. 3. j. a-
 quæ hyssopi. q. s. misce, & fiat potus. Si opus fuerit, quia mor-
 bus est chronicus, vtatur his pilulis semel vel bis in mense:
 ℞. pilularum de hiera compos. & de agarico an. 3. j. s. agari- *Pilula*
 ci optimi, & turbit electi an. 3. j. salis gemmæ ʒ. j. zingib. ʒ. s. *laudantur*
 cum aqua hyssopi fiat massa, cuius dosis quinque pilulæ pon- *in hoc mor-*
 deris ʒ. ij. Si vero non possit pilulas transglutire, quæ magis bo-
 huic morbo conueniunt, quam purgātia liquida, quia prio-
 ra diutius in ventriculo detinentur, ideoque magis & a par-
 tibus longinquiorebus, melius purgant: hac mixtura fiet pur-
 gatio ad vsum: ℞. diacatholiconis 3. ij. electuarij indi maio-
 ris 3. j. agarici trochiscati 3. ij. turbit gummosi 3. j. syrupi ca-
 pillorum Ve. q. s. misce, & fiat confectio. Dos. cochlearium
 vnum.

Quartò auertentibus auxiliis, vt iis quæ per nares & pa- *Derivatio.*
 latum purgant, errhinis scilicet apophlegmatismis, & anis
 multis, de quibus cap. 25. præcedenti, quales sunt clysteres,

DE CVRAND. MORB.

& glandes acres, & cauteria in capite.

*Promouen-
tia sputum
ei roboran-
tia pulmo-
nes.
Syrupi.
Loch.
Electua-
ria.* Quinto, promouentibus sputa, hoc est, incindentibus, di-
latantibus asperam arteriam, & roborantibus pulmones: ho-
rum quædam sunt simplicia, vt capillus Ve. liquiritia, vuz
pallæ, crocus, ficus, iuiubæ, hyssopus, scabiosa, aristolochia,
folia & semen vrticæ, enula campana, pulmo omnis, præci-
pue tamen vulpis, dulcia omnia, falsa, amara, & acria simul,
Ex his sunt decocta, syrapi, loch, & electuarium, vt syrapi
capillorum Ve. de liquiritia, oximel. S. syrupus de hyssopo,
de prasio, oximel compos. oximel scilliticum, loch sanum &
expertum, loch caulium, loch de pulmone vulpis, loch de pi-
no, electuarium Diaridis, hæc & similia detineantur in ore, &
sensum transglutiantur, vt à gula in asperam arteriam per po-
ros penetrare possint, aut saltem eorum vis. Hæc mixtura,
seu confectio est optima in hoc genere quinto: ℞. succi li-
quiritiæ, hyssopi, cillæ, radicis lilij an. 3. viij. capillorum Ve.
siccorum 3. viij. seminis vrticæ, cordumeti, piperis, aristolo-
chiæ retundæ, nasturtij, baurac, carui, amygdalarum amara-
rum an. 3. v. fiat ex his cum melle sufficienti confectio, cuius
Confectio. cochlearium vnum dosis sit mane & vespere, cum vnciis, tri-
bus sequentis liquoris: ℞. caricarum, dactylorum an. num. x.
Liquor. radicis liquiritiæ, hyssopi, calamenti, prasilij, capillorum Ve.
an. 3. j. radicis apij, feniculi, & seminis eorum, seminis vrti-
cæ, & fenugræci an. 3. ss. fiat decoctum in ℥. xij. aquæ, donec
tertia pars consumatur, percoletur, & cum ℥. duabus mel-
lis fiat instar mulsæ. Hæc aqua in hoc genere remediorum
est utilissima: ℞. pulmonum hirci, castrati in paruas partes
diuisi num. iij. pulmonem vnum vulpis, si nancisci possumus,
capilli Ve. m. vj. hyssopi, m. ij. radicis iari, seu serpentariæ
contuse 3. ij. liquiritiæ recentis, si licet aliunde parare 3. ij.
fiat ex his aqua instrumento vitreo, & igne pauciori: eius dosis
3. iij. cum paucio saccharo cando, aut saccharo communi.
*Aqua stil-
lantiæ.* Aqua ligni guaiaci, seu indi cum medicamentis pectorali-
bus facta, est etiam optima, & experta a me in hoc genere
remediorum. Ius galli gallinacei veteris medicamenti pec-
*Ius galli
veteris.* toralibus factum est ab omnibus laudatum, & expertum.
Thoraci sunt admouenda medicamenta, quæ in hoc genere
conferunt, vt facilius & citius medicamenta pectoralia spu-
tum promoueant, vt ℞. olei amygdalarum dulcium, & sesa-
mini an. 3. j. olei de lilio 3. ss. croci puluerizati 3. j. azungie gal-
linæ 3. ij. ceræ, quod satis est, misce, & fiat vnguentum, vel: ℞.
Topica. emplastri siliij Zachariæ, & de meliloto an. æquas partes, ex-
tendantur super alutam ad formam & magnitudinem pectoris.


Sexto

Sextò, reliquias materiæ siccantibus, & dissipantibus, vt *Resolutio.*
 ithridato, theriaca magna, diamusco dulci, & amaro, pli-
 s arcoticon, & suffitu cum thure, & sulphure: quamuis sul-
 hur interiùs cum melle, aut ouo, aut syrupo pectorali con-
 rat huic morbo. Ab aliquibus laudatur suffitus ex Arseni- *Aduerte.*
 o, ego tamen non laudo, etsi sit aquis cardiacis castigatum.
 Ionnulli in vltimo genere præbent pilulas ex myrrha, co-
 o, aristolochia, casia lignea, croco & arsenico: ego semper
 amno hæc medicamēta, & his similia, quanquā arsenici sit
 arū. Cauteriū in furcula superiori thoracis in hoc genere *Cauteriū*
 emediorum à multis doctissimis medicis maximè laudatur. *laus.*

De Orthopnæa, Asthmate, Dispnoæa.

CAPVT XXVI.

Scholium.




Ria sunt nomina apud Græcos.) Dispnoæa nomen *Dispnoæa*
 Græcum Latine sonat vitium in respiratione, aut læsio re- *nomen com-*
 spirationis: qua ratione sub se cōprehendit respirationē fre- *mune.*
 quentē, celerē, interceptā, anhelosā, & rectā. In hac com-
 muni significatione loquitur Gal. 1. de diffi. respi. c. 2. Et cum variæ sint
 læsiones respirationis illæ, quæ exiguæ sunt, appellantur aliquando à
 Galen. nomine generis, difficiles respirationes: & cum exigua læsio variè
 possit comparari, varia etiam habebit nomina. Si enim cōparemus quā-
 libet noxam respirationis cum abolita respiratione, omnes læsiones respi-
 rationis erunt exiguæ, & ideo seruabunt nomē generis, qua ratione Gal.
 4. de loc. affec. cap. 7. aphnæam, hoc est abolitā respirationem separauit
 à dispnoæa: omnes alias respirationū læsiones illi, quæ maxima est, oppo-
 nens. Si verò omittentes ablatam respirationē, vnā læsam, respirationis
 læsionem cum alia cōparemus: illa, quæ exigua est, hoc est densa, di-
 cetur difficilis respiratio, nomen generis huic tantum differentiæ accom-
 modantes, & hac ratione loquitur Gal. 3. de diffi. resp. c. ult. & 6. epyd. Tres diffe-
 par. 3. comm. 9. Ex quibus omnibus hanc vltimam respirationis læsionem rentiē dif-
 fassumentes, tanquam vnā differentiam, tres statuemus in vniuer- *ficilis respi-*
 sum difficilis respirationis differentias. Prima erit illa paulò ante di- *rationis.*
 cta, quæ seruat nomen generis, & nil aliud est, quàm densa respiratio. *Asthma*
 Secunda dicitur asthma, & tertia orthopnæa. Asthma est densa respira- *Asthma*
 tio sine febre, qualis apparet in his, qui diu accurrerunt: quæ vt colligi- *quid.*
 tur ex septimo de compos. secundum locos capite sexto. duo habet sym-
 ptomata coniuncta, vnum est arcuatio thoracis sensibilis, secundum est
 orthopnæa, id est recta spiratio. Vnde apparet error practico- *Practico-*
 rantium ab asthma orthopnæam. Dices, nonne tu hanc tertiam dif- *Practico-*
 ficilis respirationis, differentiam ab aliis distinctam statuisti? Responde cum error.

DE CVRAND. MORB.

verum hoc esse, quia aliquando orthopnœa reperitur sine asthmate i
suppuratis, peripneumonitis, et aliis, in quibus recta spiratio, cum non si
sine febre, neque fiat ab obstructione, sed compressione, non dicitur asth
Causæ dif- ma. Difficilis respiratio causam habet humore frigidu, parum obstruen
ficilis respi- tem: asthma tuberculum, & eundem humorem, sed obstruentem magis
rationis, arterias asperas, quæ in pulmone habentur. Inde intelliges, deceptum
fuisse Iacotum existimantem Monachum collegii de Arras, asthma
mortuum integris pulmonibus, solum abscissu in vena arteriali existen
te. Quæ enim ratione ex illo abscissu posset ladi respiratio, non video. De
cipi. ut etiam idem sentiens ex resecatione, et in chymistis, aurificibus,
fabris ferrariis, & aliis fieri asthma: nam cum asperæ arteriæ magnæ
habeant meatum, nunquam in his siccitas poterit asthmatis esse causa.
Verum est hos aliquanulum asthmaticos apparere ob vaporem cras
sum obstruentem prædictas arterias. Ex runctione autem morbi galli,
si asthma contingat, proveniet à crasso humore, ab argenteo vero ad aspe
ras arterias expulso. Orthopnœa fit ab obstructione in asthmate, aut à
compressione asperarum arteriarum pulmonis in suppuratis, peripneu
Animad- monicis, & his, qui multo humore corpus pulmonis habent imbutum. In
versio, hoc capite adverte auctorem solum tradere curam nem prædictorum af
fectuum, qui sine febre sunt, & sequuntur morbum in via, nempe obstru
ctionem asperarum arteriarum ab humore crasso factam. In curatione
asthmatis adverte medicamenta insciantia, quæ vtilia sunt, & sumen
da esse nō simplicia, sed cum medicamento aliquo humido permixta, quod
est Gal. præceptum 5. simpl. cap. 12. in affectibus thoracis, & pulmonis,
ratio est, quia humor in pectore non debet sicari, at cum amara sicca
sint, ideo cum re liquida & humida permiscenda sunt, ut penetrando in
sciant humorem, & siccitate non lætant.

De peripneumonia, & pleuritide.

CAPVT XXV.

Definitio.  Via Peripneumonia, quæ est pulmonum inflamma
tio: & pleuritis, seu lateralis morbus, quæ est infla
matio membranæ costas succingentis, vel musculo
rum ei propinquorum, (auctore Gal 3. de loc. affect.) hisdem
fermè remediis curantur: hoc capite de his duobus affecti
Causa. bus non immerito agere statuimus. Fiunt ab hisdem prope
causis, quamvis peripneumonia a sanguine magis pituitoso,
& pleuritis a bilioso, ut docet Galenus commentario 33. lib.
6. Aphor. utriusque tamen affectus causa externa calida per
se, & frigida per accidens cōprimendo esse potest. Peripneu
monia quoque fit ab angina, à pleuritide & capitis distilla
Pleuritis tione: nonnunquam vero (ut ait Paulus) eius origo est sola
cōt. g. 1. 1. 1. inflammatio. Lateralis morbus aliquando est epiecialis,
fit

fitque per contagionem, quemadmodum pestis. Peripneumonia (vt vult Gal. 2. de locis affect. cap. 3.) deprehenditur ex tanta respirandi difficultate, & angustia, vt suffocari laborantes videantur, ac recti sedere cogantur, quem affectum orthopnæam nominant: Aetius tamen sexto ferm. cap. 66. omnes peripneumonię notas depingit longo satis sermo. nimirum febrem acutam, grauitatem thoracis absque dolore, inflammatis tamē pelliculis thoracis sentitur dolor, faciem rubicundam, præcipue malas, nasum in summo sinum, appetentiam læsam, linguæ siccitatem, aquæ frigidæ maiusque etiam aeris desiderium, tussim siccam, vel, si expuant, spumum id est.

Accidentia inseparabilia pleuritidis (si Galeno & veritati credimus) sunt febris acuta, dolor perinde ac si locus vel intendatur, vel pungatur, respiratio frequens & exigua, pulsus paruus arteriam duram, & quodammodo tensam indicans, tussis magna ex parte cum sputis coloratis, nonnunquam verò sine his, has incoctas pleuritides appellat Galenus loco superius citato. 5. scilicet de locis affect. cap. 1. quæ vel celeriter hominem rapiunt: vel longo temporis spatio finiuntur, quo in loco multas doloris lateris species proponit.

Curatur vera pleuritis sex generibus remediorum: primo, ratione victus tenui vsque ad quartum diem, cum vires ferre possunt, vt lacte amygdalarum dulcium sine pane, ptisana hordei colata, vel non colata: a quarto vsq; ad septimum pane loto & lacte amygdalarum cum saccharo, & radice buglossæ condita saccharo: post septimum iure pulli refrigerato, cremore hordei, semper tamen ægri natura & consuetudo est consideranda. Bibat aquam hordei, aut saccharatam, aut ex decocto liquiritiæ remisse calidam, vinum nullo modo bibendum est, nisi vires sint admodum imbecillæ: tunc enim vinum dilutum, & ius gallinæ, aut aqua eiusdem per distillationem conuenirent, aut in declinatione. Dormiat supra affectam partem, talis enim incubatio minorem dolorem infert, augeturque calor partis affectæ, & magis resoluit materiam phlegmones.

Alius sit facilis, vt nimium semel in die. Animi perturbationes, quæ augere possunt inflammationem, tollantur, vt ira, timor, & similes.

Secundo, auertentibus materiam, quæ augere possit inflammationem, vt sectione venæ internæ cubiti, quam vocat hepaticam, eius est partis, seruata semper rectitudine, vt duplex scopus propositus sit, alter ad reuellendum, alter ad vacuandum.

cuandum: quod fieri non potest per sectionem venæ partis oppositæ. Si non apparet vena interna cubiti, communis secanda est, aut humeralis, si duæ aliæ non appareant: semper tamen sanguinis copia respondeat morbi magnitudini, naturæ ægri, viribus, regioni & consuetudini. Si morbus semper augeatur post primam sanguinis missionem fiat secunda & tertia, si opus fuerit, & vires patiantur: semper tamen ab eadē vena, postea quam ex diuersis fieri non potest: quemadmodum in inflammationibus & tumoribus aliarum partium, in quibus, cum fluit humor, facienda est sanguinis missio ex parte longinqua per reuulsionem, cum iam fluxit ex parte eadem, aut propinqua, vt in angina diximus. Si vires deficient, & ætas non sit florida, sanguis mittatur per cucurbitulas cum scarificatione inter scapulas, si non sit plenitudo, & in naribus, si fuerit plenitudo. In quacunque parte fuerit dolor, etiam si infestet partes, quæ sunt sub septo transuerso, vt docet Gal. comment. 11. secundi de ratione victus in morbis acutis, quamuis vacuationem per medicamenta purgantia Hippocrates tam eligat, sequens aphorismum 22. primi libri, quæ ducere oportet: sed ego cum Galeno semper ad reuellendum & euacuandum simul magis laudo eius sententiam, quia inflammationibus internis, & febribus ardētibus medicamenta purgantia, præcipue Græcorum sunt satis calida, & valenter mouent, ideoque timenda. Præterea alui profluuium in pleuritide, & peripneumonia, si adueniat malum, vt Hippocrates 6. lib. Aphor. 16. scribit. Quare in his duobus morbis benedictis medicamentis & salubribus purgabis suo tempore, quarto videlicet genere remedium. Auertunt quoque frictiones, ligaturæ partium extremarum, & clysteres.

Auersio.

Preparatio.

Tertio, materiam apparantibus (quæ si fuerit turgida absque coctione vacuanda est) vt syrupo violarum, syr. endiuie. S. cum aquis endiuie, cichoreæ, & borraginis: aut cum decocto hordei sine cortice, violarum, & liquiritiæ: idque cum materia est biliosa, quæ si fuerit admodum tenuis, syrupo, nenupharis, & de papauere est incrassanda: crassa vero aut mixta cum crassa syrupo capillorum Vene. de liquiritia, de hyssopo, cum oxymelle. S. & decocto pectorali, est concoquenda.

Purgatio.

Quarto, purgantibus non valentioribus, qualia sunt Græcorum, sed clementioribus, & salubribus, quæ Arabes & nostra ætas cognouerunt, exceptis stipticis, & astringentē substantiam habentibus, vt est rhabarbarū, & myrobalani, præcipue cum tota substantia: eorum tamen infusio est probata,

&

& laudata, & aliquando scammoniata correctâ, quando salubria non sufficiunt, vt in electuario de succo rosarum, & diaprunis solutiui, & in parua quâtitate, & mixta aliis salubribus: vt ℥. medullæ cassiæ fistularis recens extractæ ʒ.vj. medullæ tamarindorum (quum est ardentissima febris) ʒ.iiij. (nec timeas acetositatem tamarindorum) infusionis rhabarbari per noctem in aqua endiuia factæ ʒ.iiij. syr. violarum ʒ. j. decocti florum cordialium. q. s. misce, & fiat potus. Si copia bilis fuerit magna, adde ʒ.ij. diaprunis solutiui: & si crassa & mixta cum pituita, adde ʒ.ʒ. agarici trochiscati ʒ.ij. aut si amat magis pilulas, quæ minus in hoc morbo conferunt, has accipiat hora idonea: ℥. pilularum de rhabarbaro, & agarici trochiscati an. ʒ.ʒ. fiant pilulæ septem cum aqua endiuia, & aurentur, si non est pauper.

Quintò, sputum materiæ pleuritidis, quæ in pulmonem *Sputum* & thoracem exodat, facile, & fluidum reddentibus in omni *inuasione* tempore phlegmones, & omni hora diei, aliis atque aliis medicamentis, vt syrupo violaceo, de iuiubis, capillorum vene. de liquiritia, syrupo acetoso. S. & oxymelle. S. pilulis bechichis, saccharo cando violato, electuario diadraganto frigido, & similibus, & hoc eclegmate, seu loch: ℥. penidiarû, *Loch.* sacchari candi, violati an. ʒ. j. pulueris diadraganti frigidi ʒ. ʒ. succi liquiritiæ, & pulmonis vulpis an. ʒ.ij. gummi crassi ʒ. j. syrupi violarum ʒ.ij. ʒ. syrupi acetosi. S. ʒ. j. misce, & fiat loch. Hæc omnia quæ sputum promouent, retineantur ore, *Liquor.* & sensim deglutiantur. Hic liquor seu syrupus non perfecte decoctus sputum promouet: ℥. capillorum veneris, violarû an. m. ij. iuiubas num. x. vuarum passerû sine granis p. ij. liquiritiæ ʒ.ij. fiat decoctum, de quo percolato accipe libras duas, post parum serueant. Foris ad sputum excitandum confert *Topica.* hoc vnguentum: ℥. olei sesamini, & amygdalarum dulcium an. ʒ. j. ʒ. emplastri filij Zachariæ loco ceræ. q. s. misce, & fiat *Observatio.* vnguentum: vel ℥. emplastri filij Zachariæ. q. s. extendatur *rio.* super alutam ad formam mediij folij papyri. Quidam in hac inflammatione parti affectæ admovent repellentia medicamenta, & male, quia augent inflammationem.

Sexto, reliquam materiam resoluentibus, & dissipantibus, *Resolutio.* vt vnguentis, emplastris, cataplasmatibus, & fori per spogiam ex decocto camomillæ, meliloti, seminis lini, fœnugræci, furfuris, vel per vesicam plenâ simili decocto. Saccus ex milio, *Vesica.* sale, & fursure bene tostis est optimus in hoc genere reme- *Sacculus.* diorum. Hæc tamen omnia, & similia initio veræ pleuritidis maximè nocēt, & in augmento: valèter enim augent inflam-

mat

D E C V R A N D. M O R B.

Error indo- mationem. Quare errant multi indocti medici, qui inconf-
Etorum. deratè fomentis & calefactoriis vtuntur. Solet enim (Gale-
no autore comment. 31. sexti lib. Aphor.) in his fomentum :
liquantum mollire dolorem, sed alteram fluxionem aduc-
care : experientiæ tamen gratia ad cognoscendum qualis sit

Curatio tē- affectio Hippocrates & Galen. medici sapientissimi, & pri-
ratina vul- dentissimi iis vfi sunt. In non vera pleuritide ad flatum diff-
gò dicta. pandum optima sunt, & iis vbi dubitat medicus an sit vera
an non vti oportet : semper tamen cautè, ne attrahatur hū-
mor ad laborantem locum, & ne ex non vera fiat vera, vel
vera fuerit, ne augeatur. Si autē pleuritis suppuretur, à qu-
pauci liberantur, natura non est impedienda, sed potius ean-
ars imitari ferè semper conatur, vt hoc medicamento inter-

Medica- no : ℥.j. maluæ, bis maluæ an. m. j. ficuum. p. j. seminis lini, &
mentum fœnugræci an. p. s. fiat decoctum, de quo percolato accipe li-
internum bras iij. cui adde butyri recentis ℥. j. olei amygdalarum dul-
pus effi- cium ℥. iij. misce, & sæpe in die transglutiat paulatim parun-
ciens. huius medicamenti. Foris admoueatut hoc cataplasma, ℥.


Cataplas- foliorum maluarum. m. ij. radice altheæ. m. j. caricarum, se-
ma ad idē. minis lini an. p. j. omnia decoquantur, & postea cum vnciis
duabus farinæ fœnugræci, & cum ℥. ij. & s. olei sisamini, & ℥.
j. butyri, addendo ℥. s. axungie gallinæ ℥. s. croci, & duos vi-
tellos ouorum, misce, & fiat cataplasma : quod parti affectæ
admoueatut.

Quæ abf- Confecto pure rumpatur abscessus frequenti tussi, & vo-
cessum rii- ciferatione, vomitu, & sternutamētis, & corporis vehemēti
punt. cōcussione. Deinde abstergatur vlcus aqua hordei cum cor-
Absterfio. tice saccharata, & si non suffecerit ipsa, cum hydromelle ex
Glutinan- decocto furfuris, & cicerum, præsertim si non sit febris. Vlti-
ua. mō verò vlcus glutinabūt terra sigillata, bolus Armenus, &
alia quæ dicentur capite de Phtisi, sed in hoc, similibusque
vcleribus consule doctum chirurgum.

De Peripneumonia, & Pleuritide.

C A P V T X X V I I.

Scholium.

Peripneu-  **monia** Via peripneumonia.) Peripneumonia est inflammatio
quid. pulmonis, vbi inflammatio tumorem præter naturam signifi-
Causa. cat, potest enim fieri peripneumonia à quocunque humore, &
Signa. plurimum tamen contingit ab humore pituitoso, & crasso, quia in sub-
stantia laxa (qualem habet pulmo) melius moram facit. Signa eius sunt
febris acuta, dolor gravis, difficilis respiratio, rubedo malarum, & pul-
sus

sus mollis. Febris acuta (quæ acutior est, quàm in pleuritide, etsi fiat à
 causa calida, & peripneumonia à frigida) coingit à duabus causis, pri-
 ma à vicinia cordis, secunda à vasorum cum corde communicatione. Do-
 lor grauis fit, quia pulmo paucos & exiguos habet nervos, & ideo in eo
 dolor ratione membranæ vsus ambientis sentiri debet. Difficilis respi-
 ratio cum orthopnea contingit, quia pulmo est instrumentum respira-
 tionis, ac proinde peripneumonia est affectus acutissimus, à quocunque hu-
 more fiat, perniciosissimus tamen, si fiat à sanguine bilioso, quia habet
 maiorem febrem, ob quã ita augetur vsus, vt non possit ei respiratio suf-
 ficere. Rubedo malarum non apparet in hoc affectu statim in principio,
 sed postea vaporibus ascendentibus, & in malis detentis, exhalant e-
 nim ab humore crasso, quod non contingit in pleuritide, quæ vt plurimũ
 fit à bile, cui citò dissipari proprium est. Pulsus mollis euenit in hoc affe-
 ctu, vt amor est Gal. lib. de pul. ad Tiro. propter raritatem pulmonis, &
 irrigationem arteriæ à pituita, quãuis enim ratione inflammationis de-
 buerit esse durus, pituita tamen, & partis natura id impediunt, & oc-
 cultant exiguam arteriæ tensionem. Pleuritis nomen est æquiuocum, nã Pleuritis
 primo significat quemlibet lateris dolorem, etsi sit circa inflammationē:
 & hunc affectum nominare solemus lateris dolorem, aut pleuritidē spu-
 riam. Secundò propriè significat inflammationem membranæ pleuræ,
 quæ multis donatur venis. Vnde errat Iacotius pleuritidem etiam in pe-
 riorio collocans: in eo enim pauca & exiles vena, inflammationi nõ sup-
 peditabunt materiam. Pleuritis proprià rursus diuiditur in exquisitam, Pleuritis
 & non exquisitam. Exquisita dicitur, cum membrana primũ inflam- propria dicitur
 matur. Non exquisita, cum membrana secundariò, hoc est ad inflamma uidetur.
 tionem musculorum internorum intercostalium afficitur: cum enim pleu-
 ra his musculis adhæreat, & sit veluti tegumentum eorum, proinde fie-
 ri non potest, vt illi musculi inflammentur, quin pleura quoque inflam-
 metur, & contra: sicut in tenui meninge: & cerebro euenire cap. de phre-
 nitide diximus. Has duas pleuritides ex Gal. 5. de locis affectis cap. 2. di-
 stinguas ex pulsu, qui in exquisita magis durus est. Signa Pathognomo- Signa.
 nica pleuritidis sunt febris continuã, & acuta: dolor punctorius, pulsus
 serratilis, & durus, difficilis, & frequens respiratio, & tandem rursus.
 Febris hunc affectum comitatur, quia inflammatio propinqua est ipsi
 cordi & eius inuolucro. Dolor propter tensionem soluta cõtinuitate, pun-
 ctorius verò, quia est tensio in membrana, quæ acutum habet sensum: di-
 citur autem punctorius, quia ægroti habent talem sensum, qualis solet
 sentiri in acus punctura. Et cum membrana ex sua natura sint extensa,
 & inflammatio tendat membranam, proinde etiam vicina partes infla-
 mationis etiam tendi solent, & hac ratione dolor serè per totam mem-
 branam extēditur: unde prouenit, vt dolor aliquando ad iugulum ascen-
 dat, & aliquando in hypochondriis sentiatur. Pulsus est durus in pleu-
 ritide non propriè, sed apparentia, quia tensa est arteria, serratilis verò,
 quia

DE CVRAND. MORB.

quia inæqualiter arteria mouetur, ob eius inæqualitatem in duritie. I
autem respiratio frequēs, quia magna respiratio, quam calor cordis ar
etius requirit, exerceri non potest ob dolorem à dilatione thoracis excita
tum, & ideo frequentia motus defectum distentionis supplet. Tussis
natura excitatur, ut tumorem, qui ei molestus est, & humorem resuda
tem ex eo expellat. Præter hæc signa, alia in pleuritide reperiri solen

**Lupeii la-
psus.**

quæ mox apparentia dicuntur. Hæc aliquando contingunt, & aliquan
do non: inter quæ est aphonix, quam vocis priuationem ait Lupeius eu
nire per consensum affectus neruis vocalibus. Qui maxime decipitur, ne
ui enim vocem efficientes in pleuritide non afficiuntur: sed sunt aliqua
do pleuritici aphonix deficiente materia vocis quod in magna pleuritide
experimur, in qua ob inflammationis magnitudinem, non potest attral

**Cōtrouer-
sia.**

aer ad vocem necessarius. Vallesius libro septimo epyd. comm. 13. ex Hip
pocr. sententia motus suscitatur quæstionem, olim à barbaris medicis agi
tari solitam: qua quæritur, cuius lateris pleuritidis sit periculosior. Aliqui
pleuritidem sinistri lateris periculosiorem esse sentiunt: quia hæc pars n
bilior est ob cordis situm. Alii contrariam defendunt sententiam addu
cti etiam ex nobilitate dextri lateris, quam colligunt ex caliditate maio
ri proueniente ex maiori latitudine arteriarum, quæ per ipsam dissemi
nantur: & ad argumentum de situ cordis respondent, cor in medio tho

**Vallesii
sententia.**

racis pendere, & non in sinistra parte. Vallesius in hanc secundam de
clinans sententiam sic explicat controuersiam. Pleuritis tres exitus habet
primus est resolutio, in qua sensim euacuato humore breui intra morbi
constitutionē liberantur agri: secundus est corruptio, qua breui moriun
tur, humore vincente naturam: tertius est suppuratio, in qua magna ex
parte moriuntur etiam agri sensim tabescentes, aliquando vero libera
tur. Ex his optandus est exitus qui resolutione fit, timendus qui corru
ptione: ille verò, qui suppuratione contingit, timendus etiam, sed minus
Iam pleuritis lateris dextri maior erit, & acutior, si partis naturam cō
sideremus, quæ calidior, & sanguinolentior est, & sic parata ad calida
& acutas inflammationes, unde pleuritis huius lateris, erit parata ac
citam salutem, aut mortem, per resolutionem, aut corruptionē (acutiori
enim est hoc) sinistra sæpius in suppurationem abibit: vide rerum eligas
Facta verò suppuratione (quæ in viroque latere fieri potest) deterior est
haud dubiè dextri lateris, quia nō poterit fieri, nisi ea parte multum de
bilitata, debilitatā autem esse partem, ali qui fortiem, grauius est, quā
debilem: accedit, quòd sinistra pars, ut ignobilior oportuniore est curatio

**Quæ se-
quatur ad
Vallesii
sententiam.**

ni, quia cum minori periculo secatur, & vritur. Hæc Vallesius. Ex qu
quatur ad hæc omnia colligimus: primum est, pleuritidem tres habere exitus: Secun
dum, dextrum lauius esse calidius sinistro, & plus sanguinis continere. et
sententiam. quòd arteriæ per ipsam disseminatæ sunt maiores, quā in sinistro: ter
tium, ex dextri lateris maiori calore sequi in eo maiores inflammationes
Quartū, in parte sinistra sæpius fieri suppurationē, in dextra verò sæpius

refu

resolutionem, & corruptionem. Quintum, suppurationem dextri lateris *Vallesius* esse peiorem, eo quod pars debilitata robustior erat, cum quia maiori cum reprehensu periculo vritur & secatur. Hæc si examinemus, inueniemus primum ve dicitur, rum esse, alia vero omnia esse falsa: immittitur enim falso supposito, quod est partem dextram esse calidiorem, quia habet arterias maiores, hæc enim nullus anatomicorum id animaduertit. Imò si dissecans corpus attente id aspicias, arterias dextre parvis æqualis magnitudinis cum arteriis sinistræ reperiens, hæc enim est naturæ iustitia, quam in duobus oculis et auribus experieris. Imò si arterias spectemus, sinistrum latus erit calidius, cum arteria magna versus ipsum declinare videatur, si hoc ita est, non ergo dextrum latus erit calidius sinistro, neque plus sanguinis continebit, & inde sequetur non esse robustius, neque in eo plures & maiores fieri inflammationes, neque plures resolutiones, & corruptiones, neque erit peior suppuratio in eo, quam in sinistro, neque sectio, & vstio sinistri lateris minori cum periculo fiet, sed cum æquali, cum æquales partes, & præstantes æquè vulnerentur. Sedabitur ergo controuersia *Sedatio* cōbreuiter hoc modo. Si cætera sint paria solo discrimine existente in situ controuersia, æquè periculosa est pleuritis dextri lateris, ac sinistri, cum æqualis dignitatis partes occupet. Fortasse tamen *Vallesius* & alios, ut existimarent dextrum latus esse calidius, ac proinde robustius, decepit brachium dextrum. Cum nō sit par ratio: nam brachium dextrum plus mouetur, quam sinistrum, & ideo & calidius & robustius est, quod lateri dextro non contingit.

Curatur vera pleuritis.) Ratio victus in pleuritide, & aliis internis inflammationibus, distincta est ab ea, quæ tradit *Gal. 11. meth. in Etus.* febris, in quibus cum tota materia ad unam expulsionem seruetur, in principio crassiori (ut perdurent vires) in statu verò tenuiori victu (ne impediamus naturam) vrendum est. Contra in pleuritide & aliis internis inflammationibus, in principio tenuem adhibere oportet victum, ut fluxionem minuamus, ac in statu fluxionis, quando coctio apparet, crassum, ut vires roborentur ad sputum educendum: quod ex Hippocrate primo acut. sen. 23. colliges: si os, inquit, madescat, & quæ expuuntur ex pulmone talia sint, qualia esse oportet, sorbitionis quantitatem auge.

Aquam bibant cum liquiritia, aut capill. veneris, aut paucis cinamo- *Potus.* mo decoctam, & sit tepida, ut humor inscindatur, & attenuetur qui ab aqua frigida solet incrassari. Vinum paucum solemus concedere ob consuetudinem.

Secundò, auertentibus.) Cum pleuritis sit tumor præter naturam, in principio postulat reuulsionem, & euacuationem simul seruata rectitudine, non solius naturæ, ut voluit *Rondolius*, sed naturæ simul & vasorum. Secabis ergo basilicam eiusdem partis, quæ ex parte affecta magis & citius euacuat, quam alterius partis: & hoc propter illam venam, quæ ex axillari oritur, & sub osse pectoris delatæ, communica-

DE CURAND. MORB.

obiection. ricationem cum venæ arigos ramis habet. Dices non semper esse venam secandam in principio pleuritidis, quia ex Hippocr. 2. de ratione victus in acut. sent. 11. in pleuritide, quæ habet dolorem vergentem ad hypochondria, purgandum est. Respondeo pleuritidem omnem, etiamsi habeat dolorem vergentem ad hypochondria, in principio postulare sanguinis missionem, quoniam hoc solum remedium potest ex parte affecta reuelleret, & euacuare: neque Hippocr. in supradicta sententia contrarium docuit: Quod si dixit, esse purgandū, id fecit, ut nos doceret, id quod habet propriū illa pleuritis, in qua dolor ad hypochondrium vergit, in qua, cum post sanguinis missionem & coctione apparente videamus inclinare humorem ad venas inferiores, per ipsas purgatione educemus ipsum: hoc autem communem rationem curandi pleuritidem non tollit, quæ cum sit inflammatio, sectionem venæ statim requirit. Quem locum (ignoscant mihi eius manes) Galenus non recte explicauit.

Duo aucto Tertio, materiam apparantibus.) Bis peccat autor: primò in
ris lapsus. pleuritide turgentia statuens, cum in ea humor in una parte firmatus sit: Secundo purgans, si enim humor peccas in thorace continetur, per spiritum est educendus, & non purgatione, natura enim ut in plurimum per hanc partem eum expellit. Atto ut in plurimum, quia aliquando cum exigua est pleuritis, per alium eum expellere solet, 6. aphor. com. 16. aliquando etiam per urinam, quod raro etiam contingit, ac proinde in his eam non imitatur.

Quinto, sputu materiæ.) Facta reuulsione, & aliqua humoris euacuatione ex parte affecta, quod ex accidentibus remissis intelliges, oportus erit humorem resolutem ex inflammatione euacuare. Quid aliqui ut præstare possint, sic distinguunt: si humor in thorace contentus sit crassus, debet inscindi, si vero tenuis, incrassari, ne aeri cedens in thorace remaneat. Hi tamen decipiuntur, quia etsi illud verum sit in humore, qui

In pleuri- distillans à capite in asperis pulmonis arteriis recipitur, in pleuritide tamen falsum est, in ea enim, cum humor ex cavitate pectoris debeat asper sunt peras pulmonis arterias ingredi per poros membranæ pulmonē ambiens, attenuantia medicamenta semper desiderantur: quod elegantissime exhibenda. docet Gal. 13. method. cap. 18. Ubi aduerte hæc medicamenta attenuantia, lambendo, & supino homine sensim esse deglutienda, ut asperam petendi mediant arteriam. Quæ autem medicamenta exterius applicanda sint, ex humoris natura, & loco colligemus: si enim humor sit tenuis, qualis ut in plurimum solet esse in pleuritide, leuiter digerendum est, posissimum si sit in musculis inflammatis, hoc commodè præstabit emplastrum filii Zachariæ. Si autem humor sit crassus, & in pleura membrana, augenda erunt digerentia, qualia sunt emplastrum de meliloto, pulvis iridis, & ciclaminis. Repellentibus nunquam utaris, ne ex venis exiguis pulmonis au sis humor augeat affectum, tum ne partes vicinæ noxam suscipiant.

Sexto, reliquam materiam.) Pleuritis signis supra positis depreh

prehenditur, habet etiam pleura sua signa: unde id quod auctor dicit de curatione pleuritidis tentamina, non potest constare: reuera enim Hippo. fomenta calida applicat, non ut tentando discat, sed ob unam ex duabus causis: prima est, ut curet affectum, aliquando enim inflammatio exigua est, et exigua fluxio, quæ ex Gal. 6. epy. par. 3. com. ult. sine sanguinis missione curari possunt, digerentibus medicamentis dissipatis humoribus. Secunda vero causa, ob quam fomenta calida applicat, est, ut leuato aliquantulum dolore non fluxat sanguis ad affectum locum. Atque hæc de pleuritide.

Peripneumonia, cum sit acutissimus morbus, et non possint ægri cum Curatione illa læsione respirationis multum perdurare, in principio sanguinis missi- peripneumonia- tionem postulat copiosam, non enim semel, sed bis, ter, et quater, eadem monia- die sanguinem mittimus, ex basilica cuiusvis brachii, quoad ex remissione accidetium, cognouerimus fluxionem sisti. Et cum propter acutiem hic morbus quarto die veniat ad statum, tenuissimo victu videntur erit, assum- mentes mulsam cum decocto liquiritiæ, capil. vene. aut hordei cum cortice, decocto etiam cicero, uti possumus, aut iure pulli gallinacei, in quo cicera, et petroselinum decocta sint. Educemus id, quod resudat in inflam- matione, scilicet liquiritiæ, capil. ven. et oxymelite simplici, cum decocto rerum attenuantium. Aduertire tamen oportebit, in sputum sit coctum, necne. Si sit coctum,angebis victum, ius gallinæ exhibens: si sit crūdum, thoraci digerentia, et concoquentia appones, vehementiora tamen, quam in pleu- ritide, cum profundiori loco contineatur affectus: sic emplastro diachilo- mis magni, et filii Zachariæ, addes puluerem iridis, ut aristolochiæ, aut ceroto ex thapsia uti poteris: hæc. n. inscindunt humores, et eos ad exter- na attrahunt. Si inflammatio suppuretur, periculum certò crescit.

De sanguinis sputo. CAP. XXVIII.

Sanguinis expulsiões (autore Gal. lib. 6. cap. Species, 2. de causis symptomatum) toto genere præter natura- turam censentur, excepto sanguinis profluvio, quod mulieribus ab utero defluit: sanguinis tamen deiectio per os, & cruentum sputum aliis est deterius, præsertim quando ex pulmonibus emanat, quia tabem efficere solet. Hoc accidit nonnunquam à causa externa, & aliquando ab interna, quas omnes cap. 21. de sanguinis e naribus fluxu scripsimus: eas tamen ex Gal. sensu longius erudite collegit Aetius. Causæ. ferm. 8. cap. 59. Causæ externæ ex sermonibus ægri, aut Notæ om- assistentium cognoscuntur: internæ verò per hæc indicia, nū causa- quæ omnia ferè Aetius loco superius adnotato demonstrat. ræ, et par- Si enim ob sanguinis plenitudinem accidat, ante reiectionem a qui- nem sentitur grauitas, & post melius, leuiusque habet. Si bus san- propter oris, venarumque apertionem, calidus victus, & quis fluit.

DE CVRAND. MORB.

morbus calidus præcessit. Si ob venarum erosionem, cruentum apparet sputum, non subito, sed paulatim sanguis cum tussi expuitur, & semper peius habet. In magna tamen erosionem confertim sanguis cum tussi expuitur sine casu, & externa violenta causa. Quando est ex pulmone, sanguis educitur spumofus, subalbius, atque ex interuallo cum tussi sine dolore prodit: si vero cum leuiori tussi absque spuma pituitosus sit ex aspera arteria educitur: si niger, & in grumum concretus sanguis cum tussi, & dolore partis affectæ reicitur, ex thorace est, si vero ex locis, quæ sunt circa fauces, & palatum, ex orene, an e gingiuis sanguis feratur, ex sensu deprehendes. Nonnunquam propter hirundinem deuorata alicui parti inhaerentem per palatum sanguis tenuis & serofus educitur, si tamen a capite sanguis deferatur, titillatio palati adest, & frequens excretio: aliquando cum tussi, & præcedenti capitis colore, aut pondere. In colore, sanguis niger, aliquando pituitosus, & aliquando mixtus cum pure. Si ex ventriculo, parua copia sanguinis vomitu educitur. Si ex hepate, aut splene, colore & dolore partis affectæ percipitur.

- Curatio.* Sputum sanguinis curatur quinque auxiliiorum generibus primo, victu refrigerante, & astringente, vt aere, in ætate sparsis humi herbis, floribus, & aquis frigidis, & aceto rosato, vt cibo tenui saltem primis diebus, & glutinoso, vt hordei farina, succus agrestis, aut acetosæ, aut malorum granatorum acidulcum solus, aut cum aliis est optimum alimentum. Post primos dies, præsertim cum est necessaria instauratio maior, succus gallinæ, aut perdicis cum iure pedum arietinorum, aut vitulinorum cito & multum nutrit, & sanguinem crassiorem reddit. Farina orizæ cum lacte bene cocta, aut cum iure pedum est optima. Denique omnia, quæ sanguinem incrassant, & venarum ora obturant, huic morbo vtilia sunt, vt caseus recens, lentes, pyra, mala cydonia, portulaca, & similia. Potus sit aqua chalybeata, nisi ventriculi, aut totius imbecillitas vino egeat: sit tamen id rubrum, & bene aqua chalybeata dilutum, qua omnia alimenta sunt coquenda. Quies animi & corporis, silentium, & somnus fluxus omnes cohibet.
- Remissio.* Secundo, auertentibus a rupta vena, vel aperta, vt sectione venæ internæ cubiti frequenter, vt sexta quaque hora, si opus fuerit, pauco tamen misso sanguine, cum multus per sputum reiectus fuerit: si vero paucus & æger sit plethoricus, largiori. In mensibus, aut hæmorrhoidibus suppressis sanguis mittatur per sectionem venarum pedum, aut tiliarum. Auertunt quoque cucurbitulæ coxis, natibus, & inguinibus affi-

æ, & ligaturæ, & frictions dolorificæ, & fons ex aqua calida partium infernarum. Calor enim, & dolor trahunt ad se, & hac ratione auertunt a parte affecta.

Tertiò, æquantibus sanguinem & ipsum reducentibus ad iustam proportionem quatuor humorum, quibus constitutus est sanguis ipse, vt tenui victu parum nutriente, si fuerit largior sanguis, si acer, biliosus ac mordax syrupo rosarum, myrtillorum, endiuæ S. cydoniorum, & similibus cum duplo aquarum, aut decocti, aut succi acetosæ, endiuæ, rosarum, portulacæ, & plantaginis: vt ℥. syrupi rosarum, & acetosæ citri an. ʒ. iij. Item ℥. aquarum endiuæ, portulacæ, & acetosæ, an. ʒ. iij. misce sumptis his, aut similibus tribus diebus, aut quatuor, vacuanda est bilis non scammoniatis, neq; aliis valentibus & acris medicamentis purgantibus, sed astringentibus: vt ℥. medullæ cassiæ fist. recens extracta ʒ. j. corticū myrobalanorū citrinarū, & rhabbari electi infusi per nocte in aqua endiuæ an. ʒ. j. syrupi rosarū ʒ. j. aquæ portulacæ q. s. misce, & fiat potus. Si pituita fuerit sanguini mixta, rhodomelle, & aqua absinthij fiat concoctio eius, & euacuatio per myrobalanos cepulas, vel rhabbarū, vel turbit sine zinzibere: vt ℥. corticū myrobalanorū cepularū, & rhabbari electi an. ʒ. j. Turbit electi ʒ. ss. rhodomellis ʒ. j. aquæ absinthij ʒ. ij. misce, & fiat potus: quod si malit pilulas: ℥. corticū myrobalanorū cepularū, & agarici trochiscati an. ʒ. ss. cū aqua fœniculi fiant pilulæ vij. & aurētur, si nō est pauper. Quarto, glutinantibus vlcus, & contrahentibus oris hiatum, & tandem sistentibus sanguinem: hoc tamen genere auxiliorum semper est vtendum, & statim cum ager visitur, ne sanguis immodicè fluat: vt portulaca mansa, & ore re- tenta, lapide hæmatite, corallo albo vsto, bolo armeno, terra lemnia, balauistiis, semine myrtillorum, dragaganto, gummi Arabico, mastiche, & similibus simplicibus. Sunt quoque composita, quæ eadē, aut simili facultate valent, & valis hiatum opplent, vt trochisci ex terra sigillata, & trochisci de Karabe, & de spodio: horum singulorum, siue simplicium, siue compositorum ʒ. j. cum aquis, aut syrupis astringentibus ex dictis potenter astringit, & glutinat: asininum stercus recens odoratum, vel potum, quodcunque sanguinis profluum sistit: ℥. succi stercoreis asinini ʒ. ij. syrupi myrtillorum ʒ. j. aquæ portulacæ ʒ. ij. misce, & fiat potus: quem bibat actu frigidum, & omnia alia medicamenta, & etiam alimenta omnia, si fieri possit. Narcotica medicamenta huic morbo sunt necessaria, etiam in initio, ne subito pereat ager,

Renocatio sanguinis ad proportionem

Restrictio sanguinis, aut venæ obstratio

Admonitio

DE CVRAND. MORB.


aut ne fiat tabes, si breui tempore non consolidetur vena: i-
deoque in hoc sanguinis profluuium Galenus audacter iis vri-
tur, præter tamen trochiscos superius in hoc genere lauda-
tos, qui sunt narcotici, quamuis parum opij suscipiant, præ-
ter etiam requiem magnam, & athanasiam, quæ sunt narco-
tica composita clementia, cum prædicta non sufficiunt, vten-
dum est philonio Romano, aut Persico, aut Tharsensi ab ℥.j.
vsque ad ℥.j. semper tamen his narcoticis, aut similibus non
egent, qui calidum innatum imbecillum habent, ne ab iis
admodum frigidis omnino extinguatur, vt multis contin-
git, qui perpetuo dormierunt ex potu narcoticorum: sed tro-
chisci, qui sequuntur, sunt optimi, & à multis experti in hoc
morbo: ℥. acaciæ, balauitiarum, nucis cupressi, gallarum, hy-
pocistidos, nucleorum vuc syluestris, caudæ equinæ, corrigio-
læ, myrti, sumac an. ℥.ij. thuris, mastichis, myrrhæ, lapidis hæ-
matitis, carabæ, santalorum, corali rubri, sanguinis draco-
nis, terræ sigillatæ, boli armenici, aluminis fossi an. ℥.v. sterco-
ris asinini licci, capræ & leporis, spongiæ combustæ, centau-
ræ minoris, cornu cerui viti, spodij, cupullorum rosarum
rubrarum, bedeguar, rhabarbari tostii an. ℥.iiij. seminis pa-
paueris albi, seminis iusquiami albi an. ℥.j. corticum man-
dragoræ, opij castorei, calicis lignæ an. ℥.ij. croci, camphoræ
an. ℥.j. fiant trochisci cum succis, aut aqua plantaginis, &
portulacæ: Dosis ℥.j. cum ℥.ij. aquæ, aut succi portulacæ, aut
plantaginis, aut sanguinariæ: sed iis non est vtendum, nisi post
tres menses, vt minimum. In vsu tamen horum, & aliorum
medicamentorum, quæ sanguinem à pectore fluentem si-
stunt, semper sunt permiscenda, quæ pulmones & thoracem
iuant, vt electuarium diadragantum frigidum, syrupus de
liquiritia, & succus eius, & similia. Quare hoc medicamen-
tum est huic affectui summe utile: ℥. conseruæ rosarum an-
tiquæ ℥.ij. gummi dragaganti, gummi Arabici, & cerasi an. ℥.
iiij. (dissoluantur in aquis portulacæ, & plantaginis) succi li-
quiritiæ, boli armenici præparati, terræ sigillatæ, lapidis hæ-
matitis, corali rubri præparati, sanguinis draconis, mastichis,
thuris an. ℥.j. Karabæ ℥.iiij. ℥. syrupi papaueris, & myrtillorū
an. equas partes, & quæ satis sint confectioni faciendæ ad mo-
dum loch, cuius cochlearium vnum frequenter teneat eger
ore, & sensim transglutiat. Thoraci admoveantur medica-
menta actu, & potestate frigida, & repellentia, atque astrin-
gentia, eaque sæpe, quales sunt succi, aut aqua plantaginis,
portulacæ, rosarum, solatri, & similes cū pauco aceto & bolo
armeno. Vnguenta frigida, vt cerotū santalatum est bonum.

Quin

Quintò, corrigentibus symptomata, præcipue sanguinis *Grumus* concretionem: vt oxymelite. S. & compos. dosis sunt ʒ. ij. huic sanguinis symptomati cōfert coagulum hœdi, vel leporis ab ʒ. j. vsque dissoluētia, ad ʒ. j. cum vino albo. ʒ. j. theriacę magnę, aut diacurcumę et expurgā cum aqua hyssopi, aut scabiosę, est etiam optimum auxilia pectus. lium huic symptomati: hoc medicamentum est expertum: ʒ. amydi ʒ. ij. ʒ. farinę fabarum, seminum melonum, & malug an. ʒ. ij. ʒ. boli armenici, seminum cydoniorum an. ʒ. ij. farinę hordei sine furfure ʒ. v. gummi Arabici, dragaganti an. ʒ. j. ʒ. oxymellis. S. quod sufficit, misce, & fiat confectio ad modum loch, qua sępē vtatur.


De sanguinis spūto. CAP. XXVIII.

Scholium.

 Mnes sanguinis expuitiones.) Ea quę in hoc cap. habentur, intelliges ex his, quę cap. de sanguinis ē naribus profluuio diximus. In spūto sanguinis primum curabis symptoma, nempe Quid sit euacuationem sanguinis, eo quod vrget, & potissimum, si sit ex pectore, primò cū tunc enim statim debet sedari, antequam fiat inflammatio. Id præstabis rāndum. sanguinis missione, & victu incrassante, simili etiam medicamento, quale est hoc: ʒ. trochiscorum de karabe, et terra sigillata, an. ʒ. i. ʒ. lapidis hæmatitis ʒ. i. conferuæ rosarum ʒ. i. aquę plantaginis, & capillorum veneris (vt faciat penetrare) q. s. misce, & fiat confectio, cuius assumat æger quantitatem vnius nucis cum aqua plantaginis, et capillorum ven. Ultimò, si hæc & similia non prosint, ad narcotica deuenies. Symptoma te curato morbo prospicies, siue sit vlcus, siue rupcio, siue anostomosis.

Quintò, corrigentibus.) Sanguinem concretum inscindes posca, sanguinem hoc est aqua & aceto mixtis, & per os assumptis, mulsæ etiam & oxyconcretum melice, vnde non est, quod vtaris coagululis ab auctore propositis. inscindētia

De Empyemate, id est, suppuratione, & tabe. CAP. XXIX.

 Mpiema Græcis, Latinis suppuratio, est affectio pectoris eorum, quibus in succingente costas interius membrana abicessus, aut in aliqua alia pectoris pellicula factus, acruatim ruptus est, & in vacuum pectoris locum effusus inter pulmonem & membranam costas succingentem. Vnde constat ex non curata pleuritide hęc affectio nē maiori ex parte nasci, quod aph. viij. sect. v. vetustissimus *Descriptio.* *Causa.*

DE CVRAND. MORB.

Hippocrates docuit. Interdum tamen & ex sanguinis eruptione hoc malū oritur, disrupto scilicet vase aliquo in thorace, & ad cicatricem non perducto. Iam & propter confluxum a capite permutatam anginam in pulmone sæpe fit iuxta aphorismum decimum sectionis quintæ. Ex causis quoque procatasticis fieri potest, sed raro. Suppurati sicprehenduntur, si inflammatio præcesserit, deinde vehementes febres quieverint, & ex magna parte quoque dolor, gravitatis autem sensus remanserit intus in lateribus in profundo thoracis, simulq; transfluere aliquid appareat iuxta multiplices reclinationis permutationes, & maxime cum ab vno latere in alterum decumbunt, tunc sane multitudo puris manifestatur, & fluctuationis cuiusdam sonitus sæpe sensibilibiter in reclinationibus ipsorū auditur. Cognoscitur itaque suppuratio facta tum ex prædictis, tū quod nihil relatu dignū reiectarunt in eo, qui præcesserit vehemēti lateris dolore. Sed quoniā vicina admodū affectio huic morbo phthisis est (autore Hippocr. 5. sect. Aphor. 10.) nō iniuria de vtraque affectione vno capite agetur. Dicamus ergo de phthisi aliquid, vt deinceps curationem aggrediamur. Phthisis pulmonis exulceratio ob omnibus censetur, ex empyemate (vt dictum est) nata, nōnunquam verò & ex defluxu humoris acris, atq; erodentis oritur. His autem notis cognoscitur, totius corporis summa adest extenuatio, nares acutæ sunt, tempora collapsa, oculi concaui, scapulæ alarū more prominentes, ad hæc tussunt qui sic affecti sunt, & quod expuitur fœtidum est, & febri corripiuntur hectica, quam insequuntur ea omnia, quæ a Gal. numerantur primo de differentiis febrium cap. 11. quæ si probe cōsulas: & præter hæc etiam, quæ ab Hippocr. dicuntur Aphor. 11. 12. & 14. sect. 5. plenam habebis signorum cognitionem ad hanc affectionem dignoscendam. Suppuratio hæc diligenter est curanda, ne fiat vlcus in pulmonibus, & tandem insanabilis morbus ob motum perpetuum pulmonum, eorūque substantiam raram, & hecticam febrem coniunctam: quæ sola est incurabilis, si fuerit confirmata. Magis etiam insanabilis est, si sit coniuncta cum vlcere pulmonum, quod indiget mundificatione, & exsiccatione: hectica verò instauratione, & humectatione, quamuis quis tabe laborans agnoscat medicamentum, quo curatur.

Nota.

*Descriptio
& causa
phthisis.
Nota.*

*Curatio
suppurat
ionis.*

Curatur suppuratio hæc medicamentis purgantibus pus iam dictis capite de pleuritide in fine, cum terminatur per suppurationem post ruptum abscessum: aliquando tamē vbi mag

magna est copia puris, incisio est facienda secundum longitudinem costarum, inter quartam & quintam thoracis mēdosas, facta prius experientia fili actu humidi admoti supra locum, si exsiccatur. Sed aduerte, ne totum pus, vel illius magna quantitas extrahatur semel, sed multis purgationibus, quamuis cito & cautē in habitatione calida propter cōseruationem caloris innati & spiritus. Nostri enim temporibus fuit integræ sanitati restitutus hac curatione quidā nomine Lupus, qui ex vulnere magno partis superioris thoracis in suppurationem peruenerat magnam cum febre acuta & maxima difficultate respirationis, educto pure per nouā incisionem partis inferioris thoracis non vno die, sed multis, ne vires deficerent. *Observatio.*

Phthisis, si curari possit, quinque generibus remediorum curatur: primo, victu refrigerante, & humectante habitatione heceticę: si verò spectes vlcus, febris causam (quod prius & magis curandum esse volunt auctores) calido & sicco victu curabis. Sit ergo in actiuis qualitatibus temperatus victus, sed siccior vlceris gratia, ob id Galen. quinto methodi phthisicos ad Tabias mittebat, vbi erat aer siccior, & sanabatur. Sint cibi faciles concoctu, boni & multi sanguinis: quia calor est imbecillus, & corpus macrum: sint etiam tenues & liquidi ob eorum vias siccitas, & contractas, & causa febris refrigerent parum, & propter vlcus sint apti ad detergendum. Ab his etiam ad consolidandum & glutinandum, quæ omnia insunt lacti, & saccharo rosato. Lac enim facile concoquitur, ac maxime nutrit butyro & caseo, optimi est succi, liquidum quoque est, & sub frigidum, tergit acrimonia feri, & sapore dulci substantiæ butyrosæ alit, glutinat caseo: facultates tamen variæ lactis augentur, vel minuuntur diuersa ratione victus. Refrigerans facultas augetur lactuca, cichorea, endiuiā, portulaca, & similibus. Tergens vero vis augetur hordeo, adianto, fœniculo, & hyssopo. Natura glutinosa crescit rubo, lentisco, salice, & similibus. Humanum lac est omnium præstantissimum, omnium tamen tenuissimum est lac camelorum, deinde equarum, post asinarum. Caprarum lac est temperatum, sed vaccarum lac & ouium magis nutrit. Humano tamē lacte nobiliori omnibus, & magis familiari est nutriendus hoc morbo laborās, fugatque ipsum ab vberibus, dū modò, sit sana, & iuuenis lactans, nec candida admodum, aut nigra. Bonis quoque nutriatur cibus, fugiat venerem tanquam pestem. Si verò non possit, vt infans lac a māmīs fugere, summo studio ipsam bibat actu

DE CVRAND. MORB.

Modus sibi re temperate calido. Primo bibat vnciam vnā, deinde sen-
mendi l. tim progrediatur ad ℥.vj. vel octo, parum sacchari addendo,
Etis. ne coalescat in ventriculo, alij addunt parum mellis, aut fa-
Lac diffusa lis, sed ego magis laudo saccharum, dummodo nō aulit ven-
dentia, tris profluuium, quod prohibet lactis vsum, quemadmodum

& alia multa, vt distillatio a capite, dolor capitis, febris pu-
trida, præsertim ardens, suspensa hypochondria & murmu-
rantia, inimicitia & discordia inter ipsum & ægrum; vbi ta-
men illius vi & ope maxime eget ægrotus, quibusdam dissen-
tientibus oportet cum nutrim. præcedenti tamen aliqua cor-
rectione, vt in ventris profluuiio lac fiat acidum per sex ho-
ras, aut per noctem eductis partibus butyrosis, facta eius cō-
motione in vase vitreo, aut terreo quibusda virgulis & spu-

Lege Gale ma sæpe extracta, erit illud lac astringēs & refrigerans: quē-
num lib, admodum est lac, in quo exstinguitur quinquies ferrū igni-
de facult. tum, aut chalybs, quo nutriatur sine saccharo. Asinum lac
alim. de la post humanum eligatur tāquam tenuius, & facile concoctu,
Et. deinde caprinum, præcipue ad refrigerādum & tergendum,

Lac asini- quia est serosius. Ovinum & vaccæ valentiū glutinat, & ma-
num. gis (vt diximus) nutrit: quia butyrū & caseum imitatur. Hu-

Sumpro la manum tamen ad omnia est præstantissimum, si esset eius co-
Et non est pia. Non est dormiendum ægro hausto lacte, sed quiescen-
dormien- dum, ne lac crudum in corpus trahatur. Quare tunc frictio
dum, cutis maximè noceret: saccharum rosatum his omnibus fa-
cultatibus prædictum est, quamuis recens magis tergat, anti-
quum verò cōglutinet, sed de eo in quarto genere remedio-
rum loquemur. Nutrimentum gallinarum iuuenum, capo-
num, perdicum, attaginis, hœdi, turturis, conturnicis est o-
ptimum, & ius eorum cum horæo, & ciceribus cum amy-
do, & cum lacte amygdalarum dulcium, & quatuor seminū
frigidorum maiorum, canceri fluuiales bene præparati, si-
militer limaces saltem eorū aqua, aut ius bene nutriunt, hu-
midūmq; gignunt nutrimentum, glutinosum, & tardè disso-
lubile. Testudines, & ranæ degentes in aquis salubribus ma-
ximè laudātur ab omnibus, horum tamen mentio fiet capi-
te de curatione heclicæ lib. secundo. Hæc aqua est optima &
omnibus melior, & huic morbo utilior, omnibūque facul-
tatibus necessariis prædita est; ℥. foliorum lactucæ. m. iij. ca-
pillorum veneris m. j. hyssopi. m. j. liquiritiæ recentis si heri
possit ℥. iij. pulmones duos hirci, aut vituli, pulmonē vnum
vulpis, si reperiatur, carnis cancrorum secundum artem pa-
ratæ (quam obseruabis cap. de curatione heclicæ secundo

Aqua præ- te de curatione heclicæ lib. secundo. Hæc aqua est optima &
stantissi- omnibus melior, & huic morbo utilior, omnibūque facul-
ma, tatibus necessariis prædita est; ℥. foliorum lactucæ. m. iij. ca-
pillorum veneris m. j. hyssopi. m. j. liquiritiæ recentis si heri
possit ℥. iij. pulmones duos hirci, aut vituli, pulmonē vnum
vulpis, si reperiatur, carnis cancrorum secundum artem pa-
ratæ (quam obseruabis cap. de curatione heclicæ secundo

lib

libro) ℥.iiij. carnis testudinis nemoralis, carnis limacis bene paratæ ana. ℥.ss. carnis ranarum bonarū ℥.iiij. sacchari candi ℥.viij. pulueris diadragati frigidi ℥.iiij. boli armenici præparati ℥.ij. fiat ex his omnibus aqua instrumento vitreo, & igne paucio: quolibet die summo mane bibat ℥.iiij. illius cum paucio saccharo. Potus sit aqua hordei, & vinum album tene bene dilutū autore Rhase, inter Arabes viro multæ experientie. Quidam laborantes tabe perfunati sunt solius lactis potu, & si ferrum, aut chalybs, aut lapilli candentes in eo fuerint extincti, erit præstantius, sed ego non laudo permutationem lactis cum aliis alimentis.

Secundò, abigentibus causas phthisis, quæ si fuerit distillatio curatur, ut diximus capite 25. Si vero vas ruptum, *Causæ re-
motio.* retur ut diximus præcedenti capite: si humor in pulmonibus erodens, appareatur & vacuetur, ut diximus cap. de catharro.

Tertio, tergentibus vlcus pulmonis dulcibus & amaris ut *Detergen-
tia vlcus.* rhodomelle, syr. de liquiritia, syr. capillorum veneris de hyssopo, de prasio, & decocto pectorali, & cicerum solo cum saccharo, aut aliquo ex prædictis syrupis. Dosis vnciæ tres, quæuis frequenter & omni hora sensim transglutiendo sit utile, & necessarium aliquod ex supradictis medicamentis.

Quartò, implentibus carne vlcus, & glutinantibus, hæc *Sarcotica,
vel carne
vlcus im-
plentia.* tamen propria sunt opera naturæ præcipue præcedenti debita terfione, ut bolo Armeno, sanguine draconis, & similibus cum syrupo pectorali. Saccharum tamen rosatum: anti- quum potenter glutinat ratione substantiæ rosarum, quamuis recens tergat magis, utrunque tamen nutrit ratione sacchari. Quare recenti opus est, cum vlcus est sordidum, & vetusto, ubi fuerit tersum: hoc multis iam morti proximis fuit sanitas restituta, præcipue si semper etiam in prandio & cæna eo nutriantur ægroti. Aliqua sunt quæ totius substantiæ proprietate prosunt huic morbo, ut pulmo vulpis, pulmo ericij siccatus: ex his & aliis fiat loch, ut ℥. pulueris pulmonis vulpis, & ericij an. ℥.iiij. pulueris diadraganti frigidi ℥.j. sacchari rosati ℥.vj. gummi cerasi, & Arabici an. ℥.ij. syr. de liquiritia. q.s. misce, & fiat confectio, ad modum loch. Est etiam herba quædam nobis incognita, qua ovis curatur, ipsamque naturali cognitione inquit, & amat, ut autoritate Democriti aliqui scribunt.

Quintò, corrigentibus symptomata, ut alui profluuium, *Correctio
symptoma-
tum.* de quo capitibus 36. 37. & 38. dicemus. Fit tamen hoc symptoma ab imbecillitate facultatis retentricis, & concoctri- cis ventriculi, & aliarum partium: pulvis diarhodonis Ab- bat

DE CVRAND. MORB.

batis est optimus, & in vsu frequenti, emaciationem laborantium phthisi corrigunt aqua carnis, iura optima, dicta primo genere remediorum, & alia, quæ dicemus capite de hectica, libro secundo. Si verò fuerit confirmata & antiqua phthisis, insanabilis est, blande tamen tractanda, & callus excitandus per siccantia. Vixit enim quædam furnaria phthi-
Historia *armotada.* lica viginti octo annis, inspirato sæpe aere sicco furni.

De Empyemate, id est, suppuratione, & tabe. CAP. XXIX.

Scholium.

*Due em-
pyematis
significa-
tiones.* **E**mpyema Græcis.) Empyema à Latinis suppuratio dicitur: hac duobus modis sumitur, ex 7. aphor. comm. 44. primo pro mutatione in pus, in qualibet contingat parte, qua ratione Hippocr. lib. prædicto sent. 45. hepar suppuratum appellat, & primo prognost. sent. 36. suppurationes foras vergentes bonas, contrarias malas scribit. De his etiam suppurationis intelligenda sunt signa, quæ 2. progn. sent. 60. ab Hippocrate traduntur. Secundo modo sumitur suppuratio proprie, pro ea collectione puris, quæ fit in thoracis cavitate, & pulmonis asperis arteriis. *Altomarius* ex Gal. lib. 5. aphor. comment. 8. & 2. progn. c. m. 60. tertiam significationem scribit suppurationis, qua suppuratio dicitur mutatio in pus, earum tantum inflammationum, quæ in pectore continentur. Nos tamen rem considerantes, ex illis Galeni locis duas tantum suppurationis significationes scripsimus, & sic non est hac in parte sequendus *Altomarius*. Hac puris collectio solet fieri ex pleuride, & peripneumonia, cum ad suppurationem veniunt, & rumpitur abcessus: immo ex distillatione pituitæ à cerebro, in qua reuera pituita non venit ad suppurationem, cum nec possit nutrire, nisi prius mutetur in sanguinem, mutatur tamen in similem puri substantiam, ut patet ex Galeno 7. aphor. com. 30.

*Phthisis
unde dica-
tur.* **Phthisis** (quæ a Græcis Atheniensibus dicitur prois) à verbo stiro dicitur, quod est corrumpo, aut absumo, & proinde à Latinis dicitur *Tabes*, quæ consumptionem significat. Inde duplex phthisis significatio exorta est, quam scribit Gal. primo epyd. par. 2. com. 13. una & prima significat quamlibet corporis extenuationem, siue ex defectu alimentum (quæ atrophiam dicitur) siue ex febre hectica, siue ex pure in thorace contenta, aut ex quavis alia causa exsiccante contingat. *Secunda
Tabis si-
gnificatio.* Secunda proprie tabes significat eam corporis extenuationem, quæ sequitur ad insanabilia ulcera pulmonis. Unde mirandum est de *Altomario*, & aliis cachexiam *Tabis* speciem facientibus, cum homines cachectici non sint extenuati, nullumque
Quid sit *truncatur* ceterum, quamvis male. Quod si Hippocrates in epydimis, ali-

uos natua tabe laborasse scribit, per tabem nullam ex dictis intelli-
git, sed tantum inclinationem ad ipsam, quæ reperitur in his, qui caput bes.
abent languidam, ita ut facile impleatur, & ad pulmonem fluxiones
mittat, primo epyd. par. 1. com. 18. tum & in his, qui angusto constant pe-
tore, non quia habent pulmones languidos, & qui facile corrumpun-
tur, ut male voluit Fernelius: sed quia humores, in loco angusto inclusi
non recte diffilantur, & sic facile putrent.

Curatur suppuratio hæc.) Empyema morbus est in numero ad- Empyema
lito, est enim in thorace addita pars toto genere præter naturam, non quis mor-
tecessaria ad actionem, imò quæ causa est actionis læsa. Debet ergo au- bus sit.
erri, hoc est pus debet euacuari tussi, ut locus, in quo continetur, nobis
n licat: assumi tamen debent. medicamenta, quæ ipsum attenuant. Et Attenuan-
deò summo mane assumere poterit æger mel destumatum, aut pulue- tia pus.
rem iudis cum mulsu, aut sequentia duo medicamenta. Primum ℞.
Syrupi de hyssopo ℥.iii. Syrupi violarum & oxymellis scillitici ℥.ss. misce.
Secundum ℞. loch caulium, loch sanum & expertum ana. ℥.j. succi li-
quiritiæ ℥.iiii. pul. diaris & diapenidionis an. ℥.j. ss. conferva capillo-
rum veneris ℥.iii. cum oxymelle scillitico, & syr. violarum, quod sat est,
misce, & fiat loch. Quod si pus ex inflammatione rupta sit, quod cõtine- Cicatricem
tur in thorace, post puris expurgationem cicatricem inducemus exiccant- inducen-
tibus, qualia sunt ℥.j. sulphuris cum melle, aut miscebis cum ovo, aut tiaz,
decocto scordei sulphur, aut eiusdem scordii puluerem. Aut bolum ar-
menum cum melle, vel decocto fœtali mixtum exhibebis. Suffumigium
etiam facere oportet ex sandaraca arabum, thure, & masliche, aut ex
rusilagine, quæ est ungula caballina officinarum. Si pus prædictis me-
dicamentis non expurgatur, ad sectionem devenies: quamvis ferè hi o-
mnes moriantur phthisici.

Phthisis si curari possit.) Pulmonis vlcus tunc curari potest, cum Quando
non habet inflammationem coniunctam, ea enim præsentem, impossibile vlcus pul-
est ipsum curare, ob causam à Gal. propositam §. method. cap. 8. in quo monis cu-
eriam capite habes curationem vlcis pulmonis. Frequenter autem so- rari possit.
let exente corporis extenuatio ex materia, & thorace in puris similis. Tabis im-
dinem mutata, & à capite distillante, quam tabem improprie appel- propriè cu-
lamus. Cognosces autem hanc materiam non esse pus, quia in his homi- ratio,
nibus neque inflammatio interna, neque profluuium sanguinis præ-
cessit. Oportet autem hæc diligenter curare, quia febrem excitat putrem,
in qua moriuntur ægri: hac tabe mortuus fuit Antiphonis filius 7. e-
pyd. sent. 27. Curabitur prius distillationi proficiendo illis, quæ cap. de
e tharro di. imus: extenuanti etiam victu, & medicamentis, quæ in-
scindunt humorem crassum. Purgabimus etiam pituitosum excremen-
tum pilulis de agarico, & aliis.

De Palpitatione cordis, & syncope.

CAP.

Palpitatione cordis, seu tremor (quam recēiores medici malē cardiacam appellāt) motus cordis deprauatus est, nimirum dilatatio eius præter naturam.

Descriptio. Fit palpitatione propter inclusum vaporem crassum, ac multum. Hæc enim est generalis causa omnium palpitationum,

Causa. cuiuscunque fuerint loci, vt docet Gal. 5. de symptomatum causis: quamuis quinto de locis affectis scribens causas affectuum præter naturam cordis, & ventriculi de huius affectus causis, porro inquit vtriusque partis, tum oris ventriculi, tum cordis dispositiones aut forti duntaxat intemperie, aut venenoso humore, nonnunquam ab erisipelate, aut inflammatione, aut aliquo præter naturam tumore fieri solēt.

De syncope, Ab iisdem causis, sed maioribus fit syncope: quæ est (autore Galeno lib. 12. method.) præceps virium lapsus, qui sæpe à causis externis accidit, vt a dolore, timore, ira, & terrore, & vacuationib⁹ maximis, vigiliis, & inedia, & aliis multis, quæ vires dissoluere valent. Deprehenduntur hæ affectiones, pal-

Nota pal- pitatio quidem, ex ægroto euidenter sentiente hoc malum, & ex pulsu, qui in causa calida velox est, & aliquando cum febri: in frigida, contrarium apparet. Si ab humore intra pericardion collecto palpitatione cordis fuerit, pulsus est mollis, & languidus.

Nota syn- Cognoscemus syncope ex pulsu maximè languido, & deficienti: ex frigore extremorū, & colore faciei albo, & exāgui, ex sudore frigido, & priuatione sermonis & motus totius. Quando per consensum ventriculi fit syncope, sentitur prius dolor in ipso ventriculo, & grauitas, & sæpe nausea, ac vomitus cum angustia præcedit, de quo capitibus sequētib⁹ agemus.

Curatio Curatur palpitatione cordis quinque remediorum generibus, primò, victu, si causa calida est, refrigerante, vt aere refrigerato rosas, santalis, aceto, violis, nenuphare, myrto, addito vino, & ambra, vt frigida promptius penetrēt ad cor. A causa verò frigida, calfaciente, vt aere commutato, & alterato rore marino, maiorana, basilicone, saluia, moscho, ambra, melissa, & similibus. In his cordis morbis ratio aeris præcipua est habenda. Mox enim penetrat ad cor inspiratus aer. Cibi sint boni succi, & faciles concoctu, refrigerati in calida, acetosa, aceto, agresta, succo malorum medicorum (vulgò naranias vocant) limonum, & citrorum: & in frigida causa, maiorana calefacti, basilicone, rore marino, fœniculo, &

simil

milibus. Vinum in hac est optimum, sed in calida vitetur, recipiue generosum, & vaporosum: dilutū tamen aqua hor- ei, aut rosarum vel alia refrigerante cōfert, in omni tamen ausa, si ventriculus sit imbecillus, bibat vinum, aut aquam innamomi.

Secundò, sanguinis missione, præsertim si fuerit à sangui- *Reuulsio.*
e, & æger carnosus, per sectionem iecorariæ dextræ, non v-
am tantum, sed plures, si non fuerit senex. Si verò fiat à fla-
u implente ventriculum sinistrum cordis, secanda est basili-
a sinistra, & parce sanguis mittendus.

Tertiò, apparantibus materiam crassam tenuantibus, & *Prepara-*
alidam frigidis, eius acrimoniam remittentibus: sed tam ca- *tio.*
idis, quam frigidis moderatis: ne offendatur cor, pars prin- *Consilium.*
eps, & fons vitæ. Quare in causa calida medicamentis fri-
gidis aliqua aromata calida sunt miscenda, vt eorum frigi-
litas immodica reprimatur: & vis etiam frigida mista cali-
lo medicamento promptius (vt dixi) ducatur ad cor. Opti-
nè igitur trochiscis de cāphora additur crocus, & alia que-
lam calida secundum quosdam: quamuis calida sit officina-
um cāphora. Calida ergo materia apparatus per duos aut *Camphora*
res dies syrupo violato, rosato, endiuix simplicis comp. & in *nostra ca-*
nagna caliditate syrupo acetositis limonū, aut citri, cum *lida est.*
quis aut decocto rosarum, endiuix, portulacæ, lactucæ, plā-
aginis, nenupharis, & similibus. Frigidam verò, & pituito-
am incidunt, & tenuant mel rosatum colatum, syrupus de
yssoopo, oxymel S. & comp. syrupus de duabus & de quinque
radicibus cum aquis fœniculi, melissæ, betonicæ, scabiosæ.
Hæc materia eget maiori concoctione, quæ non fiet tribus *Aduerre.*
tantum diebus, nec forsā sex: quamuis ob loci nobilitatem
vacuatio sit facienda aliquando non expectata concoctione.
Materiam melancholicam concoquere valent ea, quæ dixi-
mus i. cap. vt sunt syrupus borraginis, buglossæ, fumariæ. S.
de pomis, de epithymo, & syrupus fumariæ compos. cum a-
quis buglossæ, borraginis, melissæ, & sero caprino. Sed hæc
terrestris materia eget magna concoctione.

Quartò, vacuantibus materiam calidam medicamentis *Purgatio.*
cholagogis, de quibus diximus cap. i. sed in hoc affectu sem-
per sunt miscenda cardiaca, & rarò cōueniunt scammonia-
ta, quia nocent cordi, nisi benè correctæ: & quando clemen- *Obserua.*
tia non sufficiunt: vt ℥. rhabarbari electi infusi per noctem
in aqua endiuix ℥. iij. medullæ cassiæ fist. recens extractæ,
aut mannæ electæ ℥. j. syr. borraginis ℥. j. decocti florum cor- *Calide cau-*
dialium. q. s. misce, & fiat potus. Si sit materia pituitosa, hoc *sc.*
aut

DE CVRAND. MORE.

- aut simili medicamento vacuabitur: ℞. agarici trochisci ℥.iiij. corticum myrobalanorum chebulorum 3.j. diacat-
Melancholia mater- liconis 3.vj. rhodomellis 3.j.℞. aquæ fœniculi. q. s. misce
ria. fiat potus. Si vero sit materia melacholica, hoc aut simili me-
dicamento vacuetur: ℞. corticum myrobalanorum indo-
rum 3.j.℞. pulueris epithymi 3.j. feri caprini 3. iiij. misce, &
fiat potus. Quandoque necessarium est, laborātem cardiaca
biliosa, vacuare 3.iiij. diaprunis solutiui cum aliis iam dictis,
& laborantem pituitosa 3.iiij. electuarij indi maioris: & me-
lancholica cardiaca. 3.iiij. confectiois medicaminis hamet
cum cassia aut manna, quando humores redundarint.
- Auersio.* Quinto, auertentibus materiam a corde ad partes igno-
biles, præsertim vrgentibus symptomatis, & in ipsa accessio-
ne, vt secta vena nalleoli, præsertim in mensibus detentis,
aut hæmorrhoidibus, & vinculis dolorificis, & fotibus par-
tium extremarum, clysteribus, & cucurbitulis.
- Corroboratio, & alte-
ratio.* Sexto, corroborantibus cor, & ipsius intemperiem corri-
gentibus, sumptis, vel admotis. In calida sumantur ex sim-
plicibus, spodium rosæ, violæ, nenuphar, acetū, corallus, suc-
cus limonum, succus citri. Ex compositis electuarium dia-
Sumenda rhodonis Abbatis, diatrium santalorum, diamargaritonis
S. & com- frigidī, confectio de hyacintho, confectio Gentilis cordia-
pos. refrige- lis contra melancholiam, conserua acetosæ, rosarum, & vio-
rantia. larum. Sæpe enim his & similibus vti debet multis diebus
summo mane: accipiat 3.iiij. electuarij diarhodonis Abbatis,
aut diamargaritonis frigidī cū 3.iiij. aquæ acetosæ, aut syru-
Dinili. pi rosarum, aut alio ex prædictis liquoribus. Accipiat si di-
ues sit omni hora in hac cardiaca cochlearium vnum huius
confectionis cum pauca aqua rosarum aut acetosæ, aut alia
simili, ℞. conseruæ rosarum, & acetosæ an. 3.j. cōfectionis de
hyacintho, & Gentilis cordialis contra melancholiam an. 3.
Admouē- ℞. pulueris diarhodonis Abbatis, & diamargaritonis frigidī
da refrige- an. 3.ij. margaritarū electarum, & ossium de corde cerui an.
rantia. 3.j. foliorum auri numero iij. syrupi acetositis citri q. s. mi-
Epithima. sce, & fiat confectio: adde musci & ambre an. 3.iiij. Cordi ad-
mouetur sæpe hoc epithyma, aut simile, in hyeme actu ca-
lidum, & in æstate aut frigidum, aut remisse calidum: ℞. a-
quæ rosarum 3.iiij. aquæ acetosæ 3.ij. aquæ melissæ, & vini
albi odoriferi an. 3.j. pulueris diamargaritonis frigidī, & tro-
chiscorum de camphora an. 3.j. croci puluerizati 3.℞. mi-
Sacculus. sce, & fiat epithima. Sacculus hic cordi semper admotus, est
optimus in hac calida cardiaca, ℞. florum nenupharis, rosa-
rum violarum, & buglossæ an. 3.ij. pulueris diamargaritonis
frigidī

frigidi 3.j.ß. santalorum omnium an. 3.j. musci, & ambre an. 3.j. fiat sacculus ad formā cordis, seu scuti cum sindone coccinea. Si tamē fuerit pauper, epithima ex sola aqua rosarum *Pauperi*. cum aceto, & croco, erit optimum ad corroborandum. Similiter in omni palpitatione cordis odor succi pomorum, aquæ *Odorifera* rosarum, & nymphae cum paucō vino albo & musco simul *profunt*. cum ambra potenter corroborat cor. In frigida sumantur *Sumenda* calida simplicia cardiaca, & composita, vt buglossa, melissa, *calfacien-* zedoaria, doricum, cortex citri, crocus, moscus, ambra, & *ria*. similia composita, vt diamoschus dulcis, & amarus, electuarium de gemmis, diamargaritonis calidi, confectio Alkermes, & similia: multis diebus ventriculo vacuo accipiat 3. iij. electuarij diamargaritonis calidi, aut electuarij de gemmis cum 3. ij. aquæ melissæ, aut basiliconis, aut alia simili. Omni hora accipiat cochlearium huius aut similis confectio- nis: ʒ. theriacæ de citro, & diamusci dulcis an. 3. j. confectio- nis Alkermes 3. iij. conferuæ buglossæ 3. ß. pulueris diamar- *Confectio*. garitonis calidi, & electuarij de gemmis an. 3. ij. margarita- rum electarum 3. j. foliorum auri numero iij. syrupi buglos- sæ. q. s. misce, & fiat confectio. Hoc epithima in hac frigida *Admoueri* cardiaca est optimum: ʒ. aquæ melissæ, & buglossæ an. 3. iij. *da*. vini albi odoriferi 3. j. pulueris vtriusque diamargaritonis *Epithima*. an. 3. j. croci puluerizati, & coralli rubri præparati an. 3. ß. musci & ambre an. 3. ij. misce, & fiat epithima. Hic saccu- lus, aut similis est optimus in hac cardiaca: ʒ. florū buglos- sæ, citranguli, & coriandri præparati an. 3. ij. corticis citri, gariophyllorum, cinnamomi, zedoariæ, doricis, basiliconis an. 3. ß. rosarum 3. j. musci, & ambre 3. v. fiat ex his pulueri- zatis sacculus ad formam cordis cum sindone coccinea. Si *Sacculus*. fuerit hæc palpitatione a vermibus, eapite si dicemus de ea. Si autem a veneno, oportet scire per proprias notas veneni spe- ciem, & naturam, vt propria medicamenta cardiaca exhi- beantur. Sed hæc ab Italis & Romanis tractantur frequen- *Si fuerit a* tius, cum apud eos multi veneno pereant. Lege tamē librum *veneno pal* de venenis doctoris Santes & Ordenies. Lege etiam Alexi- *pitatio*. pharma Nicadri, & eiusdem antiquissimi medici, & poe- tæ librum quoque de theriaca vtilissimum, quem noster ci- uis & amicus doctor Petrus Iacobus Steue fidelissimè in- terpretatus est, doctissimisque expositionibus illustrauit.

Syncope curatur primò per asperionē faciei, & aliarum *Curatio* nudarum partium aquæ frigida, præsertim rosatæ. Prohibet *syncopes*. enim hoc remedium spiritus resolutionem, dummodò non proneniat syncope a causa frigida, vel alui profluuiō: tunc *Admonē-* maximè noceret aquæ frigida inspersio, sed cum est ab æstu, *da*.

D E C V R A N D. M O R B.

aut febris incendio spiritibus resolutis, saluberrima est aqua frigida, aut rosata sola, aut aceto faciem ægri aspergere, & nutrire spiritus bonis odoribus naribus admotis, nisi sit syncope ab vteri præfocatione: quia tunc odora naribus admota nocerent, vt dicemus capite de vteri præfocatione. Spiritus tamen intus in corde quasi conculcati, quòd sæpe còtingit in hoc morbo, reuocandi sunt ad partes externas frictionibus, & ligaturis partium extremarum, & cucurbitulis, & euellendo pilos, & naribus auribúsque dolorem inferendo, ne fiat subita strangulatio. Si syncope fiat ob spiritus resolutionem post sanguinis vacuationem, aut alui fluorem, aut aliam euacuationem, nocent maxime, quæ dolorem inferunt, & quæ reuocant spiritum ad partes externas: odora tamen omnia, sunt optima & necessaria: auctore enim Gal.com.ii. secundi libri Aphor. quæ citò nutriunt, sunt liquida, vinum citiùs, & omnium maxime & celerrimè sunt odores, vt hæc optima mixtura: ℞. aquæ rosatæ ℥.iiij. aquæ florum aranciorum ℥.ij. vini optimi albi, & succi pomorum redolētium an.℥.j. musci, & ambræ ana.ḡ.vij. misce, & sæpe naribus & faciei admoueat parum huius mixturæ. Nutriatur aqua carnis gallinæ iuuenis, aut capri, & perdicis, & arietis, quam nostri valentini destillat appellant. Hæc enim celeriter nutrit, ac subito ferme in sanguinem & spiritum transmutatur: id eoque à multis laudatur, tanquam vltimum & maximum alimentum ad cordis & totius corporis imbecillitatem. Quæ cor corroborant, spiritumque vitalem instaurant, vel saltem perfectiorem efficiunt, multa sunt, de quibus dictum est superius hoc capite. Curatio syncopes, quæ ab aliis fit causis tradita est à Gal.12. methodi, & i.de arte curatiua ad Glauconē, & nos in curatione aliorū morborum eam trademus.

Victus.

Admonitio.

De Palpitatione cordis, & Syncope.

CAPVT XXX.

Scholium.

Palpitatio cordis quid. **P**alpitatione cordis.) Palpitatio cordis est dilatatio eius, & compressio præter naturam. Hic autem motus non fit à facultate, quia pulsus diceretur: Sed à flauis exitum quarente. Unde est symptoma, quod refertur ad actionem laesam, est enim motus deprauatus. Hinc apparet error Hollerii in suo lib. de curandis morbis cap. 27. & Iacobi scholii: existimantium palpitationem cordis fieri ab excretionibus maxime truce facultate cordis, conante expellere id, quod molestum est: hæc enim ratio palpitationis non efficitur à solo morbo factus, quod falsum esse intel

intelliget, qui cap. 2. lib. 2. de symp. causis perlegerit. Quod motus in pal-
 pitatione, qui violentus est, & partis causæ, simul et mollis, fiat ab spiri- Causa pal
 tu, celeritas dilatationis eius, & compressionis ostendit: cuius humor cau- pitationis.
 à esse non potest. Palpitatio cordis fit ab spiritu crasso, in eius sinu con-
 tento, & exitum quærente. Hic aut ibi generatur, aut aliunde ascendit.
 Si ibi generatur, palpitationem (quæ est affectus proprius) generat. Si
 aliunde ascendit, ex utero, ventre, aut alia parte, fit palpitatio per con-
 sensum. Dices nonne est tertia palpitatio, quæ fit ab humore in pericar-
 dio contento, quam Gal. 5. de loc. affect. cap. 1. palpitationem cum signifi-
 catione appellat. Respondeo, hanc esse palpitationem propriam, cum in
 ea, ab spiritu genito in pericardio (quod à corde non distinguitur) or di-
 citur. Dicitur autem cum significatione fieri, qui fit cum Typo, hoc est
 cum signo manifesto, ab humore enim in pericardio incluso cor compri-
 mitur, ita ut in principio palpitationis sentiant ægri compressionem, quam
 nos etiam ex pulsu deprehendere possumus. Quacunque ergo ratione
 contingat palpitatio cordis, semper fit ab spiritu flatulento, in corde de-
 contento: qui paucus non est, nam in viscere calido statim discuteretur, sed
 nultus, ita ut aliquando suffocationem fere inducat calorem, & sic animi
 deliquium, & syncopem, & aliquando omnino, suffocato calore, mortem.
 Quod cum consideraret Gal. lib. 5. de loc. affect. Omnes hos ante quinquaginta- cap. 2.
 gesimum annum more scribit. Cum palpitatio omnis ab spiritu fiat, Gal. Morbus in
 2. de cau. symp. cap. 2. omnem partem palpitantem esse refrigeratam col- palpitatio-
 ligit. Si enim multum calida est, vaporem excitabit, & discurret, si mul- ne.
 tum frigida, non eleuabit vaporem: debet ergo esse frigida, sed parum. Ex
 his habebis palpitationem cordis sequi morbum similem, nempe intem-
 periem frigidam. Hæc in palpitatione, quæ est proprius cordis affectus,
 in ipsomet corde consistit, ac in ea, quæ est per consensum, in parte humo-
 rem generante. Aduerte tamen, cor refrigerari, aut in propria essentia,
 aut (quod ut in plurimum ei contingit) agrauiatione caloris, facta à mul-
 to humore, tunc enim calor cordis, comparatione facta ad illum humo-
 rem, dicitur diminutus, ita ut non possit vapores ex eo eleuatos discutere.
 Flatus autem materia est humor potissimum crassus, qualis est melan-
 cholicus. Ut syncopes essentia intelligatur, aliqua oportebit supponere primū sup
 maxime necessaria. Primum est, vires nostri corporis esse positas in natu- positū ad
 ra partium solidarum, carnosarum, & spirituosarum: ita ut partes car- syncopes
 nosæ, & solidae, sint actionum principia, at spiritus, instrumenta. Secun- essentiam.
 dum est, prædictarum partium naturam postulare quantitatem, seu Secundum.
 molem elementorum, & debitum qualitatum temperamentum, si vires
 debent esse validæ, & actiones firmæ. Tertium suppositum est etsi vires Tertium.
 in natura omnium corporis partium, posite sint, potissimum tamen in tri-
 bus, quæ principes dicuntur (corde, cerebro, & iecore) consistunt: ab his
 enim corpus gubernatur. Quod quamuis ita sit, præcipue vitam in cor-
 de collocamus, quia in eo generatur materia (nempe spirituosus sanguis)

DE CVRAND. MORB.

à qua calidum innatum, quod est vitæ instrumentum in toto corpore conseruatur: & ideo nemo potest mori quin cor cesset agere. Ex his, quod querimus, facile inuentum erit. Si enim vita in quantitate, & qualitate partium præcipuarum, & maxime cordis sedem habet, tunc labentur vires, cum aliqua ex dictis partibus (& potissimum cor) quantitate deficiet, aut qualitate alterabitur. Animi igitur deliquium, & syncope, nil aliud sunt quam virium lapsus. Quod si inter hæc est aliquod discrimen, lause tamen positum in ratione maioris & minoris: ita vt animi deliquium via sit ad synopem. In animi enim deliquio sentiunt ærotantes

Quid syn- vires deficere (& hic est eius terminus) non autem in syncope: in ea enim
cope, & a- cum sit maior affectus, nec sentiunt, nec mouentur: quamuis possit esse
anmi deli- syncope sine animi deliquio precedente. Obiciet quis, si animi deliquium,
quium, & & syncope, sint passionis cordis, qua ratione affectus eos ex actionibus
eorum di- facultatis animalis distinguimus, in animi deliquio sentientes defectum
scrimen. sensus, & motus voluntarii, non autem in syncope? Respondco aliorum
Obiectio. sententias omittens reuera animi deliquium, et synopem, affectiones esse

cordis, consentire autem ad eas cerebrum, ex defectu enim spiritus vitalis generari non potest animalis, & hac ratione eam concidere, quæ cum habeat actiones nobis manifestas, proinde ex illis affectiones cordis col-

Causa syn- ligimus. Quæ cum ita sint, eadem ergo erunt vtriusque affectionis (ani-
opes, & mi deliquii, & synopes) causæ, consistentes in illis rebus, quæ dissipant
anmi de- substantiam partium, aut spirituum, aut earum euerunt temperamentum: toto temperamento operantia, vt venena, aut qualitate manifesta,
liquii.

vt quæ calore, frigilitate, humiditate, aut siccitate agunt. Hac ratione in cholera morbo, diarrhæa, dysenteria, henteria, muliebri profluvio, sudore, anmi pathematis, in quibus sanguis ad externa mouetur magna medicamenti purgantis euacuatione, & similibus, ob substantiæ spiritus dissipationem fit animi deliquium, sicut in marasmo, ob dissipationem substantiæ solidæ. In cruditate ventriculi fit animi deliquium, ob intemperie calida cordis per consensum genita, sicut in bullimo a frigida: in apoplexia vero, iniquam præhensat, in principis accessionum, in magnis inflammationibus viscerum, gangræna, et in illis animi pathematis, quæ habent motum ad interna, animi deliquium ab intemperie frigida ex suffocatione caloris orta prouenit. In balneo & sole, animi deliquium ex intemperie & dissipatione spiritus ortum habet. Atque hæc sunt alterationes manifestæ prædictum generantes affectum. Præter quas est venenum, quod qualitate occulta, hoc est toto temperamento alterando ani-

Error an- mi defectum inducere solet.

Floris, & Curatur palpitatio cordis.) Nescio quid in mentem venerit an aliorum præ Floris, & aliis practicis, in curatione palpitatiois distinguentibus, an Elidorum. fiat palpitatio a causa calida, an a frigida: quia sive loquantur de causa vicius in efficiendi, sive materiali, semper est frigida, vt diximus. Ac proinde ipsi hoc affectu omittis, perpetuò vicius rationem attenuantem in hoc affectu admini-

strab

trabis, ex qua humores tenues generantur: & semper fugies alimenta melancholica.

Secundò, sanguinis missione.) Hoc in loco distinguere videtur Auctor palpitationem à flatu, ab ea quæ à phlegmone fit: quasi sit pal- itatio sine flatu. In palpitatione ergo omni sanguinem mittere. Si causa Sanguinis sit plethora grauians, vt euacuemus, si cacochimia ob vitium sangui- is, cum quo multa cacochimie portio educi solet, & sic reuelli à loco as- cto. Obiciet eam palpitationem, quæ ex humore in pericardio contento rum habet, in qua non debemus sanguinem mittere, vt euacuemus, quia non fit à plethora: neque vt reuellamus, quia non fit à cacochimia vna- um. Respondeo esse sanguinem mittendum in ea, vt euacuemus, nam um illa aqua exciderit à venis, poterit iterum ad eas remigrare: vel pos- sumus dicere, sanguinem mitti ob reuulsionem, quia vacuato humore ex- enis, non descendet ad pericardion. Si fiat sanguinis missio, vt reuella- us, & euacuemus, ex brachio aut saphena. Quod si sint suppressi men- es, non est tunc eorum habenda cura, quia palpitatio vrget.

Tertiò apparantibus.) Materia palpitationis, cum vt in plurimum Syrupi. rassa sit, melancholia scilicet, postulabit attenuantia, qualia sunt syru- us de bizantiis, endiniae composui, oximel, rhodomel, cum decocto melif- e, thimi, & similibus. Vnde distinctio auctoris de causa calida aut fri- ida omittenda est, nunquam enim fit à materia calida.

Quartò, vacuantibus materiam.) Malè auctor in palpitatione ordi viuit medicamento purgante bilem, cum hæc non sit causa pal- itationis. Purganda ergo erit pituita, aut melancholia.

Sextò, corroborantibus cor.) Cum palpitatio cordis à flatu fiat, Auctoris ut diximus, exterius, & interius, ea quæ ipsum dissipare possunt, vilia lapsus. runt. Exterius, thoraci ex parte, quæ respicit cor, applicandi sunt sac- ali parati ex rebus calidis, qualia sunt cinnamomum, camemelum, ga- Dissipatia iophyli, et similia, quæ extenuandi habent vim. Hoc medicamentum op- flatum. imum est, ℞. foliorum roris marini, thimi, & saureie an. ʒ. i. melisse ʒ. i. s. cinamomi, & gariophyllorum an. ʒ. i. rosarum siccarum ʒ. iii. mu- ci, ambre an. ʒ. iii. fiat ex omnibus pul. tenuissimus, ex quo fiat saccu- us. Per os similiter confectio Gentilis contra melancholiam, et alia fla- um discutientia, assumenda sunt. Ex his presenti loco multos auctoris rrores animaduertes, primum, cum exterius, & interius iubet assumi, Nota mul- & applicari medicamenta quæ frigida sunt, sentiens cum multis aliis eos auctoris palpitationem cordis fieri ab eius feruore. Secundum, construens illas errores. ardiacas confectioes ex margaritis, ossibus, gemmis, pulueribus frigi- lis & aliis, quæ augent materiam flatu, et eiusdem dissolutionem im- pedium. Tertium, palpitationem quandam à vermibus factam nobis tendens, cum talis non extet, sicut nec palpitatio à veneno.


Syncope curatur primò.) Syncopem curamus aut in accessione, aut extra accessionem. Cum in accessione eam curamus, tunc solius

DE CVRAND. MORB.

Aduerte symptomatis habemus rationem, quo tempore cum calor sit in partibus syncopis *ve* internis inculcatus, modis omnibus nitimur eum exterius euocare leuiter ram cura-*fricantes* eum, & maxime eam, quæ est in ore ventriculi, quia hac iunctionem. cunda frictione calor natiuus excitatur. Nares etiam comprimimus, quia tunc ob usum respirationis excitatur facultas, & calor roboratur. Odorare etiam facimus vinum, ut spiritus reficiantur, propter quam etiam causam inspergimus frigidam aquam supra faciem, hæc enim excitat facultates naturales sopitas in syncope. Cum extra accessionem syncopem curamus, tunc non symptomati prospicimus: sed morbo, à quo pendet, qua ratione præuenimus syncopem. Si ergo syncope eueniat spiritus dissipato, ipsum reficiemus vini potu, qui celerrime id præstat, si non sit interna inflammatio, delirium, capitis dolor, aut febris cum cruditate ventriculi. Vinum autem in regione, atate, et tempore frigidis calidum, in contrariis frigidum exhibendum est, remedia etiam adhibenda sunt causæ, quæ dissipat spiritus. Si syncope euenit ex substantiæ solidæ evacuatione, alimentis boni succi, & facilis concoctionis impediatur. Si intemperies eius est causa, contraria intemperies, si venenum, alexipharmacum medicamentum proderit. Quod si intemperies syncopem generans à multitudine fiat, sanguinem mittemus. Atque hæc sunt medicamenta *cardiaca* verè, non illa quæ à barbaris medicis, & eorum sequacibus cordialia appellantur, ex auro, argento, gemmis, terra lapidibus, et cardiacis. ossibus indiscriminatim in omni morbo constructa.

De imbecillitate ventriculi, & de dolore, & inflammatione eiusdem.

CAPVT XXXI.

 Vanquam quælibet ventriculi læsio imbecillitatem gignit, ea tamen, quæ in coctione est, etiam si valida sit appetentia, dicitur ventriculi imbecillitas. Quo affectu laborantes stomachicos appellant medici, quemadmodum & hepaticos Gal. nominat 6. de symptomatum causis eos, qui imbecilla coctione iecinoris infestantur. Hæc coctio, ut quælibet alia actio, tripliciter læditur, ut diximus, Gal. autore 3. de symp. diffe. & cap. 80. artis medicinalis: quia vix, aut quia vitiose, aut quia nullo modo: vltimum symptoma dicitur à Græcis, Apepsia, & Latinis cruditas: duo priora dicuntur homonymos, mala scilicet concoctio ventriculi: quæ si tarda sit, cruditas quoque dicitur, ita ut cibi vix propriam suscipiant transmutationem, & hæc à Græcis dicitur bradypepsia, de qua in præsentia agimus. Si vero omnino corumpantur cibi, ut nullam bonam coctionem admittere possint

possint, sub mala & vitiosa coctione comprehenditur, quam
 nis nullum proprium habeat nomen. Tarda concoctio fit, *Causæ.*
 quia cibi difficulter concoquuntur, vel quod potentia illos
 non superat, vel quod somnus breuior fuit, quam ut eos vin-
 cere posset, vel quia immodica copia sumpta sit, vel quod
 coctioni repugnent, vel quod inordinate sumatur. Quod
 si præter hæc acrem aliquam, aut alienam habeant quanta-
 rem, non tam imbecillam concoctionem, quam corruptam
 pariunt. Potentia illos non superat, aut quia per essentiam
 læsa sit, aut propter aliquem morbum instrumentorum, ut-
 cunque tamen fiat, imbecilla reddita est. Per essentiam verò
 læditur ventriculus, cum intemperie aliqua primarum qua-
 litatum laborat vel simplici, vel coniugata: nuda, vel cum
 humore. Per instrumentorum verò morbos, ut sunt erysipe-
 lata, ædemata, phlegmones, scirrhi, abscessus, atque alij hu-
 iusmodi morbi. Deprehenditur hoc malum: Si culpa quidem *Notæ.*
 ciborum fuerit, & potus, ab ægro, & aliis scies: liberalioris
 tamen potus indicium est fluctuatio, cibi verò, grauitas in
 ventriculo percepta. Deinde num ingesti cibi fuerint con-
 coctu difficiles, ut panis in clibano non bene coctus, vel fer-
 menti expers (quem azymum appellant) aut carnes bubulæ,
 suillæ, hircinæ, asininæ, atque camelinæ, nam his vltimis A-
 lexandriæ homines vescuntur. Deinde imbecillitas ventri-
 culi, quæ cibos superare non potest, cognoscitur: si ab intem-
 perie nuda proueniat per ructus. Nidorem enim referentes
 calidam arguunt intemperiem, acidi verò frigidam. Præ-
 terea vbi calor infestat, sitis adest, secus vbi frigus: si humor
 quoque cum intemperie affuerit, deprehenditur & ex graui-
 tate, & ex ructibus, & ex iis, quæ foris emittuntur, aut deor-
 sum per secessum, aut sursum per vomitum. Tumores verò
 præter naturam, ut erysipelata, ædemata, & reliqui, propriis
 signis cognoscuntur, & qui his tumoribus laborant, contra-
 riis non in totum iuuantur. Ab iisdem his causis, quæ supra *Causæ do-*
 numeratæ sunt, duæ quoque affectiones fiunt, dolor scilicet *loris, et in-*
 ventriculi & inflammatio: dolor ab intemperie sola fit, aut *flammati-*
 ab humoribus calidis & frigidis sine putredine. Inflamma- *nis.*
 tio verò ab influxu humoris calidi, & sanguinei putridi, do- *Notæ.*
 lor per se manifestus est. Inflammatio deprehenditur, quia in
 ventriculo dolor adest immensus, assiduus, & qui nullis me-
 dicamentis admotis mitigari potest: præterea tumor, æstus,
 qui tactu diiudicari queat, febris grauitas, & nausea.

Hæc ventriculi imbecillitas nullam propriam habet cura-
 tionem, cum a multis causis (ut diximus) fieri possit: sed ces-

DE CVRAND. MORB.

fat morbus eius causa profligata.

Curatio im- Sæpe tamen reualescentibus a diuturno, aut magno mor-
becillitatis bo adest imbecillitas ventriculi, quæ curatur roborantibus
reualescen- qualitate tum manifesta, tum occulta: de quibus in vltimo ge-
rium per nere remediorum dicemus: neque verò in ventriculo imbe-
roborantia. cillo sunt vtilia calida, sicca, & astringentia: præsertim cum
 est ab intemperie calida, vt docet Gal. 7. method. contra suos
 præceptores: imò in frigida causa calida medicamenta pru-
 denter sunt admouenda, & exhibenda, ne ex accidenti resol-
 uatur naturalis calor. Sed quia frequentius fit hoc sympto-
 ma a morbo frigido, cum materia, illius curationem in præ-
 sentia ponimus, & describimus.

Curatio in Curatur ergo hæc quinque generibus remediorum: primò
temperiei victu calfaciente, & exiccante, & cibis facilibus concoctu, vt
frigida cū sunt perdices, conturnices, turtures, & similes. Ius arietis
humore. cum menta aut fœniculo, aut salvia, aut petroselino est vtile.
Victus. Exercitatio moderata ante cibum confert. Coitus maxime
 nocet, & animi perturbationes. Bibat vinum rubrum Sagun-
 tinum, aut simile bene dilutum, aut aquam cinnamomi, aut
 decoctum seminis fœn. vel anisi. Omnia pituitosa alimenta
 nocent, vt pisces, legumina, & herbæ frigida.

Secundò, curatur apparantibus pituitam, vt rhodomelle,
Prepara- syrupo de absinthio, syrupo de menta, oxymelle. S. & compos.
tio. cum decocto, aut aquis fœniculi, seminis anisi, mentæ, absin-
 thij, maioranæ, & similitum. Concocta pituita per sex, aut o-
 cto dies.

Tertio, vacuantibus ipsam pituitam myrobalanis chebulis
Tempus co qui simul purgant & corroborant ventriculum, eorum enim
tionis. vsus continuus est optimus, & expertus, aloe, agarico, turbit,
Purgatio. pilulis de Hiera. S. quæ magis purgat, quam sicca, autore Gal.
Error A- 7. methodi. Errant ergo Arabes dicentes ipsam cum melle
rabum. minori vi præditam esse. Pilulis elephanginis, pilulis stoma-
 chicis, electuario diaphæuicon, & similibus, quæ non attra-
 hunt ab aliis partibus longinquis ad ventriculum. Hiera ta-
Hieræ com men S. obtinet principatum in morbis ventriculi curandis.
mendatio. Quare ʒ. j. eius cum rhodomelle, & decocto fœniculi purgat
 clementer ventriculum, si semel in hebdomada capiatur, vel
 ʒ. iiij. pilularum hieræ. S. aut elephanginarum erit fœlix in
 huius morbi curatione successus.

Flatus di- Quarto, dissipantibus flatum, & intemperiem frigidam
scurientia corrigentibus, vt puluere diarhodon Abbatis, & rosatæ no-
 & *alte-* uellæ simul, aut aromatico rosato, si maiori calore indige-
ramia. mus, aut diacymino, aut diagalanga, aut diatriopiperon ʒ. j.
 aut

aut duæ. Ex his cum aqua absinthij, aut mentæ, aut fœniculi pondere vnciarum duarum quolibet die ventriculo vacuo validè dissipant flatum, & curat intemperiem frigidam, aut grana sex, septem, vel octo piperis integri deuorata hora ante cibum, aut drachma vna theriacæ magnæ, aut mithridati mane sumpta in septimana. Vinum ex absinthio est optimum in hoc genere. Hoc medicamentum est optimum, si æger fuerit senex, & morbus antiquus: ℞. pulueris diagalangæ, pulueris diatrion piperon an. ʒ. iij. pulueris aromatici rosati, & rosatæ nouellæ an. ʒ. iij. pulueris diacymini ʒ. j. con-
Topica.
 feruæ anthos ʒ. ss. diamusci dulcis ʒ. j. mellis, myrobalanorum chebulatorum, aut communis. q. s. misce, & fiat confectio: *Lege confectio*
 dosis cochlearium vnum, aut duo cum vino optimo, at aqua *limum unde*
 fœni. aut melissæ. Supra ventriculum pellis vulturis est opti-
 ma in hoc genere: similiter vnguentum hoc: ℞. olei absin-
 thij, anethi & de lilio an. ʒ. j. pulueris mentæ, gariophyllo-
 rum, & cinamomi an. ʒ. j. ceræ. q. s. misce, & fiat vnguentum, *nis Bapti-
 stæ Mon-
 tani Hero-*
 quod bis in die actu calidum ventriculo admoueat tam
 parti posteriori, quam anteriori: quia posterior pars est pro-
 pinquior ventriculo: vel ℞. emplastri stomatici. q. s. exten-
 datur super alutam ad formam scuti, seu ventriculi: fiat du-
 plicatum vt tam pars anterior, quam posterior defendantur
 ab externis, & melius dissipetur flatum, & intemperies frigi-
 da corrigatur: vel fiant duo sacculi ex absinthio sicco, men-
 ta, camomilla, aniso, semine fœniculi, carui, cymino, cinna-
 momo, gariophyllo, cortice citri, & similibus.

Quintò, corroborantibus ventriculum internis, & exter-
 nis, qualitate tam manifesta, quam à proprietate, seu rota
 substantia: quales sunt ventriculorum gallinarum pellicu-
 læ interiores: Syluius tamen cum Gal. has pelliculas, & mer-
 gi & struthiocameli damnat Gal. 3. de aliment. facultatibus
 cap. de differētia, quæ est in partibus animalium volatiliū,
 ventriculum mergi, & struthiocameli tantum damnat: at il-
 de facultatibus simplicium medicamentorum improbat gal-
 linæ & mergi pelliculam internam ventriculi, contra quos-
 dam antiquos. Dioscorides tamē lib. 2. cap. 41. ventriculi in-
 quit, galli pelliculam internam siccata, & trita cum vino
 in potu cōferre stomachicis. Puluis hic ante cibum sumptus
 quantitate vnus cochlearij cum vino, aut iure corroborat
 ventriculum: ℞. coriandri præparati ʒ. ij. seminis anisi, fœ-
 niculi, cinnamomi electi an. ʒ. iij. pellicularū internarū ven-
 triculorum gallinarum secundum artem præparatorum ʒ. ij.
 corticis citri, & ligni aloes an. ʒ. j. ss. coralli rubri præparati

DE CVRAND. MORB.

3.j. sacchari optimi 3.vj. misce, & fiat pulvis. In longis morbis præsertim calidis pulvis solus diarhodon Abbatis summo mane & ante pastum cum paucis iure ventericulum vehementer corroborat. Corallus si tangat regionem ventriculi diu, corroborat ipsum: eandem habet vim lapis smaragdus.

*Admonē-
da,* Pulegium montanum, & betonica quoque corroborant ventericulum. Manus sana, & iuuenis alicuius si pe deteta supra ventericulum suo naturali calore eum confirmat: eodem modo si aliquod animal viuum, vt canis adinoueatur ventericulo.

*Doloris ab
intemperie
nuda cu-
ratio.* Dolor ventericuli, si sit a sola intemperie, curatur contrariis ei, vt si a flatu, & frigida intemperie fiat, mederi illi debemus per ea, quæ diximus quarto genere remediorum hoc capite, & etiam per frequentem fotum, saltē quolibet die bis vacuo ventericulo hoc decocto spongiis madidis, vel philtro:

*Ab intē-
perie cum
affluxu
hæmoris.* ℞. absinthij, mentæ, camomillæ, calendulæ, anthos an. m. j. galangæ, corticis citri, spicæ, gariophyllorum, nucis muscatæ, cinnamomi, zingiberis an. 3. ij. seminis fœniculi, anisi, carui, & cymini an. 3. ij. rosarum, coriandri præparati an. 3. j. vini optimi rubri lb. ij. aquæ calyceatæ lb. ij. fiat ex his decoctum ad consumptionem tertiæ partis. Si a calida intemperie, per frigida curatur: si cum materia, per illius euacuationem, per sanguinis missionem, si ætas, & facultas adsint, & æger sit carnosus: quamuis in omni vehemente dolore habitata ratione ipsius sit necessaria sanguinis missio ex sententia

*Seclio ve-
na.* omnium. Si verò alij humores abundauerint, illorū euacuatio per medicamenta purgantia est necessaria. Aliquādo tamen hoc symptoma eget curatione coacta per narcotica, & non per causæ ablationem, si fuerit vehemens, & non expectans propriam curationem, de quibus cap. de colico dolore: quamuis propter ventericuli maximum sensum solet hic

*De vsu nar-
coti-
corum.* sæpe esse fortis. In vsu horum semper sunt consideranda, & mente tenenda, quæ diximus capite de phrenitide, de facultate ægri, & de fermentatione medicamenti narcotici, quia ante sex menses non possumus eo vti. In vehemēti igitur ventericuli dolore accipiat hunc potum: ℞. philonij Romani 3.

*Quæ tu-
tiora sint.* ss. syrupi de absinthio, & aquæ melissæ an. 3. j. misce. Tutior est athanasia, & requies magna: tutiora etiam sunt externa, in primis temperate calida, deinde narcotica regioni ventericuli admota, & mica panis cum cortice papaueris, lacte & croco: vel absinthium cum foliis mandragoræ coctum oleo rosarum, vel menta: & absinthium & folia mandragoræ decocta cum oleo papaueris, addendo parum croci.


*Inflammati-
o.* Inflammatio ventericuli curatur, vt hepatis phlegmone, &

& phrenitis, videlicet primò, victu tenui, & refrigerante: *se-* *tionis cu-*
 cūdo, sanguinis missione ex basilica ad reuellendū, hāc quo- *ratio.*
 que reuulsionē faciunt clysteres, frīctiones, ligaturæ, & fōtus *Victus.*
 extremorum. Tertiò, repellētibus externis, de quibus capite *Reuulsio.*
 de cura phrenitidis, & internis, vt syrupo rosarū, myrtillorū *Repellen-*
 & cydoniorum cum aquis plantaginis, portulacę, lactucę, & *tia exter-*
 similiū sępē sumptis, & omni hora, in æstate, & iuene, actu *na & in-*
 frigidis, in hyeme, & senibus, tepidis. Quartò in augmēto re- *terna.*
 pellentibus, & digerentibus, seu resoluētib; vt syrupo ro- *Indicatio*
 sarū, & de absinthio simul, aut rhodomelle cum decocto hor- *à tempori-*
 dei, & camomillæ: in statu resoluētib; solis, vt syrupo de *bus morbi.*
 absinthio, rhodomelle, & decocto camomillæ. Quintò, in- *Alteratio,*
 temperiem calidam relictam alterātibus, & corroborātibus *& corro-*
 partem affectam, vt syrupo rosarum, & decocto seminis psyl- *boratio.*
 lij, & cidoniorū & similibus. Si verò in suppurationem ter-
 minetur, curatur per ea, quæ diximus in fine cap. 27. de cu-
 ratione pleuritidis.


De imbecillitate ventriculi, & de dolore, & inflammatione eiusdem.

CAPVT XXXI.

Scholium.

 Vanquam quælibet.) Ea quæ auctor docet in hoc capite, *Auctoris*
 vera sunt: solum aduertere oportet eum, & alios errare, cum & aliorū
 scribunt esse mediāmenta totū temperamento roborantia vē- *error.*
 triculum. Solum enim corroboratur cum languidus est medicamentis in-
 temperiem eius oppugnantibus, adstringentibus etiam, quæ densantia i-
 psū virtutem vniunt, & substantiæ dissipationem impediunt.

De singultu. CAP. XXXII.

 Singultus velut quædam ventriculi cōuulsio est, non *Descriptio.*
 tamen vera censetur, cum in musculis nō fiat, quod
 ad conuulsionis essentiam requiritur. Ventrīculus
 vero musculus non est, neque eius hostiolum, vt aperte Ga-
 lenus demonstrat lib. 6. de morbo & symptomate, cap. 2. Vt-
 cunque tamen res habeat, motus est ventriculi, quo ad ex-
 pulsionem rerum molestarum, aut quantitate, aut qualitate
 mouetur. In hoc differt à vomitione, quod (vt ait Galenus)
 per vomitiones ea, quę in spatio continentur, eiiciantur: per
 singultum verò ea, quæ ventriculi corpus impleuerunt. Fit *Causæ.*
 generaliter (vt autor est Hippocrates 6. sect. Aphor. 39.) aut
 a plenitudine, aut inanitione: & præter has causas etiam ab
 hum

DE CVRAND. MORB.

humoribus vellicantibus, & rebus acri facultate præditis: item quoties quispiam affatim deuorauerit calidū aliquod medicamentum, deinde calidam potionem biberit, & ex cruditate etiam præsertim in pueris. Morbus per se patet, causæ partim ex ægri dictis, partim ex his quæ supra cap. de cōuulsione dicta sunt, perspicui poterunt.

Nota.

Curatio.

Si ab intē-

perie nu-

da, per al-

terania

contraria.

Si ab afflu-

tu humo-

ris pituito-

si, per ea

quæ dicta

sunt.

Laus

Rhasæ.

Si ab acri-

monia, &

mordacita-

te.

Vacuatio.

Antece-

dat præpa-

ratio.

Vomitus

utilitas

Alteratio.

Sedantia

singultum.

Singultus, qui ab inanitione fit, rarò curationem suscipit, similis tamē est curationi conuulsionis ex inanitione, de qua cap. 14. dictum est, & hæticæ, de qua capite octauo, secundi libri dicemus. Si à sola intemperie fit, per alterantia contraria curatur, plerunque tamen fit à plenitudine humoris pituitosi, cuius curatio similis omnino est curationi imbecillitatis ventriculi, quæ fit ab humore frigido pituitoso, de qua capite præcedenti abundē diximus. Si vis tamen hunc & alios affectus præter naturam ventriculi rectē curare, lege octauum lib. Galeni de compos. medicamentorum secundum locos, & quintum continentis Rhasis, qui inter Arabes primas tenet: fuit enim vir magnæ experientiæ, & in omnibus Galenum magis, quam alij omnes Arabes amplectitur. Si fiat à rebus acris, & mordacibus, vt à piperibus, præsertim sumpto vino, & aqua calida, super id, vt Gal. docet octauo de compositione secundum locos, & comment. 40. sexti Aphorismorum: tunc necessaria est vacuatio per rhabarbarum & myrobalanos citrinos, cum manna electa, aut cassia fistulari: & si opus fuerit, vbi materia est fixa nimis, & multa, adde drachmas tres, aut quatuor electuarij diaphenicon, præcedenti leui præparatione per syrupum rosatum & acetosum. S. cum decocto hordei. In omni tamen materiali singultu est utilis vomitus, præsertim si materia non fuerit fixa, & non penetrarit tunicas ventriculi. In hac, quæ fit à causa calida, post vacationem electuarium diarhodon Abbatris est optimum, & potus solius aquæ frigidæ: quæ omnem fere singultū curat, aliquem per se, & aliquem per accidens, quemadmodum & animi perturbationes, vt ira, tristitia, timor, & gaudium, si subito acciderint, sternutatio, cohibitus anhelitus, frictions, & vincula extremorū, cucurbitula magna, & similia singultum curant. Si verò fiat ab inflammatione, ipsa curata curabitur & singultus. In antiquo tamen singultu, qui fit a materia frigida, præter ea, quæ dicta sunt capite præcedenti, hoc medicamentum est optimum & expertum: ℞. squinantij, calami aromatici, anisi, marathrij, foliorum mentæ, & absinthij, costi an. ʒ. j. croci, ligni aloes, ambræ, gariophyllorum, aloes Alexandrinæ an. ʒ. j. apij, coriandri

dri præparati, seminis papaueris albi, cassiæ lignæ an. ℥.j. conferuæ aranciorū 3.ij. sacchari. q. s. misce, & fiat confectio, vel in hyeme cum melle, cuius vncia semis cum decocto fœniculi, aut alio simili huic summo mane per aliquot dies curat singultum indubitato. Similiter post vacuationem curatur singultus, si ventriculo admoueatur castoreum cum oleo rosato, aut si accipiat æger 3.ij. seminis rutæ cum paucio vino, aut decocto fœniculi in singultu magno: & ubi alia non contulerint, præsertim cum sit à maximo ventriculi sensu, *Ultimum* 3. s. vsque ad 3. j. philonij Romani cum syrupo papaueris, & *remedium.* aqua absinthij, aut mentæ, est vltimum, & probatum remedium.

De appetentia immodica, quam caninam appellant.

CAPVT XXXIII.

Appetentia immodica, quam caninā appellant, tunc *Descriptio* fit, cum ventriculus ea comedendi rabie vexatur, ut satiari, qui sic affecti sunt, non possint, nec post ingestos ad nauseam vsque cibos: quos cum citra noxam ferre nequeant, eorum plenitudine velut intollerabili quadam sarcina grauati ad vomitum, quod vltimum est remedium, confugiant, ut per eum a tam graui pondere liberentur. Verum cum inexplebilis sit eorum appetitus, denuò ad cibos famelici conuertuntur, & in similem priori necessitatem detrusi, iterum vomere coguntur: quod eo vsque perseverat, donec velut canes (vnde etiam morbo nomen inditum est) in edendo, atque euomendo toti sunt: quo fit, ut quæ dum inchoabat, vomendi erat necessitas, consuetudo inualecente morbo efficiatur. Causæ à Galeno sic breuiter explican- *Causa.* tur quarto de morbo & symptomate, cap. 7. Caninæ igitur appetentiæ causa vna est acidorum humorum vitium, altera vero (ut dictum est) plurima totius corporis inanitio, siue ipsa caloris vim, siue retentricis facultatis imbecillitatem sequatur. Porro acidorū humorum vitium erosionem, *Nota.* quæ suctioni proportionem respondet, inducit, appetentiāque (ut inquit Gal.) haud aliter quàm naturale pathemā excitat. Cognoscitur eorum, quæ ingesta fuerunt, deiectione, si multa simul & liquida fuerit, & ructu insuper acorem referente, corporis verò inanitio, quæ (ut inquit Aetius) ob plurimi caloris vehementiam fit, qui instar igni cibos consumit, cutem rarefacit, & exhalationem mouet, sic deprehenditur, ven

DE CVRAND. MORB.

ventris egestionem lōgē pauciores prodūt, quam pro eorum, quæ ingeruntur, modo, & proportionē: & stercus insuper quod egeritur, siccius est. Quod si propter retentricis facultatis imbecillitatem, quæ cibis dominari nō potest, corporis facta sit dissipatio: tunc multus est deiectionum prouentus.

Curatio.

Si fiat hęc immodica appetentia ab inanitione, vt in conualescētibus, curatur cibo boni succi, facili concoctu, & sepe sumpto, non tamen multo. Alimenta pingua semper laxant ventriculum, excitāt nauseam, & appetitum deiiciunt, quā-

Ab imbecillitate.

uis sint difficilia concoctu. Si fiat à vētriculi imbecillitate, illa semota cessabit affectus. Si à iecoris calore, similiter sublata causa tolletur & effectus. Si à vermibus, ipsis eductis sanabitur, vt cuidam puellæ contigit, quæ fame canina laborans à verme duodecim cubitorum sanitati restituta fuit,

A calore hepatis.

verme illo magno purgato. Si ob succum melancholicum à liene ad ventriculi os largius transmissum fiat, vt Arabibus placet, quod non repugnat Galeno volēti retentricem facultatem, corroborari melancholia, cū per accidens ipsa con-

A vermibus.

trahendo, & comprimēdo inanitionem faciat, & appetitum

Historiæ.

augeat: ideoque melancholica alimenta augent appetitum præcipuē sale condita, horum tamen omnium curatio suis locis referēda est. Si à pituita immodica, frigida, acida, os vē-

A succo melancholico.

triculi infestāte, a qua sæpius fit, curatur quinque remedio-

A pituita acida.

rum generibus, primò, victu calido, & sicco communi omnibus pituitosis affectibus, demptis acribus, vt sunt cape, alia, porra, sinapi, & acida, quæ excitant appetentiam, & ob id nocent huic affectui: quanquam aliis pituitosis affectibus sint salubria, quia incidunt, tenuant, & tergunt pituitam: menta tamen, & saluia, petroselinum, fœniculus, cicera, & similia sunt salutaria cocta cum carne arietina, aut hœdina. Potus sit vinum vetus mediocriter dilutum, vel aqua decoctionis fœniculi.

Præparatio.

Secundò, apparantibus materiam hanc medicamētis iam sæpe dictis, præsertim primo capite, & 31. de curatione imbecillitatis ventriculi. vnum tamē iterum scire oportet, syrup. acidus non conuenire huic affectui, vt est oxymel. S. & compositum, & similia: ne excitent appetentiam, nisi pauca quantitas ipsorum sumatur, & sint aliis mixta.

Observatio.

Purgatio Diaphenicon quale fit.

Tertiò, vacuantibus materiam pituitosam, medicamētis frequēter dictis præsertim 1. cap. & 31. huius libri. Inter composita tamen diaphenicon est vtile, & quantitate 3. iij. vsque ad 3. vj. quia eius vis non transit hepar, & purgat materiam mixtam ventriculi.

Quart

Quartò, resoluentibus reliquias materiei medicamentis *Resoluta*
 sæpe descriptis, maxime cap. 31. quarto genere remediorum:
 vt theriaca magna, mithridato, diagalanga, electuario rosa- *Sumenda.*
 tæ nouellæ, & aromatico rosato, cum aqua aut decocto fœ-
 niculi, aut anisi, aut petroselini, & similium. Vinum quoque *Vini gene-*
 generosum post cibos pingues, & oleaginosos statim famem *rosi facul-*
 caninam sedat, autore Gal. comment. 21. secundi aphor. non *tas.*
 tamē eam, quæ sit ex longa inedia, vel alui profluuiio, aut flu-
 xu sanguinis, aut aliqua alia vacuatione. Nam qui huiusmo-
 di aliqua causa esuriunt, plurimum offenduntur vini potu,
 in eo comment. Galenus distinguit bulimon à fame canina.

Quintò, prosternentibus appetitum, & laxantibus ven- *Appetitus*
 triculum, qualia sunt cibaria & iura omnia pinguis, vt ori- *ablatio.*
 za cocta cum pinguibus rebus, & hoc medicamentum, aut
 huic simile: ℞. decocti maluarum, & seminis lini. an. ʒ. iij. o- *Ab intem-*
 lei sesamini, & butyri recentis an. ʒ. j. misce, & fiat potus. Si *perie cali-*
 ab intemperie calida ventriculi fames canina oriatur, (quæ *da.*
 autore Galeno 4. de symptomatum causis appetentiam pro-
 sternit per accidens, meo quidem iudicio quemadmodum *Victus.*
 & fames augetur à frigore per accidens) curatur alimentis
 coctu difficilibus, vt sunt castanæ, caro bubula, suilla, panis
 azimus, & similia.

De appetentia immodica, quam caninam appellant. CAP. XXXIII.

Scholium.




Appetentia immodica.) Calidum innatum perpetuè dissi- *Nutritio-*
 pat substantiam triplicem corporis, solidam, humidam, & spi- *nis neceffi-*
 rituosam, insensibiliter tamen per occulta cutis spiramenta: *tas.*
 inleque orta est nutritionis necessitas, nisi enim loco substantiæ dissipa-
 tæ, altera substitueretur similis, breui animalia perirent: propterea na-
 tura indidit animalibus, appetitum alimentum, aut suæ conseruationis, quod
 idē est, qui appetitus fames dicitur, hæc duplex est, vna naturalis, omni- *Fames dis-*
 bus corporis partibus cōmunis, qua alimentum appetunt nullo precedente *plex.*
 sensu rei deficientis, eo enim non eguerunt, quia alimēto coniunctæ sunt,
 sicut & plantæ cum quibus hoc appetitum communicant. Est fames alte- *Fames a-*
 ra, quæ dicitur animalis, eo quod fiat cum sensu, est enim appetentia a- *imalis.*
 limenti, quæ suctionis sensum sequitur, hanc solum in orificio ventriculi
 sentimus, ob multos & magnos nervos ibi disseminatos. Quæ sit eo mo- *Vallesii,*
 do, quo docet Gal. lib. 2. de causis simp. partibus circa cutem attrahenti- *ualleriolæ,*
 bus ex vicinis, & his ex aliis, quod ad vsque suctio perueniat ad orifi- *& aliorū*
 cium ventriculi & in eo molestiam inducat. Inde colliges errorem *Val-*
error.

les

DE CVRAND. MORB.

lesu, Valleriola, et aliorum sententium melancholiam ex liene ad ven-
 Fames ex trem expurgari, vt excitaret famem. Hæc enim non erit secundum natu-
 melanco- ram, cum à partium suctione non fiat, imò erit canina, cum melancholia
 lia non est perpetuò in illis renis contenta sensum suctionis faceret. Appetentia a-
 naturalis. nimalis necessaria est animalibus, vt excitet ipsa ad quærendū alimen-
 Appetentia tum, quoniam ipsis non est coniunctum. Neque hæc appetentia est fa-
 non est fa- cultas, vt male aliqui existimarunt, sed finis naturalium facultatum
 cultas. mouens eas ad agendum, & potissimum attractricem, & proinde ad i-
 ipsam refertur, quia ita ei adhæret, vt pro modo appetentiæ attrahat ven-
 triculus. In hac appetentia tria sunt symptomata, cum nō fit, cum imbe-
 Sympto- cilliter fit, & cum male fit. Rursus appetentiæ, quæ male fit, quæ depræ-
 mata in uatam appellamus, duplex est: vna ratione motus, quæ canina dicitur,
 appetitus. in qua immodice appetimus alimenta. Altera in qua alimenta prauæ
 qualitatis appetuntur, per prauam qualitatem aliena alimenta, & ea,
 quæ non sunt alimenta (qualia sunt testæ, & carbones) intelligentes.
 Caninæ ap Hoc capite auctor solum agit de canina appetentiæ. Hæc à duabus cau-
 petentiæ sis ortum habet, prima est frigiditas orificiū ventriculi, quæ vel est nuda,
 causæ. cuius meminit Gal. 2. aph. com. 21. vel cū humore acido, de qua loquitur
 Duo aduer eodē loco, & 2. de causis symp. Secunda causa est immodica corporis dis-
 tenda. sipatio. Curationem lege apud auctorem. Solum aduerte duo, primum
 est, famem caninam ab intemperie frigida nuda factam, curari calidis,
 vt potu vini, dummodo non sit austerum. Secundum, famem caninam cu-
 rari pinguibus, quoniam hæc dissoluendo ventriculum auferunt sensum
 suctioni similem.

De cibi fastidio. CAP. XXXIIII.

Cur appe- ppetentiam nobis omnibus prouida natura indi-
 tentia est dit ne eius, sine quo constare animantium vita non
 necessari. potest, per negligentiam obliuisceremur, ea in hūc
 modū fit. Cum quodlibet animal in ambientem aerem per
 cutem dissipetur, principio partes cuti subditæ inanes red-
 duntur, hæc verò, quia talis est natiua earum facultas, à vici-
 nis partibus ad se alliciunt alimentum, vt id quod fuit exi-
 nanitum, repleatur: mox illæ rursus ex sibi vicinis, atque eo-
 dem modo aliæ ex aliis sibi proximis, donec ad ventriculum
 deuentum sit: & ab ipso suction fiat, reliquis omnibus parti-
 bus ante ipsum per eam suctionē iam euacuatis. Quam qui-
 dem suctionem cum venter ferre non possit, sed inde veluti
 diuellatur, huiusmodi molestiæ remedium cibum exquirat:
 Quis fa- atque inde tum fames, tum appetentia nascuntur. Est enim
 mes. fames suctionis sensus, appetentia verò implēdi desiderium,
 vt copiosius Galenus docet lib. 4. de causis sympt. cap. 7. Por-
 rō cum trifariam appetentia lædatur, perinde ac omnes cor-
 por

poris functiones: vnus læsionis eius modus est, cùm animal nihil appetit: cõtraria sanè canino appetitui affectio, anorexia Græcis, Latinis appetentię amissio, aut abolita appetentia, nobis verò cibi fastidium appellata. Hæc fit (vt loco citato ait Galenus) vel quia suctionis sensus perit, vel quia suction non fit, vel quia corpus non inanitur. Præter has causas etiam alias recēset Aetius lib. 9. cap. 21. in hunc modum. Cõtingit autem sæpe ob immoderatam vëtris, & intestinorum fluxionem, & ob biliosum humorem in ventrem delatum, tenacis & acris, ac porri speciem referentem, & ob phar-maci potionem, & sanguinis immoderatam detractionem, & in continuis ac vehementibus febribus, stomachi, ac ventris inflammationē, item hepatis, vesicæ, ac vuluæ. Contingit etiam in cholica & voluulosa affectione. Maxima autē, quod quis non esuriam, causa, caliditas existit: quæ solida corpora laxando dissoluit, & ad attractionem imbecilliora reddit: humida autem diffundit, atque amplius extendit. A pluribus etiā aliis causis appetitus perit, quas facile quiuus inueniet. Notæ, cùm a fluxu ventris hæc passio fit, manifestæ sunt. Si a biliosis humoribus, ventriculi morsus adest, nausæaque, & sitis vehemens: si ab humoribus putridis, etiam interdum febris adest: at quibus crassi, lentique humores fastidium cibi pariunt, ij nec rosionem ventriculi, nec sitim patiuntur. Cõmuniter autem omnibus superuenit nausea. Indicia verò, quibus calida intēperies dignoscatur, quæ huic morbo occasionem præbuit, sæpè in aliis capitibus dicta sunt.

In omni tamen cibi fastidio nocēt pingua, & oleaginea, & crocus, cum ipsis augent appetitum, odorifera omnia alimēta, præsertim si habuerint naturam contrariam causæ, acria etiam, vt cepe, allia, porrum, piper, sinapi, cinnamomū, gariophyllus, nux muscata, & similia: pari modo stiptica omnia vt menta, absinthium, pyra, cydonia. Acida quoque omnia, vt acetosa, agresta, acetum, succi granatorum, citri, limonum, & aranciorum. Salita omnia quoque mouent appetitum, vt caseus, oliuæ, capparis, caro suilla, & similia. Seruetur tamen modus præscriptus 9. cap. huius lib. obseruata semper natura infirmi. Nam sunt inimicitia quædam inter nonnulla alimēta, & singularem hominem: quemadmodum & esse potest amicitia magna, & familiaritas, quæ solo experimento cognoscenda est. Deinde materia est præparanda, si calida fuerit & biliosa per syrupum acetosum S. & rosarum, cum decocto hordei: si frigida per rhodomel, & oxymel. S. & calida per syr. de absinthio, de menta, cum decocto fœniculi, & si frigida.

mil

DE CVRAND. MORB.

- Purgatio calida.* milibus, de quibus 1. cap. Deinde vacuanda est materia calida, rhabarbaro, myrobalanis citrinis, hiera. S. & non medicamentis, quæ attrahunt ab aliis partibus ad ventriculum: vt ℞. rhabarbari optimi infusi per noctem in aqua endiuizæ cum paucis vino albo, & corticum myrobalanorum citrinorum an. ʒ. j. pulueris hiera. S. ʒ. ij. syr. violarum ʒ. j. aquæ buglossæ q. s. misce, & fiat potus: aut ℞. pilularum de hiera. S. & rhabarbari electi an. ʒ. ss. cum syr. rosarum Alexandrinarum
- Purgatio frigida.* fiant pilulæ vij. & aurentur, si non est pauper. Si materia fuerit pituitosa, vacuanda est agarico trochiscato cū hiera simplici, & myrobalanis chebulis: vt ℞. agarici trochiscati, & corticum myrobalanorum chebulorum an. ʒ. j. pulueris hiera. S. ʒ. j. ss. rhodomellis ʒ. j. aquæ fœniculi ʒ. ij. misce, & fiat potus. Si materia mixtam habuerit pituitam, & bilem ʒ. iij. diaphænicon vacuanda est, aut ʒ. j. pilularum aggregatiuarum. Postremò, curatur resoluentibus, & corroborantibus
- Materia mixta. Resolutio, & corroboratio.* ventriculum, vt in causa calida puluere diarhodon Abbatis quolibet die sumpto quantitate ʒ. ss. vsque ad ʒ. j. cum ʒ. j. syr. rosarum. In frigida, syrupo de absinthio cū aqua hordei cum cortice, mastiche, interius & exterius, & similibus, vt carne cydoniorū in calida cum saccharo condita, & in frigida cum melle, in qua electuarium rosatæ nouellæ, & magis puluis cōducit, & aromaticum rosatum cum aqua aut decocto absinthij, mentæ, alia simili. Theriaca magna, mithridatum, aut diamusculus dulcis, aut diambra resoluunt, & corroborant ventriculum, si sæpe magnitudine drachmæ vnus capiantur cum liquore aliquo calido, vt est decoctum cinamomi, corticis citri, coriandri, fœniculi, anisi, & similibus. Hoc ventriculo admotum tam posteriori parte, quam anteriori resoluit, & corroborat: ℞. emplastri stomatichonis partes duas, mastichis partem vnā, extēdatur super alutam ad formam scuti: aut ℞. olei nardini, absinthij, & de lilio ana ʒ. j. pulueris rosatæ nouellæ, cinamomi, gariophyllorum, mentæ, & corticis citri an. ʒ. ss. ceræ. q. s. misce, & fiat vnguentum, quod mane, & vespere ante cœnam actu calidum ventriculo admoueat.
- Emplastrum.*
- Vnguentum.*

De cibi fastidio. CAP. XXXIIII.

Scholium.

Auctoris lapsus.

¶ Ppetentiam nobis.) In hoc capite solum aduerte, non recte auctorem inappetentiam a causa frigida fieri scripsisse, hæc enim potius appetitum inducit, comprimendo orificium ventriculi, & hac ratione sensum suctioni similem efficiendo.

De

Quam barbari cholicam, & cholicam passionem appellant, hanc tum Græci, tum etiam Latini choleram dicunt, quæ (autore Paulo lib. 3. cap. 39.) immoderata est ventris perturbatio, quæ multo bilis fluxu, & *Descriptio.* supernè per vomitum, & infernè per alui deiectiones fit. Contingit ob multam cruditatem, quæ nonnunquam prauorum admodum alimentorum (vt docet Gal. 2. de alimentorum facultatibus, capite de peponibus, & libello de cibis boni & *Causæ.* mali succi, vbi ex boletis, inquit, non benè coctis cholera excitatur) interdum verò vitiosorum succorum culpa oritur. Malum sicprehenditur, per superiora, & inferiora excretio fit. Vtroque enim ostiolo ad expulsionem ventriculus *Note.* vitur, & eò, quòd ad gulam superius, & eò, quòd ad pylorum, id est, ianitorem, vt testatur Gal. 6. de morbo & sympto mate, cap. 2. Sitiunt præterea qui hoc morbo laborant, & copioso sudore madent, pulsùmque habent concisum, & in musculis manuum ac pedum, maximèque surarum contractionem, ac tensionem quandã sentiunt. Quæ per vomitum redduntur, aut acescunt, aut amara planè sunt. Deiectiones vel pituitosæ, vel melancholicæ, vel biliosæ, nonnunquam etiam carniū recenter cæsarum lotioni simillimæ excernuntur. Facies sæpenumero, qualem Hippo. describit 1. Prognostic. Conspicitur & color non dissimilis ei, qui in iam iam morituris cernitur, nec in numero. Frequenter enim hanc affectionem mors insequitur, nisi celeriter medicus opem tulerit: denique & in ventriculo, & intestinis summus adest dolor, angustia, & vellicatio.

Primò, victus debita ratio instituenda est, parum frigida. *Curatio.* Calor enim humores mouet, & frigus si immodicū sit (quā- *Victus.* uis immobiles ipsos efficiat, spiritum & calorem natium resolui prohibeat) nocet, humores ipsos subito ad intestina reuocans. Alimenta sint boni succi, & facilia concoctu, parū & sæpè sumpta, præsertim deficientibus viribus. Nam sæpius utilis est abstinencia, vt reddantur cæteræ partes quasi auaræ. Ius ergo ex gallina tenera, & perdicibus, ex animalium quæ bonum succum gignunt, extremitatibus est bonum, melior succus eorum, & optima aqua per distillationem expressa, præsertim si parum aquæ rosarum, aut florum myrtillorum, aut malorum cydoniorum misceatur cū cinamomo, antequam fiat aqua. Si fuerit ciborum magnum *In causâ.* fastidium, vua pensilis erit utilis, oua sorbilia, testiculi gal-*frigida.*
lor

DE CVRAND. MORB.

lorum, & hepata gallinarum sunt salutaria, & alia dicta cap. superiori. Potus in causa frigida sit vinum generosum aqua dilutam, seruata consuetudine ægri, aut aqua cinnamomi, *In calida.* aut seminis fœniculi. In calida verò aqua hordei, aut aqua decoctionis coriandri præparati, aut vinum granatorum. Animi perturbationes maxime nocent, præsertim quæ ad *Vomitus.* interiora reuocant, vt timor & tristitia.

Secundo, si materia & causa fuerit in ventriculo, vomitu curatur aqua tepida cum paucò aceto & saccharo, aut deco- *Prepara-*cto seminis raphani cū syrupo acetoso. S. Si verò fuerit mul- *tin.* ta materia, & aliunde venerit ad ventriculum & intestina, apparatus syr. rosarum, syrupo de agresta, oxysacchara. S. syrupo de endiuia. S. & similibus, cum aquis rosarum, plantaginibus, portulacæ, & aliis eiusdem naturæ.

Purgatio Tercio, vacuantibus cum corroboratione, vt rhabarbaro, *ma-riæ pi* myrobalanis citrinis, & chebulis, si fuerit materia pituitosa: *tuiofæ.* vt ℞. rhabarbari electi parū tosti ʒ. j. corticū myrobalanorū citrinorum parum tostorū ʒ. iij. syr. rosarū ʒ. j. aquæ portulacæ ʒ. ij. misce, & fiat potus. In repletionem tamen ex cru- *Si repleti-* ditate sola hiera. S. bene purgat, aut ʒ. j. pilularum stomachi- *fit ex cru-* carum, aut ʒ. j. agarici trochiscati, aut ʒ. iij. diaphænicon. *aitate.*

Error in- Amatus Lusitanus centuria 2. curatione 44. & alij iunio- *norum me-* res ante ipsum male rhabarbarum assatum, & myrobalanos *dicorū su-* in hoc, & in aliis ventris profluuiis damnant, cum hæc du- *per assatio* plicem habeant substantiam, vnā tenuem, igneam, & æ- *ne rhabar-* ream, alteram verò terrestrem, crassam, & adstringentē. Pri- *bari.* ma purgans, mundificans, & abstergens per modicam assa- tionem, & torrefactionem amittitur, crassa verò, & astrin- gens sola summe necessaria est, quando materiam & causam profluuij cum corroboratione & astrictione, & absque acrimonia clementissime educere volumus. Credunt iuniores

Reuulsio medici idem esse assationem, adustionem, incinerationem, *& resolu-* & calcinationem, quod falsum est. *tio.*

Corrobor- Quarto, reuellentibus, & trahentibus ad cutem: vt bal- *tio.* neo, quo raro est vtendum propter facultatis imbecillita- *Sumenda.* tem, frictionibus, & ligaturis extremorum, & cucurbitulis.

Potus a- Quinto, roborantibus ventriculum, & intestina, & pro- *quæ tepide* hibentibus motum humorum, & symptomata quædam, vt potu solius aquæ rosatæ tepidæ, quantitate viciarum quatuor, maxime cum sit a sola bile: est a me expertū remedium, & laudatum a grauissimis medicis ℞. ʒ. j. pulueris diarrhodon Abbatris, cū ʒ. j. syr. de agresta, aut alio simili, est in hoc genere optimum remedium. Similiter rob. de agresta, de cydon


doniis, miua cydoniorum non aromatizata, nisi causa cholerae esset cruditas, tunc enim aromatizata esse debet: & syrupus de menta, de absinthio, puluis rosatae nouellae, & electuarium eiusdem, puluis seu electuariū aromaticum rosatum Gabrielis, & similia calida medicamenta stomachica interna, & externa, de quibus cap. 31. de imbecillitate ventriculi abunde dictum est. Hæc quoque mixtura est optima in hoc genere, in calida causa & venenosa: ℞. conseruæ rosarū antiquæ ʒ. iij. conseruæ acetosæ ʒ. j. coralli rubri præparati, & boli Armenici præparati an. ʒ. j. margaritarum electarum, pulueris crystalli præparati an. ʒ. j. sacchari optimi. q. s. misce, & fiat conditum auro coopertum. *Conditum* Dosis est cochlearium vnum mane, & quacunque hora cum aqua acetosæ, aut portulacæ, aut calibeata aqua. Ventriculo, & toti etiam ventri, *Admouenda* admouenda sunt astringentia, & corroborantia, vt oleum da. mastichinum, rosatum, myrtillorum, cydoniorū, nardinum, de absinthio cum pulueribus astringentibus: vnguenta ex *Vnguenta* iis fieri possunt: vt ℞. olei de absinthio, myrtillorum, & cydoniorum an. ʒ. j. pulueris mastichis, thuris, trochiscorum de spodio an. ʒ. j. ceræ. q. s. misce, & fiat vnguentū: aut ℞. farinæ hordei lib. j. pulueris spodij ʒ. iij. albuminum ouorū numero iij. succi plantaginis, aut bursæ pastoris, aut caudæ c- *Cataplasma* quinx quod. s. misce, & fiat cataplasma: adde parum aceti calibeati, & semel in die ventri admoveatur actu frigidum, vel parum calidum: aut ℞. micæ panis tosti. p. j. carnis cydoniorum melle coditæ ʒ. ij. mēte, absinthij an. m. j. vini rubri, aut aceti calibeati, si est causa vehementer calida, quod. s. misce, & fiat cataplasma: adde pulueris gariophyllorum, cinnamomi, ligni aloes, mastichis, spicæ an. ʒ. ij. Magna cucurbitula *Cucurbitula* vetriculo & vmbilico adnota detinet vomitum, & deiectionem. Multi in hoc genere remediorum laudant aquæ frigida subitam irrorationem supra crura, & pedes, & testes: sed *deiectionem* hoc faciendum in ægro robusto. Aliquando necessaria sunt *cohibet* narcotica, vt requies magna, micleta, athanasia, & alia valentiora, vbi alia non prosunt, seruatis iis, quæ diximus superius capite de phrenitide, & capite de sanguinis profluvio è naribus, & quæ dicuntur capite de ventris profluvio sequenti. Si adlit initium vlcerationum intestinorum, curabitur per ea, quæ dicemus cap. 38. de curatione dysenteria.

De cholera. CAP. XXXV.

Scholium.

n 2 Quum

DE CVRAND. MORB.

Cholera morbus.  Vam barbari cholericam.) Cholera est v̄eris perturbatio, quæ rem molestante superne per os, & inferne per anum expellit. Vnde pars affecta erit ventriculus, vt ex 3. de caus. symp. cap. 2. colligimus: ita vt in eo facultas expultrix irritata immodice moueatur. Neque video qua ratione adductus Valles. 5. lib. epy. com. 10. hoc symptoma etiam ad retentricem ventriculi referat, cum fiat ab irritatione, & veteres in eius definitione solius excretrici facultatis meminerint: Præterea ex definitione prædicta colliges, de essentia cholerae esse euacuationem, sic Eurychides lib. 5. epy. sent. 75. in principio sit de essentia morbi vomitu affectus, & non deiectione, cholera non laborabat: nisi in sua cholera quarto die, in quo non solum vomuit, sed & per anum deiecit. Quod si ante deiectionem cholera vocatum morbum habuisse scriptum sit, in illa sententia, dicendum est, librum non esse Hippocr. Et quamuis vtraque euacuationes proprie cholerae conveniant, aliquando tamen post dictas euacuationes solet vomitus cessare ob imbecillitatem facultatis expultriciæ, quo tempore hunc affectum cholera esse non possumus negare, sicut neque quando declinante affectu, vomitus cessat. Causa cholerae in genere est quicquid totum ventriculum molestat: hoc autem ex omnium medicorum sententia vel est alimentum corruptum, vel bilis acris à venis expulsa ad ventriculum. ¶ Ego tamen existimo cholera morbum semper fieri ab una causa, nempe a fluxione humoris biliosi, & acris à toto corpore ad ventrem: quod confirmo, primum ex nomine, nam idem hic affectus cholera dicitur, quia in eo cholera, id est bilis euacuatur: secundo ex Gal. 3. de nat. fac. cap. 13. ubi in choleris per venas, quæ ad intestinum & ventrem pertinent, totum corpus euacuari scribit: Tertiò ex imbecillitate, quæ in choleris in toto corpore sentitur, quæ non sequitur ad solam humoris corrupti in ventriculo euacuationem. Dices, nonne Gal. lib. 2. de alim. fac. cap. de peponibus, ex vitioso succo ex peponibus genito cholera morbum fieri dicit? Respondeo, eo loco Gal. vitiosum succum non in ventriculo, sed in venis coactum cholera efficere nos docuisse: quod si aliquando corruptum cibum cholera causam statuat, intelligendum est, illum irritando id efficere, quod manifeste colliges ex lib. 4. de rat. vic. in morbis acutis com. 103. ubi sic habet. Nempe ea choleraceorum eduliorum communis est malitia, cum & humida & acris fuerint. Talia siquidem similiter corrumpunt, suæque acrimoniae rasorum eorum, quæ ad ventrem decumbunt, ora remordent, atque fluxionum earum, quæ ex toto corpore in eum fiunt, causa efficiuntur: Hæc Gal. Ex quibus videatur Valles. qua ratione possit fieri cholera ex redundantia immodica, vt ipse scribit: hoc in loco aduerte, ea quæ superius diximus de cholera simpliciter dicta, intelligi, nam est altera, cuius meminit Hip. 4. de ratio. vict. in acut. sent. 104. quæ cholera sicca appellatur, quæ Valles. 7. epyd. com. 81. sicam appellari sentit, quia in ea non excretritur humor, sed quia habet solam irritationem ad euacuationes, quæ per os, & anum fiunt: existim

stimat enim cholera siccam & humidam nasci ab eisdem causis et ratione, qua nausea & vomitus. Cuius viri sententia, quam falsa sit intelliges ex com. supradictæ sententiæ, in quo Galenus cholera siccam appellat eam, in qua non humor, sed status acrimoniæ habens per os, & aluum emittitur, qua ratione Hippocrati hydropem tympanicam, hydropem siccam appellare solet, quia ab spiritu fit. Ex supradictis intelliges etiam, quam male auctor inter signa cholera simpliciter dictæ deiectiones pituitosas, aut melancholicas, enumeret.

Primo, victus debita ratio.) Qui in cholera statim in principio victum adstringentem imperant, detento humore acris, mortis sunt auctores. Oportet ergo in principio istius affectus victu refrigerante uti, quia, ut diximus, cholera à causa calida ortum habet, & ita multoties curant cholera potu solo aquæ niue refrigeratæ. Quod si alimentis utamur temperatis, erunt alteranda rebus frigidis. Cessante autem vomitu, & remissa molestia, aut quando iam alimentum incipit delueri, tunc adstringentibus, quæ roborare possunt ventriculum, utimur: aut, si his nolumus uti (quod melius erit) sufficere sola victus ratio censens. Ea alimenta quæ in causa frigida ab auctore conceduntur, omittenda sunt, quia cholera à frigida causa non fit.

Tertio, vacuantibus.) Si natura recte humorem ex ventre eua- Eua-
cuet, nil oportet nos mouere. Si euacuet, sed aliquantulum diminuat (quod in cholera,
ex molestia colliges) tunc vomitoris ab auctore paulo superius descri-
ptis utere: poteris tamen uti eo, quod paratur ex aqua tepida decoctio-
nis hordei cum coriice, aceto, & pauco saccharo, hoc enim vomitum mo-
uet, & simul extergit, & retundit acrimoniæ humoris. Quod si natu-
ra ita diminuit irritantem humorem expellat, ut ex eius e-
p-
p-
tas, & extremorum frigiditas sequamur, tunc cum hoc medicamento e-
ducemus: ℞. castia præparata ʒ. vi. pulueris hier. e. pieræ ʒ. iiii. decocti
hordei cum coriice. q. s. misce, & fiat potio: quam qualibet hora diei assu-
mere poterit. Qua in parte errat auctor, & cum eo Vallesius, purgan-
tes humorem, & simul corroborantes ventrem: cum solum inueniamus
illum tam molestum educere humorem, post cuius purgationem, si eua-
cuatio remittat, oportune roborantibus utimur.

Quinto, roborantibus ventrem.) Hoc in loco remedia tantum Que robo-
sunt ea, quæ frigida cum sint, contrahendo roborant ventrem. Id, quod tenet ven-
auctor dicit de medicamentis calidis cholera ex cruditate curantibus, tem.
falsum est, cum ex humore senicocto non fiat cholera. Condiuum etiam Auctoris
autem cooperitum omittatur, quia præter expensam, non est gratum. Pre-
lapsus, terea ea omnia, quæ docet facienda, ut vomitum compescamus, inutilia
sunt: quia si vomitus multus est, & nos humorem ita prauum violenter
deinamur, certam inducimus mortem.

De Diarrhæa. CAP. XXXVI.

DE CVRAND. MORB.

Descriptio. **D**iarrhæam Barbari corrupto vocabulo diarriam appellant. Est autem ac si diceret simpliciter alui profluuium, cum sine exulceratione & inflammatione sit. Cuius variae sunt species ac differentiae, quas sigillatim recensēbimus causas simul ac notas cuiusque breui perstringentes. Alui ergo profluuium seu a toto corpore, seu ab aliqua eius parte oriatur, aliquādo quidem sit natura per indicationes (quas crises appellant) humores inutiles expellente: aliquando vero vi symptomatum. Magnopere tamen diiudicari oportet, an hoc vel illo modo alui fluor cōtingat. Si enim crisi naturę fiat, curatione non indiget iuxta Hippocratis præceptum aphorismo vigesimo sectionis primę, quæ iudicantur, & iudicata sunt integrę, neque nouare aliquid siue medicamentis, siue aliter irritando, sed sinere oportet. Porro num per naturę crises sequutus sit alui fluor, consulere oportet ea, quæ ab Hippocr. dicta sunt lib. 2. prognosticorum prognostico 14. & a Gal. ibidem in commentario, & lib. 3. de crilibus: maximum tamen signum est, si confert, & ægri tolerant. Quod si symptomaticum fuerit, & non a natura vincente factum, curationem requirit, & de huiusmodi alui profluuiio hoc loco agitur: cuius vna differētia est, quoties ab hepate nascitur ob multitudinem bilis ad aluum defluentis, quæ irritat ad excretionem, vnde ventriculus & intestina, non expectata in totum concoctione, chylosam substantiam expellunt, & huius alui profluuij meminit Galen. aphoris. 20. sectionis secundæ. Deprehenditur, quia in deiectionibus cōmixtus bilioso humori chylus apparet, & quia iuuenibus temperamento biliosis accidit, & æstiuo tempore, & noctu magis, & citissimē in dysenteriam degenerat. Prouenit etiam nonnunquam obturatis mesenterij venis, quibus hepar velut manibus vtitur, dum alimentum ad se trahit. Notæ sunt, quod in deiectionibus nihil præter chylū cernitur, & in dextro hypochondrio grauitas quædam sentitur, & anteaacta vita, quæ humores crassos generaret, extitit: verum animaduerrere oportet, sæpē prædictas venas obturari propter abscessum aliquem in ipsis existentem: quod cognoscitur, quia febris adest, calor, ac dolor dextri hypochondrij: lienis quoque vitio accidit, quod sic dignoscitur, egestionem nigræ sunt, sinistrum hypochondrium dolet, adest in eo grauitas & cætera melancholiæ signa cernuntur, iam & ventriculus huius mali origo est, vel quia eius expultrix facultas fortior est, vel quia retentrix imbecillior, vel quia intemperie aliqua laborat, & concoquere cibos non potest.

Confid

Consideranda verò sunt ad id deprehendendum, quæ supra de ventriculi affectionibus sunt dicta, & quod cibus semicocius protruditur, & in ventriculo dolor, & grauitas sentiuntur. Multis à capite alui profluuium prouenit: cognoscitur *Ex capite.* verò, quia distillatione aliqui laborant, & dolor, & grauitas capitis præcesserunt: & quod ea quæ deliciuntur, spumosa sunt iuxta Hippocr. septima sectione, aphor. 29. sunt & aliæ differentia, quæ a nobis prætermittuntur, quod illorum in aliis capitibus mentio fiat.

Diarrhæa curatur primò, victu refrigerante, & astringen- *Curatio.* te, vt acere arte parato, aceto, aqua rosarū, & similibus: quem, *Victus.* si epidemialis fuerit (vt anno 1450. Ferrariæ omnibus ferme hominibus accidit) omnino oportet relinquere, & saluber-
rimum quærere, si fieri tamen non possit, considera quæ dicentur cap. 9. secundi libri, semper tamen necessaria sunt, quæ simul restringunt, & veneno resistunt.

Cibus, sit paucus, & parum nutriendus, præsertim initio, & *Cibus.* facilis concoctu, vt reliquæ corporis partes quasi auarè red-
dantur, propriūque retineant alimentum. Tunc enim pyra, & cydonea tosta satis nutrent, aut ius pulli gallinacei aqua calybeata factum, & eius caro tosta. Vbi diuturna fue-
rit diarrhæa, aut facultas imbecilla, nutriatur hepate galli- *In diuturna.* næ, ouis sorbilibus, testibus pullorum gallinaceorum, succo *na.* carnis gallinæ aut perdicis, aut arietis, iure pedum arietino-
rum, suillorum, & similibus, amido, aut oriza assata, aut pane bis cocto, & cum iure optimi nutrimenti & aqua calybeata facto: perdix tã assata, quam elixa restringit. Si facultas fue- *perdix sim*
rit admodū imbecilla, nutriatur aqua carniū gallinæ, per- *per restrin-*
dicis, & arietis, quæ sit per distillationem, vase vitreo apposi- *git.*
to supra aliud vas semiplenum aqua effervescente, miscendo ante illius distillationem aquam malorum cydoneorū, aut *Noxia &*
myrtillorum, semper tamen ante cibum comedat ossam pa- *uilia.*
rum assatam immersam mīna cydoneorum, aut rob cydo- *Admoni-*
neorum, aut de agresta. Acrīa omnia nocent, quemadmo- *tio.*
dum glutinosa, & astringentia iuuant. Toties & tantum cibi sumendum, quoties, & quantum consueuerat capere licet parum & sepe sint alendi, qui facultatē habent imbecillam. Potus sit aqua chalybeata, aut pluuiālis, si tamen fuerit ven- *Potus.* triculo imbecillo, aut si solitus vinum bibere, sit rubrū & a-
stringens, quale est Saguntinū, bene aqua chalybeata dilutū. Tandem quiete animi & corporis vtatur, & somno magis, *Si sit ab*
quam vigilia. Quando ventris profluuiū sit a medicamento hyperca-
immodicè purgante, acrimonia obtunditur quatuor, aut *charsi.*

DE CVRAND. MORB.

sex vnciis aquæ calidæ, aut decocti hordei cum ʒ. j. sacchari, vel hoc potu: ʒ. mucaginis feminis psyllij, & cydoneorum an. ʒ. ij. decocti hordei ʒ. ij. misce. Hæc tamen immodica purgatio multis curatur modis, causis eius abscissis, primo per ea, quæ vim medicamenti purgantis frangunt, incrassant, & à corpore expellunt compingendo, vt sunt mucagines supradictæ, aut per ea quæ canales, & partes seruientes expulsioni roborant, & constringunt, vt est mastix, & similia: aut per ea, quæ ad contrarium vacuant, & trahunt, qualia sunt vomitus, balneum, frictiones & cucurbitulæ: aut per ea, quæ laboriosum motum sedant, per quietem scilicet, & somnum: & per ea, quæ cor corroborant, & animum oblectant. Si quis tamen hanc rē perfecte cognoscere cupit, legat caput Mesue

Si ab hæ- de medicamento immodice vacuante theoremate tertio, Ca
morrhoidi- none primo. Sanguinea diarrhæa, si sit ab hæmorrhoidibus,
bus. curabitur cap. 52. huius libri. Si à mensibus suppressis nasca-

Si à sup- tur, cap. 56. Si critica, vt in synocha, nulla eget curatione, ni-
pressis mē si modum excedat: tunc curatur sanguinis missione, per se-
sibus. ctionem venæ cubiti internæ, extracto pauco sanguine: ma-

Curatio ior tamen copia sanguinis est educenda, cum diarrhæa san-
critica. guinea est à mutilatione membri. In vtraque tamen præce-
denti sanguinis missione vtile, & necessarium est hoc, aut si-

Confectio. mile medicamentum: ʒ. conseruæ rosarum antiquæ ʒ. ij. mi-
cletæ ʒ. j. lapidis hæmatitis, coralli rubri præparati, Karabæ,
mastichis, boli Armenici præparati an. ʒ. ij. syrupi myrtillo-
rum, quod satis est misce, & fiat confectio. Dosis, mane, & o-
mni hora cochlearium vnum cum aqua caudæ equinæ, aut

Curatio bi sanguinariæ. Diarrhæa biliosa, præcedenti victu prædicto
liosæ. initio huius capitis, curatur vacuatione bilis per medicamē-
ta stiptica: vt ʒ. rhabarbari parū assati, & corticum myro-
balanorum parum assatorum an. ʒ. j. syrupi rosarum ex infu-
sione siccarum ʒ. j. aquæ portulacæ ʒ. ij. misce, & fiat potus.

Observa. Aliquando initio, vbi materia fuerit multa, ante purgatio-
nem necessarius est vsus syruporū de agresta, cydoneorum,
rosarum ex infusione siccarum, & similium, cum dupla quā-
titate aquarum, aut decocti portulacæ, plantaginis, & simi-
lium: & tunc fiet vacuatio per rhabarbarum non tostum, &

Curatio pi per myrobalanos non tostos. Diarrhæa pituitosa curatur, si
uitosa. materia fuerit multa, per vacuationem factam myrobalanis
chebulis eodem modo paratis, & aliquando addendo scrup-
ulum vnum agarici trochiscati, præcedenti concoctione fa-
cta per rhodomel, per decoctum, & syrupum de absinthio.

Melanchol- Diarrhæa melancholica curatur per vacuationem factam
myr

myrobalanis indis, & epithymo, præcedenti concoctione *lica cura-*
per syropos, & medicamenta dicta capite primo: quamuis *tio.*
aliquando si fuerit ob obstructionem lienis, hæc diarrhæa e- *Præpara-*
geat propria curatione, de qua capite 45. huius libri loque- *tio & qua-*
mur copiosè. Deinde auertentibus curatur, vt vomitu, auto- *cuatio.*
re Hipp. lib. de locis in homine, quo libro docet vomitum cu *Reuulso.*
rari vomitu, & ventris profluuium ventris profluuiio. San- *Sectio ve-*
guinis missione, si sint signa sanguinis & robur virium. Mo- *nae.*
uentibus sudorem & vrinam cientibus, præsertim si simul *Sudoris,*
ventrem restringant, & vrinam prouocent, vt cydonea. Fri- *& vrinæ*
ctione externa totius corporis, demptis infernis partibus. *prouoca-*
Postea curatur per ea, quæ intestina lauant, & simul corro- *tio.*
borant, dolorémq; sedant, ac defendunt illa ab vlcere, vt cly *Clyster la-*
stere hoc pauca quantitatit: ℥. decocti hordei ʒ. vj. sacchari *uans.*
ʒ. ij. misce, adde lutea duo ouorum. Ex solis vnciis octo lactis
(in quo lapides marini extincti fuerint, aut chalybs ignitus)
clyster est optimus, & vtilissimus huic profluuiio ventris: in
dysenteria tamē sunt maioris momēti clysteres, & magis ad
multa necessarij. Deinde curatur incrassantibus, meatus cō- *Constipa-*
stipātibus & corroborātibus retētricem facultatem, vt thu- *tio, & cor-*
re, cymino assato, & aceto infuso, aniso tosto, semine nastur- *roboratio.*
tij assato: hæc tamen calida magis profunt, si sit profectus
morbus à causa frigida, quamuis in calida sint vtilia, præci-
pue si misceantur his syrapi aut aquæ astringentes frigida, *Aduerte.*
vt syrupus myrtillorum, rosarum ex infusione siccarum, sy-
rupus de agresta, cydoneorum & similium. Simplicia tamen *Mastiches*
& composita medicamenta huic profluuiio necessaria sunt, *commēta-*
omnia fermē frigida, quamuis mastix calida obtineat prin- *tio.*
cipatum in omni profluuiio, quare ea perpetuò vtendum est
etiam loco salis in cibis. Oriza etiam assata est optima, a- *Adeps ca-*
deps quoque caprinus, quo multi diarrhæa laborātes etiam *pinus. i.*
inueterata sanati sunt, mixta cum pane facto in modum di- *capræ, aut*
ctum ab Hispanis migas. Drachma vna casei antiqui in a- *capri ca-*
qua chalybeata per diem infusi, deinde decies, eadem aut si- *straci.*
mili aqua loti, si sæpe cum cibis, aut syrupo, aut liquore ali- *Virga cer-*
quo astringente comedatur, curat omne vētris profluuium. *ni, coagu-*
Similiter ʒ. j. virgæ cerui in puluerem redactæ. Coagulū hæ- *lum hæli.*
di ab scrupulo vno vsque ad ʒ. j. cum ʒ. ij. aut iij. aquæ plan-
raginis, aut portulacæ, aut alia simili astringente, potentissi-
me curat hoc profluuium, incrassantur eo humores, ac coa-
lescunt. Sed hoc auxilio & antiquo caseo non est vtendum, *Tempus*
nisi post alia remedia clementiora, vt sunt omnia simplicia *venit.*
astringentia, vt balauitæ, spodium, hypocystis, sanguis dra- *Simplicia.*
conis,

Composita conis, thus, sandaraca Arabum, nux cupressi, myrtillorum
astringen- bacca, & similia. Composita etiam vtilia sunt multa huic
tia. profluuiio, vt syrupus rosarum ex infusione siccarum, syru-
 pus cydoneorum, syrupus myrtillorum, syrupus de Ribes,
 syrupus de agresta, miua cydoneorum, rob de agresta, aut cy-
 doneorum, conserua rosarum vetus, conserua cydoneorum,
 caro cydoneorum saccharo condita. Hæc composita summo
Ante ci- mane sumpta sola, vel cum aqua calybeata conferunt, & e-
bos sumen tiam tempore sitis. In prandio tamen, & coena semper in fi-
da esse. ne nocent, quia impellunt cibum, ideoque initio mensæ of-
Micleta. fa tosta & madefacta aliquo ex supradictis syrupis, aut rob
 sumenda est. Micleta omne ventris profluuium curat, siue
 per os, siue per clysterem injecta, est ab omnibus, & a me
 probata diligenter. Sunt multa alia medicamenta composi-
 ta à variis doctoribus scripta, & longa experientia probata,
Qui auto- lege Antidotarium Mesuæ, Nicolai, & Arnaldi de Vilano-
res legendi ua, in quibus medicamenta omnia composita inuenire li-
in hoc. cet: quamuis nostris temporibus extet opus diuinum Ni-
Confectio colai Mirepsij, a Leonardo Fuschsio Latinitate donatum.
causæ ca- Hoc medicamentum est à me, & a multis expertum in hoc
lile proba profluuiio, præcipue a causâ calida: ℞. granorum myrti, spo-
tiissima. diij, sumach, santalorum omnium, gummi Arabici an. ʒ. j. β.
 olium myrobalanorum omnium assiatorum ʒ. viij. coriandri
 præparati tosti ʒ. iij. seminis acetosæ, seminis plantaginis,
 seminis rosarum an. ʒ. j. omnia in puluerem redacta infun-
 duntur cum succis plantaginis, agrestis, & acetosæ per diem,
 deinde exsiccata, & cum sufficiente quantitate miuæ cydo-
 neorum fiat confectio ad modum opiata. Dosis ʒ. iij. cum a-
 qua, aut succo aliquo astringente.
Causæ fri- In causâ frigida hoc medicamentum est expertum: ℞. li-
gide. gni aloes, spicæ, galliæ muscatæ, cyperi, calami aromatici an.
 ʒ. j. cymini insuli per diem in aceto, deinde tosti, seminis por-
 ri tosti an. ʒ. ij. β. seminis nasturtij tosti ʒ. iij. granorum myr-
 ti ʒ. viij. balaustis, conchularum tostaram, thuris, fructus len-
 tisci an. ʒ. j. ameos ʒ. j. β. omnia bene puluerizata infundan-
 tur in vinum rubrum Saguntinum, aut simile per diem, de-
 inde exsiccantur, & iterum infundantur in aquam cydoneo-
 rum, aut aliam similem, & cum siccata fuerint omnia cum
 sufficiente quantitate miuæ aromaticæ fiat confectio. Dosis
 ʒ. iij. cum ʒ. ij. aquæ, aut succi, aut syrupi ex superius dictis
Deliquit alicuius. Quando laborans ventris profluuiio afficitur animi
curatio deliquio à materia venenosa, hoc remedium est optimum:
quod sym- ℞. conseruæ rosarum antiquæ, & micletæ ana. ʒ. j. confectio-
 nis

nis de hiacinto, & confectionis Gentilis cordialis contra *ptoma est.*
 melancholiam ana. \mathfrak{z} . ss. coralli rubri præparati, margarita- *Confectio.*
 rum electarum, seminis portulacæ an. \mathfrak{z} . ij. lapidis sinaragdi
 \mathfrak{z} . j. syrupi cydoneorum, quod satis est, misce, & fiat confe-
 ctio cordialis. Dosis cochlearium vnum omni hora cum a-
 qua cydoneorum. Lapis sinaragdus curat profluuium ven- *Aque sma*
 tris venenosum auctore sene Auenzoar. Nostri enim tem- *ragdi fa-*
 poribus curatus fuit hoc lapide illustris Ioannes de Mendo- *cultas.*
 ça post multa alia auxilia. Quare hac in re non est audien- *Historia.*
 dus Aloisius mundella, qui sua prima epistola damnat vsum *Arabum*
 lapidis smaragdi contra Arabes, a quibus certè aliqua scri- *defensio cõ*
 pta sunt partim a Græcis prætermis-*sa*, partim ignorata, vt *tra Alo-*
 docet Andreas Turinus nostræ ætatis doctissimus medicus. *sum, Mun*
 Postea, imò semper vacuata causa ventri sunt admouenda *dellam.*
 vnguenta, emplastra, cataplasmata astringentia, præcipue si *Turinus*
 præcedat fots hoc, aut simili liquore factus: \mathcal{L} . aceti caly- *laudatur.*
 beati partem vnam, aquæ calybeatæ (præsertim si fuerit in *Arabum*
 qua extinguantur enses, pugiones, & gladij igniti) partes *Topica.*
 duas, foliorum & fructuum myrti, cydoneorum, mespilo- *Forus.*
 rum, sorborum an. m. ij. nucum cupressi num. x. fiat ex his
 decoctum ad medietatem, & reseruetur ad fotum. Bis in die
 admoueat ventri hæc mixtura: \mathcal{L} . mastichis, & emplastri *emplastrũ*
 stomatichonis ana. æquas partes, extendantur super alutam *inguentũ*
 ad formam scuti, & magnitudinem ventris. Hoc quoque *Cataplas-*
 vnguentum, si bis, aut ter, in die admoueat, est optimum: *ma opti-*
 \mathcal{L} . olei mastichis, cydoneorum, & myrtillorum an. \mathfrak{z} . j. pul- *min.*
 ueris sanguinis draconis, thuris, & gummi draganti ana \mathfrak{z} . j.
 ceræ quod s. misce, & fiat vnguentum. Hoc cataplasma, aut
 simile, si quolibet die semel ventri admoueat, ventris hoc
 profluuium curabit: \mathcal{L} . micæ panis tostæ & infusæ in ace-
 tum calybeatum, carnis cydoneorum cum melle conditæ a-
 na partes æquas, decoquantur cum oleo mastichino, & vinq
 rubro, addendo pulueris mastichis, thuris, sanguinis draco-
 nis an. \mathfrak{z} . ij. misce, & fiat cataplasma. Emplastrum diaphani- *Emplastrũ*
 con Mesuæ ex Alexandro Tralliano, & est secundæ descri- *diaphenicũ*
 ptionis (Syluius non credit esse Alexandri) omne ventris
 profluuium sine dubio curat, ventriculũque corroborat,
 est a me sæpe probatum. Fots rerum astringentium (vt *Forus.*
 sunt folia & fructus dicta) per anum confert non parum
 huic morbo. Similis est & expertus fots pini habentis no-
 dos igniti, & postea extincti vino rubro.

Postremò curatur hoc profluuium quemadmodum a-
 lia omnia immodica profluvia narcoticis medicamentis: *Narcotica*
 quia

DE CVRAND. MORB.

- Somni vis* quia somnus omnes vacuationes detinet præter sudorem, iis tamen non est vtendum, nisi cum alia non contulerint, & præsentia aliqua constantia virium: multi namque his medicamentis perierunt extincto calore natiuo. Quare doctus & prudens medicus primò iis externis admotis vtatur, minus enim hæc nocent, & à medico, & ab astantibus amoueri possunt & debent somno iam incepto: ne nobis contingat quod multis medicis eruditis Italis, præcipientibus famulis, vt statim ab incepto somno amouerēt narcotica fronti, aut ægrorum capiti admoti quibus præcepti oblitis, multi perierunt perpetuò dormientes. Secundò, si hæc externa non suffecerint, parti inferiori sunt admouenda narcotica in forma suppositorij, aut clysteris. Tertiò, & in maxima ferme necessitate opiatas & interius deuoratis vtendum est.
- Supposito-
ria, aut cly-
steres.*
- Topica ef-
ficacissima
ad somnũ
inducen-
dum.* Primò igitur fronti & naribus admoueatur parum huius mixturæ: ℥. vnguenti populeonis, & olei papaueris an. ʒ. j. Thebaici grana v. misce, solum tamen vnguentum populeon aliquando somnum inducit. Hoc etiam medicamentum laudatur in hoc genere: ℥. lactis fœminei ʒ. ij. Thebaici ḡ. v. misce, vel ℥. olei violarum & papaueris an. ʒ. j. Thebaici ḡ. v. misce.
- Clyster ad
somnum.* Secundò, si externa non suffecerint, hic clyster, aut similis somnum affert: ℥. lactis caprini, aut ouini ʒ. vij. olei papaueris ʒ. ij. philonij Romani ʒ. ss. misce, & fiat clyster: vel ℥. philonij Romani, & micletæ an. ʒ. j. pinguedinis caprinx, aut ceræ. q. s. misce, & fiant duo suppositoria cū philo magno bombicis, aut lini.
- Narcotica
sumenda.* Tertiò, & vltimò, laudantur interna narcotica, quorum hatanasia, & requies magna sunt tutiora. Dosis horum duorum à drachma semis vsque ad ʒ. j.
- Potentio-
ra.* Postea potentiora, vt sunt trochisci de karabe, de spodio, de terra sigillata. Dosis est ab scrupulo vno vsque ad ʒ. ij. aut drachmam vnā.
- Pilulæ
Nicolai.* Pilulæ Nicolai contra fluxum sunt probatæ in hoc numero. Dosis est quarta pars vnus drachmæ, fiant ad magnitudinem grani Orobi. Valentiora sunt philonium Romanum, Tarsense, & Persicum ab scrupulo semis vsque ad drachmam semis, vel drachmā vnā. His tamen narcoticis non est vtendum, nisi post sex menses, & quanto vetustiora sunt, tantò tutiora, vt sæpe diximus cum Gal. 12. method. Theriaca recens a drachma semis vsque ad drachmam vnā inter narcotica adnumeratur. Hoc quoque medicamentum in genere remediorum narcoticorum recensetur: ℥. micletæ ʒ. j. cōseruæ rosarum antiquæ ʒ. ss. trochiscorum de

de karabe, de spodio, & de tetra sigillata an. 3. ij. pilularum Nicolai contra fluxum 3. j. requiei magnæ 3. ij. s. syrupi myrtillorum. q. s. misce, & fiat confectio. Dosis semel in die drachmæ duæ cum aqua, aut syrupo astringente ventriculo vacuo. Pilula hæc sumpta hora vndecima noctis omne ventris profluuium curat, experta est à me, & à multis medicis Valentinis, eius author fuit doctor Tortella: ʒ. opij ḡ. j. parci *Pilula do-*
ponderis, cinnamomi, cassiæ lignæ, croci an. ḡ. iij. cum glu- *ctoris Tor-*
tine dragaganti fiat pilula vna. Composita tamen narcotica *telle.*
post sex menses, & post annum sunt tutiora, vt diximus cum *Quando*
Gal. quia vis opij, & forma corrupta est saltē maiori ex par- *sunt rui-*
te, quod in theriaca fermentata demonstratur, quæ calida est *ra narcoti-*
in fine secundi ordinis. *ca.*

De Diarrhæa. CAP. XXXVI.

Scholium.

Diarrhæam barbari.) Diarrhæa, quam Latini alui proflu- *Diarrhæa.*
uium appellant, est immodica per aluum excretio alicuius hu-
moris, siue hic sit pituita, siue bilis, siue melancholia, siue cor-
ruptus humor in ventriculo, cuius excretionem diarrhæam venteralem ap-
pellare solent: siue etiam fiat cum crisi, siue sine crisi, siue cum febre, siue
sine febre: quamuis diarrhæa rariò fiat ex toto corpore sine febre. Humor
hic, qui in diarrhæa euacuatur, aut generatur in ventriculo, aut aliunde
fluit. Si in ventriculo, aut generatur culpa ventriculi, quando intem-
peratus est, aut prauum humorem in cavitatem continet, aut culpa ali-
menti cum peccat quantitate, aut qualitate. Si humor aliunde ad ven-
triculum confluat, aut id contingit ex toto corpore, vt in febribus, chole-
ra, morbo, & super purgationibus: aut ex vnica tantum parte, hepate,
liene, capite aut alia, quam ex signis eius partis affectæ cognoscet.

Si diarrhæa ventriculi culpa contingat, curabitur eius intemperiem
corrigeno: si sit humor in eius cavitatem, ipsum euacuando. Si verò ali-
mentum eius sit causa, diminuemus eius quantitatem, aut aliud muta-
bimus.

Diarrhæa curatur primò.) Diarrhæa bene potest esse epydemia. Error au-
tis, & sine veneno, & proinde non est, quod semper cum adstringētibus etoris.
misceamus, quæ veneno resistunt.

Sanguinea diarrhæa.) Excretio sanguinis per aluum non dicitur Alius er-
diarrhæa, sed dysenteria, & idem non erat, quod hoc in loco eius faceret ror.
mentionem.

Diarrhæa biliosa.) Biliosa diarrhæa, quæ frequenter molestare Curatio
solet, aut est critica, aut symptomatica. Critica in febribus post coctionē diarrhææ.
apparet, quæ non est sistenda, quia in ea solus humor peccans excerni-

fin.

DE CVRAND. MORB.

tur, sed solum intestinorum habenda est ratio, ne exulcerentur ab acrimonia humoris, lac tepidum infundentes. Symptomata principis febrium accedit, sit a natura irritata ab acrimonia humoris, aut a calore, quod idem est, quæ, velit nolit Vallesius, semper est mala, Contra Val quia cum utilis humor cum inutili mixtus in ea euacuatur, sit cum incom-
 lesum. modo animalis. Neque ratio eius aliquid probat, quia etiam si videamus aliquos homines robustos ferre hanc euacuationem, non proinde colligimus eam esse bonam, reuera enim debilitauit egrum, qui ob robur eam potuit ferre noxam, & ex accidenti inuari multo humore inutili euacua-
 Diarrhæa to. Hanc ergo euacuationem in principis morborum factam sistemus, non
 symptoma sanguinis missione, quia ex Hippocr. fluente aluo sanguinem non detra-
 rita qua hes, sed temperabimus bilis acrimoniam syrupo rosarum, acerositatis ci-
 ratione si tri, & similibus, cum decocto endiuie & borraginis: deinde purgabi-
 stenda. mus bilem ea ratione, qua purgat auctor. Vbi aduerte nos parum terre-
 Purgatio, facere mirobalanos, & rhabarbarum, ut minuat in eis vis purgans,
 & augeatur vis corroborans, ut ea ventriculus roboratus non ita facile recipiat humorem. Cibus & potus debent refrigerare, & adstringere: Et ita ante assumptionem alimenti minui citoniorum cum paucis pane torrefacto utilis erit. Quod si persisteret affectus, mane per aliquot dies cochlearium vnum nucletæ conueniet, vel pilulas ex ea constituemus hoc modo, ℞. specierum confectionis nucletæ 3. j. cum syrupo rosarum sicca-
 Que assu- rum fiant pilule nouem, quas vna vice accipiat ager. Que si non prosint,
 menda me ad pilulas Nicolai contra fluxum deueniendum est. Ex 3. j. facientes pi-
 dicameta. lulas xxx. & assumentes ix. hora decima, aut undecima noctis, quam quantitatem, poteris pro robore, & imbecillitate egrotantis augere, aut minuire. Hæ enim pilule ratione medicamentorum adstringentium roborant ventrem, & incrassant humorem, propter opium vero somnum conciliant, & sic sistere faciunt diarrhæam, quia somnus omnes euacuationes cohibet, quæ egent ope facultatis animalis. Inferne per aluum in-
 que infun- fundes lac, in quo lapides igniti extincti sint. Regionem hepatis illines
 denda. vnguento refrigerante, quale est rosatum sandalatum. mixtum (et pe-
 Iecoris vn- netret) cum paucis aceto aut cerato refrigerante Gal. ex 10. meth. Quauis
 Etio. enim ex vniuerso corpore bilis fluat, in icore tamen focus est putredinis, & per ipsum transit bilis, antequam ad intestina perueniat. Si in fe-
 Animi de- liquium in brium accessionibus bile descendente ad ventriculum fiat cardialgia,
 tiquium in accessione tunc propina vinum aqua dilutum, aqua enim refrigerat ventrem, & vinum citam facit humoris distributione. Præcanebis autem in sequen-
 febris. ti accessione animi deliquium, si antequam præhendat, panem vino madafactum, aut syrupum adstringentem assumat. Si biliosa hæc diarrhæa citra febrem accidat, prædicta curatione aluum firmato: si ex toto corpore fluat bilis, eam purgabis: si ex vna parte, eam corroborabis, & cau-
 Ventriculi sam generatioris bilis submouebis. Roborabimus etiam ventriculum, qui roboratio est pars recipiens, medicamentis exterius applicatis: quæ adstringentia
 sint,

int, quale est emplastrum factum ex malo cotoneo, in vino austero decocto, puluerizato cum cinnamomo, mastiche, et myrillis. Quod si bilio- Diarrhæa hæc alui fluxus ex acri medicamento euenerit, curabitur medicamen- ex acri me-
tis acrimoniam temperantibus succo agrestæ aut granatorum, sorbitio- dicamento,
ne ex alica (pro qua nostra similagine utemur.) Enematis etiam em-
plasticis ex lacte calybeato, & amylo paratis, vt cap. i. diximus.

Diarrhæa pituitosa curatur.) Si in hac diarrhæa pituita in vē- Curatio
triculo generatur copiosa, aut vētriculus multas generet cruditates, ine- diarrhææ
dia, & abstinentia a potu (vt coquitur humor) utemur, purgabimus & pituitosæ.
roborabimus ventrem, & optima imperabimus alimenta. Si a capite de-
scendat pituita, ipsi prospiciemus ea ratione, qua capite de distillatione
diximus. Purgabimus pituitam ex ventre, & ultimo corroborantibus
utemur, capite de imbecillitate ventriculi descriptis.

Diarrhæa melancholica.) Si diarrhæa sit ab humore melancholico- Melancholico,
& critica, sinenda erit, si symptomatica, sistenda, purgantes humo- lice cura-
rem corticibus myrobalanorum indorum parum torrefactis, & deinde tio.
adstringentibus, & aliis superius propositis utentes. Si sit ex atra bile,
& critica præcedentibus signis coctionis, optima erit. Si symptomatica,
lethalis, nihilominus tamen in ea idem præstabimus, ac in superiori ex
melancholico humore orta.

De lyenteria, id est leuitate intestinorum.

CAPVT XXXVII.

ILyenteriam, quam Latini læuitatem intestinorum *Descriptio,*
nominant, Gal. aphor. i. sect. 6. tum carentiam con-
coctionis dicit esse, cum scilicet neque secundum
consistentiam, neque colorem, vel odorem in ventriculo fa-
cta fuerit mutatio ciborum: tum velocem exitum eorum, quæ
comeduntur, & bibuntur, quæ talia deiciuntur, qualia fue-
rant deuorata. Veteres medici, qui primi lyenteria nomen
huic affectioni indiderunt, id voluere significare, tale quip-
piam per hanc affectionem intestinis euenire, quale extrin-
secus in corporis cuticula ex cicatricibus contingere solet:
existimarunt enim fieri ipsam propter internæ superficiei
intestinorum læuitatem, ob quam cibos in eis cōtentos non
amplius retinet, vt cum suam & sibi a natura inditam aspe-
ritatem seruarent, retinebant. Si quidem graui aliqua dysen-
teria præcedente, intestina ab erodentibus humoribus altè
exulcerantur, deinde cicatricibus densis & læuibus succeden-
tibus ipsa tum densa, tum læuia redduntur: vnde propter den-
sitatem ciborum per corpus distributio fieri non potest, cum
ora vasorum sint velut obturata, vasorum inquam, quæ ali-
men

DE CVRAND. MORB.

mentum ex intestinis ad se attrahunt: propter leuitatem verò, cibus antequàm plene concoquatur, nullo retinente delabitur, atque sic de lyenteria sentiunt: quos Galenus non probat. Quam rem (vt puto) animaduertēs Paulus Aegineta lib. 3. cap. 40. duplex lyenteriae genus facit, alterũ quidem quod ex intestinorum exulcerationibus, & eorum cicatricibus oritur, quod mali genus, intestinorum tormina plerumque sequitur. Aut ex aliis distillationibus rheumatisque inducitur: Alterum verò, quod ex infirmitate languorẽque facultatis, quæ alimentum in stomacho retinet, prouenit: hac enim languente, ac imbecilla, cibi neque cõcoquuntur, concoctiue distribuuntur, sed crudi humidi, & nihil immutati excernuntur continuo fluxu tentata aluo. Ex his quæ dicta sunt, constare potest à quibus causis hoc malum proueniat: fit enim vel ab exulcerationibus, & cicatricibus intestinorum, vel à facultatis imbecillitate. Interdum & post voluolosa tormina, & post alui ingens profluuium sequitur. Aliquando etiam & aqua inter cutem per ventrẽ euacuata contingit. Signa sic ab Aetio adnotantur lib. 6. cap. 51. Ex quacũque igitur causa lyenteria orta sit, ægri cibum non sentiunt, & malum corporis habitum acquirunt, quod vtrunque malum inemendabile est: succedit enim ægris assidua excretio cruda, colore subalbida, inæqualis, & aquosissima citra sanguinis ac bilis complexum. Adest autem simul & ardor per tota præcordia se dilatans, quem cibi fastidium comitatur. Videtur autem bonum & amicum signum in eis ructus acidus esse, indicat enim iucundi quippiam factum esse, & ventrem ac intestina non velut inania cibum sinere pertransire: Hactenus Aetius. Verũ hoc vltimum confirmat etiam aphorismus supra citatus primus sectionis sextę in longis leuitatibus intestinorum, si acidus ructus fiat, qui prius non erat, signum bonum, & quæ à Galeno in commento dicuntur. Præcedenti cap. multa scripsimus non solum diarrhææ vtilia, & necessaria, sed lyenteriae & omni ventris profluuii: ideoque paucis curationem hanc expediemus.

Curatio lyenterie ex acrimonia. Si intestinorum & ventriculi leuitas fuerit à re acri irritante expultricem facultatem, & retẽtricem imbecillam efficiẽte curatur primò, ratione victus conueniente, de qua *Victus.* superiori capite. Secundo, vacuatione materiae calidæ per *Purgatio.* rhabarbarũ tostũ facta, & per myrobalanos citrinas similiter tostas. Deinde per frigida stiptica corroborãtia, vt sunt *Corroboratio.* electuarum diarhodon. Abbatis syrupus de agresta, syrupus *Curatio ex vlceribus.* rosarum ex infusione siccarum, & similia. Si fuerit ab vlceribus

us ventriculi & intestinorum (quod per excrementa cognoscitur, & per dolorem, quo tempore sumendus est cibus, præsertim acer, & expellenda excrementa) curatur per abstergentia, mundificantia, & consolidantia, de quibus cap. de pleuritide & suppuratione dictum est. Si fiat a materia multa ventriculo affixa (a qua sæpius fit) curatur primò, victu tenuante, incidente, tergente, vt rebus salis parum amaris, & parum ex materia scribis. Secundo paretur pituita rhodomelle, syrupo de absinthio & oxymelite. S. cum decocto, aut aquis absinthij, foeniculi, mentæ, & similium. Tercio vacuetur vomitu aut deiectione facta per vnciam semis diaphanicon, aut per 3. j. pi. Præparatarum elephanginarum, aut stomachicarum, aut per 3. j. a. garici trochiscati. Postremò corroboratione facultatis constricticis, & retentricis medicari poterimus per ea, quæ diximus cap. 31. de curatione imbecillitatis ventriculi. Hoc cataplasma est in hoc genere bonum: ℞. mentæ siccæ, balaustræ, myrti, corticis mali granati, anteræ, florum roris marini an. 3. j. myrrhæ, masticis, gumi Arabici an. 3. ij. vini rubri & succi cydoneorum an. æquas partes & sufficientes pro cataplasmate. Hoc medicamentum est in hoc expertum: ℞. pulueris caudæ equinæ, balaustræ, mentæ, mastichis an. 3. ss. foliorum myrti, seminis lini tosti an. 3. iij. syrapi myrtillorum. q. s. misce, & fiat confectio. Dosis drachmæ duæ sunt mane & vespere cum syrupo & aqua aliqua adstringente. Hoc cataplasma ventriculo & ventri sæpe admodum, est optimum in hoc genere: ℞. acaciæ, psidii, gypsi, granorum vuarum, boli Armenici, hypocistidos, balaustræ, galbani, myrti, mastichis an. 3. ss. gariophyllorum, cinnamomi an. 3. ij. vini rubri optimi, & succi cydoneorum an. æquas partes, & sufficientes pro cataplasmate. Semper ante cibum comedat æger duo, vel tria cochlearia miuæ aromaticæ, aut duas offas tostas & madefactas prædicta miua, desuper addendo parum coriandri præparati, & cinnamomi, vel parum pulueris scripti capite 31. Ius carnis perdicis elixæ aqua calybeata, & prius plenæ cetera noua, pinguedine hirci castrati & cydoneis, mespilisque curat hoc, & quodcunque aliud ventris profluuium.

De Lyenteria. CAP. XXXVII.

Scholium.

LYENTERIAM, quam Latini.) Lyenteria est affectus præter Lyenteriam naturam, in quo celeriter ea, quæ comeduntur talia deiciuntur quia, tur, qualia denotata fuerint. 4. aph. com. 12. vel ex 6. aph. com.

DE CVRAND. MORB.

10. breuius, est coctionis carentia. Qua in parte errat Hieremias existi-
mans in ea tenuem alimenti partem concoqui, si enim non retinetur, quo-
modo concoquitur. Hic affectus est symptoma in his que immodice excet-
nantur, sequens etiam aliquando aliud symptoma, nempe debilem acti-
nem facultatis retentricis. Præterea hic affectus solet sequi morbos in-
strumentorum omnium, quæ ad aluum pertinent, qualia sunt ventricu-
lus & intestina. 4. aph. com. 12. sic Hippocr. præditi commentarii senten-
tia sic habet. Quorum alui leuitate intestinorum laborant, &c. Unde

Obiectio.

cum Galenus lib. 6. aph. comment. 1. agens de Lysteria solius ventricu-
li meminit, addit intestina, aut ea nomine ventriculi intellige. Dicit quis,
si ventriculus est instrumentum concoctionis, & in lysteria alimentum
crudum manet, qua ratione lysteriam etiam in intestinis collocamus?
Respondet intestina etiam concoquere, etsi leuiter, cum habeant eam-
munem tunicam cum ventriculo, ac prout si alimentum in ipsis nu-
tram faceret, concoqueretur: in lysteria vero cum crassum omnino ex-
cernatur, signum est ipsum non que in ventriculo, neque in intestinis de-
tineri, & lysteriam esse affectum ventriculi & intestinalium. Mor-

Lysteria bi, aut quos sequitur lysteria, duo sunt. Primus est intemperies quolibet
dus mor- imbecillam reddens retentio, cum caliditate, & potissimum frigida, &
bos sequi- humida, quia hæc molles reddit fibras, quæ robur possunt ac retien-
tionem: Rursus hæc intemperies frigida & humida, aut est nuda, aut

Primus. (quod ut in plurimam cōtingit) oritur habet ab humore pituitoso in ven-
triculo generato, aut aliunde fluxante. Atque hæc est lysteria, quæ non
sequitur immediate morbum, sed aliud symptoma, quod est actio aboli-

Secundus. ta facultatis retentricis. Secundus morbus lysteriam efficiens est soluta
continuitas partis internæ ventriculi, & intestinalium, quæ fit ab a-
cri humore: in hac enim parte aliquando contingunt exulcerationes mul-
tæ proportionem habentes cum aphris, quæ ratione, existimo in variolis,
& morbillis lysteriam fieri: & ideo esse lethalem, & postulare eam
curationem, quæ roboratis partibus internis humores ad externas expel-
luntur, ut libro secundo videbimus. Fit ergo in hoc secundo morbo lysteria,
eo quod alimentum in vlcusculis dolorem excitans expellitur a fa-
cultate, & sic noxa refertur ad irritatam expultricem. Præditi sequuntur
Paulum & Cornelium Celsum tertium morbum in lysteria addunt,

Reprehendit quod est leuitas ventriculi a magna cicatrice inducta. Quorum senten-
tiam præditi non probat, non enim tanta potest viuente animali soluta continui-
tatis in ventriculo incidere, ut eam cicatricem inducat, ex qua sequatur
morbum lysteriam, ab exigua enim non fiet. Lysteria acutissimus est affectus,
addentes. cum enim partes non nutriantur, utrophiam patientur. Neque pugnat,
quod Hippocr. dicit 6. aph. In longis lauitatibus intestinalium, quia
cum his legitur diarrhæas, potissimum ventrales, si tempus deiectionis
non nisi leuiter, longæ erunt.

Error au- Si intestinum & ventriculi. Si causas lysteria, hoc est mor-
bus

hos ad quos sequitur, consideres, intelliges male auctorem curare lyenteriam a re acri irritante factam cū talis non deur: sicut neque illa, quam Curatio à multo alimento oriri scribit. Curabitur ergo hac ratione: si ortum habent lyenteria, beat ab intemperie nulla, contraria alterantia conuenient: si cum afflu-
 xu pituita, si affluxus multus est, corticibus myrobalanorum chebularum torrefactis cum hiera, aut decocto eorum cum hiera & agarico, ut ventriculus purgetur simul, & roboretur? Si autem humor contentus in ventriculi cauitate multus sit, fluxusque non sit magnus, tunc abster-
 gentem intendemus facultatem, miscentes aloem cum hiera, idque non unica vice præstabimus, hac enim neque totum humorem euacuabit, neque ventriculi facultatem (quæ multum læsa est) corroborare poterit. Possumus etiam his peractis exterius applicatis ventriculo robur adde-
 re. Hoc vnguentum id commodè præstabit: ℞. olei cotoneorum, mastichini, & myrtilorum an. ʒ. j. pul. sanguinis draconis, mastichis, gummi dragagani an. ʒ. j. ceræ. q. s. misce, & fiat vnguentum. Remur etiam emplastro stomaticho confortatio, per os: syrupus de absinthio roborabit ventrem. Si post euacuationem ventriculi & eius corroboracionem, ructus acidus apparuerit, bonum est, quia melius est coctionem esse im-
 minutam, quam abolitam.

De Dysenteria. CAP. XXXVII.

D Vm quatuor sint dysenteria differētiæ (vt apud Ga- *Descriptio.*
 lenū videre est sexto de morbo & symptomate cap. 2. ad finem) de vltima nobis agendum est, quam de-
 scribentes, & solam dysenteria nomine dignantes dicimus, esse vlcus intestinorum: Galenus verò citato loco supra e-
 ius notas simul enumerans de hac, hunc in modum loqui-
 tur. Per quartam verò, scilicet dysenteria differentiam pau- *Nota.*
 latim, & breuibis interuallis deiectio fieri solet, nonnun-
 quam grumosi, cum quo interdum puris quoque nonnihil
 excerni conspicitur, itidem & ramenta (Græci vocāt ephel-
 cidas) & partes quædam intestinorum membranis similes,
 sæpenumerò densum quoque stercus excernitur cruentis
 guttis respersum. Porro Latini hanc affectionem tormina ap-
 pellant, ob id, vt conicere licet, quod intestina vlcerationis *Causæ.*
 dolore admodum torqueantur: vnde hoc malo affecti tor-
 minosi perinde ac Græce dysenterici dicuntur. Prouenit au-
 tore Aetio cap. 43. lib. 9. ab externis causis veluti frigiditate,
 ardore, perniciosorum medicamentorum potu, vt scammo-
 nij & colocynthidis. Item à cruditatibus, & ciborum a-
 crium sumptione. Galenus verò lib. 1. de loc. affect. mordax
 humor dysenteria causa statuitur, vt qui ab initio & abster-
 gat, & abradat: deinde téporis interuallo vlceret intestinum.

D E C V R A N D. M O R B.

Note præ- Nonnunquam à tenesmo incipit hoc malum, sæpe etiam per
serim in- se. Si à causis exterioribus accidat, interrogandus æger erit,
testinorum fin minus per traditas sæpe methodos internæ causæ sunt in-
affectorū. uestigandæ. Signa vero quibus morbus cognoscitur, iam su-
pra a Gal. tacta sunt, quibus alia quoq; addit Aetius, sed di-
cta satis sunt. At cum aliquando cōtingat tenuia, aliquando
vero crassa intestina in hoc morbo vlcerari, breuiter Paulus

in hunc modū docet distinguere. Si cū stercore mixta exul-
cerationis signa cum labore & circa vmbilicum torminibus
excernantur, in gracilibus intestinis exulcerationē esse co-
gnosces. Si vero absq; vllius rei cōmunionē immixtum ster-
Dysenteria cus egeratur, in crassioribus. Hæc multò fusiùs ab Aetio, &
curata dis- a Gal. 5. de loc. affec. cap. 5. tractantur. Cæterū tam grauis est
facilis. hæc ægritudo, & curatu difficilis, vt quāuis eius curatio nō-
nunquam sit expectanda, maiori tamen ex parte desperatur,

maximè in iis, de quibus Aphor. 3. sect. 6. scriptum est, in lō-
gis difficultatibus intestinorū cibi fastidium malū est, & cū
febre peius: & 23. sect. 7. a deiectione sincera difficultas inte-
stinorum malum: & Aphorismo 24. sect. 4. difficultas intesti-
norum si ab atra bile inceperit, lethalis est, cui aphorismo
consonare videntur, quæ dicuntur sectionis 6. aph. 43. Qui-
cunque lienosi à difficultate intestinorū capiuntur, iis super-
uenientem longam difficultatem intestinorum aqua inter-
cutem, aut leuitas intestinorum excipit, & moriuntur.

Curatio. Quatuor itaque remediorum generibus mederi dysente-
riæ possumus: primo, victu refrigerante, & astringente, si sit

Victus. causa calida (a qua sæpius fit.) Vt cibis parum acidis ad ex-
citandam appetentiam, paucis & facilibus concoctu, & bo-
num sanguinem gignentibus, quales sunt testes gallorum
gallinaceorum, oua forbilia, hepata gallinarum, succus, aut
aqua gallinæ, vel perdicis cum succo agrestæ, aut acetosæ.

Quæ no- Vitentur acetum, salsa, acria, quia vlceribus nocent, morda-
ceant. cia. In hoc genere, quæ scripta sunt cap. 36. de curatione diar-
rhææ, conueniunt.

Vacuatio. Secundo, materiam vacuantibus biliosam (à qua fit cre-
brius) vt myrobalanis citrinis parum tostis, rhabarbaro e-
tiam tosto: vt ℥. corticum myrobalanorum citrinorum, pa-

Potio bi- rum assatorum, rhabarbari parum tosti an. ℥. ij. syrupi rosa-
liosæ. rum ʒ. j. aquæ portulacæ ʒ. ij. misce, & fiat potio. Si a pituita
falsa sit dysenteria, hac potione, vel huic alia simili vacuabi-

Pituitosæ. tur: ℥. corticum myrobalanorum citrinorū, & chebulorum
parum tostorum an. ʒ. ss. agarici trochiscati ʒ. j. syrupi rosa-
rum ʒ. j. aquæ plantaginis ʒ. ij. misce, & fiat potio. Si fuerit ab
atra

atra bile, myrobalanis indis parum tostis vacuabitur.

In fine 3. generis capit. 35. docuimus purgationem in o- *Melancholice.*
 mni ventris profluio esse faciendam per medicamenta a-
 stringentia, & quæ omni carent acrimonia, & facultate i-
 gnea, quale rhabbarum parum assatū, & myrobalani mo-
 dice assati. Quare dicitur Amatus Lusitanus Centuria 2. cu-
 ratione 44. credens lotionem & infusionem solam in aqua
 plantaginis, aut alia simili posse acrimoniam, & vim purga-
 toriam tollere, cum substantia horum sit terrestris, & densa,
 à qua sola decoctio, aut assatio potest recte acrem, & purgā-
 tem facultatem separare, remanente sola astringente, & pa-
 rum purgante, & vlceri curante, qua indigemus in ventris
 profluuiis, præsertim in dysenteria, cui maxime nocet mel,
 cum autore Gal. 5. de facultatibus alimentorum cap. 39. mel
 sit tenuium partium habens acrimoniæ quippiam, quæ præ-
 terquam quod aluum ad excretionem excitat, vlceribus mul-
 tum nocet. Est quoque calidum, & siccum secundo ordine,
 vertiturque in bilem in iuuenibus & biliosis, & non potest
 materiam huius, & alterius profluuij purgare. Neque con-
 trarium sentit Galen. 2. de facultatibus simplicium medica-
 mentorum cap. 12. & 14. docens prius esse educendos humo-
 res facientes morsiones, & postea, quæ morsiones acrimo-
 niam tollunt, dare per os, & per inferiora in aluum infunde-
 re. Purgat Galenus humores facientes morsiones melle, quo
 nunquam Galenus in dysenteria vsus fuit, nisi iniecto per
 clysterem ad lauanda, & tergenda vlceri, vel per os sumpto
 ad purgationem mixto cum aqua plantaginis, aut alia, &
 pauco decocto. Pari modo lac siue alininū, siue caprinum in-
 iectum per inferna vtilissimum est, præsertim si in eo lapides
 igniti extincti fuerint: per os vero sumptum nocet huic mor-
 bo, maxime si æger fuerit biliosus, laboretque febre putrida.

Tertiò, sanantibus vlceri, primò lotis intestinis a muco, *Detergen-
 tia vlceri.*
 & materia mordaci hoc, aut simili clystere: ℞. decocti hor-
 dei lb. j. sacchari rubri ʒ. ij. misce. Si vlceri sint in superiori-
 bus intestinis, bibat uncias quatuor, aut sex superioris liquo-
 ris. Cum maiori egent lotione intestina, hoc aut simili cly-
 stere vtere: ℞. decocti hordei cicerum nigrorum, & furfuris
 ʒ. x. oxymellis simp. & rhodomellis an. ʒ. j. misce: aut bibat ʒ.
 v. si vlceri sint in intestinis superioribus. Si vlceri fuerint for-
 dida, maiori egent lotione, decocto scilicet lupinorum, myr-
 rhæ & absinthij, & oxymelle simp. & compos. Sed hæc & si- *Lactis ca-
 lybeati*
 milia vlceri raro curantur, etiam si sit in intestinis inferiori-
 bus. Lac calybeatum, vel in quo extincti fuerint lapides ma- *laus.*

D E C V R A N D. M O R B.

Sarconica.

zini igniti, siue per os, siue per clysterem infundatur, lauat, moderate refrigerat, & dolorem sedat, quare eo sæpe vtendum est: præcipue iniecto per clysterem, quando intestina inferiora affecta sunt vlceribus. Lotis intestinis, & eorum vlceribus mundificatis, necessaria est incarnatio, glutinatio, & consolidatio addendo quæ internam superficiem tegant, & muniant, vt sunt pinguedines, cera, & similia, quod his clysteribus perfecte fiet: ℞. succi plantaginis, & portulacæ an. iij. albuminis duorum ouorū, pulueris mastichis, sanguinis draconis, gummi draganti an. 3. j. ℞. ceræ, pinguedinis caprinæ an. 3. ij. misce, & fiat clyster, vel ℞. iuris pedum, in quo sint decocta folia sanguinariæ, plantaginis, portulacæ, & caudæ equinæ 3. viij. pulueris mastichis, sanguinis draconis, & boli Armenici an. 3. ij. ceræ, pinguedinis caprinæ an. 3. ℞. misce, & fiat clyster: vel ℞. lentium tostorum, orizæ aslatæ, rosarum, balaustrarum, sanguinariæ, caudæ equinæ an. m. j. fiat decoctum, de quo accipe vncias octo, micletæ 3. ℞. trochiscorum de karabe 3. j. vitella ouorum aceto elixorum numero duo, misce & fiat clyster. In hoc profluuiū ventris, &

Clyster sit minor ℥. j.

Antiquæ curatio.

in quocunque alio quantitas clysteris sit minor vna libra, ne suo pondere noceat. Aliquando in antiqua dysenteria, vbi alia non sufficiunt, necessaria sunt narcotica primò externa, secundò iniecta per inferiorem partem, tertio per os sumpta, obseruando semper, quæ diximus cap. 36. præsertim virium robur, cum in hoc morbo semper fere sit facultas imbecilla.

De Dysenteria. C A P. XXXVIII.

Scholium.

Dysenteria.

Cum quatuor sint.) Dysenteria proprie a veteribus appellatur sanguinis euacuatio per sedem cum torminibus ex vlcere intesti-
Dysenterie norum procedens. Vnde tres habet conditiones, prima, vt in ea sanguis conditiones. profluat, secunda, vt profluat cum torminibus, tertia verò, vt ex vlce-
Vnde orta re intestinorum nascatur: Inde factum est, vt nomen dysenteriae varie fuit varia accipitur: nam aliquando euacuatio quælibet per aluum, dummodò dysenteriae sanguinis sit, dicitur dysenteria, vt in hepatica, & cruenta videre est. significatio. Aliquando etiam quælibet euacuatio per aluum cuiuscunque humoris, dummodò dolorem, & mordicationem excuset, dysenteriae gaudet nomine. Hac ratione 3. de causis symptomatum cap. 2. sanguinis nigri ex iecore excretio dicitur dysenteria: de hac etiam loquitur Hippocrates 7. Aphor. sent. 5. cum scribit: a furore dysenteriam bonum esse, vbi dysenteria significat mordicationem in intestinis ab humoris translatione factam. Eadem ratione 6. aph. sent. 43. & 48. intelligendum est, cum in lienosis dysen-

Dysenteriam, euentientem bonum esse docet, in his enim ab humore melancholico, qui exulcerare non potest, per intestina transcurrente flatu ex-
itatur, a quibus fit dolor. Neque enim est, quod cum Hieremia hunc
dolorem a parte humoris putrefacta fieri concedamus: nam hac ratione
icnosi habuissent febrem. Dysenteria illa, in qua sanguis excernitur, Cruentaria
quam sanguineam appellamus, quatuor habet differentias lib. 3. de deiectionu
caus. sympt. cap. 2. a Gal. explicatas nomine cruenti excrementi. Prima 4. differen-
tiæ, cum optimus sanguis ex toto excernitur corpore, ob mutilatum insi-
gne membrum, aut amissum validum aliquod exercitium, aut suppres-
sam consuetam evacuationem, seruat eodem victu, neque sanguine ar-
te euacuat sanguinis missione, aut alia ratione. Secunda, cum excerni-
tur quosus sanguis, ex imbecilla coctione iecoris proveniens. Tertia,
cum per anum mittitur sanguis niger, & splendens, quæ dicitur dy-
senteria hepatica. Quarta est deiectio cruenta ex ulcere intestinorum na-
ta, quæ proprie dicitur dysenteria, in qua sanguis paulatim, & breui-
bus intervallis excernitur: paulatim, quia fluit ex ulcere, & non ex ca-
uitate venæ, per brevia intervalla, ob irritationem. Hac aut est siens, Dysenteria
aut facta. Siens (in qua iam est dolor) tunc dicitur, cum pinguis (hoc est diuiditur,
mucosus humor tunicis intestinorum hærens, & pinguedo) excernun-
tur: Facta vero, cum ramenta, aut carunculis similia. Hanc dysente-
riam a frigidi- tate etiam posse fieri scribit Vallesius, adductus ex Hip-
pocrate lib. 2. epy. sec. 3. com. 4. ubi frigiditatem ulcerare sentit. Debit
tamen Vallesius considerasse ex placiti absurditate illum librum non Vallesius
ess. Hippocratis, aut debuit legere nam cum Petro Iacobo Stue cine taxatur.
nostro medico Valentino, in doctissimis in eum librum commentariis, Laudatur
non ut frigus ulceraret, sed ut eger frigus attraheret. Quæ lectio con- Petrus
textui magis quadrat, ut ibi videre poteris. Errat etiam hac in parte Iacobus
Vallesius, existimans Hippocratem agere in prædicta sententia de dy- Stue.
senteria, cum de diarrhæa loquatur. In hac dysenteria (de qua auctor
agit in hoc capite) aut est vlcus in intestinis tenuibus, aut in crassis: Vlcus in
quod distingues ea ratione, qua contextus docet. Si dysenteria in tenui- quo intesti-
bus intestinis appareat, difficile curatur. Primo ob situm, quia eò ali- no sit distin-
menta iam mutata perveniunt. Secundo ex natura propria, quia sunt guendiam.
membranosa, & sicciora, quam crassa. Causæ propriæ dysenteriae sunt Causæ pro-
res acres, siue sint humores biliosi, atrabiliaris, aut pituitosi, dummodò priæ dysen-
pituita salsa sit, aut medicamentum acre. Et in plurimum tamen ab teria.
humoribus biliosis oriri solet.

Secundo, materiam vacuantibus biliosam.) Bilem purgabi- Cur purga-
mus, ut prohibeamus, ne vlcus maius fiat. Ex illius vero medicamen- mus bile,
ta torrefacta, ut roborentur intestina, ne recipiant fluxum. Quod si et medica-
considerassent Amatus, Hollerius, et Rondoleus, non prohibuissent co- mentis tor-
rum usum: præsertim cum adducti sint leni ratione, torrefactio, n. exigua refectis.
no relinquit empiricuma, sed magna, ita ut mutet speciem rei, ut in bile

DE CVRAND. MORB.

Aliquerū vitellina, porracea, atra bile, calce, videre poteris. His medicamentis pur reprehēſio. gantibus pluribus vicibus vii oportet, quia una eorum exhibitio non ſufficit. Tantāque eſt neceſſitas iſtius purgationis (quam fortāſſe veteres aloe, aut hiera adſtringente exceſſebant) ut, niſi timeremus phlegmonem, Vallef. ſen præcederet ſanguinis miſſionem. Qua in parte mirandum eſt Vallef. 2. tentia non epy. ſec. 6. com. 27. tantum purgare in maligna dysenteria, quæ non po- probatur. tuit adſtringentibus & extergentibus curari. Si enim ſit dysenteria ex bile acri, quæ ratione adſtringes non euacuata cauſa: tum cum adſtrin- gentibus vteris, aut perſeuerat fluxio, aut non: ſi perſeuerat, augetur vlcus, ſi non perſeuerat, nonne humor ille ſua acrimonia irritans deten- Sanguinis tus nouiſſimi mali, et peioris forſe erit occaſio? Si ergo cauſæ agentis af- miſſio. ſectum ratio eſt habenda, in qualibet dysenteria euacuare oportebit.

Tertiò, ſanantibus vlcera.) Ante curationem vlceris opus eſt ſem per in dysenteria, dummodò vires conſtent, ſanguinem mittere, ob af- ſectum poſtulantem euacuationem, qui eſt phlegmon: qui futurus timetur ob dolorem. Et ideo male Rondolez. exiſtimat, in dysenteria, cum mole- Cur locus ſita ſecari venam. Seſta vena vlcus curabis, extergens prius, & deinde affectus di agglutinans, quod rectè præſtabis, ſi diſtinguas locum affectum, an ſci ſtinguen- licet vlcus ſit in tenuibus, aut in craſſis inteſtinis: nam ſi ſit in tenuibus, dus, quæ iuxta ventriculum ſita ſunt, remediū per os aſſumptis vicmur, ſicut in craſſis per clyſterem immiſſis. Et ideo neſcio, quæ ductus ratione Val- lef. 2. epy. ſec. 3. com. 4. in dysenteria, ſiue malum ſit in ſuperioribus inte- ſtinis, ſiue in humilibus, in cibis, & potibus, et medicamentis ore aſſum- ptis, curationis ſpem colloceat, ea. n. quæ per os aſſumuntur, integris viri- bus ad inteſtina craſſa nunquam peruenient, bene tamen per clyſterem inſuſa. Si ergo vlcus tenuia occupet inteſtina, ipſum exterges per os aſ- ſumens decoctum hordei, aut cicerum cum ſaccharo, aut ꝓ. xx. aquæ mul- ſæ: quod ſi lanire etiam velis dolorem, lacte cum amylo vteris. Expur- gatio vlcere ad aſtringentia deſcendes, quæ vim habent conglutinandi,

Congluti- nantia. qualia ſunt bolus armena cum aqua plantaginis, ſyr. etiam de agreſta, mirtillorum, & roſarum ſiccæ, cum decocto roſarum ſiccæ, &

Exterſio vl hordei. Vlcus verò craſſorum inteſtinorum extergemus ſine acrimonia, ceris craſſo clyſtere inſuſo ex mulſa, aut ex ꝓ. j. decocti hordei cum cortice, & mel- rum inteſti lis roſati ꝓ. j. poteris etiam ſaccharum, aut mel cum prædicto decocto norum. miſcere: quòd ſi volueris addere oleum roſaceum, bene licebit ob dolo- rem. Si vlcus ſordidum fuerit, ad ea, quæ fortiùs abſtergunt, deuenies

In vlcere ad decoctum hordei cum melle centaurei, aut cum prædicto decocto mi- ſordido ex- ſcebis ꝓ. j. vnguent. apoſtolorum, aut ꝓ. ſ. vnguenti ægiptiaci, aut ꝓ. j. tergentia. pul. Ioannis Vigonis. Quod ſi vlcus ſit in inteſtino recto, prædictis vn- guentis intinges ſt. immulam, & immittes. Si his non curetur, deuenien-

Si ſit putri dum erit, cum vlcus eſt putridum, & ſerpens, ad cauſtica, quibus cru- dum et ſer ſt. am inducemus. Aſſumentes paſillorum Andronis, aut Paſionis ꝓ. ii. p. ſ. cum ſucco plantaginis, aut decocto myrtillo- rum, ex quibus etiam poſſu-

mus

mus unguentum conficere ad inungendam flammulam in ulcere intestini recti. Attramentarius etiam mysi, calcantho, fori, et aliis cum succo Cicatricem plantaginis uti poteris. Expurgato ulcere, quod cognoscas ex paucitate inducentia sanici, & ex sanguine puro egrediente, cicatricem induces adstringenti in dysenteribus medicamentis, permiscens cum eis, quæ acrimoniam bilis temperent. Præterea cum hæc affectio vigilias, & dolorem inducat, eis prospicere Ad vigi- oportet, quia vires deiciunt. Vigiliis medebimur ea ratione, qua cap. de lias, ad do- phrenicidæ diximus: hæc autem potio in hoc affectu est utilis, quæ bilem lo- rem. temperat, adstringit, & somnum conciliat: ℞. Syrupi de papauere ℥. j. ℞. Syrupi myrtillorum ℥. j. di. margaritonis frigidi, ℥. ss. boli ℞. aqua- rum plantaginis, & caudæ equinæ an. ℥. ii. capiat dormiturus: aut pote- ris exhibere pilulas Nicolai contra fluxum. Dolorem sedabis anodinis propriis, sæuo anserino cum rosaceo, aut decocto capitis arietis, vel galli- næ cum rosaceo. Quibus si non sedatur, narcotica proderunt, aut supra partem dolentem unguentum comissæ applicabis, in quo grana tria o- pi sint dissoluta.

De Tenesmo. CAP. XXXIX.

Tenesmus vehemens, & inanis est deiciendi appe- titus cum paucò sanguine, lenta, & mucosa eie- ctione. Quæ definitio placuit Paulo lib. 3. cap. 41. *Molestus* & Aetio lib. 9. cap. 43. Hic affectus (quamvis Cel- *utro gerē-* so autore lib. 4. cap. 18. neque acutus, neque longus sit, cum fa- *tibus hic* cile tollatur, ut ipse inquit & nunquam per se iugulet) mo- *-affectus.* lestus tamen est omnibus, & utrum gerentibus molestior. Nam (sene & sapientissimo Hipp. autore 7. lib. aph. 27.) mu- lieri utrum gerenti si tensio superuenerit, facit abortum: qui aphorismis, licet quinquagesimus in antiqua Constantini translatione cum comment. Galeni reperitur 5. lib. in quo Philotheus exponit sic aphorismum, Tenesmus inquit, est continuus, & violentus motus, & secretio pituitosarum, at- que pinguium materialium, cum paucò stercore, & breui san- guine affricto: in antiquo tamen, & Aldino contextu hic a- phorismus non reperitur in 5. lib. & propterea Theodorus, Leoniceus, Musa, Hieremias, Fuchsius, & alij docti scripto- res tantum in 7. lib. collocant hunc aphorismum, qui siue se- mel in aphorismis ab Hippocrate scribatur, siue bis, ut mul- ti alij nimirum si qualia oportet purgare, &c. & ille utrum gerentes, si conuenit purgare à quarto usque ad septimum, &c. Verus est, ut Galenus in commentario demonstrat, di- cens, ob talem igitur tensionem, atque molestiam, & totum aliud corpus laborat, sed præ cæteris matris, quæ cognata est recto intestino: nihil enim mirum, si propter vehementes, atque

DE CVRAND. MORB.

- Causa.* atque crebras exurrectiones foetus abortitur, quando ex aliis omnibus fortibus moribus, atque doloribus mulieres grauidæ solent abortire. Fit hoc malum aliquando ab vlcere intestini recti, quamuis Gal. initio commentarij dicti, 27. visus sit sentire, ab hac causa semper fieri Tenesimum, vt in difficultate intestinorum sit vlcus in intestinis, quæ superius sunt. Neque audiendus est Erasistratus, qui (vt ait Gal. com. 1. 6. lib. aph.) tres esse species leuitatis intestinorum voluit, difficultatem videlicet intestinorum, leuitatem proprie dictam, & tenesimum. Nonnunquam fit a frigidityte externa, aut ab inflatione recti intestini, aut a falsa pituita, aut ab humoribus serosis, acribus, & biliosis. Aliquando (vt scribit Aetius loco superius annotato) obstructio stercoris coacti in intestino cæco efficere potest tenesimum. Frigidam causam externam ex agro deprehendes. Humores & excrementa ex iis, quæ cernuntur, dignosces. Vlcus ex pure, & sanguine minimo stercori immixto inflammationem ex dolore grauante, & ex febre significat. Stercoris multitudinem cognosces ex graui sensu, & distentione circa ventrem inum, & ex priuata deiectione. Pro varia causarum ratione variè etiam medicinam facere consueuimus: curatur tamen primò, victu iam dicto tribus superioribus capitibus, vel saltem contrario causa. Deinde si ab vlcere fiat, curabitur, vt diximus cap. precedenti de dysenteria: Si ab aliis causis per ordinem curabis. Si ab inflammatione sit, sequenti capite curationem demonstrabo. Si corpus bile redundet, vacuabitur per drachmam vnā rhubarbari, aut per drachmam semis corticum myrobalanorum citrinorum, deinde per clyster lauterem lauante: vt ℞. decocti hordei ℥. v. succi siclæ ℥. ij. sacchari rubri ℥. j. misce, & fiat clyster, adde vitella ouorum numero duo, olei rosati ℥. ij. ℞. Si causa sit pituita falsa: ℞. decocti furfuris, & cicerum ℥. v. succi siclæ, & rhodomellis an. ℥. ij. misce, & fiat clyster. Si a fecibus induratis fiat: ℞. foliorum maluarum, violarum, & mercurialis an. m. j. furfuris, passularum sine granis, prunorum damascenorum an. p. j. fiat decoctum, de quo percolato accipe ℥. vij. diacatholicon. & butyri recentis ana. ℥. j. benedictæ ℥. ℞. olei sesamini ℥. ij. salis ℥. j. misce, & fiat clyster. Si a causa sit frigida, lignum nucis, aut cupressi benè calidum, & ignitum sedi admotum curabit. Saccus ex camomilla, anthos, calendula, vino optimo decoctus sedi admotus est remedium salutare huic tenesimo.
- Tapsus.* Tapsus barbatus diuisus in partes paruas, & vino optimo decoct

lecoctus, sed admotus sæpè est non mediocriter remedium, & me feliciter expertum. Si dolor & appetitus deliendi fuerit magnus, & superioribus remediis non curatur, necessaria sunt suppositoria ex athanasia, aut philonio cum pinguedine, aut cera noua, & filo magno: præsertim si ægra fuerit verum gerens, ne abortum patiatur, ut Hippocrates timuit.

De Tenesmo. CAP. XXXIX.

Scholium.



Tenesmus vehemens & inanis.) Non rectè meo iudicio. *Altimario* Altimarius, & alii semper in tenesmo ulceratum esse riuus et alii intestini rectum sentire videntur: sed ut ex 7. aph. com. 27. reprehendimus, tenesmus nil aliud est, quam vehemens et inaudum in us conatus ad egerendum. Ibi aduerte nos pro tensione legere conatum, essentia tenesma enim in tenesmo nulla est in intestino tensio sed conatus magnus, nesmi. b quem frequen ipsius exurgunt: & idè tenesmus est molestissimus locus cori effectus, ex quo abusus solet sequi ob dolorem, quando fit ab ulcere, ob gignit. compressionem rieri à musculis abdominis factam & ob frequentem motum, ex quo etiam febris diaria oriri solet. Causæ tenesmi sunt ea o- Causa tenesmi. nia, quæ facultatem expultricem intestini recti excitant ad vehementem & continuum motum, qualia sunt quæ irritant, & quæ grauant. Curatio. irritant, pituita ibi impacta, & ulceris dolor: grauant fæces inmodicæ. Frigiditatem externam exilimo nunquam facere tenesmum, benè musculi resolutionem. Curatur tenesmus ea ratione, qua dysenteria ex intestinis crassus dependens.

De Colico dolore, & ileo. CAP. XL.

Color, qui in intestino laxiore, quod colon Græcè *Descriptio.* vocatur, accidit, colica à nostris medicis dicitur, & aliorum etiam duorum intestinorum crassiorum dolor, de quo Paul. lib. 3. cap. 43. dicit, Colon cum pars sit intestini crassi a dextra iliorum regione procedens ad sinistram, cincturæ modo pertinet. Et Actius lib. 9. cap. 29. & Gal. variis locis, præsertim lib. 2. de loc. affec. cap. 1. ubi ponens discrimen inter dolorem, qui fit ab humore acro, & eum, qui fit a multitudine: porro, inquit, mihi ipsi accidisse dolorem vehementissimum, ut mihi videretur in initio ventrem terebro perforari, in eo potissimum spatio, quod a renibus ad vesicam *Galen.* per vretes scimus extendi. Quo loco docet Gal. hunc dolorem sæpe præcedere dysenteriam, & aliquas scribit huius doloris notas, quamuis lib. 6. cap. 2. quomodo medicus hunc affectum a nephritide discernere possit, docet. A variis fit *Causa.* causis hoc symptoma, ut videre est apud Galen. Paulum, & Act

D E C V R A N D. M O R B.

Aetium locis supra notatis. Sed à quatuor potissimum nascitur, interdum à crassis ac pituitosis humoribus oritur, ut Gal. cōtingit, qui laborans hoc symptomate excreuit simul cū dolore grauissimo pituitam vitream. Interdum fit à flatulentis spiritibus, aut propter inflammationem molestantem ac distendentem crassum intestinum, aut ob acres, & erodentes humores prædictum intestinum vehementer affli-

Notæ crassæ humoris. gentes, fieri solet ab stercore indurato, & aliis. Quando crassus & pituitosus humor est causa, per totum abdomen in alto, præsertim ubi est coli situs, sentitur dolor perinde, ac si intestinum tunderetur, & perforaretur. Adest nausea, ructus,

Spiritus flatulentii. vomitus pituitæ maxime si natura ægri, & victus pituitam ament. Qui dolent ex flatulento spiritu, tensionem experiuntur, flatum quoque sentiunt, & emittunt. Qui inflammationis causa dolent, febrium sentiunt feruorem, sitiunt, circa ventrem pulsationem sentiunt, laboriose urinam & stercora

Acritū humorum. depellunt, bilē etiam aliquando euomunt, & hæc colica tanquam grauissima in ileum transire solet. Similes ferme sunt *Descriptio ilei.* notæ, quando ab acribus fit humoribus: quamuis vrina & deiectiones biliosæ apparent, & earum suppressio sit minor.

Ileum malum est tenuium intestinorum, grauissimos & lethales dolores inferens. De quo symptomate Paul. lib. 3. c. 44. dicit ileos cum affectus sit maximus, acutus, & dolorificus, symptoma quoddam habet periculo grauius: & Aetius lib. 9. cap. 28. dicit, voluulus est affectio intestinorū lethalem dolorem inferens, & Gal. com. 10. lib. septimi aph. in quo innuit, in iliis nihil descendere ad inferiora, quod est proprium illis, & inseparabile. Sed vomitus iis non semper adest, sed quando exitiales sunt, etsi vehemētius distorqueantur, stercus eis ascendit, atque singultiunt, & alia multa scribit de desipientia, & cōuulsione, quæ in hoc morbo exitialia fiunt.

Dubitatio. An reperiatur ileum sine vomitu, ut vult Gal. Musa dubitat, cum longa satis experientia semper vomere iliosos omnes ipse viderit. Huius symptomatis duæ differentię ponuntur

Differentie a Celso lib. 4. c. 14. Prima est, cum obstructio est in parte superiori gracilioris intestini, in qua cibus per vomitum exit: altera, quando obstructio est in parte inferiori, in qua exit stercus per os. Causæ & notę similes sunt colicę causis, quamuis Gal. com. 40. lib. 6. aph. huius, quibus dolor ilium fit absque inflammatione, his febris superueniens morbum soluit, causas omnes ferme huius sympt. scribat, præter illas tamen est illa de veneno sumpto. Nonnunquam verò intestinum vnā cum stercore descendit in scrotum, quos ferme semper mori vidi

di sine voce.

Curatur primò, victu contrario causis huius symptoma- *Curatio co*
 :semper tamen molliente, præsertim si ex fœcibus desicca- *lici doloris.*
 fiat, vt iure pingui, beta, prunis damascenis, passulis sine *victus in*
 anis, butyro recenti, oleo sesamino, & oleo amygdalarum *fœcibus de*
 alcium. Cibi bonum sanguinem generent, sint faciles con- *siccatis.*
 etu ob dissolutionem facultatis, qualia sunt ius gallinæ, *In causa*
 ia sorbilia recentia, testes gallorum gallinaceorum, hepa- *frigida.*
 gallinarum. In frigida causa misceri oportet parum cin-
 namomi, gariophyllorum, croci, & zingiberis. Allia sunt o- *In phleg-*
 tima, laudanturque a Gal. 12. methodi, neque sitim efficiunt, *mone.*
 cape. Aliquando indiget æger inedia, vt si fiat ab inflam- *In calida,*
 matione ex cruditate, & flatu, præcipue in principio. In ca-
 da causa nutriatur iure pullorum gallinaceorum, ptisana
 ordeacea, spinachis, prunis damascenis, & similibus. Po-
 us in frigida sit vinum potens moderatè aqua dilutum, vel
 qua cinnamomi, vel seminis fœniculi, vel anisi, vel mulsæ.
 In calida, aqua hordei, aut liquiritiæ, aut aqua sacchari. De-
 inde curatur abscissione causarum. Sed prius oportet regu-
 lis quasdam generales satis obseruare, & eas maximè me-
 moriæ mandare. Prima est quamuis propria cuiusque mor- *Regulæ. I.*
 i, & symptomatis curatio fiat per causæ abscissionem: in ve- *dolorè esse*
 nienti tamen dolore, breui tempore facultatem vitalem, *sedandum.*
 & omnem dissolvente, prius, & subito curandus est dolor,
 per narcotica medicamenta, quæ sensum partis dolentis po-
 tius semouent, quàm causam amoueant. De his nos abundè
 ap. 4. de cephalalgia, & 36. de diarrhæa, cum Gal. duodeci-
 mo methodi diximus, quo lib. Gal. multa satis necessaria in *Appendix.*
 usu narcoticorum scripsit: vbi etiam docuit narcoticorum *De usu nar-*
 usum esse vtiliorem in colico dolore à bile: nam præterquàm *coticorum.*
 quod magna refrigeratio minus illi nocet, narcotica etiam
 incrassant, & concoquunt bilem, ipsamque immobilem fa-
 ciunt. Hæc regula desumpta est ex Galen. 12. methodi, quam
 postea confirmauit Auicennas. 4. fen. primi lib. cap. penult.
 his verbis semibarbaris. Et quandoque est res, in qua fidu- *Auicennæ*
 cia est, quod dolor ea remoueatur, sed est tarde operans, ita *opinio.*
 quòd dolor ille vsque ad horam illam tolerari non potest, si-
 cut euacuatio materiæ dolorem facientis colicæ retentæ in
 villis intestinorum: aut citò operans, sed ex ea timetur finis
 vehementer malus, sicut stupefactio membri dolentis in co-
 lica, cum medicinis, quæ hoc operari solent, & sit medicus in
 hoc non rarò ambiguus. Oportet ergo vt apud ipsum sit æ-
 stimatiua fortis, vt sciat, quod duorum temporum sit lon-
 gius

DE CVRAND. MORB.

gius, aut tempus fixationis virtutis, aut tempus doloris: & etiam quæ duarum rerum deterior, an dolor, an malus finis, qui ex stupefactione timetur, ut eligat prætermittere illud, quod magis est conueniens: fortasse enim si dolor remanserit, fortitudine sua & magnitudine interficiet: & stupefactio forsan non interficiet, licet ex alia parte impediatur, cuius nocumentum fortasse corrigere poteris, & redibit forsan dolor, & tu

Regula 2. curabis medicina conuenienti. Secunda regula, colica, quæ de medio fit à materia pituitosa, & flatu, curatur medicamentis medicis calidioribus, incidentibus tenuantibus, coquentibus, & diutius adhibe per os aperientibus, externis & internis: nam si initio non va-
dis initio in cuato humore nimis calidis uteremur, fieret maior attractio
flatu. ad partem dolentem, dolorque augetur, & pars dolens posset facillime laborare inflammatione, aut alio tumore præter naturam. Perpetuo ergo a clementioribus ad valentiora

Regula 3. est procedendum, & ultimum utendum post vacationem. Tertia regula, vacuatio in dolore intestinorum facienda est per
de purgan- tibus. tibus. medicamenta clementer purgantia, quæ non attrahant ab aliis partibus, & longinquis præsertim si humor tantum in

Discrimen intestinis fuerit, qualis est hiera simplex, pilulæ elephangi-
faciendi. næ, & de hiera simplici, agaricus trochiscatus & diaphænicon: hæc tamen, & similia per clysterem in colico dolore, &

Regula 4. per os in ileo magis conferunt. Quarta regula, in hoc dolore, semper præcedat vacuatio per clysterem mollientem, & clementem, vacationem aliam, siue facienda sit per acres clysteres, siue per potum, aut pilulas, aut alia medicamenta, ut per hoc, aut simile, ℞. decocti maluarum, bis maluæ, seminis lini, fœnugræci, & fursuris lb. j. butyri recentis, dialthææ, & benedictæ, an. ʒ. j. olei sesamini, & de semine lini an. ʒ. ij. salis ʒ. j. misce, & fiat clyster, quo sumpto decubat æger in partem dolentem. Si flatus impediatur ingressum clysteris, instrumentum, quo infunditur liquor clysteris, habeat fistulam biforem,

Clyster a- ut vna via materiam clysteris iniicias, altera flatus foras eru-
periens. rumpat, sit ita conformatum. His bene consideratis citò curandus est dolor colicus, quia ob vehementiam vires proster- nit. Primum ergo clysteri superiori, aut hoc vacua, ut viam aperias, per quam vacuatio facienda est: ℞. foliorum, maluarum, betæ, bis maluæ, an. m. j. seminis lini, fœnugræci, ficuum siccarum, fursuris an. p. j. fiat decoctum, de quo percolato accipe uncias decem, cui adde benedictæ, butyri recentis an. ʒ. j. olei camomillæ, & de semine lini an. ʒ. ij. salis ʒ. j. misce, & fiat

Clyster a- clyster. Si vero ob stercora exsiccata, aut aliam causam non
acrior. fiat vacuatio, ut sæpe contingit, necessarius erit alter clyster acrior

prior, & aliquando tertius, addendo, cum sit decoctum, drach- *substantia*
 mas duas carthami, drachma vnam hellebori, & drachmam colocyntidis *colocynthidis*
 in ligatura, ne substantia colocynthidis dis- *nocet*
 intestinis noceret. Aliquando ad facultatem expultricem in- *intestinis*
 tandam, atque mouendam indiget æger his aut similibus *Suppositoriis*
 suppositoriis: ℞. pulueris benedictæ, & pulueris hieræ logo- *rit.*
 nis an. 3. iij. salis gemmæ 3. j. s. mellis q. s. misce, & fiant *Preparata*
 duo, aut tria suppositoria nō appensa. Deinde vacuis inte- *tio.*
 stinis, si materia est in aliis partibus pituitosa (à qua sæpius
 concoquatur rhodomelle, syr. de absinthio, de duabus ra-
 dicibus, & similibus, & decocto aut aquis fœniculi, petroseli-
 ni, melissæ & aliis eiusdem naturæ. Postea vacuetur drach-
 ma vna pilularum de Agarico, aut drachma vna pilularum
 ochiarum, aut hoc simili potu: ℞. diacatholicon. 3. s. agar- *Purgatio*
 trochiscati 3. j. electuarij indi ma. 3. iij. rhodomellis 3. j. a-
 quæ fœniculi. q. s. misce, & fiat potus. Si materia fuerit in in- *Decoctum*
 testinis fixa, & in partibus propinquis, sola hiera simp. & aga-
 rico aut diaphænicon fiat vacuatio. Die sequenti post eua- *Clyster*
 cuationem bibat æger hunc, aut similem potum: ℞. decocti
 camomillæ 3. iij. theriacæ magnæ, aut mithridati 3. j. rhodo-
 mellis 3. j. misce. Aut hic clyster, aut similis iniiciatur: ℞. de-
 octi hordei, & radice althææ lb. j. rhodomellis 3. j. oiei de
 semine lini, & camomillæ an. 3. ij. misce, & fiat clyster. Dein- *Sublatæ*
 e curatur dolor clysteribus ex oleo camomillæ, vino opti- *causa cura*
 no, & aqua naphæ, aut ex solo oleo rutæ, & camomillæ, aut *rio doloris*
 x iure intestinorum, & pedum arterinorum (quod dicitur *sequitur*
 calcozinado) cum oleis camomillæ, de semine lini, & iis- *Intestina*
 nino. Si intestina sint lupi, maiore habebunt facultatem, & *lupi qua-*
 im ad corroboranda humana intestina, & eorum dolorem *lia sint.*
 urandum: stercus tamen lupi per superiorem partem sum- *Stercus*
 tum, & per inferiorem iniectum omnem dolorem colicum *lupi.*
 proprietate curat, quamuis magis a causa frigida. De quo,
 & aliis, quæ a proprietate iuuant, in fine huius capituli copio-
 sus dicemus. Si cum colico dolore renalis coniungatur, cu- *Curatio mi-*
 ratio mixta erit ex hac, quæ nunc traditur, & alia, quæ dice- *sta doloris*
 ur capite quidragesimo primo huius libri, vt est hic cly- *coli. & re-*
 ster: ℞. parietariæ, maluæ, bisinaluæ, rutæ, an. m. j. camomillæ, *num.*
 seminis lini, fœnugræci, anisi, carui, cymini an. p. s. fiat deco-
 ctum: de quo percolato accipe lb. j. cui adde benedictæ, dia-
 catholicon. an. vnciam semis, butyri recentis, & dialthææ.
 an. vnciam vnam, olei camomillæ, & de semine lini. an. vn- *Clyster*
 ciam vnam semis, olei scorpionum vnciam semis, salis *communis.*
 drachmam, misce, & fiat clyster. Ex prædictis, & similibus
 decoct

DE CVRAND. MORB.

- Fotus.** decoctis in duabus partibus aquæ, & vna vini fotus frequēs, parti dolenti est optimus, vel liquor hic ex ciepsydra ab alto ventri affusus, vel potius admotus ex magna spongia expressa, aut in vesica: Aut ex hoc: ℞. foliorum lauri, origani, calamenti, pulegij, saluiæ, rutæ. an. m. j. vtriusque stæchadis, camomillæ, meliloti. an. p. j. seminis anisi, anethi, carui, dauisi. an. ʒ. ss. vini, & aquæ. an. æquas partes. Fotus etiam ex solis oleis benè calidis camomillæ, de semine lini, rutæ, & scorpiionum curat hunc dolorem à flatu, & causa frigida factum. **Filum ex lixiuio.** Filum ex lixiuio cum cineribus coctum, admotum & bene calidum curat hunc dolorem. Infessus ventris inferioris per semihoram in balneo ex superioribus medicamentis decocto aliquo apparato adiumento est: mora tamen in hoc balneo vires fractas dolore, vigiliis & inedia nimis affligit: quare bono odore, vino & aliis huiusmodi opus est. **Stercus vaccarum.** Stercus vaccarum, præsertim mēse Maio collectum, siue recens, siue ancucurbitu tiquum sit, est in hoc optimum solum, & cum aliis. **Cucurbitula in flatu.** Cucurbitula magna ventri admota curat dolorem ex flatu. **Clyster præcipuus** hic ex iure galli gallinacei veteris, & aliis obtinet in curando dolore principatum: ℞. seminis anisi, fœniculi, fœnugræci. an. ʒ. ij. thymi, epitlimi an. ʒ. j. agarici, colocynthide, salis indi. an. ʒ. ss. sticados, camomillæ. an. m. ss. carthami. ʒ. ij. his omnibus semipuluerizatis farciatur, & consuatur gallus galinaceus vetustissimus, ante mortem verberatus, & post decoquatur, donec ossa separentur à carnibus: deinde ex t̃b. vtilissimus. na huius iuris fiat clyster. Cui iuri percolato si adderes benedictæ vnciam vnā, olei camomillæ vncias tres, esset clysteri maior, & acrior vis. Huic etiam clysteri magna vis inest in hoc dolore curando: ℞. vrinę pueri. t̃b. j. olei de lilio, & de semine lini. an. ʒ. ij. theriacæ magnæ ʒ. ij. misce, & fiat clyster. **Victus.** Si dolor colicus sit àb inflammatione, curatur primò victu tenui, & refrigerante. **Reuulsio.** **Repellentia sumenda.** Secundò, auertentibus per sectionem iecorariæ. Tertiò, repellentibus internis per os, cum est in superioribus intestinis, & si in inferioribus sit, per clysterem, vt decocto hordei, & oleo rosato, aut solo lacte caprino, aut ouino, aut solo oleo violaceo, aut de papauere, aut succis plantaginis, portulacæ, solani, & similibus. Quartò, & vltimò, dissipantibus, & resoluentibus, vt decocto camomillæ, fœnugræci, radicis althææ, seminis lini & similibus. Si à bile fiat colicus dolor primò vacuata bile, secundò, moderatè frigidis, vt est lac, & oleum rosatum, & similia, curabitur. Si à veneno fiat hic dolor, curatur statim vomitu per totum, syrupi acetosi simpli-

ris, cum decocto seminis raphani, aut per infusionem helle-
 bori cum raphano, & postea cum oxymelle simp. secundo, o-
 leo sesamino, & de semine lini in quantitate vnciarum qua-
 tuor. Non dormiat veneno sumpto, quia somnus reuocat ve-
 nenum ad interiora. Tertio, curatur iis, quæ a tota substan-
 tia, seu proprietate veneno sumpto repugnant. Theriaca ma-
 gna, & mytridatum omnia ferme venena curant. Si vis scire
 perfecte naturam cuiusque veneni, & facultatē medicamen-
 torum contrariorum venenis, lege sextum librum Diosco-
 ridis, & libros de facultatibus simplicium medicamentorum
 Galeni, & libros de alexipharmacis, & de theriaca antiquis-
 simi medici, & poetæ Nicandri: lege etiam opus de venenis
 doctoris Santes de Ordonyes. Quæ curant omnem dolorem
 colicum, & iliacum a tota substantia, seu proprietate, omni
 tempore, sunt stercus lupi per os cū rhodomelle, aut aliquo
 liquore. Dosis est drachma vna per clysterem cum cōuenien-
 tium aliorum medicamentorum drachmis duabus, aut tri-
 bus. Si recens fuerit, ventri admotum ad modum cataplas-
 matis curabit hūc dolorem. Ossa etiam, quæ reperiuntur in
 stercore lupi parua quantitate sumpta curant dubio procul
 eum, & ne iterum fiat, prohibent. Idem os collo suspensum a
 multis in hoc laudatur. Lupi intestina, si comedantur, cura-
 bunt ipsum dolorē. Radix iusquiami ventri admotā colicum
 dolorem curat, & qui fieri potest, prohibet. Ventriculus an-
 seris affatus, si comedatur, curat hunc dolorem. Drachma v-
 na semis cornu cerui tosti liberat ab hoc symptomate. Vena
 umbilici masculi infantis curat colicum dolorem masculi,
 & fœminæ, fœminam sanat Deo auspice. Virgæ cerui puluis
 laudatur a quibusdā in hac curatione. Pes lupi collo suspen-
 sus ab aliis laudatur, ius cancrorum hunc dolorem leuat. In
 vehemēti dolore deueniendum est ad narcotica medica-
 menta, semper tamen sunt maximè consideranda quæ de ho-
 rum vſu diximus c. 36. de diarrhæa: primò parti dolenti ad-
 moueatur hoc cataplasma: ℞. parietariæ, foliorum iusquia-
 mi an. ij. farinæ fœnugræci, seminis lini, & camomillæ an. *Topica.*
 p. fiat decoctum, & ex his benè pistis fiat cataplasma, adden-
 do olei de papauere, & de camomilla an. ʒ. ij. croci pulueri-
 zati drachmam vnā, thebaici scrupulum vnum, vitellos
 ouorum numero iij. aut si fortiori egeat auxilio narcotico, &
 simul purgante: ℞. benedictæ ʒ. ss. diaphenicon ʒ. iij. philonij
 Romani ʒ. j. olei camomillæ, & de semine lini an. ʒ. ij. misce, *Narcotica*
 & fiat clyster. Rhazes miscet narcotica cū purgantibus: Ali-
 quando cogimur in vehemētissimo dolore exhibere drach-

*Promitus.**Somnus**vitandus.**alexiphar-**maca.**Qui libri**legendi.**Verumque**dolorem cu-**rantia to-**ta substant**tia.**De narco-**ticis.**Topica.**Cataplas-**ma.**Narcotica**purgans.*

DE CVRAND. MORB.

nam vnam athanasiae, aut requiei magnae, aut philonij Romani cum vncijs tribus decocti camomillae, & vncia vna sy-
Ilei curatio rupi papaueris. Ileus dolor curatur iisdem ferme auxilijs,
an eade sit. quaquam valentioribus, usque magis per os sumptis, quam
 per clysterem iniectis: semper tamen vti oportet clysteribus
 non tantum mollientibus, sed acribus, vt per loca apta ster-
 cora depellantur.

De cholico dolore, & ileo. CAP. XXXIX.

Scholium.

*Colicus do-
lor.*

Dolor, qui in intestino.) Dolor colicus ex symptomate &
 parte affecta nomen sumpsit, afficitur enim in eo colon secun-
 dum ex crasis intestinis, quod incipiens à sede dextri renis, et
 currens ad iecoris cauum, hinc secundum ventriculi fundum ad lie-
 ris sedem, & dextrum renem complicatur. Vnde cum dolor secundum
 ventris longitudinem exiit, aut ex parte dextra in sinistram locum
 mutat, vt in eo, qui à flatu fit, sine dubio ex situ partis dolorem colicum
 esse colligimus: cum autem in aliqua parte intestini fixus manet, tum
 Aliquando opus est alia addere signa, aliter enim decipiemur. Cum enim intestini
 nephritici hoc attingat duos renes, quando dolet in parte reni coniuncta, non est
 dolor pro mirum existimare nos dolorem nephriticum esse, videmus enim hac in
 colico assu- re Galen. in seipso deceptum. Neque hic error est periculosus, cum in
 minus. principio, siue dolor sit nephriticus, siue colicus, eadem remedia applica-
 Discrimen vi oporteat ea scilicet, quae sedare possunt dolorem. Hic dolor colicus di-
 doloris co- stinguitur ab ileo ratione doloris, & ratione situs: ob dolorem, quia do-
 lici ab ileo. lor ilei maior est. Primo, quia fit à crassiore substantia magis disten-
 dente, nempe stercore indurato: quod non euenit in colico dolore, quia
 cum hoc intestinum sit multum capax, non potest obstrui, ita vt prohibe-
 beatur stercoris descensus. Secundo, dolor est maior, quia membranosi-
 est ileon intestinum, quam colon. Ex situ doloris etiam distinguuntur
 affectus, quia dolor illic manet semper in regione umbilici, hoc enim inte-
 stinum suis anfractibus illic & sedem vndique umbilico subiectam at-
 Discrimen que conterminam implet. Dolor colicus distat à nephritico, quia etsi in
 doloris coli vtroque vomitus sequatur (ob debilitatem ventriculi ex defectu spiri-
 ei et nephritici, qui à dolore attrahuntur) maior tamen sequitur in colico, ob ricti-
 tiam & continuitatem maiorem cum ventriculo. Tum quia in colico do-
 lore excrementa retinentur aliquando, ita vt neque flatum, neque ru-
 dum emittere possint. Terriò quia à sumpto cibo exacerbatur dolor co-
 licus, non autem nephriticus, cum renes longè à ventriculo absint. Quar-
 to in nephritide dolor est semper fixus, ac in dolore colico aliquando mu-
 tat locum. Quinto in nephritide antecedunt vrinae albae, & perlucidae,
 in quibus deinceps sabulosa subsident, quod in cholico dolore non euenit.

Dolor

Dolor colicus aut sit à causis externis, aut internis. Externæ sunt, alimen Cause co-
ta, aer, aut veneni potio, intemperiem frigidam generantes. Internæ, in- lici doloris,
temperies frigida ex vitrea pituita orta, intemperies calida ex acris hu-
more, flatus distendens, libro de multitudine cap. 10. aut inflammatio.
Si dolor fiat à pituita, cum hæc sit glutinosa, infixa erit, ita vt perforari
videatur intestinum, neque in eo est sitis. Si fiat à bile, erit dolor acutus,
sitis, oris amaritudo, & præcesit bilis retentio. Si ab inflammatione, fe-
bris ostendet. Sicut loci mutatio, distentio eum, qui à flatu ortum habet.
Aliqui, imò omnes dolorem colicum ex stercore indurato fieri scribunt;
quorum sententia aliquibus non placet considerantibus intestini ampli-
tudinem.

Ileos affectus est ilei intestini, à quo eorum, quæ per anum excernuntur. Ileos quid-
ur, evacuatio omnino supprimitur. Hæc suppressio in aliis duobus inte-
stinis tenuibus non contingit, propter bilem (quæ in his expurgatur) ma-
ximè ea intestina irritantem. In intestino vero ileo, cum ita conformatum Ex feci-
ti, vt in suis anfractibus excrementa crassa possint immorari, hanc vi- bus retentis
lemus affectionem contingere, non autem in aliquo ex crassis intestinis. non sit do-
r ex com. 44. libri sexti aph. colligimus. Quòd si Gal. 3. epy. par. 2. som. lor in cras-
s. hunc affectum aliquando ad crassa referat intestina, intelligendum so intestino
d est de crassiori parte intestini tenuis, quæ crasso intestino adheret. Ex ex Galeno,
iac varia partium in intestino consideratione Celsus lib. 4. cap. 14. Ilei illi doloris
luas differentias scribit. Huius symptomatis causæ sunt minime illa, quæ causæ
excrementorum descensum impedire possunt, qualia sunt magna inflam-
matio, stercus induratum, & mutatus situs intestini, qui herniam inte-
stinalem efficit. Aliqui addunt quartam causam, crassum scilicet & Ileos non
iscidum humorem, ab eo enim etiam potest fieri obstructio. Horum sen- sit à crasso
entia non placet Gal. 6. aph. com. 44. eo quòd (vt existimo) bilis flava humore,
per ipsum descendens humore extergit. Quæ etiam est causa, ob quam
leos et si fiat ab stercore indurato, raro tamen, & cum contingit, id fit
x esu rerum adstringentium, vt mespilorum, aut ex febre adurere, aut
x venenoso pharmaco exsiccante stercus, vt ex auri pigmento in socri-
nea vidit Ludouicus Collado præceptor. Si obicias, Hippocratem in præ Vietti-
icti commentarii sententia sentire, ileon posse fieri ab humore crasso &
lutinoso. Respondet Gal. in com. dictum aphor. esse suspectum. Magnam
leos proprium est, nil per inferna excerni, quòd si exitiali sit, stercus
er os educetur. Ex dolore etiam, & tumore in regione animum intesti-
orum ipsum deprehendes.

Curatur primò, victu contrario. Dolor colicus à causis externis. Curatio co-
rtus facile curatur: non ita ab internis, & ideo breuiter eius curatione licet doloris
roponimus. Si dolor hic fiat à pituita vitrea, & non urgeat, statim non Curatio si
st, quòd discutientibus vtamur, quia et si illa pituita sit materia fla- fiat à pitui-
tis, & hi ex ea eleuari dolorem inducant, nihilominus tamen, cum dis- ta et flaua
sistentia medicamenta humorem inflatum muerit, augebunt dolorem,

DE CVRAND. MORB.

ac proinde ab illis abstinendum erit, & utendum prius illis, quæ pituitam euacuant: quale est clyster factus ex faniculo, anetho, canemelo, thymo, pulegio, semine lini, cum rhodomellis ℥.ii. benedictæ & hieræ picræ ana. ℥.℞. & olei rutacæ ℥.iii. Pituita euacuata, sacculos parabimus discutiētes flatus, ex fursure, sale, & milio. Fomētābimus etiā locum panno imbuto in aqua & vino, in quibus faniculum, polium, aut anethum bullierint. Clystere etiā utemur ex oleo cum prædictis herbis decocto addita pinguedine gallinæ, aut anseris. Allia, nisi ad sit febris, si edamur, flatum discutiunt, sicut & cucurbitula supra partem affectam adnota, quæ ob utilitatis celeritatem incantamenti ritu id videtur præstare. Debemus tamen post cucurbitulam clystere acri euacuare humorem, si aliquis contineatur in intestinis, aliter enim calfacientes partem, aut malo victu statim redibit dolor. Si dolor à bile procedat, & non urgeat, curabitur alimentis frigidis & humidis. Clysteribus etiā, dummodò non sint acres, ne humoris acrimoniā intendant, facultas eorum debet esse abstergens, & refrigerans, cui rei decoctum hordei, cum rhodomelle permixtum conueniet. Et cum bilis duplicem præstet indicationem, in quantum in colo præter naturam detinetur, euacuationem, & in quantum acris, contemperationem, vnum enim diuersis modis consideratum variè indicat: proinde syrupis granatorum, cydoniorum, & similibus temperata bile eam purgabimus, ita, ut si nullam voluerimus educere, utamur hiera parata ex aloë non lota si paucam, ex aloë lota. Ex his intelliges male auctorem, & alios lupinum stercus, & alia medicamenta toto temperamento aut proprietate (ut ipsi dicunt) colicum dolorem curantia, describere: talia enim non reperiri ostendit affectus ipse habens manifestam causam. Si obiicias Galenum libro II. simplicium: Responder multoties eum tanquam supersticiosum omittendum in his remediis.

Si ab infla Si dolor colicus sit ab inflammatione.) In dolore colico ab inflammatione. inflammatione secanda est vent, ut remellamus, & euacuemus. Pena autem potest esse ea, quæ est in pede, aut brachii basilica, quia colon (sicut & renes) in medio corporis pendet, posuum intra testes & iecur. Deinde sup. locum affectum repellentia imposita sunt ex vsu, sicut & alia omnia, quæ ad curationem inflammationis applicari solent. Atque hæc Curatio do est colici doloris, quando non urget, curatio. Quod si urgeat, & ab humoris urgen more acri oriatur, tum sedabimus narcoticis medicamentis, quæ improprie anodina appellantur à Galeno. Clyster ex decocto hordei, & capitibus papaueris parabitur. Per os assumemus philonii maioris ℥.j. cum decocto lactucæ, & faniculi: hæc enim medicamenta in hoc affectu ex calida causa orio triplici ratione præsent: Primò, quia partis sensum offerunt, & ideo dolorem, dolor enim non fit sine sensu: Secundò, quia retundunt acrimoniā humoris: Tertiò, quia incrassant tenuem humorem, ne intra membranas intestinorum se insinuet. Si obiicias incommodum (quod

quod est intemperies frigida) ex stupefacientibus medicamentis sequi Narcotica solitum, tibi satisfaciet Gal. 12. method. melius esse intemperiem ex illis in dolore à relictam longo tempore curare, quàm breui viriliter mori. Si dolor ut-
pitiua vi-
geat, & fiat à pituita vitrea, cauendum à narcoticis est, quia duplicem trea vitam
inducunt noxam, prima est, densando tunicam intestinorum viam præ-
cludere spiritui: Secunda est humorem incrassare. His ergo si utaris me-
dicamentis, statim sedabis dolorem, attamen si deinceps calefacientibus
cures, ex spiritu aucto dolorem denovo excitabis, ita, ut ad narcotica de-
uenire cogaris, quod tertio & quarto efficiens in sanabilis affectus au-
ctor eris. Quæ omnia docent hunc dolorem medicum postulare peritum,
qui sensim extenuet, & concoquat humorem.

Ileos dolor curatur eisdem fermè.) Ileus si fiat ab inflammatio-
ne (quod cognoscemus ex febre, tumore apparente in regione intestinorū, ab inflam-
& pulsu) curatur sanguinis missione, propter causam sæpius dictā. Ex-
matione.
terius repellentia, oxirrodinum, & alia, quæ applicantur, permiscenda Exterius.
sunt cum digerentibus, decocto camemeli, fœnugræci, & similibus, quo-
niam in hoc affectu principium breuissimū est. Clystere nil infundatur, Clyster.
sed per os ob intestini ilei viciniam cum ventriculo, & ut iuuent descen-
sum excrementorum assimi debent remedia, quæ ideò repellere debent,
& non adstringere, imò lubricam reddere aluum. Huiusmodi sunt deco-
ctum maluarum, lactuca, scariolæ, solani, semperuiui, syrupus rosarum,
& violarum. Pituita in cibo assumpta aluum lubricat, sedat sitim, re-
pellit, humectat, & statim nutrit. Ileus ex stercore indurato emollientia
postulat. Partem exteriorē fouebimus decocto lini, maluanisoi, althææ, Curatio illi
fœnugræci cum butyro, & axingūs, aut oleo solo dulci, aut oleo, in quo doloris ex
semen lini, fœnugræci, aut aliud simile efferuerit: Unguentum etiam stercore in
eandem partem unguentis de althæa, de agrippa, & aliis emolliendi durato.
rim habentibus, ex feruesfacto etiam semine lini cum radice althææ, &
oleo, & pauca cera unguentum construere poteris. Emolito stercore
(quod tactu deprehendes) ad eccoprotica medicamenta accedes, quorum Eccoproti-
vis non transcendit iecur, ut ad cassiam per euaporationem extractam ea,
cum decocto maluarum lini, & fœnugræci. Si hæc non prosit, ad majo-
ra deuenies, diacatholicon, cassiam, diaphanicon, diacarthamum, et dia-
prunis laxatiuum. Quod si neque ex his utilitatem animaduertas, colo-
cynthide vii poteris: ℞. colocynthidis ꝯ.iii. cassiæ ꝯ. j. cum decocto supe-
riori. In stercore verò indurato à veneno, præter ea, quæ diximus, vomiti-
toria medicamenta, & quæ toto temperamento veneno aduersantur, Si fiat à ve-
conducent. Quando mutatus situs intestini à casu, aut flatu ileos gene-
neno ster-
rat (quod sensu deprehendes) periculosus est affectus, quoniam statim cus indu-
solet inflammari intestinum. Hoc restituetur supino collocato homine, & rante,
digitis comprimentes intestinum. Aer etiam per folles fabrorum per a- Si à muta-
num immisus sua vi lentia intestinum in suum locum reponit, quod re-
to situ inte-
medium etiam vile est in ileo à facibus induratis orto. In ileo à qua-
stini.

Nota re- cunque causa procedat, semper opus est, faeces deponere ab intestino re-
medium, Etio, ne reliquorum excrementorum euacuatio impediatur.

De inflammatione Hepatis. CAP. XLI.

Inflamma Inflammatio in hepate perinde fit, atque in aliis visceri-
tis hae bus, & ab iisdem causis. Quare quæ diximus capitibus de
causa ab phrenitide, de peripneumonia, & de pleuritide iterum inspi-
aliis peren ce, similiter quæ a Paul. lib. 3. cap. 46. in quo multi alij iecoris
da, affectus demonstrantur. Aetius quoq; de hoc morbo agit lib.
10. c. 3. & Gal. lib. 5. de locis affect. cap. 6. quo cap. omnes ferme
Nota, huius affectus notas describit, dolorem scilicet dextri hypo-
chondrij, grauitatemque peruenientem sursum ad iugulum
vsque, deorsum verò ad costas spurias: Tumor in eodem dex-
tro hypochondrio est, præsertim si gibba pars fuerit inflam-
mata: Acuta febris adest, tuilis sicca, difficultas spiritus, sitis
inexhausta, cibi fastidium. Aliquândo hepatis inflammato sin-
gultus aduenit, vt docet vetustissimus Hippocr. aph. 58. lib. 5.
non semper, vt inquit in commentario Gal. sed quando ad
Error maximam atq; tollitur inflammationē. Propter neruorū com-
Oribasii. municationem singultus hic est per cōsensum vaporis acris,
& etiam compressio ventriculi ore: errat ergo Oribasius di-
cens, hunc singultum esse ex inanitione. Aphorismum hunc
confirmat Celsus Latinus, Hippocr. lib. 2. cap. 7. dicens fre-
quens singultus & præter cōsuetudinem continuus iecur ef-
se inflammatū significat. Philotheus exponens finem huius
aphor. quod iecore, inquit inflammato fit, non talis, sed sin-
gultus, & maxime si simam partem inflammari contingat,
cum in inflammatione caliditas ad se ipsam humiditates, quæ
in stomacho sunt, trahit, & consumit, & hinc stomachus ex-
siccatur, & ex siccitate consumitur, ad quam conuulsoriam
dispositionem singultus fit. Quo in loco Philotheus visus est
sequi Oribasium, sed ipsis repugnat Gal. comm. quoque 17.
lib. 7. aph. dicens, per consensum os ventriculi ab hepatis ma-
gna inflammatione laborare, atque morderi, & singultire
certum est. Scire quando pars sima inflammata est, & quan-
do gibba, & quando muscoli, Gal. aperte, & longo sermone
cap. 6. lib. 5. de locis affectis demonstrat.

Curatio in Curatur septem remediorum generibus: primò, victu
flamatio- refrigerante, tenui, reddente sanguinem ineptum motui,
nis in par- vt aere natura frigido, vel arte parato, aquis, herbis, & flo-
re causa ie- ribus frigidis, lacte amygdalarum, cremore hordei, suc-
coris, co malorum granatorum, cichorea, & lactuca coctis, pane
bene loto, & iure pulli gallinacei, si fuerit imbecilla facultas,
abit

abſtinentia vini, carniū & ouorum, & cæterarum rerum, quæ ſanguinem augment, & calfaciunt.

Secundò, auertentibus, vt ſanguinis miſſione per ſectio-
em iecorariæ dextræ, extrahaturque ſanguinis quãtitas, &
umerus reſpondens plenitudini, & naturæ infirmi, & ma-
nitudini morbi. Vbi ætas & vires prohibent venæ ſectio-
ẽ, fiat ſanguinis miſſio per cucurbitulas admotas naribus,
ut ſcapulis cum ſcarificatione. Ligaturę, friccionẽs, & fotus
xtremorum ſatis auertunt. *Renulſio.*

Tertiò, repellentibus frigidis, & ſtipticis, internis, & ex-
ternis mitioribus, & ſemper admixto aliquo corroborante
arum calido, ne conuerſa phlegmone in ſcirrum, aut facta
obſtructione inter iecur & veſicam fellis, hydrops, aut mors
equatur, vt ſumpto hoc medicamẽto, aut ſimili, tertia qua-
que hora, quantitate duarum vnciarum: ℥. ſyrupi roſarum
ex infuſione ſiccarum ꝑ. iij. ſyrupi endiuiz compoſ. ꝑ. ij. aquæ
endiuiz, & cichoreæ, an. ꝑ. iij. aquæ eupatoriij, aut abſinthij
ꝑ. ij. miſce. Hepati ſæpe admoueatur vnguẽtum ſantalatum, *Internæ.*
vel cerotum ſantalatum tepidum: aut liquor hic remiſſe ca-
lidus, ℥. aquæ roſarum, & endiuiz an. ꝑ. iij. aquæ abſinthij,
& olei roſati an. ꝑ. ij. aceti ſambucini ꝑ. ſ. miſce, & fiat epi-
thema, quod ſæpe hepati admoueatur. Hoc vnguẽtum re-
pellit ſatis bene: ℥. olei roſarũ ꝑ. ij. olei myrtillorum ꝑ. j. olei
de ſpica, & de abſinthio an. ꝑ. ſ. ſantalorũ omnium, & trochiſ-
corum de camphora an. ꝑ. j. ceræ q. ſ. miſce, & fiat vnguẽtũ. *Externæ.*

Quartò, concoquentibus materiam mixtam ex pituita,
& bile, additis ſemper aſtringentibus, partem principem ro-
borantibus: vt ℥. rhodomellis vncias iij. ſyrupi roſarum
ꝑ. ij. miſce: & ℥. decocti hordei ſine cortice, endiuiz, & ab-
ſinthij ꝑ. v. ſi magna fuerit copia pituitæ, ſyrupo de duabus
radicibus, & rhodomelle concoquenda eſt. Si verò atra bilis
mixta fuerit, ſyrupo de fumoterræ, de bugloſſa, & ſimilibus. *Præparatio humo-
ris miſti.*

Quintò, vacuantibus materiam mixtam medicamentis
habentibus mixtam facultatem purgãdi bilem, & pituitam,
vt ℥. diacatholicon. ꝑ. v. agarici trochiſcati, & rhabbarbari
electi infuſi per noctem in aqua endiuiz an. ꝑ. j. diaprunis ſo-
lutiui ꝑ. iij. ſyrupi endiuiz ſimplicis ꝑ. j. aquæ borraginis q.
ſ. miſce, & fiat potus: aut ℥. pilularum aggregatiuarum ꝑ.
j. fiant pilulæ ſeptem. Ex medicamentis, quæ pituitam, &
bilem purgant poteris componere augendo, vel minuen-
do habita ratione humoris dominantis. Si verò atra bilis ſit
mixta cum pituita, aut flaua bile, quæ purgant ipſam, ſunt
miſcenda: ſemper tamen, quæ iecur corroborant, adde, vt ſunt *Obſerua.*

DE CVRAND. MORB.

Curatio omnis endiuita, absinthium & spica. Sed si materia fuerit in gibba hepatis parte, mouentibus vrinam vti oportet, vt syrupo capillorum veneris, de liquiritia, de duabus radicibus, & decocto quatuor seminum frigidorum maiorum, & radicum diureticarum in parua quantitate, quia tam purgantia, quam vrinatoria medicamenta clementi, & benigna egent vi, & natura.

Resolutio Sexto, resoluentibus, & digerentibus reliquias materiam cum astringione, senfim, & mixtis stipticis: vt ℞. florum camomillæ, meliloti, anethi, althææ an. p. j. absinthij, m. ss. rosarum p. ss. spicæ, squinanti, & mastichis an. z. iij. fiat decoctum in lb. iij. aquæ ad medietatem; quo percolato vttere ad formam foti. Ex his etiam fiat sacculus hepati ad mouendum, vel oleum camomillæ, rosarum & de spica simul calida hepati admoueantur, vel hoc vnguentum: ℞. olei camomillæ ℥. ij. olei de lilio, de absinthio, & nardini an. ℥. ss. pulueris squinanti, rosatæ nouel-
Fotus. le & absinthij an. z. j. ceræ quod sufficit, misce, & fiat vnguentum, quo inungatur hepar.
Sacculus.
Olea.
Vnguentum.
Alteratio.

Interna Septimo, intemperiem calidam à sanguine, & bile relictam corrigentibus.
Externa. corrigentibus internis, vt electuario diatrium santalorum, diarrhodon abbatis, conserua rosata, syrupo rosarum, endiuie simplici & composito, & similibus. Et externis dictis tertio genere remediorum. Si phlegmone suppuratur (quod scies

Suppuratio. autore Hippocrate aph. 47. lib. 2. ex febris, & doloris intensione) coctio & suppuratio iuuari debet cataplasmate ex decoctis ficibus, maluis, bis malua, semine lini, fœnugræco, vuis passis, oleo amygdalarum dulcium, butyro recenti, vitellis ouorum, & pauco croco. Deinde abscessum motu violento rumpes, saltu videlicet, tussi, vocibus, sternutamento. Postea tergebis, hoc, aut simili medicamento, si est in gibba parte vlcus: ℞. furfuris cicerum nigrorum, hordei, an. p. j. liquiritiæ, radicis petroselinij an. ℥. ss. fiat decoctum: & de quo percolato accipe lb. ij. cui adde mellis & sacchari, an. lb. ss. aceti

Ruptio. 3. j. misce, & fiat ad modum oxymellis. Si verò fuerit in sima, tergebis cassia, manna, sero caprino, & succo rosarum in parua quantitate, & aliis aluum deicientibus. Postremo vlcus est glutinandum bolo armeno, terra sigillata, sanguine draconis, thure, & similibus. Si hepar obduruit, emplastro de meliloto, aut filij Zachariæ molliatur, aut hoc vnguento: ℞. olei sesamini, amygdalarum dulcium, & de semine lini, an. ℥. j. mucilaginis fœnugræci, & de semine lini, aquæ bis maluæ extractæ, an. z. iij. axungia gallinæ, & medullæ cruri vituli an. z. ij. emplastri de meliloto loco ceræ, quod sufficit, misce

Tertio in parte gibba.
In parte sima.
Glutinatio.

Vnguentum ad duntaxat.
Vitium.

misce, & fiat vnguentum: vel ℥. emplastri filij Zachariæ, & de meliloto, an. æquas partes extendantur super alutam ad formam mediæ lunæ, & hepati admoveatur.

De inflammatione iecoris. CAP. XL I.

Scholium.

Inflammatione in hepate.) Per iecoris inflammationem Per inflā-
intelligimus tumorem præter naturam, siue fiat à sanguine, mationem
siue à bile, siue à melancholia, nam à pituita non potest fieri, iecoris
vt docet Galen. lib. 4. de præf. ex pul. cap. 3. eo quod hæc à iecore conco- quid intel-
quitur, & compactam habet viscus substantiam. Qua ratione fiat in- ligendum.
flammatiō, ex libro de ineq. intemperie cap. 3. & ex 2. de diff. feb. cap. de Locus in-
fluxione intelliges. In huius visceris inflāmatione primò distingue, an sit flāmatio-
in parte gibba, an in caua, hoc enim maximè cōducit ad curationem. Hæc nis cōfide-
variae hepatis partes inflāmatæ aliquid habent commune & aliquid randus.
propriū, commune habent grauitatem in iugulo inducere, ipsum enim Quid ha-
deorsum ferunt quasi pressum: quod ex Gal. 2. de loc. affec. cap. 7. ob venę beant com-
cauæ tensionem, magis quàm ob membranas contingit. Vbi si diuersionem mune va-
illam magis, consideremus, intellectum simul habebimus, Gal. non ne- riæ hepa-
gare ob membranas etiam fieri. Secundo habent communem pulsum duæ partes
rum, qui proprius est inflammationum, à quibus solent arteriæ distendi: inflāmatio.
communis etiam ipsis est febris acuta, linguæ nigredo, & suis, sicut &
ichores semper ex ipsis resiccare. Oportet etiam in his inflammationibus
propter victum distinguere tempora fluxionis à temporibus concoctio-
nis. Propriū, quod habet inflāmatio gibbæ partis, est tussicula sicca Quid pro-
ob septi compressionem orta, si etiam comprimimus iecoris regionē, dolo- prium.
rem excitatum sentiemus. Distingues autem, an inflāmatio sit in mu-
sculis necne, ex figura partis. Si inflāmatio cauam occupet partem,
dolor ad intestina verget, ventriculus vomitu bilioso, & multis ichori-
bus referto tentabitur, deiectiones erunt cruentæ, & singultus aliquan-
do apparebit, quod malum signum est ex Hippocrate, quia inflāmatio
nis magnitudinem sequitur.

Curatur septem remediorum generibus.) Victus in hoc af- Victus.
fectu debet esse tenuis, & abstergens, ex cichorea, asparagis, prisanæ
cremore, & oxymelite, omittentes mulsam, quæ detenta bilescit. Tum a-
limenta adstringentia pirum, malum cydonium, & malū punicum, cum
in caua parte mutantur in sanguinem in inflāmatione gibbæ partis con-
ceduntur: quæ in sine partis inflāmatione lædunt cōstringendo meatus.

Secundo, auertentibus.) Sanguinis misio non est exercenda pro- Sanguinis
pter plenitudinem, vt auctor voluit, quia bene potest esse iecur inflam- misio.
matum non existente in corpore plenitudine. Cum ergo in inflammatione Error au-
sit aliquid fiens, & aliquid factum, sanguinē mittimus, vt reuellamus etoris.
humorem fluentem ad locum affectum, & euacuemus cōtentum in ipso.

Et

D E C V R A N D. M O R B.

Que vena Et quamvis vtræque basilica secari possit, si solam venarum rectitudinem consideremus: consulo tamen semper secare basilicam dextram, quia hæc præter dictam rectitudinem, altæram habet, quæ naturæ dicitur.

Repellentia. Tertio, repellentibus frigidis.) Si inflammatio sit in parte gibba iecoris, repellentibus in parte exteriori utemur, dummodo non sint æstu frigida, ne lædant iecur: utemur ergo absinthio cum oleo rosaceo, aut

Purgatio, cum aceto. Si inflammatio sit in caua parte, ab his repellentibus abstinendum erit, quia eorum vis eò non penetrat: & apparente concoctione (quod in incremento contingit) per alium oportebit purgare ichores residuales, ex inflammatione, ut mercuriali, in declinatione verò diacatholicon, & electuario de succo rosarum. In inflammatione verò gibbæ partis, in incremento per urinam benigna purgantia utilia sunt, eupatorium scilicet, urtica, & feniculum: In declinatione verò vehementissima, inter quæ est assarum.

Error auctoris. Quarto, concoquentibus.) Hoc loco errat crassissimè auctor purgans in inflammatione iecoris bilem, & pituitam indiscriminatim, quasi inflammatio semper ab his humoribus fiat. Quæ autem ratione sit purgandum, paulò superius explicavi, non enim humorem à toto corpore educere intendimus in hoc affectu, sed ichores ex inflammatione residuales in cavitates venarum iecoris.

D e o b s t r u c t i o n e h e p a t i s. C A P. X L I I.

Que partes laborant. H Ecoris venæ tam sinæ partis, quam gibbæ obstructionem patiuntur; tametsi priores frequenter: quod ansam (ut reor) Aetio dedit, illas tantum memoradi: reuera tamen vtræque in id vitium incidunt, ut obstruantur. Fit autem, ut prioribus id magis contingat, quòd alimentum ad cauam iecoris partem crassum adhuc, atque illaboratum perueniat: quam iniuriam gibba non sentit, & si aliquando sentiat, obturatur similiter: nec ob hæc solum causam, sed propter alias quoque, quas tam gibba, quam caua iecoris pars habent communes. Hæ sunt procatartica nonnunquam, ut ictus, casus, aut duræ alicuius rei ad dextrum hypochondrium collisio. Præterea singuli, aut alterius cuiuspiam rei, arcta constrictio, frigus exterior, & quicquid suo compressu hepatis venas potuit arctare, ita ut quasi conniveant, aut saltè doloris sensu per compressionem excitato eam sanguinis molè attrahant, quæ venæ ultra modum repletæ in obstructionem incidunt. Sæpè verò internæ, quas Gal. lib. de loc. affec. 5. c. 6. binario numero comprehendit. Obstructiones inquiens, iecoris fieri vel propter crassos, & viscidos humores, qui à crasso & pituitoso alimento generantur, vel a flatuoso spiritu, cui exitus non patet. Cau-

procatarctica ab ægrotante sunt petendæ. Internæ sic
prehenduntur, si a crassis, & viscidis humoribus obstru-
to fiat, grauitas in hypochondrio dextro sentitur, si a fla-
uoso spiritu præter grauitatem, tensionis quoq; sensus ad-
obstructos pallor totius corporis sequitur, tussis & diffi-
tas anhelitus, maxime si exercuerint seipsos, vel in altio-
n locum ascendere tentauerint: trahitur enim ad inferio-
propter hepatis grauitatem septum trāsuersum: vnde dif-
ilter anhelat. Porro cum multa sint signa tam obstructio- *Curatio*
hepatis, quam inflammationi communia, febris inter a-
solius inflammationis proprium signum est.

Hepatis obstructio, quæ sit a frigidis, & crassis humoribus, *Victus.*
tratur quinque rennediorum generibus: primò, victu te-
ante, calido, & aperiente, non immodico, præsertim ante
rgatione: cum in quarto genere valentioribus sit vtédum:
asparagis, iure cicerum nigrorum, radicum petroselini,
iorum raphani, senationum, vel nasturtij aquatici. Hispa-
berros, de quo Dioscorides lib. quarto cap. 82. & simillium
n carne, & sine carne. Potus sit vinum album aqua dilu-
n, vel decoctum capilli Veneris, aut ceterac. Vitanda sunt *Vitanda*
nia alimenta crassioris succi, balnea, coitus, & exercita-
nes à cibo.

Secundo, celerrimè (quia inueterata obstructio non solum *Præpara-*
iccinore, sed in omni corporis parte putrefactionem pa- *tio celerri-*
febrimque accendit) attenuantibus, & incidentibus ma- *ma.*
ia concoquatur, vt ℥. rhodomellis ʒ. vj. oxymellis sim-
cis, & syrupi de absinthio an. ʒ. ij. Item ℥. decocti aut a-
arum capillorum Veneris, fœniculi, & absinthij ana. ʒ. vj.
isce, parato humore pituitoso his vel aliis similibus me-
amentis.

Tertiò, vacuantibus materiã crassam: vt ℥. diacatholicon. *Vacuatio.*
diaphænicon. & electuarij indi maioris an. ʒ. ij. ʒ. rhodo-
ellis ʒ. j. aquæ fœniculi q. s. misce, & fiat potus: vel ℥. pilu-
um de agarico ʒ. j. fiant pilulæ septem. Vacuata pituita, *Sectio ve-*
c, aut alio medicamento phlegmagogo, de quibus cap. i. *ne confert*
qui laudant sectionem basilicę dextrę, vt per eam partem si ægrotus *si ægrotus*
mores moti faciliùs educantur, & viæ meliùs aperiantur, sit sangui- *fit sangui-*
struictioque bene curetur. Hoc non damno, sed aliquando *neu.*
ido, præsertim si æger sit sanguineus.

Quartò, curantibus obstructionem hanc internis & ex- *Obstructio*
nis, vt iecore lupi, fumo terræ, absinthio, eupatorio, no- *nem curā-*
is agrimonia, camomilla, asaro, radice acori, quinque ra- *tia.*
tibus diureticis, casia lignea, spica, capparibus, amygdalis
amar

DE CVRAND. MORB.

Interna amar, lupinis. Ex his simplicibus, & aliis similibus fieri so-
simplicia. lent multa composita. Inter quæ leuant ab hac obstructione
Composita. præclare citra omnem molestiam syr. de bysantiis, de endi-
 uia comp. de duabus radicibus, & de quinque radicibus, o-
 xymel comp. diacurcuma, dialaca, trochiscus de eupatorio,
Confectio. de rhabbaro, de absinthio. His ergo multis diebus sump-
 tis curatur obstructio iecoris, præsertim partis gibbæ hoc
 medicamento vel simili: ℥. diacurcumæ, & dialaccæ an. ʒ. j.
 trochiscorum de rhabbaro, & de absinthio an. ʒ. ss. pulueris
 diarhodon. abbatis ʒ. ij. hepatis lupi præp. ʒ. iij. quatuor se-
 minum frig. maiorum mundatorum, an. ʒ. ss. syr. de scolopen-
Syrupus dria. q. s. misce, & fiat confectio. Dosis quolibet die cochlea-
Laudanisi- rium vnum cum ʒ. ij. aquæ capillorum Ve. Curat hanc ob-
mus. structionem ex multorum experientia syrupus hic: ℥. cete-
 rac, capilli Veneris, lapathij, lentisci, & rutæ an. m. ss. quin-
 que radicum diureticarum, radices acori gladioli, an. ʒ. j. qua-
 tuor seminum frigidorum maiorum ʒ. ij. seminis apij, fœni-
 culi, petroselini Macedonici, an. ʒ. ij. camædreos, camæpy-
 teos, vallerianæ, an. m. j. hordei mundi, p. j. infundantur radi-
 ces & semina per noctem in aceto, & postea fiat decoctum
Topica. in vino albo, & aqua sufficienti, cui percolato adde mellis. q.
 s. m. & fiat syrup. Dosis quolibet die ʒ. iij. Bis in die post duas
 primas concoctiones vngatur hoc vnguento: ℥. succorum
 apij, petroselini, fœniculi, sanationum, endiuie & cichoreæ,
 an. ʒ. j. aceti ʒ. ss. olei ʒ. iij. bulliant omnia ad consumptionem
 vsque succorum & aceti: deinde adde santalorum omnium
 & spice, an. ʒ. ss. ceræ. q. s. misce, & fiat vnguentum.

Corrobo- Quinto, corroborantibus iecur: vt theriaca magna, mithri-
rantia, dato, & trochiscis de rhabbaro, puluere diarhodon. Ab-
 batis. ʒ. j. alicuius medicamenti ex his cum aqua absinthij, &
 endiuæ multis diebus sumpta corroborat iecur. Hepar lupi,
 auellanæ, passulæ, & cichorea, & endiuiæ corroborant iecur.

Confectio Hæc confectio est optima in hepate corroborando: ℥. tro-
optima, chiscorum de eupatorio ʒ. j. trochiscorum de spodio cum
 seminæ acetosæ ʒ. ss. seminis endiuæ, cassiæ lignæ, spicæ,
 cinnamomi, ameos, hepatis lupi, an. ʒ. j. seminis lentisci ʒ.
 iij. rhabbari electi puluerizati ʒ. ij. ss. sacchari tb. ss. misce,
Vnguentum & fiat confectio. Dosis ʒ. ij. cum aqua absinthij, & endiuæ.
utilissimū. Et hoc vnguentum est maximo auxilio: R. ceroti santalini ʒ. j.
 olei de spica ʒ. ss. pulueris absinthij, & rosarum, an. ʒ. j. misce

De obstructione hepatis. CAP. XLII.

Scholium.


Iecor

Ecoris venæ tam simæ partis.) Iecur pars est instrumentaria Cur in ie-
exercens propriam actionem nempe sanguificationem ex chylo, core fre-
inquam ex materia. Chylus autem non continetur in aliqua insi- quenter
ni cavitare, quoniam ea destituitur iecur: sed in venis multis, à sias obstru-
uibus tanquam ex radicibus ortum habet vena portæ. Orificia ha- ctio.
m venarum in iecoris extremitate adherent orificiis venarum
ibbæ partis iecoris, ut sanguis in caua partis venis generatus, &
b excrementis repurgatus, ad gibbam ascendat partem, & inde ad
enam cauam. Cum ergo anastomosis illa venarum angusta sit, non
st mirum, si inter omnes corporis partes iecur magis sit obstructioni-
us oportunum. Obstructio iecori, morbus est in via, habens vricam Quis affe-
antum causam, nempe humorem crassum fluentem, ut constat ex 8. Etus sit.
le comp. secundum locos cap. 6. & lib. 5. de loc. affec. cap. 6. unde mi-
andum est de his, qui practicas ediderunt, alteram causam iecoris
obstructionis ad flatum referentibus, & quod magis est, Altomarius Error Al-
d probat ex Gal. supradicto loco, cum nec id somniauerit, et repugnet tomar. au-
rei naturæ. Quod autem hec non sit sententia Gal. manifeste patebit etoris, &
eum locum legenti, in quo postquam scripsit iecur pati morbos in in- aliorum.
temperie nuda, & cum fluxione, ut in erysipelate, schirro, & flatuosa
distentione, pati etiam obstructionem à crassis humoribus addit. Si-
gnum obstructionis est grauitas in dextro hypochondrio, quod si in eo
preter grauitatem sit tensio, una cum humore erit ibi inclusus statulen-
tus spiritus. Hec Gal. Ex quo loco, si animum aduertis, nunquam colli-
ges ipsum existimare spiritus esse causam obstructionis, sed si cum ob-
structione sit statulentus spiritus tensionem sentiri. Dices, cur in ob-
structione iecoris non est semper febris coniuncta, cum obstructio sit
causa putredinis? Respondeo in iecore esse multas venas, & ideo hu- Obiectio.
mores diffuari, quod si aliqua est putredo exigua tamen, ita, ut vapo-
res ex ea eleuari non sufficiant ad generationem febris. Curationem Curatio.
huius affectus lege apud auctore, solum animaduertas relin, ietum, Auctor
casum, dure alicuius rei ad dextrum hypochondrium collisionem, & reprehensio.
cinguli constrictionem, que inter causas externas connumerantur ab ditur.
auctore, non esse causas: quia ietus casus, et constructio, si violenter fiant,
& constringant iecur, sanguinem expriment, non autem obstruent,
cum non habeant vim generandi crassos humores, sicut nec cingulum.
Preterea iecur Lupinum permiscet in compositionibus deobstruenti- De iecore
bus iecur, existimans toto temperamento operari. Quod non probatur lupino ac-
à Galen. lib. 11. simpl. cap. de iecore lupino. Fortasse adductus fuit ex eo- uerte.
dem Gal. qui lib. 8. de comp. secun. locos cap. 7. iecur lupinum toto tem-
peramento hepaticis conuenire scribit, non animaduertens Galenum
eo in loco non proponere medicamenta toto temperamento hepaticos
iuuantia, sed postquam scripsit multa medicamenta ex Asclepiade ad
hepaticos addidit ipsum scripsisse pharமாக ex cochleis iris cum vino,
quod

DE CVRAND. MORB.

quod toto temperamento iuuat, sicut & lupinum hepar non una aut altera qualitate. Vbi Galenus hæc toto temperamento iuuare scribit, quia sunt alimenta, quæ eadem ratione paulo supra riuas passas visceri secundum totam substantiam familiares esse docuit.

De Ictero. CAP. XLIII.

Quid icterus.  Votiescunque vniuersi corporis color propter bilis aut flauæ, aut porraceæ, aut nigræ effusionem immutatur, malum fit, quod Græci icterum appellant, Latini regium, & arquatum, & originem ab iis, quæ tum in morbo, tum in eius curatione accidunt, appellatione sumpta, quod longū esset referre. Porro errant, quicunque vitio tantum hepatis hanc affectionem putant prouenire: sæpe enim nihil patiente iecinore, saltem primaria affectione icterus oboritur, nonnunquam ex indicio naturæ, quoties in febribus bilis vniuersa ad cutem defertur. Qui si ante septimum appareat, malum est signum iuxta aph. 62. sect. 4. Si verò post septimum, non perpetuò bonum, præsertim si dextrum hypochondrium obdurescit, vt ex aph. 64. sect. 4. colligitur. Interdum ex venenatorum animalium morfu, vt Imperatoris cuiusdam seruo contigit, qui ex vipere ictu, quarum vipera- rum venatio ipsi commissæ erat, ictericus est effectus nimirum colore totius corporis prasinæ, aut si mauius porraceam bilem referente: vt fusius Gal. ait 5. de locis affect. cap. 7. sæpe tamē hepatis occasione fit, vel quia inflammatum fit, aut intemperie calida laboret, aut obstructione. Accidit quandoque ob imbecillitatem (vt ait Aetius) vesicæ bilem excipientis, quæ biliosum humorem, veluti consuevit, in sese ex hepate non attrahit, ideoque impurum sanguinem relinquit. Fieri etiam potest, vt ipsa nimium repleatur, & propter repletionem multam non euacuetur. Magna tamen ex parte contingit hic morbus ex obturatione, aut debilitatione venarum, quarum ora ex ipsa ad hepar feruntur, aut illius meatus, qui bilem ad intestina effundit. Sed neque illud tacendum erit, quod lien quoque ictericam affectionem parit, illam inquam, in qua tota cutis nigro colore inficitur, quod accidit: aut quia ab ipso liene hepar non bene purgatur, aut seipsum purgare per solitos canales non potest: vtrūque verò, vel propter imbecillitatem aliquam, aut obstructionem fit. Præter iam dictas causas a procatacticis quoque generatur, vt ab immoderata exercitatione, rerum calidarum vsu, & aeris ambientis calida intemperie. Vnde in Sardinia ex aeris corruptione scribunt quidam, ineunte æstate, aut in autum-

ummo in hanc affectionem incidere indigenas ferè omnes
 exceptis iis, qui propter robur tēperamenti, aut alia de causa
 resistere malo possunt. Cæterū si a causis procatarcticis icte- *Nota.*
 rus contingat, aut ex venenatę ferę morſu, interrogare egrū
 tantum conuenit, aut aeris naturā considerare. Aliarum cau-
 ſarū signa nunc docuimus. Si igitur ex indicio naturę factus
 sit arquatus morbus, tam vrina, quam alui excrementa à na-
 turali modo non recedunt, si ab inflāmatione hepatis, febris
 adest, & dextri hypochondrij grauitas, & deiectiones sunt bi-
 liosę. Si ab intemperie, citra grauitatem furor inest. Si ab ob-
 ſtructione, citra grauitatem vna cum grauitatis alicuius sen-
 ſu circa dextrum hypochondrion alui excrementa alba dei-
 ciuntur. Si ab imbecillitate facultatis, vel attractricis, quę bi-
 lem ab hepate trahit: vel expultricis, quę ipsam ad intestina
 expellit citra grauitatem, & stercorea alba sunt, & vrina bilio-
 ſissima. Deniq; si a vitio splenis contingat, quod genus icte-
 ri atrum appellāt: fit enim ab atra bile vna cum sanguine ad
 cutem delata, grauius multò afficiuntur, consequitur enim
 eos (vt inquit Aetius lib. x. c. xviij. cuius placet verba referre)
 tristitia præter rationem, & mordacitas eorū, quę circa ven-
 trem sunt, difficultasq; spirādi. Cibos auersantur, & nigrum
 lotium excernunt: Aliquando autem & per interualla quæ-
 dam corpora ipsorum tepescunt, stercorea verò chalcanti co-
 lorem referunt, & aluius magis his exsiccatur. Cæterum eos,
 qui ex pallida bile arquatum contrahunt, nulla mordacitas
 eorum, quę circa ventrem sunt, consequitur: neq; etiam tan-
 tū auersantur cibos, sed obtusior aliquādo fit in iis ciborū
 appetitus. Et stercorea quidem albida egerūtur: vrinę autem
 crocei coloris, turbatę tamen, & tenebras referentes perma-
 nent. ¶ Signa præterea omnibus ictericis communia sic Ae- *Signa com-*
 tius scribit. Communiter autem omnibus ictericis pigritia *munia.*
 ad motum corporis accidit, & à dulcibus cibis sunt animo
 alieno: amatos verò nō admodum auersantur: Et variis ima-
 ginationibus vexantur: Pruritus etiā vniuersi corporis co-
 mitatur, & difficulter exudant. porro alba oculorum, & par-
 tes faciei temporibus propinquę, itémque malę pallorem
 ostendunt. Venę etiā sub lingua repletę reperiuntur, &
 abundantem humorem significant.

Curatur icterus criticus quatuor generibus auxiliorum: *Curatio*
 quamuis si perfecta fuerit crisis permutationis, nihilque bi- *icteri cri-*
 lis interius remaneat, sola cutis infectio, & intemperies eget *tici.*
 curatione. Si aliquid intus sit, & hepatis & venarū intempe-
 ries calida fuerit primò, curatur victu refrigerante, & hume-
 ctan

DE CURANDA MORB.

stante, vt cremore hordei, endiuia, cichorea, lactuca, & simili-
libus. Et aqua hordei, aut vino albo bene aqua diluto.

preparatio Secundo, apparantibus bilem: vt syrupis endiuia simp. &
compos. granatorum, violarum, nenupharis, acetositis l.
monum, & citri, cum duplo aquarum, vel decocti cichorea,
endiuia, lactuca, portulaca.

Vacuatio. Tertiò, vacuantibus bilem: vt cassia fistula, manna, tama-
rindis, rhabarbaro, & aliis cholagogis: vt ℥. medullæ cassiæ
fistulæ recens extractæ, & medullæ tamarindorum an. ʒ. ss.
infusionis rhabarbari in aqua endiuia per noctem factæ. ʒ.
iiij. cum ʒ. iiij. squinanti, diaprunis solutiui ʒ. iiij. syrupi vio-
larum ʒ. j. aquæ borraginis. q. s. misce, & fiat potus, vel, si ma-

*De sectio-
ne veng.* lit pilulas: ℥. pilularum de rhabarbaro ʒ. j. fiant cum aqua
endiuia vij. pilulæ. Si toti corpori est communis intempe-
ries, aut æger iuuenis, & carnosus venæ iecorariæ dextræ se-
ctio est necessaria, extrahaturque sanguinis copia respon-
dens naturæ ægri & morbi.

Alietatio. Quartò, tollentibus intemperiem calidam hepatis inter-
nis, & externis medicamentis, dictis tertio, & septimo ge-
nere remediorum cap. 41. de curatione inflammationis he-
patis.

Curatio Si verò icterus est ab obstructione per crassam bilem, aut
icteri ab pituitam, quatuor remediorum generibus curatur, primo,
obstructio- victu tenuante, aperiente, & calfaciente: minus si a bile est,
ne crassi quam a pituita, vt alimentis, & aliis iam dictis cap. præced.
humoris. de hepatis obstructione.

preparatio Secundo, apparantibus materiam, vt syrupis, & aquis, in-
cidentibus, tenuantibus, & aperientibus, primo mitioribus,
dictum est cap. præced. secundo auxiliorum genere.

Vacuatio. Tertiò, vacuantibus bilem crassam, & pituitam ei admix-
Sectio tam: vt medicamentis dictis cap. præced. tertio auxiliorum
veng. genere. Vena secatur quoque basilica, vel salua tella media
inter anularem, & minimum dextræ manus digitum, si fue-
rit iuuenis aut bilis, vel pituita sanguini mixta per eam hu-
mores hepatis fixi agitantur, faciliusque obediunt medica-
mentis leuantibus obstructionem.


Aperientia. Quartò, aperientibus meatus, vt medicamentis dictis se-
cundo, & quarto genere remediorum capit. præced. 42. ʒ.
iiij. aquæ, vel decocti foliorum raphani, aut eupatorii, aut

Simplicia. prasilij, aut matris syluæ matutinis quinque, vel septem sum-
ptæ sanant icterum. ʒ. j. pulueris lumbricorum terrestrium
tribus matutinis sumpta, vel pluribus cum vino albo, & sac-
charo saporis boni gratia sanat icterum, vel fiant pilulæ au-

intectæ ex eodem puluere lumbricorum cum syrupo de
 zantiis. Idem præstat sterco canis ossibus tantum nutriti,
 rum capræ nutritæ herbis aperientibus, vt fœniculo, apio,
 trofelinio, fenationibus, & similibus factum cum semine
 rthami, quantitas carthami ʒ. ʒ. ad lb. iij. lactis. Sanant *Composita.*
 quoque icterum aperientia hæc, dialacca scilicet diacurcu-
 a ʒ. ij. ad iij. & trochisci de rhabarbaro, de eupatorio, &
 ablinthio ad ʒ. j. cum aquis prædictis aperientibus, sæpe
 utata remedij forma, & specie, vt in althmate, & cæteris
 æctibus diuturnis: ne natura vni afflascet. Decoctum ca-
 ifolij, scolopendriæ, hepaticæ, capil. Veneris, & quatuor
 ninum frigidorum maiorum septem matutinis sumptum
 rat icterum, præsertim si postea sumatur hic potus tribus
 atutinis: ʒ. feri caprini lb. j. rhabarbari electi ʒ. ij. pulpæ
 loquintidæ, spicæ nardi ana ʒ. j. sacchari rosati, & violati
 a ʒ. ʒ. misce, & fiat potus. Quidam tempore Arnaldi de *Historia.*
 illanoua multos laborantes ictero sanauit hoc medicamen-
 , vacuatione per sudorem & vrinam: ʒ. stercois asini re-
 ntis pugillum semis, vini albi odoriferi ʒ. iij. misce. Color *Color fla-*
 uus cutis, & oculorum tollitur mouentibus vrinam præ- *uus quib.*
 ctis medicamentis aperientibus, & balneo ex decocto ca- *tollatur.*
 omillæ, meliloti, althææ, & similibus, aut sulphureo aere
 lido, & aliis omnibus aperientibus poros. Conferunt ocu-
 sternutamenta, fots camomillæ, & parum croci in ace-
 , quamuis antequam appareat icterus, oculis aqua rosacea
 admouenda, vt in variolis, & morbillis fieri solet. Si alia *Aqua ro-*
 media, & omnia ferme scripta à grauissimis doctoribus sci facea ocu-
 cupis, lege c. 5. serm. 5. tract. 6. Nicolai Florentini. Si icterus *lis admo-*
 ger est, vt præcedens curatur, sed remediis valentioribus, *uenda.*
 melancholiæ debitis, de quibus in affectibus lienis dice- *Icteri ni-*
 us cap. scilicet 45. *gri curatio*

De Ictero. CAP. XLIII.

Scholium.

Votiescunque vniuersi corporis.) Morbus regius (qui Icteros
 plura habet nomina, & vulgò dicitur aliacea) nil aliud est quid.
 quàm effusio biliosi humoris per vniuersum corpus: Vbi per
 lem non solum flauam intelligas, sed & eam, quæ præter naturam
 t: ex morsu enim animalis solet fieri icterus, bile porracea per corpus Quis a
 fusa, sicut in indicis morborum bile vitellina. Morbus regius, icterus à ctus sit.
 racis dictus, symptoma est in affectu corporis, est enim color vitiatu,

DE CVRAND. MORB.

sequens alterum symptoma, nempe vitium excrementi: quod etiam ex altero symptoma e dependet, nempe ex actione laesa: quæ male separat, aut non separat bilem: vel ex actione corporis deprauata, cum in toto eo multa bilis generatur. Aliquando tamen icteros non sequitur morbum, sed nature robur, quando in crisis apparet. Morbus, ad quem hæc actio laesa sequitur, varius est: nam aliquando est instrumentarius, aliquando similis. Hoc intelligemus, si varias icteri causas ex Gal. lib. 5. de loc. affec. cap. 7. in hunc locum transferamus. Prima est natura, quæ in crisis ad cutem humorem peccantem expellit: Secunda sanguis ita corruptus, ut mutetur in bilem porraceam: quod contingere solet ex veneno in corpore genito, aut exterius inflicto, ut Imperatoris seruo ex viperæ morfu accidisse scribit Gal. Tertia intemperies calida iecoris multam bilem generans, quæ tota, cum non possit expurgari à vesicæ bilis, una cum sanguine ad partes delata eas colorat. Quarta est intemperies calida totius corporis bilem ex tenui parte generans. Quinta obstructio iecoris in meatu, qui ex iecore defert bilem ad vesicam, aut illius, qui ex vesicæ eam ad duodenum intestinum expurgat: Sexta inflammatio iecoris: Septima schirrus iecoris: quæ duæ causæ media obstructione impediunt, quo minus vesicæ bilis attrahat bilem. Sunt autem hæc causæ distinctæ ab obstructione, quia sine his obstructio sola potest morbum regium efficere. Octava imbecillitas vesicæ bilis orta ex aliqua forti intemperie, ob quam non rectè attrahit bilem. Ultima verò causa est immodica quantitas bilis in vesicæ coaceruata impediens, quominus (à magna distentione vesicæ impedita) possit contrahi: quod in vesicæ lotii lib. 3. de caus. symp. aliquando accidere scribit Gal. Ex his facile intelliges hoc symptoma icteros appellatum sequi varios morbos: Quorum unus est intemperies manifesta, à qua icteros ex imbecillitate vesicæ, aut iecoris & totius corporis calore contingit. Alter est intemperies occulta, à qua icteros ex veneno fit. Tertius est morbus in via, qui icterum ex obstructione, inflammatione, & schirro generat. Inter hos morbos obstructio, inflammatio & schirrus mali sunt, non ita intemperies: ac proinde cum ante septimum diem in febribus icteros apparet 4. aph. comm. 62. malum significat, hoc est aliquem ex illis tribus affectibus. Quod si post septimum diem ex aliquo prædictorum affectuum appareat, etiam malum est. Si verò sine affectu aliquo in febribus post septimum diem in die decretorio eneniat, bonum est, ex 4. aph. sent. 64. Si criticè fiat morbus regius, tunc solam euacuare oportet bilem, quæ est in habitu corporis, & intemperiem calidam (etsi morbosa non sit) in ipso corrigere, quod balneo commodè præstabis. Si venenum causa sit, alexipharmacum exhibebis illi veneno contrarium. In ictero ab intemperie calida

calida, aut obstructione oris sanguinem mittes, nam venelles, & una cum sanguine prauo partem humoris euacuabis, et deinde efficies ea, quæ auctor docet. Si icteros ab inflammatione ortum habeat, lege caput de iecoris inflammatione. Si ab schirro eueniat (quem tactu cognosces) sanguinem mittes, ut sanguinem educaas prauum, vteris syrupis inscindentibus, & emollientibus inunctionibus, miscens, semper ea, quæ robur seruent visceris: quod perpetuò faciendum est in affectibus partium, quæ actionem habent toti corpori necessariam, quales sunt iecur, ventriculus, & lien.

De Hydrope. CAP. XLIIII.

HYdrops omnis vitiato hepate, & in frigidam intemperiem perducto oritur. Neque enim quod dudum de ictero dictum est: nempe non semper vitiato hepate fieri, id quoque de hydrope dici poterit. Quicunque enim hydrops hepatis vitium causam habet, siue nunc per primariam affectionem, siue per consensum aliarum partium nascatur. Negari enim non potest aliarum quoque partium occasione, cum scilicet vehementer fuerint debilitatæ, hydropem oriri: non tamen ob id fateri cogimur intacto hepate tale quippiam contigisse, cum eam affectionem, nisi ipsum in sui consensum illæ vocassent, nunquam potuissent inducere. Sunt autem in vniuersum hydropis, seu aquæ intercutem tres species, quarum primam Græci Ascitem, secundam Tympanitem, tertiam Anasarcam, hypofarcam, & leucophlegmatiam appellant. Ascites, quam Barbari corrupto vocabulo asclitidem nominant, fit ab humore aquoso cum perexiguo spiritu inter peritonæum, & partes sibi subiectas coaceruato: sic dicitur Græcis, quod utrem aqua plenum ea pellicula referre videatur, ascos enim latine utrem sonat. Tympanites accidit, quoties in prædictis locis multus spiritus flatulentus modico humori commixtus includitur. Sic affectis venter tympani instar sonitum, si percutiatur, edit unde malo nomen inditum est. Hypofarca contingit, cum vniuersa corporis moles prætumida est, & spongiæ instar laxa, & madefacta propter frigidum & pituitosum sanguinem per vniuersum quidè corpus diffusum, non tamè vnitum. Omnis hydrops, ut supra dictum est, vitio contingit hepatis, aut per primariam affectionem, aut per societatem affecti: per primariam affectionem, vel quia inflammatione, schirro, aut obstructione laboret, quando per has, aut similes affectiones impense refrigeratur: per societatem autem aliarum partium, ut lienis, ventriculi, intestinorum maximè gracilium, pulmonis,

DE CVRAND. MORB.

renum, & septi transuersi. Ex immodica præterea hæmor-
rhoidum euacuatione, aut menſtruorum, & eorundem re-
tentione, & ex quocunque alio vteri affectu, ſi ingens fuerit,
hydrops contingit: in omnibus enim his affectionibus ex ſo-
la hepatis frigidityte hydrops naſcitur non ſecus, ac ſolet o-
riri, quoties ob intempetiſtiſuam refrigerationem iecur valde
refrigeratur: tunc enim antequam in tumorem ſcirrhoſum
attollatur, aqua intercutem ſequitur: magna tamen ex parte
euenit iis, qui cibum non ſentiunt, & malo corporis habitu
præditi ſunt, & ictero infeſtantur, aut dysſenteria, aut colica
affectione. Generaliter omnibus hydropicis ſpirandi diffi-
cultas adeſt, & rumor, & grauitas, & vitiatuſ color ex virore,

*Communia
ſigna.*

vt inquit Aetiuſ, albicantibus ægriſ. Faſtidiunt ad hoc ci-
bum, qui ſic affecti ſunt, potu autem impleri quam maxime
appetunt, præſertim qui ex aſcite laborant. Humor enim,
qui intra peritonæum includitur cum & ſaluſ ſit, & putriſ
inextinctam ſitim excitat, quam febris, vt plurimum, ſequi-
tur: traditiſ generibuſ, hiſ notis diſtinguere inuicem hydro-

differentia

piſ ſpecies conuenit. Anaſarca ab aſcite, & tympanite in hoc
differt, quod in anaſarca tam ſupernæ, quam infernæ omneſ
partes tumidæ apparent. Et ſi digito comprimantur, cauæ
remanent, in tympanite verò, & aſcite ſuperiora omnia gra-
cilia ſunt, inferiora autem inflata, & vmbilicuſ eminens.
Aſcites a tympanite in hoc diſtinguitur: quod in aſcite ven-
ter agitatuaſ non aliuſ reddit ſonum, quam ſolet vter, vbi
aqua ſemiplenuſ agitur, in tympanite verò, qualeſ ſupra
diximuſ.

Curatio

anaſarcæ.

Anaſarca curatur quatuor remedioruſ generibuſ, primò,
viſtu calido, & ſicco: vt ære æſtiuo natura, vel arte parato,
fuga frigidi, & humiduſ, qualis eſt pluuialiſ, & nebuſoſuſ: pau-
co cibo, & raro, ſacili concoctu ob facultatiſ naturalis imbe-
cillitateſ: & tenui potiùſ quam craſſo, vt pane biſcocto, car-
nibuſ auium montanaruſ, & herbis diureticis: vt fœnicu-
lo, aſparagiſ, & ſenationibuſ, cinnamomo, zingibere, gario-
phylliſ, pipere, aniſo, vino albo, & pauco. Si vires valent, ex-
ercitatio, quæ ſudorem excitet, eſt ſaluberrima. Quare ſem-
per tergenduſ, aut vice eiuaſ friſtio multa, mollis, & medio-
criſ vigiliæ, & affectuſ animi exſiccanteſ vtileſ ſunt, niſi de-
ficiant vires.

*Præpara-
tio.*

Secundò, apparantibuſ pituitam per totuſ corpus ſpar-
ſam: vt rhodomelle ſimp. ſyrupo de hyſſopo, de duabuſ radi-
cibuſ, oxymelle compoſito, & ſyrupo de quinque radicibuſ
cum aquis aut decocto herbaruſ calidaruſ, & quæ pitui-
tam

cam parant. ¶ Tertiò, vacuantibus pituitam per medica-
 menta phlegmagoga, aliquando tamen utilis est sanguinis *Sectio ve-*
 missio, si ex menibus, aut hemorrhoidibus suppressis fiat, & *na.*
 nunquàm alias, nisi æger esset maxime sanguineus, & iuue-
 nis, sanguisque pituitæ esset permixtus, sed semper parçè
 extrahatur sanguis, ne iecur imbecillus reddatur, à cuius im-
 becillitate fit. In primis duobus affectibus venæ tibiæ, aut
 pedum sunt secandæ, in tertio vena hepatis: sed in hoc
 affectu cautè sanguis est mittendus. Sint medicamenta pur- *Quæ venæ*
 gantia in hac, & omni specie hydropis, benigna, & quæ he- *secandæ.*
 par non lædant: vt agaricus, hiera simp. diaphænicon: vt ℥.
 diaphænicon. 3. iij. agarici trochiscati 3. j. s. rhodomellis 3. j. *Purgatio.*
 aquæ fœniculi quod. s. misce, & fiat potus: vel ℥. pilularum
 de hiera simplici 3. ij. agarici trochiscati 3. j. fiant cum aqua
 absinthij pilulæ vij. vel ℥. Hieræ simplicis 3. j. frequens vsus
 & longus hieræ simplicis est utilis, & necessarius huic, & om-
 ni speciei hydropis. Vacuatur quoque materia hæc diureti- *Laus hie-*
 cis, vt syrupo de duabus radicibus, de quinque radicibus, *ræ simp.*
 aqua vel decocto quinque radicum diureticarum, vel pra- *Canthari-*
 sij. *Cantharides* à quibusdam laudantur in hac, & ascite, sed *des impro-*
 vitandæ sunt, quia potenter vesicam vlcérant, & hepati mul- *bantur.*
 tum nocent. Materiam hanc resoluunt, sol æstiuus incidens
 in nudum corpus, aut arenæ calefactæ sole, aut igne, fatus ex
 vino, & rebus calidis, suffitus per lapides ignitos ex deco-
 ctis in vino, foliis lauri, camomillæ, ruta, rore marino, origa-
 nò, saluia, pulegio, & similibus. Balneum falsum, aluminò-
 sum, aut sulphureum, naturale & artificiale mirifice prodest.

Quartò, tollentibus dispositionem hepatis, & causam a- *Alteratio.*
 nasarcæ, vt obstructionem hepatis, aut duritiem remediis
 dictis cap. 24. de obstructione hepatis, & contrariis sananti-
 bus intemperiem frigidam simul, & obstructionem, & cor-
 roborantibus: vt dialacca, diacurcuma, trochiscis de absin-
 thio, de rhabarbaro, de eupatorio cum puluere rosatæ no-
 uellæ, aut diarrhodon Abbatis, si calida intemperies timea-
 tur. Tympanites curatur quatuor remediorum generibus, *Curatio*
 primò, victu calido, & sicco flatus resolvente, vt fame, siti, c- *Tympani-*
 xercitatione, pane biscocto, & cum aniso, & fuga eorum om- *tæ.*
 nium, quæ flatus gignunt: vt sunt legumina, herbæ frigidæ, *Victus.*
 & crudæ, pisces, & similia.

Secundò, apparantibus pituitam, vt rhodomelle, & aliis *Prepara-*
 dictis superius hoc cap. de curatione anasarcæ, quamuis in *tio.*
 hac specie sit minus necessaria euacuatio, quam in anasarca, *Observa- ti-*
 & ascite, in quibus multa est copia humoris, & pauca flatus, *sermen.*

DE CVRAND. MORB.

in Tympanite verò plus flatus est, & minus humoris.

- Tercio,* vacuantibus materiam frigidam, vt agarico trochiscato, hiera simp. benedicta & similibus tam per os sumptis, quam per clysterem iniectis. Quidam medicus doctus, & senex curauit pilulis mezereon sacerdotem quendam senem tympanite laborantem. Flatum resoluunt balneum sulphureum, salsum, arena calfacta sole, aut igne: fofus, & suffitus per lapides ignitos, & alia dicta tertio genere remediorum superius hoc capite. Puluis hic optime resoluit flatum: vt *℞.* anisi, anethi, seminis fœniculi, carui, cymini, origani, cinnamomi, gariophyllorum an. ʒ. iiij. sacchari ʒ. iiij. misce, & fiat puluis. Dosis cochlearium vnum ante cibum cum vino, & summo mane. Diagalanga, diamoscos, theriaca magna, mithridatum, diatriumpiperon, diacuminum, & similia resoluunt, & euacuant flatum, Sacculi quoque ex sulphure, sale, milio, camomilla, kalendula, origano, pulegio, anthos & cucurbitula similibus, ventri actu calidi admoti dissipant. Cucurbitula magna flamma multa vmbilico affixa valenter resoluit. Hoc cataplasma potentissime discutit flatum multis diebus ventri admotum: *℞.* stercoris vaccini, columbini, & caprini an. p. j. pulueris cymini, carui, ameos, baccarum lauri, origani, rutæ syiuestris, & anthos an. ʒ. l. sapa, q. s. misce, & fiat cataplasma, adde aquæ vitæ vncias duas.
- Alteratio* Quartò, & vltimò, tollentibus hepatis affectionem, mali
& *corrobo* causam per contraria, & corroborantibus hepar, de quibus
ratio. dictum est superius quarto genere in curatione anasarcae, & de his dicemus in curatione ascitæ.
- Curatio* Ascites curatur quatuor auxiliorum generibus, victu cali-
ascitæ. do, & sicco dicto initio huius capituli. Carnes semper sint fa-
visus, ciles coctu, & boni sanguinis, & magis tostæ, quam elixæ.
- Prepara-* Secundò, apparantibus humorem: quosum, & corruptum:
ti. vt *℞.* syrupi endiuicæ compositi, & de icolopendria an. ʒ. ij. rhodomellis ʒ. iiij. misce. Item *℞.* decocti, vel aquarum absinthij, fœniculi, & capillorum veneris an. ʒ. iiij. misce, parato humore hoc vel simili medicamento. ¶ Tercio, vacuantibus aquas excitâtes hydropem, primò purgatoriis nō valentibus, & nocentibus iecori, vt sero lactis caprini, aut ouini, agarico, myrobalanis citrinis, & kebulis simul, puluere hieræ simplicis, vel hiera simplici, succo, aut puluere brassicæ marinæ (quā vulgus sedanellā, Arabes cachitam vocant) citra mole- stiam purgante aquâ, & hepar roborante: quæ duo sunt sum- me necessaria ad curandum hydropem. Dosis est à ʒ. ij. vsque ad ʒ. quatuor, & ego exhibui drachmas septem frequenter mane

manè laboranti hoc genere hydropis, & fœliciter successit. Aliquando hic morbus ob sui vehementiam eget valentio- *Laus seda-*
bus purgantibus, etiam si ab iis iecur lædatur: inter quæ *nella.*
succus radicis ireos dempto sedimento ab omnibus lauda-
tur. Dosis à drachinis duabus vsque ad drachmas tres semel *Valenter*
à hebdomada, dummodò inter has vacuationes valentes ie- *purgantis.*
tur corroboretur puluere diarrhodon. Abbatis, vel trochis- *Hepar cor-*
is de rhabarbaro, vel syrupo de absinthio, vel puluere hepa- *roborantia.*
is lupi, vel alimento ex vuis passis, ex auellanis, & ex lima- *Laus pul-*
tibus. Hoc succo ireos multi hydropici deplorati ferme sa- *ueris ireos.*
nati sunt. *Molestè*

Pilulæ de serapino, de euphorbio, & mezereon potenter *purgantis.*
purgant aquam, sed moleste, & violenter, quare iis non nisi
rarò, & coactè vtendum est. Dosis est ab scrupulis duobus vs-
que ad drachmam vnâ. Succus quoque cucumeris agre-
stis siccatus, quem elaterium vocant, potentissime purgat: &
oranium maximè durat, autore Plinio, seruatur enim cen- *Elaterium.*
tum annis integer. Sauonarola medicus sua ætate celeberr- *Sauonaro-*
mus dabat scrupulum semis huius succi siccati mense Augu- *læ experiē-*
sti, & mixti cum speciebus elephanginis redactis in pilulas *ria.*
cum succo absinthij, & multos curauit hoc medicamento.
Syrupus hic ex decocto radicis cucumeris agrestis est effi-
cax in curatione hydropis & ascitæ, & eruditissimus doctor
meus Iacobus de Leon Compluti Architielinum illustris *Doctoris*
Comitis de Salinas hydropicum confirmatum curauit: *℞. de Leō sy-*
radicis cucumeris syluestris ꝑ. iij. decoquatur in libris dua- *rupus exi-*
bus aquæ ad dimidium, deinde accipe mellis libras duas, a- *minus.*
que libras octo, bulliant per se ad dimidij vsque cōsumptio-
nem, cui percolato adde ꝑb. j. decocti radicis cucumeris syl-
uestris percolati quoque, & fiat syrupus, addendo in fine
pulueris dragagati vnciam vnâ, cinnamomi electi drach-
mam vnâ: Dosis quolibet mane cochlearium vnum. Me- *Galenī me-*
dicamentum benè *pararum ex cantharidibus* in maxima *dicamentis*
hydrope, tam ascite, quam anasarca, ex Galeno purgat per
vrinam valenter aquosum hunc humorem, *sed iis non vten-*
dum, nisi cum alia non contrulerint.

Valescus tamen de Taranta vir doctissimus & magnæ ex- *Valesci cu-*
perientiæ hoc medicamento multos laborantes, & Anasar- *ratio.*
ca, & Ascite sanitati restituit. Castigatur cantharides abs-
que capite, & pedibus, nõ alis (vt quidam malè docent con-
tra Hippocratem & Plinium, & veritatem) accipe ergo vnâ *Error quo-*
cantharidem absque capite & pedibus, quatuor seminum *randam.*
frigidorum maiorum mundatorum an. ꝑ. semis sacchari

DE CVRAND. MORB.

candi violati ʒ.ij. gumi crassi, vel dragaganti ʒ.vj. misce, & fiat ad modum pulueris. Dosis est vncia vna summo mane: sed defende vesicam admo- uendo ei lac caprinum, vel oleum rosatum tepidum: autore enim Actio cap. de dolore capitis *Vesica de- sensio.* sexto sermone, cantharides capiti admotæ nocent vesicæ, & *Vis cãtha-* quod magis incredibile videtur, quidam chirurgus Medio- *ridum quã* lanensis bis sanguinis profluui- o correptus fuit per vrinam *ta sit.* solum, portando cauterium ex cantharidibus in Byrsa. Tria *Purgantia* grana alkekengi in puluerem redacta cum vino albo curant *per vrinã,* hydropem, vacuando per vrinã. Quæ per vrinam clementer *et iecur cor* purgant, & corroborant iecur, sunt diacurcuma, dialacca, & *roborãtia.* trochisci de rhabarbaro, hi enim obtinent principatum in *Historia.* hoc curando morbo, quibus curatus fuit excellentissimus Dux mediolanensis Franciscus: Dosis à drachma vna vsque ad drachmas duas. Propter illorum amaritudinem fiant pi- *Altera nõ* lulæ cum aqua absinthij. *lisdem trochiscis curauit ego ma-* *minus infi-* gnificam vxorem magnifici Francisci Marci, quæ laborauit *gnis.* principio ascite cum febre ferme habituali: cui dedi præ- ter hos trochiscos multis diebus lac asinæ, quæ pasceretur *Lac an no-* herbis diureticis, *lac enim non nocet hydropi,* vt multis gra- *ceat hydro* uissimis medicis placet, præsertim, si ab ea animante emul- *picis.* geatur, quæ pascatur herbis diureticis. Ideoque à quibusdã *Clysteres* laudatur lac caprarum arabicarum propter pastum. *Clyste-* *laudatur.* res acres purgant hanc aquositatem, & flatum. Vacuatio hæc *Clyster o-* tutior est aliis purgationibus: quare frequens illorũ vsus est *ptimus.* utilis, & necessarius. Hic clyster, vel huic similis est optimus: ʒ. furfuris, camomillæ stichados an. p. j. rutæ, & saluiæ an. m. j. hellebori, agarici, & turbit an. ʒ. ij. carthami ʒ. ʒ. roris ma- rini, cyclaminis an. m. j. fiat decoctum: de quo percolato ac- cipe ʒ. j. olei de ruta, & de lilio an. vncias duas, salis drach- *Pilulæ.* mam vnã ʒ. misce, & fiat clyster. Pilulæ hæ purgant mate- riam hydropis: ʒ. cinnamomi, squinanti, cuscutæ, croci, ca- lami aromatici, seminis apij, fu, prasij, nardi, asari, masti- chis, mirrhæ an. ʒ. ʒ. serapini, agarici, an. ʒ. iij. euphorbij, tur- *Serum ca-* bit, colocinthidis an. ʒ. j. rhabarbari ʒ. iij. aloes ad pondus o- *prinum,* mnium, misce, & cum succo absinthij fiant pilulæ: Dosis qua- *maiorana.* libet hebdomada drachma vna. Sex vnciæ feri caprini cum drachma vna semis pulueris spicæ nardi mane sæpè sumptæ purgant clementissime hanc aquositatem. Succus maioranæ cum oxymelle, si mane frequenter sumatur, hydropem hanc *Prasium.* curat, purgando aquositatem. Idem facit succus prasij defic- *Coturmix.* catus, & mistus cum vino albo. Idem præstat sanguis cotur- nicis: resoluunt ventris aquositatem omnia superius dicta in resol

resoluendo flatu in tympanite: quamuis valentioribus egeat *De tympanite.*
 ascites cum difficilius vacuetur humor, quā flatu posita pa-
 rilitate. Hoc, aut simile cataplasma est optimum in resoluendo *Topica.*
 do: ℞. foliorum althææ m. ij. radicum cucumeris sylvestris, *Cataplasma.*
 & ireos an. ʒ. j. ficus siccas numero 20. omnia decoquantur in *mata resolu-*
 vino albo, & fiat cataplasma: vel ℞. sellis tauri, nitri, an. par- *uenia.*
 tem vnam, piperis puluerizati, partem semis, cum melle, fiat
 ad modum cataplasmatum, quod per dimidiæ horæ spatium
 admoueat vtri, ne vesica, aut vlcera intumescant: vel ℞.
 stercoris bubuli, & caprini an. p. j. cineris quercini, & vitis
 an. p. ʒ. salis sulphuris an. ʒ. ʒ. baccarum lauri, staphisagriæ
 an. ʒ. j. ex his decoctis cum vino fiat cataplasma, cui adde vn-
 guenti Aragon, & marciaton an. vncias duas. *Cauteria mul-*
 ta ventri sæpe admota non profunda purgāt hanc materiam *Cauteria.*
 & his curauit quidam Agarenus duos Valentinus nobiles. *Historia.*
 Idem præstant cauteria tibiis infixa, vt per ea materia vacue-
 tur, quia illarum vlcera in hydropo difficulter curantur, nisi
 prius hydrops tollatur. Aliqui scroto setarum immittūt, vt *Incisio pri-*
 eo multis diebus, & sensim vacuetur materia. Postremò, si æ- *denter fa-*
 ger fuerit iuuenis, & fatis robustus, incisione ei extrahatur *etia.*
 hæc aquositas, non vna eductione, sed multis & sensim ad vi- *Exemplū.*
 res conseruandas, præcedente tamen mortis præfagio, ne no-
 bis ascribatur: nam præfente Sauonarola, & aliis doctissimis
 medicis Patauij Ioannes Ludouicus vtriusque iuris doctor
 eximius sexagenarius subita facta incisione in manibus chi-
 rurgorum interiit. Eodem tempore quædam mulier quin- *Alterum*
 quaginta annos nata laborauit Ascite sex annis, & ex casu *exemplum*
 in lapidem fuit vulneratus venter eius, per quod vulnus su- *admiran-*
 bitò omnis aquositas euacuata fuit, incidit illa quidem in a- *dum.*
 nimi deliquium, sed post in xenodochio Patauino bonis ali-
 mentis pristinam recuperauit sanitatem: quæ res digna est
 admiratione: fiat igitur incisio musculi obliqui dextri ascen-
 dentis, si primò fuerit hepar affectum, & sinistri si lien: prius
 cute deorsum reuulsa, vt post incisionem, & aliquam aquæ
 extractionem locum naturalem repetens foramen obturet,
 ne aqua affluat largior, vel immisso syphone in hiatum. A-
 qua autem quotidie bis, aut ter syphonis operculo ablato
 mittatur, tunc æger roboretur cibus optimis.

Quartò, affectionem hepatis causam mali tollentibus per *Alteratio*
 contraria & corroborantia hepar, vt puluere diarrhodon. & corrobo-
 Abbatis, hepate lupi, & aliis iam dictis superius. *ratio.*

De Hydrope.

CAP. XLIIII.

Schol

Scholiū.

Hydrops
nomen.



Hydrops
symptoma
est.
Morb.

Ydrops omnis.) Hydrops nomen ex aqua assumpsit: in
omnibus enim hydropis speciebus, aquosus generatur hu-
mor. Quod in tympanice, in quo id difficile videtur, etiam
verū est, quia in eo humor etsi paucus in abdominis regio-
ne coaceruatus apparet. Hydrops symptoma est, tumor scilicet præter na-
turam ventris, aut totius corporis sequens aliud symptoma, quod est a-
liquo iecoris deprauata. Morbus, ad quem sequitur, est intemperies frigi-
da iecoris. Hæc vel primam in eo generationem habet, quando à iecoris
schirro, aut obstructione fit: aut per consensum ei aduenit, ex affectu lie-
nis, ventriculi, intestinorum, & pulmonis. Hæ enim partes refrigeratæ,
per venas frigiditatem transmittunt, venis causæ aut gibbæ partis ieco-
ris, & inde eius carni. Iecur etiam frigiditatē concipit ex immodica san-
guinis per hæmorrhoidas euacuatione, aut suppressione, sicut ex suppres-
sione mēstrui, quorū immoderata euacuatio, nec hydropē, nec cachexiam
immodica efficit, ex Galeni sententia, li. de curan. per sang. missionem, c. 19. eo quod
euacuatio mēstrua euacuatio secundum naturam fieri solet. Frigida iecoris intem-
peries in Hydrops, aliquando à causa calida ortum habet: in febribus e-
nim ardentibus (etsi raro) etiam in principio visus est Hydrops. Qui ma-
iorem signum est, ex eo enim colligimus adeo esse intensum calorem, ut vi-
detur à iecoris coctione iecoris, aquosa humilitas in eo, pro sanguine generetur.
causa calida. Quod si Lupeius, & alii, sequuntur Alexandrum, frigida (quibus hunc
da. Hydropem curari aiunt) post febrem concedant, grauius errabunt: non au-
tem si eis vtantur, ut febrem curent. A causis externis etiam potest hy-
dropis nasci, potu aquæ frigidæ, aut natatione in ea. Existimo autem aerem
frigidum, hydropem nunquam effecisse, eius enim vis non potest integris
viribus ad iecur usque penetrare, præsertim cum eius tenuitas non sinat
ipsum magnam, & perdurantem actionem exercere. Iam cum hydrops,
refrigerato iecore fiat, inde pro maiori aut minori refrigeratione, tres hy-
dropis differentie ortum habent. Prima dicitur hydrops tympanites, in
qua in iecore exigua est imbecillitas, ita ut chyli maiorem partem, in opti-
mum sanguinem mutet, & alteram, quæ minor est, in aquam: ex qua in
cavitatē naturali multum flatum eleuant partes, adeo ut in ea multus
Secunda. flatus, & paucus humor collectus sit. Secunda nominatur Ascites, in
qua iecur maiorem habens frigiditatem, et imbecillitatem, quam in pri-
ma, ex chylo paucum sanguinem, etsi optimum generat, et simul multam
aquam: quæ cum sanguine non est multum permixta, eo quod iecur, ut
eam separet, aliquod seruat robur. Hæc aqua per iecoris carnem in ca-
uitatē à peritoneo circumscriptam permeans, eam replet: quod non con-
tingit aquæ ex obstructione renū in venis coaceruata, non quia est pau-
ca, ut sentit Valles, lib. 5. de loc. affect. cap. 6. sed quia non generatur in
Tertia. iecore, neque in eo moram facit. Tertia differentia hydropis ea est, quam
ant

anasarcam, & leucophlegmatiam appellant, in qua maiorem habet ie-
 frigiditatem, quam in supradictis ita ut sanguis non optimus, sicut
 in aliis primis: sed totus viciosus generatur, est enim aquosus, aut pi-
 osus potius, quia pituitosa humiditas in iecore præter naturam gene-
 ra, ob imbecillitatem partis non potuit à sanguine separari. Atque
 hoc est causa, ob quam omnes partes corporis, male nutriantur, & hu-
 miditate madeant. Qua in parte maxime mirandum est *Valles lib. 4. a- Vallesii*
 error. *orum, & lib. 4. epyd. com. 42. anasarcam minorem habere frigidita-*
 error. *tem, quam alias hydropis differentias, scripsisse. Ex his tribus differen-*
tiis, etsi in tympanite minor sit intemperies, est tamen in ea maius peri-
culum, quam in reliquis non ratione affectus, sed curationis: quia flatum
inscientia (quibus curatur) calida cum sint, de nouo flatum generant.
 Secundò, apparantibus pituitam.) In hac sola hydropis specie, In quo hy-
 dra dicitur anasarca, licet nobis ante purgationem præparare humorē: dropes præ-
 parata pituitosus & crassus est. Non autem licet in aliis differentiis (nisi parauimus
 propter obstructionem id efficiamus) cum ex humore aqueo tenui fiant. humorem.
 Tertiò, vacuantibus pituitam.) Multi sequuti Galen. lib. 4. de An sit se-
 t. vic. in acutis comm. 113. in hydrope anasarca ex suppressione men- canda re-
 um, ex hæmorrhoidibus, aut alia plethorica affectione orto, quando in- na in ana-
 nit venam secant. Quod difficillimum nobis videtur, imò falsum, quia sarca.
 eo iecur maximè refrigeratum est, & sanguinis missio ex accidenti re-
 gigerat. Dices sequetur ex sanguinis missione alia maior vilitas, quæ
 mouere suppressam euacuationem, aut minuere plethoricum humo-
 rem, à quo refrigeratum fuit iecur. Respondeo, non posse tunc oportune,
 ut remedium, si consideremus massam sanguinariam adeo deprava-
 tam, & validam iecoris intemperiem. Hoc quamuis ita sit, possumus
 tamen Galenum (ut par est) excusare, si dixerimus ipsum per princi-
 pium anasarca cachexiam intellexisse. Cum ergo in anasarca, pitui- In anasar-
 osus humor in omnibus partibus contineatur, omne vacuationis genus ca omne va-
 eo tentandum est. Infernè per aluum, per urinam radice petroselinii, cuationis
 sparagi, & aliis diureticis medicamentis. Per cutem etiam frictioni- genus ten-
 us cum melle, balneis sulphureis, vel sponte nascentibus aliis, arena randum.
 alida, frictione cum oleo irino sub sole, tecto capite, & similibus. Iecur
 oborabis, & simul humorem discuties vnguento in hac forma parato: Taxatur
 ℞. olei absinthii, & irini an. ʒ. ii. vtriusque dialthæ ʒ. ʒ. cera parum, auctor.
 fiat vnguentum. *Cantharides non probat auctor, timens earum reho-* Canthari-
 nentiam quasi eam quantitate, & mixtione, non possimus minuere & dum exhi-
 orrigere. Proinde eo omisso res sic distirguenda est. In hydrope ascite bitio.
 & tympanite fugiendus est vsus cantharidum, quia humor in canita-
 e naturali inclusus, non poterit per urinam purgari. Si verò sit anasar-
 ca, in qua humor in renis continetur, earum vsus commodus erit, ex-
 purgabitur enim per urinam. Non quòd cantharides id præstent
 (ut male sentit auctor) sed medicamenta urinam mouentia, cum qui-
 bus

DE CVRAND. MORB.

bus cantharides miscentur, tantum ut sint vehiculum. Neque est quod timeamus, totas eas integras assumere, cum Galenum libris simplicibus de cantharidibus subscriptorem habeamus.

Medicamenta ad solet fieri ex obstructione iecoris & lienis: quem post purgationem cui hydropicos, agarico, in eo qui fit ex obstructione iecoris: & cum confectione hamece altero, utere unguentis, capitibus de obstructione iecoris, & lienis descriptis, & hac confectione: ℞. diacurcumæ, & dialaccæ Isac. ana. ʒ. j. trochiscorum de absintio, & de rhabarbaro an. ʒ. ii. conferva capillorum veneris ʒ. j. cum syrupo de bizantiis fiat confectio.

In ascite Secundò, apparantibus humorem aquosum.) Ex Gal. 4. aqua non cutorum com. 113. humor in ascite aquosus est, & tenuis, non ergo egebit est præparatio: si memor es eorum, quæ primo Scholio docuimus.

Varia Tertiò, vacuantibus aqua.) Nonnulli, ut educant aquam in hydropticis, utuntur brasicæ marinæ, quam vulgò soldanellā appellant: eam quæ purgans, & ex pulvere assumens singulis diebus ʒ. j. usque ad ʒ. ii. gatio.

Prima. ℞. (si vires constant) cum mulsæ & decocto eupatorii. Alii ex eius succo expresso & percolato, ob eius tenacitatem cum melle aut saccharo syrupum parant, cuius ʒ. j. singulis diebus propinare solet.

Secunda. Alii tithimalum marinum (quem Dioscorides tithimalum paralyon nominat) exsiccant,

Tertia. & eius pulueris ʒ. j. ℞. uno quoque die, cum mulsæ aut decocto eupatorii exhibent. Alii virosque dictos pulveres permiscunt, addentes propter

Quarta. suavitatem, semen anisi, carui, & fœniculi. Quæ omnia etsi euacuent humorem aquosum, nihilominus tamen succus radicis iridis principatum

Quinta. hac in parte habet, cui uni debetur desiderata aquæ euacuatio: potenter enim eam educit, minusque prædictis omnibus molestus est ventriculo.

Præcedentibus ergo syrupis (si opus fuerit) purgare poteris succo iridis, agarico trochiscato, diaphæmicone & aliis. Potionem in hunc modum parare poteris: ℞. succi radicis ireos ʒ. ii. aquæ mulsæ ʒ. ii. misce. Aut ex eodem succo iridis confervam efficere poteris hoc modo: ℞. radicis iridis rectè excorticatæ lib. i. mellis ʒ. xiiii. fiat conferva ea ratione, qua fit caro cydoniorum, quæ in vase vitreo ponatur, commiscendo semen anisi, fœniculi & carui: cuius unum cochlearium singulo mane assumet.


Nota hæc Quamvis verum sit in hydrope, humorem esse euacuandum, magis tamen in curatione, tentos esse oportet ad roborandum iecur & lienem: quia ea medicamenta, quæ humorem euacuant, vehementia cum sint, imbecillitatem viscerum augent, atque hæc est causa, ob quam culpa medicorum, plus ad humorem quàm ad iecur respicientium, egroti in peius semper abeant, & miserè moriantur.

Curabitur ergo rectè hydrops, sensim euacuantes humorem medicamentis benignis, & simul viscera roborantes: cumque sit morbus longus, longo tempore oportet assumere medicamenta, potissimum ea, quæ a nobis modò describentur. Tria enim sunt, in quibus tota hydropis curatio reposita est, primum mane sumendum est, secundum

notum

Et tertium est vnguentum, quo regionem ventris inungemus. Me Medicamentum, quod mane assumi debet, parabitur hac ratione. Noctu ex mentu m. asinae, aut in eius defectu, ouis, & in huius defectu, caprae extrahe ne assumere. feri, ita ut in eo clauos numero duos, trochiscorum de eupatorio, dum. e capparibus an. 3. ss. cum pauco cinnamomo apponas. Hoc serum e assumatur, ita ut aeger neque ad prandii horam abstineat a cibo. Hoc medicamentum clemente purgans, deobstruens, & viscera ro- ns. Aduerte tamen praedictos trochiscos de tertio in tertium diem, re r esse construendos. Medicamentum noctu assumendum, quatuor Medica- post caenam in hora qua aeger dormire vult vile erit: quo tempore mentum cur schirro careat) assumat tria cochlearia, confectionis ab Andro- noctu assu- o descriptae, quae dicitur cyphoides; superbibens 3. vj. vini albi vete- mendum. t medicamentum ad hepar permeet. Istius compositionis laudes le- pud Galenum lib. 8. de compos. medi. sec. locos. Vnguentum hoc est. Vnguen- vnguenti de Althaea 3. ii. olei nardini & absinthii ana. 3. iii. olei lau- tum. 3. j. ss. vnguenti aragon. 3. iii. vnguenti marciaton. 3. iiii. misceantur ia, & cum pauca cera fiat vnguentu, quo calido regio ventris inun- ur. Atque hec de curatione istius affectus. Solum superest, ne cu au- Taxatur e decipiaris, fugere xsum lactis in tympanite propter flatum: in aliis auctor in- i, quia non poterit recte concoqui, & sic acescens intemperiem frigi- lactis exhi- augebit. bitione.

De lienis obstructione. CAP. XLV.

 Ien perinde, ac hepar obstructione quoque laborat, Descriptio. quod bifariam contingit, aut obturato eo meatu, per quē humoris melancholici, qui sanguinis velut us est, ad splenem fit deriuatio, ut hepar purgetur, & san- is purior reddatur: aut eo, qui eundem humorē ad ventri- Causa. lum eructat. Cause cap. de hepatis obstructione dictae iam Notae. nt. Notae hae sunt. In primis Gal. 5. de loc. affect. cap. 7. solo Galeni pe- lore cognoscebat hepatis, & splenis affectum nulla audita rna. ateritorum accidentium enarratione: imò (quod grauius) non inuestigato viscerum affectu per tactum: hoc tamen tellige cum ab hepatis, vel splenis vitio fit icterus. Si ob- ructio in eo meatu fiat, qui crassum, atrumque sanguinem l splenem mittit, nullus in splene tumor, aut grauitas sen- tur: cutis tamen color, praesertim faciei nigrior euadit ad- o, ut ater icterus saepe oriatur impuro scilicet sanguine per orpus fuso. Quod si non huius, sed alterius meatus, qui ad Utilitas entriculum atram bilem desert, obstructio infestet, & tu- succi me- or, & grauitas sinistri hypochondrij adsunt, & ventricu- lancholici is ea commoda nō sentit, quae eum humorem in ipsum de- in ventricu- tum sequuntur: hae sunt constructio eius atque corrobo- lū delati. ratio

DE CVRAND. MORB.

ratio : cuiuscunque tamen meatus obstructio sit, qui sic afficiuntur, timorem, atque tristitiam patiuntur, spiritus præterea difficultatem, & somnos turbulentos habent, & hepatis per consensum iis quam primum læditur, vnde in aquam intercutem sæpe incidunt, præsertim si lien induratus fuerit consentiente iecore, vt docet Gal. 6. de loc. affect. cap. 1.

Curatio ob Lienis obstructio curatur quinque remediorum generibus, quemadmodum hepatis obstructio, sed valentioribus, *frustionis.* propter maiorem distantiam, & partis ignobilitatem. *Indicatio* Consideranda sunt ergo, quæ diximus cap. 42. in 4. tamen genere *ex natura* remediorum præcedenti fotu ex aceto, tamarisco, & cetera *partis.* simul decoctis bis in die ventriculo vacuo vngatur lien hoc *Topica.* vnguento, aut huic simili: ℞. oleorum amygdalarum amararum, & de capparibus an. ʒ. ij. armoniaci dissoluti in aceto *Fomentum.* ʒ. iij. vnguenti Aragon, & dialthææ compositæ an. ʒ. ʒ. cera. *Vnguentum.* ʒ. iij. vnguenti Aragon, & dialthææ compositæ an. ʒ. ʒ. cera. *Scirrhi cu* q. s. misce, & fiat vnguentum. Scirrhus lienis curatur quin- *ratio.* que remediorum generibus, primo, victu tenuante, & me- *Victus.* diocriter calido, ne parte tenuiori resoluta augeatur duri- ties. Sint ergo cibi boni succi, & faciles concoctu, & tenuis substantiæ, & humidi, vt iura pingua cum radice petroseli- ni vel fœniculi, vel foliis raphani, & similibus.

Prepara- Secundò, apparantibus materiam terrestrem hac aut si- *tio.* mili mixtura: ℞. syrupi de scolopendria ʒ. iij. syrupi buglos- sæ, & rhodomellis an. ʒ. ij. misce. Item ℞. aquarum aut de- coctionis buglossæ, capilli Veneris, ceterac, & tamarisci an. ʒ. iij. misce.

Purgatio. Tertiò, vacuantibus hanc materiam melancholicam, hoc *Potus.* aut simili potu: ℞. confectionis diasenæ ʒ. ʒ. confectionis me- dicaminis hamec ʒ. iij. agarici trochiscati ʒ. j. syrupi buglos- sæ ʒ. j. aquæ borraginis. q. s. misce, vel si magis amat pilulas: *Pilulæ.* ℞. pilularum indarum, & de fumoterræ an. ʒ. ʒ. diagridij ʒ. iij. cum aqua buglossæ fiant pilulæ septem.

Mollien- Quartò, curantibus duritiem internis, & externis mol- *tia.* lientibus: vt ℞. caricas numero xx. vuarum passarum sine gra- *Sumenda.* nis p. j. foliorum maluarum, & althææ an. m. j. seminis lini, & fœnugræci an. p. fiat decoctum in libris sex aquæ ad dimi- dium, de quo percolato accipe ʒ. ij. ʒ. & cum ʒ. j. mellis

Admonē- fiat ad modum syrupi non perfectè decocti. Adde syrupi de *da.* scolopendria ʒ. vj. Dosis quolibet mane vnciæ quinque. Lien bis ter in die vngatur hoc, vel simili vnguento: ℞. olei sesa- mini, & amygdalarum dulcium an. ʒ. j. olei de capparibus ʒ. ʒ. axungie gallinæ, & anatis, medullæ crurum vituli, an. ʒ. ij.

Curatio. ʒ. dialthææ simplicis & hyssopi humidæ an. ʒ. iij. armoniaci dissol

diffoluti in aceto ʒ. ij. ceræ quod sufficit, misce, & fiat vn- *Fomentum.*
uentum. ante tamen vnctionem semper lien hoc vel simili
potu præmuniatur: ℞. caricarum vuarum passarum sine gra-
is, seminis lini, & fœnugræci an. p. j. radices althææ, & ta-
marisci an. ʒ. j. ℞. aceti albi ℔. iij. fiat decoctum ad medietate-
m. Lien hoc aut simile emplastrum imponatur: ℞. em- *Empla-*
plastri de meliloto, & filij Zachariæ loco ceræ quod sufficit *strum.*
extendatur super alutam ad formam linguæ bubulæ, adde
rmoniæ diffoluti in aceto ʒ. iij. pulueris radices ireos ʒ. j. *Corrobo-*
Quintò, corroborantibus lienem, vt trochiscis de rhabar *rancia.*
aro, & de capparibus simul, & puluere diarrhodon. Abba-
is cum syrupo de scolopendria, & hoc aut simili fotu: ℞. ra- *Fotus.*
licis scolopendriæ. m. ij. radices cappar. p. j. rosarum, m. j.
aceti calibeati ℔. ij. fiat decoctum ad medietatem.

De Lienis obstructione. CAP. XLV.

Scholium.

Lien perinde.) In toto hoc capite solum est quod addas, san-
guinis missionem (cuius auctor nullam fecit mentionem) vs
reuellas ab obstructione sanguinem prauum, nempe melan-
cholicum. Quod si non fuerit melancholicus, à sanguinis missione absti-
nebis.

De suppressione vrinæ. CAP. XLVI.

Suppressionem vrinæ Græci ischuriam nominant, *Descriptio.*
ea fit, quoties lotium in totum supprimitur, ita vt
eo agrotantes nihil reddant. Hæc fit nonnunquam *Causæ.*
propter vesicæ imbecillitatem, cum id, quod in ipsa contine-
tur comprehendere non potest, ita, vt exprimat. Interdum
etiam obstructo inferiori meatu à crassis humoribus, aut ab
impacto lapide, aut à pure, aut à caruncula, vel callo ibi ge-
nito, aut à sanguinis grumo. Aliquando accidit ab inflamma-
tione, aut aliquo alio huiusmodi tumore præter naturam.
Quorum occasione vel angustior redditur meatus, aut in to-
tū obstruitur. Propter obtusum quoq; vesicæ sensum suppres-
sam vrinā aliquando vidimus, & Gal. de quodam scribit, cui
torpente vesicæ sensu ob male affectos nervos vrina fuerat
cohibita. Accidit & sanis sæpe, vt ait Aetius, vrinā ipsorum
cohiberi, aut ob negotiorum importunitatem, aut in con-
cionibus, aut foro iudiciario, aut somnis, si diutius cōtinue-
rint lotium. Hactenus de causis, nunc de notis agamus. Si ab
imbec

- Nota ex imbecillitate.* imbecillitate vesicæ vrina supprimatur, frigida eius intemperiem considerare oportet, & num ipsa manu compressa vrinam reddat: si enim hoc contigerit, & insuper eam intemperie frigida laborare ex propriis notis coniecimus, argumentum certissimum habebimus suppressionis vrinæ causam vesicæ imbecillitatem extitisse. Si obstructus inferior
- Ex obstructione.* meatus sit à glutinosis humoribus, ante actam vitam disquiremus, num in otio educatus sit, (vt inquit Galenus) qui sic affectus est, multis cibis crassis viscososq; humores generare valentibus fuerit vsus. Si à lapide, notas ex sequenti capite desumemus. Si à pure, inuestigabimus per proprias notas num in renibus, vel in parte aliqua renibus superiori abscessus aliquis fuerit, quo abrupto pus in renes, & vesicā fuerit transmissum. Præterea num vesica malo aliquo laborauerit, ex quo ea puris generatio potuerit prouenire. Si à caruncula, aut callo genito, ex præcedentibus vlceris notis colligitur. Si à sanguine in grumum concreto, præcessit sanguinis per eam partem excretio. Atque in huiusmodi coniecturis maximus est æneæ fistulæ vsus, siue lapidis interpositio, siue glutinosorum humorum, siue carunculæ, aut grumoli sanguinis obstructus meatus fuerit, ex eo quod traiecto cathetere (sic enim ænea fistula Græcis appellatur) mingitur sæpe obstruentis rei vestigia apparent. Si oborta inflammatio, aut tumor aliquis meatum vrinæ angustiores reddat, aut omnino obstruat, vt in eo accidit, qui vulneratus in ea parte, quæ semen appellatur, (est autem spatium anum, & penem intercedens, Græci perineon, dicunt) vrinæ passus est suppressionem, vt refert Gal. i. de loc. affect. cap. i. notæ facillè patent. Reliquas causas ex ægrotantis sermone discas.
- Curatio suppressæ vrinæ ex inflammatione.* Si ab inflammatione renum, vel viarum vrinæ fiat, curatur primò, victu tenui, & simili victui dicto cap. 41. de curatione inflammationis hepatis.
- Renulso.* Secundò, auertentibus per sanguinis missionem ex venis tibiarum, aut pedum autore Hippocrate aph. 36. sexti libri, & 48. septimi. Confirmat id Galenus comment. 36. sexti libri aph. quamuis in libello de curandi ratione per sanguinis missionem doceat, posse in morbis renum tam venas brachiorum, quàm tibiarum secari, licet Arabes, & plerique alij nõ contemnendi medici tam in initio inflammationis renum, quàm vesicæ primò secant venas brachiorum, deinde tibiarum, si æger sit multo sanguine repletus: ne prius sectis venis pedum trahatur ad infernas partes à toto, augeaturque inflammatio.

Tert

Tertiò, vacuantibus bilem, vt rhabarbaro, cassia fistula, *Purgatio.*
 ina, tamarindis, & similibus: vt ℥. medullæ cassiæ recens
 tractæ 3. vj. infusionis 3. iij. rhabarbari in aqua endiuivæ
 per noctem bene factæ, syrupi violarum 3. j. aquæ buglossæ, q.
 misce, & fiat potus.

Quartò, parti affectæ sunt sæpe admouenda non repel- *Topica me-*
 lita stiptica, ne claudantur meatus: sed temperate frigida, *diocriter*
 sunt lac caprinum, ouinum, oleum rosatum, & similia. *frigida.*

Vltimo, digerentibus, & resoluentibus, vt oleo camomil- *Resolutio.*
 l, de semine lini, & decocto radicis althææ, & similibus, de
 his actum est cap. 41.

Si sola intemperie fiat, curatur contrariis alterantibus. Si *Sublatio*
 vesicæ imbecillitate, corroborantibus, vt fotu vini rubri, & *aliarum*
 nilium. Si a lapide renum, aut vesicæ, per illorum abscissio *causarum.*

Si a callo genito in
 s vrinariis, curatur per recisionem calli, per medicamen-
 temperate corrodentia imposita callo, seu carni additæ,
 indela cerea, vel tenui ligno petroselini: hæc tamen a pru-
 nti chirurgo sunt experta, eligendæque ne vlcus fiat in viis

urinariis. Quidam Lulitanus Romæ nostris tēporibus mul- *Histerie*
 s curauit laborantes hac vrinæ difficultate: & inter alios *Valenti-*
 alentiæ curati sunt perfecte nobilis Gaspar Aguilar, & fi- *na.*

is magnifici Ximen Peres de Pertusa. Si fiat a grumis san- *Curatio si*
 guinis, vel a pure implēte vias vrinarias, curatur primo san- *fiat a gru-*
 guinis missione, si fuerit æger sanguineus, per sectionem ba- *mis, aut a*
 micæ dextræ, deinde, si opus fuerit, purgatione. Postea mol- *pure.*

entibus, & aperientibus vias vrinarias, vt balneis fotibus,
 guentis, & cataplasmatibus, quæ dicemus capite sequenti.

Vltimo vero, curatur dissoluentibus, & vacuantibus gru-
 os sanguinis medicamentis necessariis, vt theriaca magna,
 it mithridato a drachma semis vsque ad 3. j. cum 3. ij. aquæ
 beæ tinctorum, vel milij solis, vel ℥. coaguli hœ. di 3. s. a- *Si a pitui-*
 ta quinque radicum 3. v. syrupi capillorum veneris 3. j. mi- *ta.*

ta, & fiat potus. Si fiat a pituita crassa obstruente vias vri-
 narias, curatur, primò, victu calido, attenuante, & aperien- *victus.*
 de quo sequenti capite loquemur.

Secundo, apparantibus materiam frigidam breui tempo- *Prepara-*
 propter necessitatem, quamuis pituita egeat per se longa, *tio brevis.*
 magna concoctione: vt ℥. rhodomellis 3. vj. decocti capil-
 lorum veneris, vel fœniculi 3. ix. misce hoc, vel simili medi-
 amento. sumpto primo die summo mane, meridie, & duo-
 decima hora noctis.

Tertiò, vacuantibus medicamentis phlegmagogis, vt 3. j. *Purgatio.*
 r hür

DE CVRAND. MORB.

- Clyster.* hieræ simplicis, vel drachma vna semis agarici trochiscati vel saltem vacuetur hoc, aut simili clystere: ℥. foliorum vtriusque maluæ, & parietariæ an. m. j. furfuris, camomillæ, seminis lini, fœnugræci an. p. j. fiat decoctum, de quo percolato accipe ℥. ix. olei sesamini, & amygdalarum dulcium an. ℥. j. s. butyri recentis, & benedictæ an. ℥. j. salis ℥. j. misce, & fiat clyster. Vacuatio, quæ fit per clysteres, est tutior in his, & si-
Quæ ra- cuario sit milibus affectionibus præter naturam, tutissima autem, quæ
tutissima, fit per suppositoria, quæ minorem extensionem in intestinis
& suavis- efficiunt, minusque comprimunt vias vrinarias.
sima. Quarto, prouocantibus vrinam primum mitioribus, v-
Urina pro compressione imi ventris, glâde acri ex sale, aut felle, aut fri-
uocatio. ctione peritonæi, & pudendi prope ignem, pediculo immis-
so in primam virilis membri partem qui motu titillet, & ir-
ricat expultricem facultatem sopitam, aut ægri iacentis su-
pra dorsum tibiæ, & pedes in altum sæpe, & valide mouean-
Vnguen- tur: quæ si non sufficiant, pecten illinatur oleo scorpionum
tum. & lilij cū pinguedine cuniculi, vel imponatur parietaria fri-
xa, vel apium, vel hoc vnguentum: ℥. olei scorpionum ℥. ij.
olei sesamini, & axungie cuniculi an. ℥. j. croci puluerizati ℥.
Potus. j. ceræ q. s. misce, & fiat vnguentum. Valentior est potus imi
ventris ex spongia cum camomilla, radice althææ, semine
lini, fœnugræco, origano, pulegio, abrotano, mentastro &
similibus: & infusus ex decocto prædictorum, & similium
Spuma sa Spuma saponis vmbilico adnota vrinam prouocat, sed va-
ponis. ualentiùs Galerius vetus (quo vtuntur fullones, genibus, im-
Galerius posito ad lanam oleo imbutam apparandam) cum aceto a-
fullonum. cri, calido, vmbilico admotus. Oleum amygdalarum dulcium
vel sesaminum cum saccharo vrinam prouocat, meatibusq; red-
Quæ prio- dit molliores, & ideò prius his vtendum, vel hoc: ℥. decocti
ra esse de- maluæ syluestris ℥. iij. butyri recentis, & mellis an. ℥. j. misce
beant. & fiat potus: vel ℥. pulueris seminis dauci ℥. s. aquæ mili-
Potus ra- solis ℥. ij. syrupi de duabus radicibus ℥. j. misce, & fiat potus
rii. vel ℥. pulueris corticū ouorum, e quibus pulli egressi sunt
℥. j. sacchari candi ℥. ij. vini albi optimi ℥. ij. misce, & fiat po-
A tēpore tus, vel valentiùs: ℥. duo capita aliorum vini albi optimi
& ætate ℥. vj. decoquantur ad medietatem: cui percolato adde theria-
coindica- cæ magnæ ℥. j. In hyeme & sene tutior est hic potus, vel: ℥.
zio. corticum limacum parū adustarum ℥. ij. decocti capillorum
Laus po- Veneris ℥. iij. vini albi ℥. j. misce, & fiat potus. Hoc potu mul-
tus. ti ex suppressione vrinæ morti propinqui sunt ad pristinan-
sanitatem restituri. Vinum alkekengi valenter, & certissime
vrinam prouocat. Vide historiam ab Arnaldo de Villanova trad-

traditam, qua demonstrat Cardinalem quendam affectum *Historia*
 suppressione vrinæ quatuor diebus hoc vino fuisse curatum *eximia.*
 a medico quodam indocto, & nullius fere nonunis, qui ex
 paupere diues factus est hac sola curatione. Fiat vinum al- *Vini albe*
 kekengi hoc modo, accipe poma rubra (quæ ab antiquis di- *kekengi con-*
 cuntur solanum rubeum) quo tempore vinum fit, quum hæc *fectio.*
 poma rubescunt, vt cerasa, & sunt plena granis paruis, simi-
 libus granis ficuum, habentque tum saporem bonum cum
 amaritudine quadam, conseruanturque per annum filo ap-
 pensa: & vbi hoc caremus vino, accipe quinque, vel septem
 poma in puluerem redacta, & vino albo parum decoquan-
 tur: quod percolatum bibat æger. Vrinam quoque prouocat
 calamus gallinæ oleo tinctus, si meatui penis imponatur, vel
 cādela cerea, vel algalia argentea a viro experto, (quam ca- *Admoni-*
 theterem appellant Græci) vt si a vesica ad penis extrema- *tio.*
 tem sit aliquid impediens exitum vrinæ, facilius in vesicam
 redeat, sed hoc non est faciendum nisi a viro docto, & in hoc
 multum exercitato, ne viæ vrinariæ exulcerentur, vt sæpe fit.

De vrinæ suppressione. CAP. XLVI.

Scholium.

Suppressionem vrinæ.) Vesica pars est instrumentaria,
 quæ vrinam seruat, quo ad molestiam sentiat ab eius mul-
 titudine, aut acrimonia, tunc enim eam excernit. Vrinæ
 excretio propria actio est vesicæ, in qua tria symptomata
 solent accidere, cum non sit actio, cum male sit, & cum deprauare.
 Quando non sit actio, dicitur à Græcis hoc symptoma ischuria, à Latinis Ischuria
 vero vrinæ suppressio, de qua disputat auctor præsentii capite. Ischu- duobus mo-
 ria sumitur improprie, aut proprie. Improprie pro vrinæ retentione in dis sumi-
 qualibet parte sit affectus: hac ratione, obstructio in renibus à lapide tur-
 arenulis, pure, aut humore crasso facta, vrinæ transitum impediens, is-
 churia dicitur. Eā cognosces ex eo, quod in regione pubis nullus in ve-
 fica apparet tumor, quia vacua est: tū quia nullū est irritamentū ad
 vrinā excernendā. De hac ischuria nō agimus modò, sed de illa, quæ Ischuria
 proprie sumitur, in qua vrina in vesica cōtenta nō potest excerni. Cui proprie
 se illius ischuria ex Gal. lib. 3. de caus. symp. c. 2. duæ sūt, imbecilli- causæ
 tas vesicæ, & angustia meatus, per quē vrina excernitur. Imbecillitas
 vesicæ ab intemperie potissimum frigida ortū habet. Angustia meatus
 duæ sūt causæ, præclusio, et obstructio. Præclusio etiā duas habet cau-
 sas. Prima est tumor præter naturā, qui in ceruice vesicæ ortus, ipsam
 cogit cōcidere. Secunda est siccitas. Obstructionis quinque sūt causæ:
 Prima est grūmus sanguinis: Secūda pus: Tertia lapis, ad quā reuo-
 lari possunt arenulæ, & crassa excrementa, quæ communem habent

DE CVRAND. MORB.

materiam. Quarta corpulentū tuberculum ceruicis vesicæ, aut meatu
vrinarij, ex ulcere non rectè curato ortum: quod nostris temporibus e
morbo gallico, frequenter accidere videmus. Quinta, callus in eisdem
paribus. Qua ratione hæc distinguantur, & curentur, & quod præter
dictas ischuricæ causas, soleant esse aliæ duæ, nempe sensus exiguus ve
sicæ, & immodica quantitas vrinæ in præsentī capite habes ab aucto
re rectè tradita. Dysuria, id est vrinæ difficultas ab eisdem causis fit,
quibus ischuria, sed remissioribus.

Sanguinis Secundo, auertentibus.) In sanguinis missione, quæ in renibus
missis in inflammatis exerceatur, hac ratione distinguens, habebis conciliatos &
renibus leni locos. Si inflammatio (hoc est tumor præter naturam) sit recens
inflammata cum in parte paucus sanguis sit collectus, & multus fluat, sanguinem
zis. mitte ex basilica, maiorem enim ex ea facies reuulsionem. Si verò si
inflammatio inueterata, cum in parte multus sit iam coaceruatus hu
mor, & paucus fluat: tunc ex pede sanguis missus iuuabit, multo hu
more ex parte affecta euacuato. Quod quamuis ita sit, Galenus ta
men in methodo semper, ex pede secat venam.

Curatio Tertio, vacuantibus bilem.) Consuevit auctor semper, in qua
ischuricæ libet inflammatione purgare bilem: nescio certè qua ratione ductus.
ab humo- Si fiat a pituita crassa.) Si ischuria ab humore crasso originem
re crasso ducat: primo sanguinem mittes propter venarum affectum, hac e
factæ. nim ratione minuemus humorem obstruentem, ne fluat ad renes. De
inde si occasio locum det præparabimus humorem, cum oximelle, rho
domelle, & aliis. Postea cum purgabimus cum pilulis paratis ex 3

An sit pur j. benedictæ cum aqua fæniculi. Dices, nōne purgabis helleboro, e.
gandum ratione, qua docet Galenus lib. 6. epyd. par. 1. sent. 6. Respondeo, nō
helleboro. licet, quia ex eodem Galeno in hellebori assumptione debet fieri ma
gna corporis præparatio, qualis non poterit exerceri in ischuria ol
vrgentiam symptomaticis: bene tamen in eo, quem dolorem grauem
in renibus per multos dies perdurātem, pati videmus. Post purgatio
nem balnea, in sequenti capite descripta, vtilia erunt. Quæ si non

Balnea. proficiant, in balneo medicamentū ex cantharidibus constitutum exhi
Medica- bebis. ʒ. cantharidum præparatarum ʒ. vii. (quantitatem pro vir
mentum tutis robore, aut imbecillitate augens, aut minuens) cum aqua pa
canthari- dibus pa
*dibus pa-*stinacæ fiat potio.
ratum.

Quarto, prouocantibus vrinam.) Optima aliqua medicamen
ta hoc in loco proponuntur, solum aduerte, nullum ex his imponen
dum umbilico, sed pubi, aut perineo. Medicamentum etiam ex allio
rum capitibus, tãquam ingratum omittatur, sicut illud, quod ex cor
ticibus ouorum, tanquam inutile.

De renum calculo, & vesicæ.

CAPVT XLVII.

Ren

Renum & vesicæ calculi duplex est causa, altera, *ut Cause.*
 materia: altera ut efficiens. Materia, est humor visci *Materia.*
 dus, & pituitosus in ventriculo ob assiduas crudita-
 res genitus. Efficiens tum renū, tum vesicæ calor materiam *Efficiens.*
 adatiāns, & in lapidem indurans. Differunt inuicem hi lapi- *Discrimē.*
 des: nam renum minores sunt, friabiliores, asperiores, & ru-
 bri: vesicæ contra: & quantum ad colorem attinet, albi sunt,
 aut paulū ad cineris colorem declinant. Præterea illis pro-
 uectæ ætatis homines sæpius quam pueri: his pueri, quam *Puerorū*
 ætate prouecti frequentius corripuntur. Voraces enim sunt *natura.*
 pueri, cibisque largiū vtuntur, & nulla temporis, ordinis, &
 illos sumēdi habita ratione: quiescere a cibo ingesto nō pos-
 sunt perpetuūq; mouētur: vnde crudum alimentū per venas
 & vniuersum corpus distribuitur. Mollia verò cum sint illo-
 rum corpuscula, & facile cedentia obturari renes non pa-
 tiuntur. Crassissimæ igitur vrinæ in vesicæ amplitudinē nul-
 lo impediēte recipiuntur, ibiq; velut in vino fæx, & in aqua
 limus, crassum illarum sedimentum subsistit, & a caliditate,
 quæ multa in pueris est, cogitur desiccātū, & lapidescit: quo
 fit, vt frequentius in vesicæ lapidem pueri incidant, quem *Noue.*
 cum patiuntur, vrinas habent aquæ similes, in quibus sub- *Sabulum.*
 sident sabulosa quædam: ipsi insuper assidue pudendum scal- *Scalptio.*
 punt, idque vel laxum, vel intentum præter rationem. Vri- *Suppres-*
 na repente aut in totum supprimitur, aut non nisi guttatim *sio.*
 redditur. Sæpe etiam comitatur ani procidentia: certius ta- *Prociden-*
 men nullum signum est, quam digitus immissus in rectum *tia ani.*
 intestinum: sic enim num lapis vesicam infestet, & quantus *Note cal-*
 ille sit, detegitur. Renum calculus sic deprehenditur: renem *culorum*
 grauis dolor, & infixi aculei instar, nullo foris tumore appa- *renum.*
 rente infestat. Spina ægre, inflecti potest, crus stupet: quod è
 directo laboranti reni respondet. Vomitus præterea, & cibi
 fastidium adest. Vrina inchoante obturatione pauca, & a-
 quosa mingitur, post in totū supprimitur. Alius cū iam ni-
 hil excernat, ad egerendum subinde mouetur. Calculo e re-
 nibus emoto vrina subsidentiam arenosam habet, & sanguis
 plerūque excernitur, ob violentiam videlicet asperioris cal-
 culi excussi. Porro cum dolores coli sæpe cum nephritide
 confundantur, non ab re fuerit signa quibus inuicem distin- *Distinctio*
 guantur, proponere: sunt autem, quæ sequuntur. Renum do- *doloris co-*
 lor, breue occupans spatium, vno loco innititur immobilis, *lici & re-*
 aut saltem per vterque decliuis ad vesicam protenditur: co- *num.*
 licus verò magna apprehendit sedem, hac illac reuoluitur, *Differunt*
 & ab vno latere incipiens in alterum fertur, dolore interim *loco.*

DE EVRAN D. MORB.

ventriculo per transitum infestato. Præterea colicus affectus a cibo intenditur, nephritis remittitur. Denique in colico dolore vehemens est, ac magis frequens & vomitus, & nausea: per vomitum vero excreta tum biliosa, tum pituitosa sunt, quibus assumpti cibi aliquid admixtum videtur. Sunt & alia signa, sed breuitati studentibus hæc sufficiant.

Cumatio.

Victus.

*Quæ no-
ceant.*

Lapis in renibus, & vesica gigni prohibetur: primò fugiendæ eorum, quæ augment pituitam in corpore, calculi scilicet materiam: qualia sunt, alimenta frigida, crassa, lenta, & difficilia concoctu, vt caseus, præsertim antiquus, salsus, panis zimus, animalium partes pingues, & neruossæ: vt sunt intestina, ventriculus, cor, & similes partes, aues aquaticæ, fures, bos, lepus, hircus, pisces, præsertim grandiores, legumina demptis ciceribus: herbarum frigida, cruda, & cibus largior, a cibo somnus, Venus, labor, & balneum, & animi perturbationes, vt ira, tristitia, timor, & similes, quæ omni temporis nocent: sumendi ergo sunt cibi parcius, quam pro appetentia, bonique sint succi, & faciles concoctu, quales sunt pullus gallinaceus, gallina, motacilla, quæ dicitur a quibusdâ cauda tremula, coturnix, perdix, hœdus, carnes arietinæ præsertim in Hispania, & similes. Potus sit vinum album, aqua liquiritiæ bene dilutæ, vel aqua cinnamomi, vel aqua solis optimi fluij, aut fontis, vel pluuiæ percolata lapide Balearico, vel saltem sine arenosa, & terrestri residentia.

Remissio.

*Clyster le-
niens.*

Cassia.

Catholico.

Terebin-

thina.

Pilula.

Secundò, pituitam genitam nobis praua victus ratione ventibus (ne ad renes ruat) retrahentibus, & auertentibus vincto bis in hebdomada clystere hoc leniente, vel simili: ℞ decocti maluarum, radicis althææ, seminis lini, & fœnugræci lb. j. butyri recentis, & benedictæ an. ℥. j. olei sesamini, & camomille an. ℥. ij. salis 3. j. misce, & fiat clyster. vel ℥. j. medullæ cassiæ fistularis sumpta in hebdomada, vel ℥. j. diacatholicon, semel in hebdomada sumpta, vel terebinthina bene lota aqua capilli veneris, vel maluæ, & postea cū saccharo mixta: hæc enim ventriculū, intestina, renes, & vesicam purgant sine alicuius partis detrimento. Vel pilula vna elephangina aut ex hiera sumptæ singulis diebus, vel alternis sumptæ.

Diuretica

pituitosam

materiam

expellenda

Tertiò, pituitosam materiam, si viis vrinariis hæsit, ne in renibus, aut vesica lapidescat, expellemus vreticis, vt 3. vj decocti maluæ syluestris cum ℥. j. sacchari candi, vel 3. v. decocti cicerum, & liquiritiæ, aut 3. vij. seri caprini, decoctionis liquiritiæ cum 3. j. sacchari candi, vel 3. viij. iuris galli gallinacei decrepiti decoctionis liquiritiæ, maluarum & capilli veneris, seminis lini, & fœnugræci.

Quart

Quartò, temperamus calorem harum partium, calculi *Alteratio*
causam effectricem emulsione quatuor seminum frigido-
rum maiorum, syrupis violato, nenupharino summo mane
sumptis, oleo violato tepido renibus, & vesicæ sæpe admo-
to, lacte caprino, vnguento santalato, & similibus: vitamus
tamen astringentia, ne materia calculi retineatur, sæpe, præ- *Expende.*
sertim æstate lumbos aeri aperimus, pelles, plumas, cætera-
que, calorifica contingere lumbos prohibemus.

Calculus concretus in renibus, si dolorem efficiat vbicun- *De cura-*
que fuerit, sed potissimum in vreteribus expellentibus cura- *tione calcu-*
tur, frangentibus scilicet lapidem, lubricantibus, aperienti- *li renum.*
bus, dilatantibus, & vrinam prouocantibus: prius tamen ob- *Sanguinis*
seruare oportet necessariam esse corporis euacuationem an- *missio.*
te vretica, & lapidem frangentia medicamenta, siue per san- *Vomitus.*
guinis missionem, si dolor fuerit magnus, æger carnosus, ne *Clyster.*
partes dolentes inflammentur, siue per vomitum, si ventri-
culus abundauerit cruditatibus, siue per clysteres, si intesti-
na, & meatus propinqui, siue per alia medicamenta pur-
gantia, si fuerit his opus, ne trahantur excrementa à ven-
triculo, vel aliis partibus ad vias vrinarias, & ibi augeatur
dolor, vel vrina omnino supprimatur.

Secundò, considerandum satis est, tutiorem esse purgatio- *Clyster po-*
nem, quæ fit per clysterem lenientem, & parum acrem, ea *tioni ante*
quæ fit per potionem purgantem, seu pilulas præsertim, si sit *ponendus.*
paucus clyster, ne suo pondere extendens comprimat vias *Cur potio*
vrinarias, dolorémque in ipsis augeat: quia medicamentis non pro- *betur.*
purgantibus, præsertim valentibus moti humores per cor- *Opinio non*
pus à partibus dolentibus attraherentur. Nonnulli hanc e- *nullorum.*
uacuationem per suppositoria, seu glandes faciendam esse
tutiùs censent, quos ego non omni ex parte laudo. *Dolor in*

Tertiò, sciendum est, necessariam esse ante lapidis fra- *primis se-*
ctionem doloris curationem omni auxiliorum genere. po- *dandus.*
tionibus videlicet, clysteribus exiguæ quantitatis, fotibus,
vnguentis, cataplasmatibus, & balneis, vt hoc, aut simili po-
tu: ℞. decocti radicis althææ, foliorum maluæ, & seminis li- *Potus.*
ni ʒ. ij. sacchari ʒ. j. misce, & fiat potus: vel ℞. olei amygd-
alarum dulcium recentis ʒ. iij. sacchari ʒ. j. misce: vel ℞. de-
cocti camomillæ, & radicis althææ ʒ. vj. sacchari ʒ. ij. misce,
& fiat potus. Hic vel similis clyster dolorem harum par- *Clyster.*
tium curat, intestina purgat, ac vtramque viam lenit: ℞. pa-
rietariæ, foliorum maluarum, bisimaluæ ana. m. j. semi-
nis lini, fœnugræci, & camomillæ ana p. j. fiat decoctum,
de quo percolato accipe ʒ. vj. olei sesamini, & de semine lini

DE CVRAND. MORB.

Forus.

an. 3. ij. benedictæ, & butyri recentis an. 3. j. salis 3. j. misce, & fiat clyster. Dolor quoque curatur hoc, aut simili fotu ex decocto seminis lini, fœnugræci, camomillæ, meliloti, radicis althææ, maluæ, parietariæ, & similia. Inde facit hoc, aut simile vnguentum sæpe renibus & vesicæ, & viis vrinariis ad-

Vnguentum.

motum: ℥. olei scorpionum scfamini, & camomillæ an. 3. j. axungia cuniculi 3. ij. mucilaginis seminis lini, & fœnugræci, & pulueris croci an. 3. j. ceræ quod sat est, misce, & fiat vnguentum. Vel adinqueatur hoc, aut simile cataplasma bis in

Cataplasma.

die renibus, & vesicæ: ℥. foliorum parietariæ, senationum, apij, & herbæ medicæ, hoc est alfalfa ana m. j. decoquantur omnia, deinde cum oleis scorpionum, & de semine lini sufficientibus fiat cataplasma, addendo farinæ camomillæ, fœnugræci, & de semine lini, an. 3. s. axungia cuniculi, vituli, & gallinæ an. 3. ij. croci puluerizati 3. ij. Optimum quoque est in hoc genere remediorum sæpe adinovere renibus, aut vesicæ parietariam, vel herbam medicam diuisam in partes paruas, & parum cum vino albo decoctam, vel rorem marinum cum cineribus calidis, & pauco vino, quod a nostris fœ-

Tabalet.

minis dicitur tabalet, Tortella ex ouis v. aut vj. cum aqua

Tortella.

nasæ bene permixtis, & postea frixa cum cepæ albo diuiso

Inseffus in balneo.

in partes minimas, & cum pinguedine porci, & oleo scorpionum iuuat multum. Inseffus vsque ad vmbilicum in balneo per semihoram ex decocto radicis althææ, seminis lini, fœnugræci, parietariæ, camomillæ, ficuum v. radicum diureticarum, foliorum alliorum & caparum, capilli veneris, liquiritiæ, & similia. Et dum æger sedet in balneo, bibat

Narcotica.

potum aliquem lapidem frangentem, de quo postea dicemus: his peractis si dolor augeatur, aut si vehemens, nec spem vllam frangendi lapidem det sine periculo vitæ, tunc narcotica sunt necessaria mixta medicamentis externis, vel clysteribus, vel potionibus, semper attente considerando, quæ diximus in vsu narcoticorum capitibus superioribus, præsertim cap. 40. de curatione colici doloris: in hoc tamen

Theriaca.

dolore 3. j. theriacæ magnæ ferme recentis sex, vel octo mensium est tutior aliis narcoticis, quia simul sensum morbi eripit, vrinam prouocat, & lapidem frangit: vt ℥. theriacæ magnæ sex, vel octo mensium vsque ad annum 3. j. aquæ capilli

Patius.

veneris 3. ij. syrupi de duabus radicibus 3. j. misce, & fiat potus. His sic adnotatis accedamus ad medicamenta, quæ lapidem frangunt, & vrinam prouocant, quorum quædam a qualitate manifesta id faciunt, alia tantum a substantia, seu proprietate, alia sunt, quæ a proprietate, & qualitate simul manifest

manifesta. Quæ à manifesta qualitate agunt, amara, non vehementis caloris: quia vehemens caliditas exiccando, & resoluendo lapidem duriores faceret: incisio enim in his materia lapideior solet esse caliditate: quæ tamen lapidem renum frangunt (præter pauca) possunt vesicæ lapidem frangere, quamuis maiori vi egeat lapis vesicæ ob magnitudinem, duritiem, & distantiam maiorem. Medicamenta, quæ recte lapidem renum, aut vesicæ frangunt, multis facultatibus, ac naturis egent, quæ raro vel nunquam in simplicibus reperiuntur. *vesicæ.*
 Primò, urinam prouocant, ac humores secum ad vias urinarias trahunt. Secundò in renibus, aut vesica ipsa, vel facultates earum tempore debito detinentur, vt possint lapidem frangere. Tertiò, renes, & vesica ab ipsis corroborantur, vt postea lapidem fractum expellere possint: hoc Galenus docet 10. de compositione medicamentorum secundum locos. *Simplicia lapides frangentiæ.*
 Simplicia quæ lapidem renum, & vesicæ frangunt, à grauissimis & antiquis medicis, & à me sæpe experta hæc sunt, vinum scilicet, præsertim album, radix graminis, semen maluæ sylvestris, ceterac, capillus veneris, pentaphyllon, radices cannarum, blitis, crocus, cinnamomum, polium maius, cicera nigra, radices v. diureticæ, asparagi scilicet, petroselinis, feniculi, brusci, & apiij, raphanus, bdellium, cortex ciperi Aegyptij, cortex radices capparis, armoniacum, ameos, saxifraga, vrtica, chamæpitys, milium solis, amygdalæ amaræ, nuclei ceraforum, grana hederæ, nuclei persicorum, siliqua fabarum, eryngium, cuius vim in hoc morbo vide apud Aetium. Aqua seu decoctum ex his, & similibus quantitate Lenitio
 3. iij. vsque ad 3. vj. cum melle in hyeme, & saccharo in æstate præcedat.
 te ventriculo vacuo est exhibendum: semper tamen præcedat lenitio, & mollificatio viarum urinæ per oleum scfaminum recens, vel amygdalarum dulcium cum saccharo cando, vel per decoctum maluæ sylvestris cum butyro, & melle, vel per terebinthinam benè lotam.

Sunt etiam & multa alia valentiora medicamenta lapidem frangentia, vt lapis Iudaicus (de quo Dioscorides lib. 5. cap. 93.) quantitate ciceris, præparatus in lapide marmoreo, ad modum sieph, lapidem vesicæ frangit cum 3. iij. semis decocti diuretici, vt capilli veneris: aliqui tamen, vt Galenus nono, de facultatibus simplicium medicamentorum, lapidem solum renum frangere existimant. Quidam huius lapidis præparati drachmam semis præbent cum paucis vino albo.

Cinis scorpionum affatorum validè, & violenter calculum

DE CVRAND. MORB.

lum vesicæ frangit pondere granorum quatuor hordei cum vino maluatico. Ego non auderem eo vti: oleum tamen scorpionum pectini admotum sæpe confert, & eius iniectio per penem.

Lapis spongiæ. Lapis spongiæ renum tantum calculos frangit, vt quibusdam medicis grauissimis placet. Dioscorides tamen scribit frangere etiam vesicæ lapidem. Cuius dosis est à drachma semis ad drachmam vnam cum pauco vino, vel decocto aliquo vretico.

Lapis lyncis. Lapis lyncis calculos renum, & vesicæ frangit. Dos is est drachma vna cum pauco vino albo, aut liquore aliquo vretico.

Cinis leporis combusti. Cinis leporis combusti valenter frangit lapides renum & vesicæ. Dos is cochlearium vnum, vel drachma vna vsque ad drachmam vnam semis. Forma comburendi lepore tradita est à multis, & à Matthæo de Gradi. capit. de lapidibus renum, & vesicæ, & ab omnibus fermè pharmacopolis cognita est: Plinius tamen lib. 28. scribit renes leporis exsiccatos lapides renum, & vesicæ frangere.

Cinis corticis cum ouorum. Cinis corticum ouorum adustorum, à quibus pulli sunt egressi, valenter frangit lapides renum, & vesicæ, a me sæpe expertum hoc medicamentum. Dos is a drachma semis vsque ad drachmam vnam cum vino albo, vel aliquo alio liquore vretico.

Sanguis hirci. Sanguis hirci præparatus valenter frangit lapidem renum & vesicæ, est expertus a multis, & à me, facileque obtinet principatum in curando hoc morbo. Eius dos is est à ʒ. ss. vsque ad ʒ. j.

Cinis motacillæ. Cinis motacillæ, quam caudatremulam vocant, valenter frangit lapides renum, & vesicæ, & caro huius auiculæ tam elixa, quam tosta habet eandem facultatem.

Lapis hominis, vel porci. Lapis hominis, vel porci lapides renum frangit, autore Galeno, sed aliorum sententia renalis lapis frangit renum lapides, & vesicæ calculus comminuit vesicæ calculum. A me non est expertum medicamentum, neque a meis præceptoribus.

Puluis cimicis. Puluis cimicis lapides quoque frangit. Dos is ʒ. ss. cum vino albo, vel aliquo alio liquore vretico. Non sum expertus viuæ tamen per penem inmissæ vrinam prouocant, quemadmodum pediculi.

Offa mespilorum. Puluis ossium mespilorum lapillos renum, & vesicæ frangit. Dos is à ʒ. ss. vsque ad ʒ. j. Est à multis, & à me hic puluis sæpe expertus.

Puluis

Puluis corticum auellandarum frangit lapidem : Dosis 3.j. *Puluis cor-
decoctum etiam earum eadem vi pollet. Est expertum me-
dicamentum.* *ticum auel-
lanarum.*

Puluis anseris combusti cum pauco vino albo frangit la- *Puluis an-
pidem, vt aliquibus autoribus placet.* *seris.*

Puluis pullorum hirundinum combustorum frangit la- *Pullorum
pidem. Dosis drachma vna: Carnes eadem facultate præditæ
sunt.* *hirundinũ
puluis.*

Lapides inuenti in capitibus gallorum, & columborum *Lapides
veterum frangunt lapidem cum pauco vino albo : Dosis à
drachma semis vsque ad drachmam vnam autore Plinio li-
bro 30. Christa galli gallinacei habet eandem vim, vt qui-
dam arbitrantur.* *gallorum
gallinaceo
rum, & co-
lumborũ.*

Puluis vesicæ mustellæ frangit lapidem : Dosis drachmæ *Puluis ve-
duæ.* *sicæ mu-
stellæ.*

Puluis vesicæ apri cum vrina exiccata (Plinio autore lib. *Puluis ve-
15.) frangit lapidem. Multi alij volunt solam vrinam apri
hac eadem vi præditam esse.* *sicæ apri.*

Puluis cornucervi assati frangit lapidem. Dosis 3.j. *Cornu cer-
ui.*

Puluis foliorum mori valenter frangit lapidem : Dosis *Puluis fo-
drachma vna.* *liorũ mori*

Pellicula interior ventriculorum pullorum gallinaceo- *Pellicula
rum frangit lapidem, vt docet Plin. lib. 30.* *interior.*

Lapides inuenti in vesica fellis bouis frangunt lapidem. *Lapides ve-
Puluis renum asinorum frangit lapidem, vt scribit Pli-
nius lib. 18.* *sicæ fellis
bouis.*

Cinis glandium frangit quoque lapidem, vt docet Plin. *Renes as-
lib. 24.* *inorum.*

Lumbrici terrestres frangunt lapidem, autore Plinio, *Cinis glan-
lib. 30.* *dium.*

Lapides reperti in hepate apri lapidem quoque fran- *Lumbrici.*
gunt, vt vult Plin. lib. 28.

Cinis Erinacei combusti rumpit lapidem, præsertim si re- *Lapides
periatur iuxta rubum, quia rubi fructus habent hanc vim, hepatis
vt ego sum expertus. Dosis à drachma semis vsque ad drach-
mam vnam.* *apri.*

Stercus columbinum mistũ cinnamomo, & theriacæ ma- *Cinis Eri-
gnæ frangit lapidem: vt ʒ. pulueris stercoris columbini, cin-
namomi, & theriacæ magnæ. an. 3.ß. aquæ capilli veneris ʒ. lumbinũ.
ij. syrupi de duabus radicibus ʒ. j. misce, & fiat potus.* *Puluis sca-
rabei.*

Puluis scarabei combusti, & apis fortiter comminuit cal- *Cinis lepo-
culum. Dosis ab ʒ. ß. vsque ad 3. semis.* *ris.*

Cinis leporis, & præsertim capitis valenter frangit lapi-
dem

DE CVRAND. MORB.

dem, & carnes eiusdem habent eandem vim, si comedantur.
Pulvis cā Pulvis cantharidum præparatarum, cicadarum, & noctu-
tharidum, lucarum valentissimæ frangit lapides, & eo nō est vtendum
cicadarū, nisi cū alia non suffecerint. Præparandi forma scripta est
et noctilu cap. 44. de curatione hydropis : quam etiam hic decreui in-
carum. dicare. Accipe duas, aut tres cantharides demptis capitibus
Forma præ & pedibus tantū, vt Hippocrates, & Dioscorides docent
parādi can & non alis, vt Arabes volunt, benè pistas : quibus adde dra-
chbarides. gaganti, & gummi Arabici in aqua maluarum dissoluti. an.
 3. iij. postea in vmbra exiccentur, & eodem modo bis, vel ter
 infundantur omnia in decoctum maluarum, & tandem fiant
 trochisci. Quorum dosis est ab scrupulo vno cum paucō o-
 leo sesamino, vel amygdalarum dulcium, vel decocto ma-
 luarum.

Composita Composita medicamenta, quæ lapides renū & vesicæ
lapides frā frangunt, parari possunt omnia necessaria, & vtilia huic mor-
gentia. bo, melius quam simplicia, vt superius diximus. Et quamuis
Confectio sint multa à doctoribus tradita, in præsentio nobiliora, & ma-
saluberri- gis experta trademus : vt ℥. cineris vitri, cineris scorpionū,
ma. cineris caulis nabati, cineris leporis, spongiæ, sanguinis hirci
 præparati, cineris corticum ouorum, à quibus pulli egres-
 si sunt, lapidis Iudaici, gummi, nucis, macis, acori. an. partes
 æquales, seminis petroselinī, dauci, pulegij, gummi Arabici,
 seminis althææ, & piperis. an. partem vnā, & semis, mellis.
 q. s. misce, & fiat confectio. Dosis, drachmæ tres cum aqua,
 vel aliquo decocto vretico, est medicamentum expertum, &
 saluberrimum.

Altera Hoc quoque medicamentum est optimū,
confectio. & ab eruditissimis medicis probatum : ℥. lapidis Iudaici,
 gummi cerasi, lapidis spongiæ, corticis melonis, liquiritiæ.
 an. 3. iij. seminis dauci, vitri combusti, abrotani. an. 3. j. me-
 dullæ granorum pini, & amygdalarum dulcium. an. 3. iij.
 mellis. q. s. misce, & fiat confectio : Dosis drachmæ tres. Hoc
 etiam medicamentum est vtilissimum, & valenter frangit la-
 pides renū, & vesicæ : ℥. sanguinis hirci præparati, lapidis
 Iudaici, lapidis inuenti in vesica fellis vaccæ aut tauri, anisi,
 asari, amygdalarum amararum, seminis cucumeris, bdellij,
 costi. an. æquales partes, mellis quod sufficit, misce, & fiat
 confectio. Dosis drachmæ duæ cum decocto rubæ, vel asa-
 ri, vel camomillæ. Hoc medicamentum Gal. 10. de compositi-
 one medicamentorum secundum locos valenter frangit la-
 pides, & purgat renes, & vesicam, & dolores curat : ℥. cassiæ
 lignæ 3. ij. seminis apiij 3. iij. myrrhæ 3. x. piperis 3. ij. olibani
 3. iij. lapidis de syria masculi, vel fœminæ 3. j. seminis pastina-
 cæ

Quarta.

nace, anisi. an. 3. ij. spice nardi 3. ij. amygdalarum amararum, *Medici ca-*
 asari. an. 3. ij. storacis, ireos. an. 3. ij. seminis papaueris albi 3. *insdam ci-*
 ij. seminis cyperi 3. ij. mellis quod sufficit, misce, & fiat con- *bus, aut bo-*
 fectio. Quidam medicus eruditus laudat non parum ad la- *lus.*
 pides frangēdos cibum, qui sit ex hepate, pulmone, renibus,
 & testiculis cum priapo hirci, cum croco, cinnamomo, &
 melle, & postea imple intestina hirci hac mixtura. Dosis sunt
 duæ, aut tres bucellæ. Habet tantam vim hoc medicamentū
 ad lapides expellendos, vt non solum a renibus, & vesica, sed
 ab annulo comedentis fracti omnes excutiantur. Res est
 monstruosa, si vera est. Præter supradicta quatuor medica-
 menta composita, sunt multa alia a doctoribus laudata, &
 probata, inter quæ litrontipon a 3. j. vsque ad 3. ij. theriaca
 magna, & mithrydatum, electuariū ducis, dialacca, & dia-
 curcuma sunt magis in vsu, & magis experta: quamuis mul-
 ta alia scripta sint, & etiam componi possint ex simplicibus
 superius dictis, & similibus: semper tamen, vt superius ad-
 monuimus, præcedant hæc vretica, & quæ lapidem frangūt
 mollientia, & anodina externa, & interna: de quibus iam sa-
 tis diximus. Sed præter illa utilis erit hic, aut similis clyster *Observa-*
 semel, vt minimum in die: ℥. florū camomillæ, p. ij. meli- *tio.*
 loti, fœnugræci, seminis lini. an. p. ij. s. seminis fœniculi 3. s. *Clyster.*
 olei lib. vj. vini lib. j. decoquantur omnia ad vini cōsumptio-
 nem, postea conseruetur oleum percolatum. Dosis cuiuslibet
 clysteris vnciæ sex. Sæpè in die, vel saltem ter vngatur pe-
 ctus, femur, & tota regio vesicæ, & renes, si opus fuerit, hoc
 vnguento: ℥. axungie capi 3. j. axungie anatis, gallinæ, & *Vnguentū*
 cuniculi. an. 3. s. axungie vrsi, medullæ crurum vrsi, vel virtu-
 li, & theriacæ magnæ. an. 3. ij. emplastri filij Zachariæ 3. vj.
 olei scorpionum, lumbricorum, camomillæ, & anethi, an. 3.
 s. ceræ. q. s. misce, & fiat vnguentum. Sepe quoque admouea-
 tur parti dolenti vesica porci, vel hirci plena sequenti oleo: *Vesica ad*
 ℥. olei lb. j. florū camomillæ. p. j. s. vini optimi lb. s. deco- *mouenda.*
 quantur omnia donec vinum consumatur: cui percolato ad-
 de olei lumbricorum, de lilio, & sesamini. an. 3. ij. olei scor-
 pionum 3. ij. misce, his impletur prima vesica. Ad implendas
 alias vesicas, ℥. florū camomillæ, meliloti, vtriusque sti-
 chados, iux arteticæ. an. p. j. foliorum vrticæ. m. ij. parietariæ.
 m. iij. radicum althææ 3. ij. maluarum. m. ij. s. seminis lini,
 fœnugræci, & milij solis. an. 3. j. seminis fœniculi, & carui.
 an. 3. ij. liquiritiæ 3. j. s. fiat decoctum in libris duodecim a- *Balneorum*
 quæ, donec tertia pars consumatur. Inter ea, quæ maximè *vsus mode-*
 vtilia, & necessaria sunt ante vsū, & in vsu vreticorum, *rarsus.*
 sunt

D E C V R A N D. M O R B.

sunt balnea vsque ad vmbilicum ex decocto rerum dictarum superius, quæ vias vrinarias aperiunt, molliunt, & dolores sedant: hæc tamen temperate, & non in frequentissimo vsu conferunt, ne pars dolens, & ægra fiat nimis apta ad recipienda excrementa totius corporis, & humores, & iterum generentur lapides: semper tamen ventriculo, & intestinis vacuis oportet ingredi balneū. Præter hæc balnea, quæ fiunt ex rebus vreticis, & lenientibus, sunt alia multa naturalia balnea calida, sulphurea, vel salsa, quæ habent vim manifestam, & occultam prouocandi vrinam, & lapidem frangendi: quæ quotidie experimur apud Italos, Gallos, Hispanos, & præcipue inter Vasconiam & montes Perinæos sunt optima balnea dicta de Cauteres. De his Philosophus 24. particula problem. vltimo.

*Proble.
vltimo.
24. part.*

*Cautè diu-
retica esse
exhibenda.*

In exhibendis vreticis medicamentis debet esse prudens medicus, & non audax: sed semper, si fieri potest, ab iis abstinere, præsertim valentibus, nisi vrgente dolore, & præsentē calculo, & necessitate: quia sæpe ex vsu eorum immodico fiunt vlcera, vel ardor vrinæ, profluuium, & tandem alij morbi perniciosi.

*Cucurbitu-
la.*

Cucurbitula renibus admota mouet lapidem, & postea admota per vretes versus vesicam ducit ipsum ad eam.

*Si vrina
supprimatur.*

Aliquando lapis inter vesicam, & penem infixus vrinam supprimit, & instrumento argenteo dicto cathetere, seu algalia impellenda est ad vesicam, vel scapo petroselini, vel calamo gallinæ, vel candela cerea. Si vero appareat, ferreo in-

*Incisio, &
eius cura-
tio.*

strumento extrahatur. Aliquando necessaria est incisio in pene. Si fuerit prædurus, & magnus lapis in vesica, sola incisione extrahi potest: hæc tamen facienda est à viro perito, & docto: incisio verò pro magnitudine lapidis erit facienda, quæ cognoscetur immisso digito per anum: & postea curetur vlcus per consolidantia, & glutinosa, & per cibi, & potus abstinentiam. Si sanguis in vesicam descenderit, ibique coalescat, antequam putrefiat, theriaca magna, vel coagulo hordi cum decocto liquiritiæ euacuabitur per vrinam.

De Renum calculo, & vesicæ. CAP. XLVII.

Scholium.



Enum & vesicæ calculi.) Vrina frequenter supprimitur à renum calculo, aut vesicæ. Proinde breuiter, quæ ratione huic malo occurrendum sit, explicabo. Prius autem scias velim, me consulto omittere multa, quæ in calculi disputatione propo-

nunt

nuntur (ea enim habeo diffusè scripta, in libr. de simpl. med. fac. quem imprimendum statim, domi seruo) solumque supponere, materiam, causam efficientem, & generationem calculi, ut inde colligamus essentiam Calculi medicamentorum, quæ ipsum comminuerè nata sunt. Calculi materia est materia, humor crassus, siue sit pituita, aut melancholi. 1. 3. de alim. fac. cap. 6. si- Causa efficiens purulenta substantia epy. 6. par. 1. comm. 15. Causa, quæ calculum efficiens, sicut, est calor immodicus quantitate, aut tempore, non autem frigiditas, Vallesius ut male voluit Vallesius, lib. 6. epyd. non considerans ex Galeno, ut pro- errat. inde ex veritate, viuentè animali non posse, tantum frigiditatem intendi, Modus gæ ut ex ea aliquid concreseat in duritiem. Generatur calculus, calore cuius generationis porante humulam partem crassi humoris, & reliquam concrecente, ita calculi. ut si ille concretus humor in renibus moram faciat ab altero augeatur, quoad lapidis magnitudinem ex arenula acquirat. Lapis in renibus generatus, & detentus, dolorem grauem efficit 6. epy. par. 1. sent. 6. quia renes non sentiunt nisi per membranam. Vallesius eodem loco existimat, Dolor gra- magnum lapidem, quando exciditur ex carne renis, acutum dolorem uis. inducere. Id colligit ex eo, quod hunc dolorem, difficile distinguere pos- Vallesius sumus, à colico dolore. Quæ sententia facile refutabitur, ab eo qui consi- errat. derat, carnem renis esse intensilem, ac proinde neque à magno lapide posse acutè dolere, quod exemplo inflammationis docet Galen. 6. aphor. comm. 5. Adde in carne renis, non posse generari lapidem, quia deficit locus, nempe cavitatis: & ita Galenus 6. epy. agens de lapidis generatione, semper eius meminit: Accidit quòd si in carne renis lapis generaretur, non posset ad vterem permeare. Probatio etiam infirma est, quia cum principium vteris, sit iuxta colon, dolor à lapide in eo contento excitatus, bene poterit à nobis colicus indicari, præcipuè acutissimus cum sit, vtereres enim multum sensiles ex natura sunt. Hunc renum dolorem nephritim appellamus. Quem vomitus primò pituitæ, & deinde bilis æ- Nephritis ruginosæ comitatur. Ratio hæc est. Hic dolor ad se attrahit sanguinem, Vomitus & spiritum magis, quibus destitutus ventriculus debilitatur, & cum in nephri- sit pituitæ naturalis officina eam euomit; in renis autem quæ sunt iux- ta renem, à caliditate bilis adurit, & fit æruginosa, quæ ad ventricu- lum languidum expulsa vomitu euacuatur. Franciscus Vallesius 7. Dubitatio epy. com. 59. dubitat, qua ratione lapide existente in vno rene, aquosa à Vallesio fit vrina, aut supprimatur: si verum est ex Galeni sententia, partes ge- proposita, minas affectas esse, ut una læsa, altera ageret. Respondet venas emul- Solutio gentes, simul oriri ex vena caua, ac proinde, raro vnum renem, lapidem eiusdem. congerere, quin alter, à crassis succis & arenis obstruatur: & ideo vri- nam supprimi, aut colatam per ambos renes puriorem excerni. Hoc au- tem intelligendū est, in affectibus dolore generantibus, quia in indolen- tibus bene potest esse affectio in vno rene, altero non cessante ab actione. Quod confirmat in homine, quæ totū renē corruptū habuisse, et per vri- nā excretū se vidisse testatur, qui vrinā altero rene solo reddebat. Quid si

DE CVRAND. MORB.

si in vterem prodiit lapis, & supprimatur urina? id inquit fieri, qui ob dolorem perit nixus musculorum abdominis, qui ad reddendam urina. **Refutatur** nam necessarius maxime est: Hæc *Vallesius*. Quæ omnia falsa sunt, imo *Vallesius*. primis cum respondet, emulgentes venas à causa oriri, ac proinde affecti vno rene, alterum affici, rem falsam supponit: nempe simul debere affici duos renes, hoc enim est contra experientiam, quia in dies experimur lapidem in vno rene existente, alterum renem recte operari, ea ratione quæ abiectione vno oculo sæpe, alter illa sus seruat. Neque distinguit recte quia siue sit affectus dolorificus siue indolens, affecta vna parte, reliqua optime aget. Præterea si duo sunt renes, & duo vteres, quis sibi poterit persuadere, lapidem, vnum vterem obstruentem supprimere urinam? Ratio ex nixu musculorum desumpta nil persuadet, quia musculi abdominis non habent vesicam subiectam, quæ intra ossa pubis latitat, & sic potest comprimi solum, quando repleta est, à musculis rectis, e parte qua ossibus pubis adhærent. Adde, urinam excerni à facultate naturali, quæ expultrix dicitur. Tum si propter dolorem cessat musculorum nixus, debuit etiam in colico dolore cessare, et eadem ratione urinam supprimere. Experimentum etiam illud, quod adducit, corrupti renis & per urinam excreti, tanquam impossibile omittendum est: si enim vteres teneseruantur à renibus, non corruptius per quam partem ingredi poterit vterem laxatum? tum si rem corruptus, urinam non attraheret, quæ ratione renis frustula deducebantur ad vesicam? omisso ergo hac in par-

Dubitatio - te *Vallesio*, qui contrariam ponit ubi non est: dico naturam duos fabricasse renes, ut impeditam vnius actionem, alter suppleret (non ut voluit *Vallesius*, ne facile obstruerentur) & inde sequi, esse impossibile (recte se habente collo vesicæ) à lapide in vno rene contento, posse urinam supprimi. Quod si urina suppressio contingat, necessario in duobus renibus erit obstructio: aut si in vno tantum rene sit lapis (quod ex dolore colliges) excrementa crassa in vesicam delapsa obstruere eius collum, & impedire urinae transitum. Quæ ratione distinguatur dolor nephriticus, à colico capite de dolore colico explicatum habes.

Medica- Calculus concretus in renibus.) Quando aliquis solitus est lapidem in renibus generare, eo tempore quo arenulas emittit, neque dolores expur- re cruciatur, potest habere usitata aliqua medicamenta renes expurgantia: qualia sunt mel cum vino albo, mel cum puluere ossium mespilorum, decoctum pastinacæ cum melle, aqua distillatitia florum fabarum cum melle, & similia. Si lapis existat in vterem acutum excitans dolorem, dilatatantibus viam indigemus, simul etiam possumus frangentia lapidem **Sectio re-** assumere. In dolore hoc nephritico auctor sanguinem mittit, si æger sit **na.** carnosus: quasi solum oporteat secare venam in plethoricis affectibus. Secabimus ergo venam in magno dolore, non propter dolorem, quia hic cum deiciat vires, potius eam impedit: neque propter morbum, quia lapis sui ablationem indicat, quæ sanguinis missione, excerni non potest, sed

sed propter morbum magnum, qui futurus timetur, nempe inflamma-
tionem.

Secundò considerandum.) Non rectè hoc in loco rem explicat Taxator
auctor, quia si multus humor continetur in renis, potius medicamento auctor.
purganti per os assumpto euacuabitur, quam clysteribus lenibus.

Tertio sciendum est.) Dolor nephriticus aut vrget, aut non. Si vr- Curatio do-
get, cum deiciat vires, ad se trahit curationem, & ideo sedandus est. loris vrger
Quod commodè præstabit hoc unguentum, exterius positum in ilibus suis.
pra locum dolentem. ℞. olei scorpionum, et camomillæ an. ℥. ii. unguenti
aragon, & axungie gallinæ an. ℥. j. Philonii maioris ℥. iii. cera parum
fiat unguentum. Hoc dilatat pariem emollientibus, & stupefacit narco-
tico medicamento. Possimus etiam uti aliquo ex dictis oleis, cum gra. iii.
opii permixto. Per os assumere potest ager theriacam magnam, quam lo-
fermentationem patitur, quo tempore stuporem inducet, quia opium ad-
huc seruat vim: aut ℥. i. Philonii maioris (quod post duos annos totius
est) cum aqua pastinacæ, aut faniculi, ut permeet. Quod si neque reme-
dus dictis sedatur dolor, in balneo (quod statim describetur) bibat medi-
camentum narcoticum: aut si hoc non possit, assumat, quæ vim habent
calculum comminuendi, oleum amygdalarum dulcium, cum melle, aut
saccharo candi appellato, quod etiam habet lubricandi vim: pulvis etiam
ossium mespilorum, vulgò axerolles utilis est, sicut & hæc potio: ℞. li-
contripon. ℥. j. ℞. pul. elec. duct. ℥. ℞. cum ℥. iii. aquæ pastinacæ, fiat po-
tus. Si dolor non vrget, curatio à causæ ablatione inchoabitur, propellen Curatio ne-
tes lapidem à renibus ad vesicam, medicamentis, quæ calore et humidi- phritidis,
tate laxando, veteres dilatabunt. Hoc exterius applicatis, et clysteribus cum nō vr-
præstabis. Exterius multis poteris uti unguentis, illud, quod paulo supra get dolor.
descripsimus, ab eo auferentes Philonium, accommodatum est. Sicut & Exterius
hoc alterum: ℞. unguenti agrippæ ℥. j. olei scorpionum. ℥. ij. olei ruta- applicanda.
cei. ℥. ℞. cera parum, fiat unguentum, cui adde axungia cuniculi. ℥. ii. His
inungatur illi regio, & superponantur herba medicæ foliæ, à caliditate
moderatè madentia, vulgò alfalfa ab asfuor. Clysteres parare poteris ex Clysteres.
ruta, anetho, feniculo, maluis, fursure, semine lini, & sanuigraci: deco-
ctioni addens, benedictæ confectiorem, cassiam, saccharum rubrū, oleum Balneum.
rutaceum, aut butirum. Quod si his remediis dolor non remittitur, ad
balneum vniuersale deueniendum erit, paratum ex aqua, in qua lauer
seu sion vulgò crexenases, parietaria, althæa, malua, & semen lini bul-
lierim: ita ut ex eisdem herbis meatus urinarii fricentur, ut dilatentur.
Quod si ager intuerit ingredi balneum, prædictas partes, eadem aqua
fouebit, spongia rehana. Si his omnibus peractis lapis semper resistat,
neque excernatur, imò suppressionem urinae efficiat, paucos ab ea libe- Si lapis in
rari videris. Quod si descendat ad vesicam lapis, & ibi urinam suppri- vesica uri-
mat (quod ex pubis tumore intelliges) veteres solebant anea fistula, la- nam sup-
pidem à meatu amouere. Sed quoniam nimium est dolorificum instru- primat.

DE CVRAND. MORB.

Si sit in r- (ob dolorem) inuncta efficere. Si vero per urinæ meatum excernatur ring me- lapis, eisdem medicamentis utere. Quæ si non profint, & lapis i- tu. medio via quiescat, extrahendus erit sectione recta per meatum fa- cta, cauendo semper, ne fistulosa vulnereantur corpora, quia non pote- rit vlcus ad cicatricem venire.

Non da- His sic adnotatis accedamus ad medicamenta.) Nullum tur medi- datur medicamentum à tota substantia lapulem frangens: quia la- cametum pis non est morbus tota substantia nobis contrarius, ac proinde pelli tota sub- leporis cremata, lepus decollatus, aut viuis in fictili vase crematus stantia frã leporis renes cremati, cinis ungulæ equi, plumæ palumborum, testa gës lapidë. cochlearum, steruus murium, cinis cancrorum, vermium terrestrium & passeruli calculus, quem quis prius reiecerit, lorium capræ mon- Medica- tana, cicadæ arida, hepar asini, & similia à practicis descripta som- menta la- nia sunt. Erunt ergo solum ea medicamenta lapidem frangentia, qua- pidem frã calida modice sunt, & tenuium parium: hæc enim penetrando per- gentia. * lapidis substantiam eam diuidere possunt. Calculi vesicæ difficulter Calculi re aut nulla ratione possunt frangi, propter loci distantiam, ob quam in- ficæ non transitu exoluitur medicamentorum vis: ac proinde ad chirurgiam possunt veniendum erit, aperientes vesicæ collum, & calculum extrahentes. frangi. Quam sectionem multi nostris temporibus, felici successu exercent.

De ardore urinæ. CAP. XLVIII.

Descriptio **A**RDOR urinæ, quem medici & stranguriam, & stil- licidium urinæ nominant, tum fit, cum ægri assidue ad meiendum irritatur, urinaque paulatim, & gut- Cause. tatim redditur. Prouenit propter urinæ acrimoniam, quam ipsa acquisiuit vel ob caliditatem hepatis, aut rerum acrium vsum, maiori tamen ex parte ob bilem commixtam, quam natura sæpe per eam partem expellit: à quacunque tamen causa proueniat, ea qualitate prædita est urina, vt & ad me- iendum cōtinuo stimulet, & renes sæpè, atque vesicam exul- ceret. Nonnunquam etiam accidit hæc passio ex ulceratio- ne vesicæ, aut, ex abscessu rupto vel in renibus, vel in vesica. Puris enim acrimonia idem, quod de urina dictum est, præ- stare potest. Cæterum si ex acri urinæ qualitate hoc contin- gat, urinæ sunt biliosissimæ, & vniuersus corporis halitus, esse medi- & reliquæ etiam notæ bilem testantur. Si vel ex vlcere, aut camenta abscessu, ex propriis tum vlceris, tum abscessus notis hoc i- lapide frã psim dignoscitur. Monendi in hoc modo tyrones in medi- gentia. ca arte sunt, ne conuulentibus, quod aiunt oculis, causas huius mali inspiciant: decipiantur enim passim credentes ex vesicæ calculo oriri, vnde medicinas comminuendis cal- culis

illis accommodatas miseris ægrotantibus ministrant, quod
eorum perniciem vertitur: augetur enim per ea medica-
menta, quæ calida facultate sunt prædita, vrinæ acrimonia:
unde vlcus aut in renibus, aut in vesica generari necessum
est, ideoque iugi cruciatu torqueri, qui in tam impias carni- *Historia*
cum manus inciderunt, quemadmodum cuidam meo tem- *observan-*
ore contigit, qui initio remedia necessaria fugiēs, post em- *da:*
tricotum omnia remedia amplectens in vrinæ multitudi-
nem lapsus est, & eos morbos, a quibus deinde periti medici
uare minime potuerunt.

Stranguria, si a calculo fiat, curatur iis, quæ diximus su- *Curatio*
eriori capite. Si ab vlcere, abstergentibus, mundificantibus,
c incarnantibus (vt ita dicam) vlcus: de quibus cap. 28. de
uratione sputi sanguinei diximus: quanquam hîc miscen-
ta sunt, quæ clementer ad vias vrinarias alia medicamenta
referant. Si ab acrimonia, auferentibus causam. Primò, si bi- *Si ab a-*
s est vrinæ mixta, victu frigido, & humido, vt vsu lactucæ, *crimonia*
portulacæ, cichoreæ, vtriusque maluæ, cremoris hordei, & *curatio.*
miliū: quatuor tamen semina frigida maiora sola nocent
rouocando vrinam. Prodest fugere acria, salsa, acetum, coi-
um, labores animi, & corporis. ¶ Secundò, sanguinis mis- *Quæ fu-*
one per sectionem venæ hepaticæ dextræ, euacuando san- *guenda.*
uinem plenitu dini & robori respondentem. Hæc refrige- *Sectio ve-*
at hepar, bilem vacuat, & a viis vrinariis auertit. *na.*

Tertiò, purgantibus bilem prius sumpto syrupo rosarum *Prepara-*
x infusione siccarum cum aqua portulacæ per tres, aut qua- *tio.*
uor dies ad tollendam bilis acrimoniam, & caliditatem, me- *Purgatio.*
dicamentis clementibus, vt cassia fistulari, manna, tamarin-
is, myrobalanis citrinis, & rhabarbaro, vt hoc aut simili po- *Potio.*
u: ℥. medullæ cassiæ fistularis recens extractæ ℥. j. rha-
barbari electi infusi per noctem in aqua endiuæ ℥. iij. syru-
vi violarum ℥. j. aquæ borraginis. q. s. misce, & fiat potus. Et
quia morbus est diuturnus, hac cōfectione fiat vacuatio fre-
quens: ℥. medullæ cassiæ fistularis recens extractæ ℥. j. me- *Confectio*
dullæ tamarindorum, & diaprunis solutiui, & conseruæ ro- *ad vsum.*
rarum recentis. an. ℥. s. mucilaginis seminis psyllij in aqua
maluarum extractæ ℥. iij. pulueris diarhodon. Abbatis ℥. ii.
acchari dissoluti in aqua rosarum ℥. iij. misce, & fiat confe-
ctio. Dosis qualibet hebdomada cochlearia duo. Hoc etiam, *Dosis.*
vel simili clystere purgatio frequens est utilis: ℥. foliorum *Clyster.*
maluarū, lactucæ, violarū, & portulacæ. an. m. j. hordei excor-
ticati. p. j. seminis psyllij, & cydoniorum. an. ℥. ij. fiat decoctū:
de quo percolato accipe vncias decem, cui adde olei violarū

D E C V R A N D. M O R B.

vincias tres, cassiæ fistularis præparatæ ʒ. j. vitellos ouorum numero duos, misce, & fiat clyster. Ex solo lacte ouino, vel primo clyster est optimus, & eius frequens vsus vtilissimus huic morbo.

Alteratio. Quarto, refrigerantibus hepar, renes, & totum corpus

Balnea. ternis & acrimoniam vrinæ tollentibus, & externis auxili

Electua- vt balneo folius aquæ tepidæ, electuario diatrium fanta

ria. rum, diarhodonis Abbatis, conseruis violarum, rosaru

Conseruæ. nenupharis, & acetosæ: aquis, vel decocto portulacæ, en

Aquæ. uiz, cichoreæ, acetosæ, & similia. Vnguento santalato l

Vnguentæ. pari & renibus bis in die admoto, vel hoc, & simili vngue

to: ℞. oleorum rosarum, nenupharis, & violarum aqua ro

ta lotorum. an. ʒ. j. mucilaginis seminis psyllij, & cydonioru

aqua rosata extractæ an. ʒ. ij. santalorum omnium, & troch

scorum de camphora. an. ʒ. j. ceræ. q. s. misce, & fiat vnguent

Vsus vitel Vfus longus vitellorum ouorum recentium cum syrupo v

lorum ouo lato tollit vrinæ acrimoniam, & stranguriam. Puluis hic o

rum lauda rat quoque eam: ℞. seminis papaueris ʒ. j. seminis lactucæ,

tur. portulacæ parum tosti an. ʒ. ij. pulueris liquiritiæ, quatu

Puluis. seminum frigidorum maiorum mundatorum. an. ʒ. j. sacch

ri candi violati ʒ. iij. misce, & fiat puluis, qui cum ouo reco

ti summo mane, vel cum iure ante cibum quantitate vni

Syrupus cochlearij sumatur. Syrupus de mucilaginibus ex Mattha

eximius. de Gradi, curat hanc vrinæ acrimoniam, & prohibet vlci

fieri in viis vrinariis: estque medicamentum singulare, opti

mum, & expertum, cuius hæc est descriptio: ℞. seminis a

thææ, maluarum, & cydoniorum. an. ʒ. j. dragaganti ʒ. ij. in

fundantur in aqua tepida decoctionis maluarum, seminis p

paueris albi, & granorum alkekengi. an. quantum suffici

postea fiant expressiones dictorum seminum, & dragagant

de quorum mucilaginibus fiat syrupus, vt ℞. prædictaru

mucilaginum ʒ. j. s. decoctionis prædictæ ʒ. ij. sacchari opti

mī ʒ. ij. misce ad vnam dosim, quæ per sex, vel octo dies exh

benda est: & si fuerit vehemens caliditas, adde parum muc

laginis seminis psyllij. Aliquando in maxima acrimonia, &

Iniicienda caliditate vrinæ oportet syringe argenteo per penem lac o

per syrim- uinum sæpe inicere, vel aquam plantaginis, vel hordei de

gem. coctum cum mucilagine seminis psyllij, vel cydoniorum, v

collyrio albo Rhassæ sine opio, & in maximo dolore cum

opio.

De Ardore vrinæ. CAP. XLVIII.

Scholium.

Ard

Ardor vrinae quem medici.) Stranguria, à luvinis vrinae
 stillicidium dicitur, in quo vrinam parvam, et frequenter red-
 dimus, lib. 5. aph. com. 33. Quod symptoma propriū est vesicae
 praevae expellentis vrinam. Neque enim loquimur de stranguria
 antica. Cuius meminit Hipp. epy. par. 1. sent. 41. in qua humores acres per Cause
 nes ex toto corpore expurgantur. Causae symptomaticae stranguriae, ex strangu-
 riali sententia lib. 3. de caus. symp. cap. 2. duae sunt, imbecillitas facultatis duae.
 alicuius retentivae vesicae, & vrinae acrimonia. Imbecillitas vesicae fit ab Imbecilli-
 tate intemperiebus, quatuor nudis ex lib. 3. aph. com. 16. & potissimum tatis vesti-
 ta frigida 7. aph. com. 48. aut à quatuor cum fluxione humoris 3. aph. r. ca. causae.
 um. 16. Acrimonia vrinae varias habet causas. Prima est abscessus ru- Variæ cau-
 tus in renibus, aut aliis partibus, & per vrinam expurgatus. Ad hanc sae acrimo-
 niam reducenda est bilis acris, quae permixta cum vrina stranguriam niæ vrinae.
 facere solet: de qua intelligendus est Gal. 3. aph. com. supradicto, cum Prima.
 tribit intemperiem primò calidam, secundò calidam & siccam, & ter-
 tiò humidam acrem reddere vrinam. Quo loco, ubi Gal. habet humidam,
 lege siccam, quia humida intemperies impedit humoris acris generatio-
 nem, quam ipsam generare possit. Secunda causa est pituitosum simul- Secunda.
 que falsum excrementum. Hoc autem falsum redditum est, non à putre-
 line, sed ex permixtione falsae serosae humiditatis, hoc est vrinae, quae sal-
 ta est: pituita enim crassa & glutinosa cum sit, habensque permixtam
 falsam serosam substantiam detineatur in vesica, magis irritat, quam
 faciat vrina sola. Terciam causam stranguriae addit Gal. 6. de loc. aff. c. Tercia.
 4. vlcus in vesica, aut meatu pudendi. Vbi per meatum pudendi intelli-
 ge vesicae principium, quod cervicem vesicae appellant. Potest tamen ali- Excusatur
 quis hoc in loco Galen. tanquam diminutum accusare, quia omittit lapi- Galenus.
 lem, & arenulas, à quibus stranguria excitari solet. Cui satisfacimus
 ea ad acrimoniam reuocantes, quia renera arenulae, & lapis calidita-
 tem, & ardorem habent: aut ad vlcus, quia haec in transitu per corpora
 sentientia (saltem lapis) sua asperitate molestiam inducunt. Quod si la-
 pis in cervice vesicae contineatur, stranguriae etiam causa est, quia ob- Curatio
 struens, & si non omnino liberum vrinae transitum impedit. Si acrimo- stranguriae
 nia vrinae, quae stranguriam facit, à pure abscessus rupti ortum habeat, ab acrimo-
 abstergemus vlcus renis, mulsa permixta cum decocto pastinacae, & nia vrinae
 maluarum: pastinacae, ut sit vehiculum, maluarum verò propter acri- facta.
 moniam. Mundato ulcere (quod ex paucis pure, minori fatore vrinae, &
 paucis sanguine excreto colliges) cicatricem inducimus cum decocto ca-
 pitum glandium, aut malicorii, addito paucis melle, aut saccharo cando,
 ut penetrat. Exterius ad conglutinandum illines, unguento commitissae
 cum paucis aceto, ut penetrare possit. Alia etiam unguenta ex oleis myr-
 tillorum, rosarum, & cydoniorum cum pulueribus myrtilorum, corticis
 mali granati, & similibus, quae adstringere nata sunt, conficere pot-
 eris cum paucis cera. In acrimonia vrinae à pituita falsa, aut bile, sangui-


DE CVRAND. MORB.

nem mites propter venarum affectum, tum etiam, quia sanguinis, ex accidenti refrigerabit euacuato humore calido. Secundo preparabis huiusmodi, si sit pituita, oximelle, rhodomelle & aliis decocto maluarum, & liquiritia propter acrimoniam. Si sit bilis non eget preparatione, quia tenuis est. Tertiò purgabimus bicastica simul cum electuario de succo rosarum, & syrupo rosarum alexand. ex 9. infusionibus: pituitam vero diacatholicone, diaphanone, & agarico cum prædicto decocto. Aduerte tamen, in ardore que ex pituita salsa maximè utilitatis esse, vsum therebentine acrinæ: si eam a 3. ij. vsque ad 3. β. cum syrupo violaceo assumam. Renes & iecur in stranguria vnguento refrigerante illines, cerisandalino, aut ceroto refrigerante Galen. cum paucis aceto. Hoc est ʒ. ceroti sandalini ʒ. iij. olei nenupharini ʒ. ij. aceri ʒ. β. ceræ parafiat vnguentum. Neque omittendum erit balneum aque tepide quod excrementa renum refrigerat, & dilatat vias, vt ipsa euacuari possint. Syrupus de mucilaginibus à Matthæo de Gradi, compositus maximè ardorem extinguit: si tamen non sint in renibus crassa excrementa: Tunc enim permiscebimus cum eo oximel, aut paucis oximel scillitici. Syrupus hoc modo parari poterit: ʒ. seminis rhæe, maluarum, & cyclanorum ana ʒ. j. dragaganti ʒ. iij. infundatur in aqua decoctionis maluarum, seminis papaueris, & granorum Alkekengi, ana. q. s. deinde fiant expressiones dictorum seminum, & dragaganti: de quorum mucilaginibus, & decocto prædicto q. s. cum saccharo albisimo conficiatur syrupus benè coctus. Huius assummanè ʒ. ij. cū hoc decocto: ʒ. decoctionis maluarum, liquiritia, seminis papaueris & granorum Alkekengi lib. i. Si stranguria à lapide & arenulis oriatur, curabitur ea ratione qua diximus cap. superiori.

Catether Aliquando in maximā acrimoniam. Si instrumento argenti
construendus. ab auctore positus, liquorem immittas, non perueniet ad vesicam, si poteris construere catether, quod habeat longitudinem quindecim digitorum, ita vt in parte superiori sit latius.

De mictu sanguinis. CAP. XLIX.

Causa.
Externa.



Anguinis mictus sæpe à causis exterioribus fit nonnunquam etiam ab interioribus. Exteriores sunt casus, & ictus maxime cum partibus, quæ iuxta vrinæ instrumenta sunt, inferuntur: rumpitur enim ex hac occasione vena aliqua in illis locis, vnde sanguinis mixtio cōtingit. Præterea rerum calidarū vsus, & immoderata corporis agitatio, & ea omnia, quæ sanguinē attenuare, & ad renes, & vesicā propellere possunt, hoc malū pariūt. Internæ sunt corporis plenitudo, hepatis imbecillitas, renū in attrahendo valida facultas, eorundē, atque vesicę exulceratio.

no. Calculus porrò in renibus, aut abscessus aliquis, & naturæ iudicium, quam crîsum appellant, causæ sunt. Si a causis externis proueniat hoc malum, ægrotum, quod millies dictum est, interrogabimus. Si ab internis, in causarû cognitionem sic deueniemus: si corporis plenitudo in causa fuerit per methodos superius traditas, maxime cap. de cephalalgia, signa patebunt. Si hepatis imbecillitas, vrina emittitur cruenta, carniû recês cæsarû lotioni non absimilis. Si renum in attrahendo robur, vrina pari ratione cruenta, sed aliquâto albidior. Si exulceratio renum aut vesicæ, sanguis puri commixtus, & modicus excernitur: ad hæc dolor sentitur circa locum, cui vlcus inest. Si calculus renum aut abscessus, signa ex propriis capitibus mutuari oportet. Si naturæ iudicium, iuuari ab ea re laborantem cernimus.

Mîctus sanguinis, qui à redundantia fit, vel criticus, nisi *Curatio.* vires deiciat, non est suppressendus. Si fiat ab vlcere corrodente, curetur prius vlcus: si ab immodico coitu, instauratione & glutinatione succurrendum est. Si a recenti solutione, victu frigido astringente, sanguinis missione, & astringentibus medicamentis externis, & internis curabitur: de quibus dictum est cap. de sanguinis profluuiò e naribus, & hic quoque de iis agemus. Si ab imbecillitate recenteris facultatis renum, curabitur primo, victu frigido astringente, de quo capitibus de curatione profluuij sanguinis e naribus, & de curatione sputi sanguinei. ¶ Secundo, sanguinis missione, à qua cûque fiat causa, dempto coitu, per sectione venæ iecorariæ. *Si ab imbecillitate recenteris facultatis renum, curatio.*

Tertio, concoquentibus bilem, vel pituitam, vel atram billem, si alius humor fuerit sanguini mixtus, quem cognoscet colore, & multis aliis argumentis. *Præparatio.*

Quarto, vacuantibus per medicamenta dicta c. 1. & c. 21. de profluuiò sanguinis e naribus. *Curatio.*

Quinto, astringentibus, & glutinantibus internis, & externis, vt syrupo rosarum ex infusione siccarû, myrtillorum, cydoneorum cum aqua, vel decocto plantaginis, portulacæ, & similium, lacte ouino calybeato cum pauco bolo Armenico, conferua rosarum antiqua: vel hac mîxtura: ℞. mîletæ, conferuæ rosarum antiquæ ana. ʒ. j. pulueris corallij rubri præparati, Karabæ, lapidis hematitis præparati, spodij, dragaganti, corticum glandium, boli Armenici, quattuor seminum frigidorum maiorum mundatorum an. ʒ. j. syrupi rosarum quod sufficit, misce, & fiat cōfectio. Dosis cochlearium vnum cum aqua portulacæ, vel plantaginis summo mane, & omni hora, præsertim vacuo ventriculo. Renibus & vesicæ

D E C V R A N D. M O R B.

Vnguentum. admoueat^r vnguentum fantulatum, vel cerotum fantulatum, & panni linei perfusi hoc, vel simili liquore: ℞. succi plantaginis, & portulacæ, an ℥.iiij. aceti rosati ℥.j. misce. Aliquando necessaria sunt narcotica simul & astringentia, vnde sunt trochisci de spodio, de terra sigillata, & de Karabe, quorum dosis est a ʒ.ʒ. vsque ad ʒ.ʒ. Et in maximo sanguinis mictu sequens potus est necessarius: ℞. philonij Romani ℥.ij. syrupi papaueris ʒ.ʒ. aquæ portulacæ ʒ.ʒ. misce, & fiat potus. Si sanguis in vesica coalescat, curatur per medicamenta dicta cap. 28. de sputo sanguinis, qualia sunt theriaca magna, coagulum hœdi, & similia.

De mictu sanguinis. C A P. X L I X.

Scholium.

Sanguinis mictus.) Omnes causæ mictus sanguinis redi-
cende sunt ad tres illas, quas capite de sanguinis è naribus
profluvio, ex Galeni sententia proposuimus.

De Diabete. C A P. L.

Descriptio. **D**iabetes à quibusdam fluor vrinæ dicitur, ab aliis
hydrops matulæ, & diapfacon à nonnullis nomina-
tur: differt non parum ab vrinæ multitudine, nam
in syncera diabete potus non mutatur, vt in lyenteria cibus,
expellitur. In non vera, quamuis aliquando vrina potum su-
peret, mutatur tamen, & non sunt omnia signa veræ diabe-
tis. Puella olim Mediolanensis per sexaginta dies singulos
Historia
maudita. sexdecim matulas vrinæ mictu impleuit, cum biberet circi-
ter tres ampullas, corpus tamen persanate puellæ parū con-
siderat magno exempli miraculo, medici illius tēporis cre-
debant acrem in vrinam conuerti. Hæc igitur spuria diabe-
tes, si non curatur, in synceram transit, quæ a Galeno tatū
bis visa est, & à me quater, ab Aegyptiis tamē sæpe, siue pro-
pter calum, siue propter aquam Nili. Est autore Gal. 6. de
locis affect. cap. 3. affectus renum proprius, in quo tātus inest
vrinæ fluor, vt totum corpus exhauriatur, quo quicquid bi-
bitur, quale sumptum est, tale per vrinam redditur: qua par-
te similis est hæc affectio ventriculi, intestinorūque læui-
tati, illi proportionē respondens.

Causa. Prouenit ex imbecillitate retentricis facultatis renum,
attrahentis verò magno robore: attrahunt enim ad se renes
vehementer aquosum id excrementum, quod in sanguine
est, quod cum retinere ipsi præ imbecillitate non possint, ad
vesicam demittunt, quæ res cum continuo fiat, continuus
quoq

quoque adest vrinæ fluor, adeò vt poculenta omnia nulla sui qualitate mutata per vrinam continuo excernantur. Comi- *Signa.*
tatur sic affectos sitis vehemēs, & quæ satiari alicuius liquo-
ris hauſtu non poſſit, vnde etiam aſſidue bibere cupiunt, aut
bibunt, nec ab re: cùm id quod fuerit injectum continuo ad
renes, & veſicā delabatur. viſcera præ nimia caliditate exu-
ri videntur: tumor autem magnus lumbos teſtes, ac coxas
infeſtat. Quod ſi amplius viſcerum calor increuerit, ſupe-
rior venter corrugatur, & venæ, quæ in ipſo ſunt, attollun-
tur. Vniuerſus habitus corporis gracileſcit, & tabe quadam
generali afficitur.

Multitudo vrinæ, quæ proprie non eſt diabetes, ſi à potu *Curatio.*
largiori fiat, curatur abſtinentia potus. Si à qualitate falſa,
& acri, cibi & potus vt largo eſu alliorum, caparum, & por-
rorum abſtineat ab iis. Si a frigore externo, calidis internis,
& externis, de quibus dictum eſt cap. 31. de imbecillitate, vt
aſcites curabitur. Si à paralyſi, per ea quæ diximus cap. 13. Si
a muſculo rupto, vel dilacerato, curatio eſt difficilis, & fer-
mè impoſſibilis, vt in quibuſdam à partu laborioſo vidimus.
Si autem inuitis vrina excidat, vt pueris, & aliis quandoque
dormientibus, cauſa auferatur per euacuationē, ſi ſit humor
calidus medicamentis cholagogis, de quibus cap. 1. & aliis
multis locis dictū eſt: deinde per refrigerātia dicta ſuperiori
cap. & in hoc in curanda diabete. Si ſit humor frigidus pi- *Ex pitui-*
tuitoſus poſt illius concoctionem, & vacuationem per ea, *toſo humo-*
quæ dicta ſunt cap. 1. & etiam cap. 13. de paralyſi, curabitur *re curatio.*
his pilulis. ℞. caſtoſei, myrrhæ, maſtichis, thuris, pyrethri, *Pilula.*
cupularum, glandium, an. partes æquales, cum ſyrupo myr-
tillorum fiant pilulæ ſeptem pro drachma. Doſis drachma
vna. Hi trochiſci, autore Arnaldo de Villanoua, ſunt optimi *Trochiſci*
in hoc affectu, quibus curatus fuit iuuenis affectus diabete, *meientibus*
& vrinæ profluuiio in lecto: ℞. roſarum, ſpodij ana. 3. v. ſe- *in lecto.*
minis portulacæ, liquiritiæ, boli armenici, ſumac an. 3. j. ſe-
minis lactucæ, coriandri, ſantalorum, berberis an. 3. ſ. draga-
ganti, gummi Arabici, balaustiæ an. 3. j. cum ſucco malorum
granatorum acidorum fiant trochiſci. Doſis 3. j. in die cum
ſyrupo roſarum, & aqua calybeata.

Diabetes, ſeu tranſitus vrinæ non mutata curatur ſex re- *Curatio ve-*
mediorum generibus: primò, viſtu refrigerate, & aſtringen- *næ diabe-*
te, dempris cydoneis, quæ vretica ſunt, & ex eorum eſu ſere- *ris.*
niſſimus Rex Neapolitanus Alſonſus incidit in diabeterem: *Viſtus.*
vehemēter enim nocent huic morbo calida vretica, & etiam *Hiſtoria.*
animi, corporis labores, & coitus. Potus ſit aqua calybeata
non

DE CVRAND. MORB.

non frequens, neque magnus, quamvis caliditas immodica ipsum semper appetat, & eo egeat: quare si potus multæ frigida aquæ euomatur, est utilis: refrigerat enim, & humect. ventriculum, iecur, & renes, a quorum immodico calore attrahitur potus non mutatus.

Reuulsio Secundo, auertentibus, & refrigerantibus simul, ut sanguinis missione per sectionem basilicæ in initio cum vires adsunt, & frequenti vsu clysteris huius, vel similis: ℞. folia clyster sereni lactucæ, violarum, maluarum, & portulacæ an. m. j. hodie dei præparati p. j. fiat decoctum, de quo percolato accipe f. j. cui adde olei rosarum, & papaueris an. ℥. ij. cassiæ fistulari præparatæ, & diacatholiconis ana. ℥. j. sacchari rubri ℥. j. misce, & fiat clyster.

Concoctio. Tertiò, concoquentibus bilem, ut syrupo rosarum, violarum, myrtillorum, & papaueris, & aquis vel decocto portulacæ, lactucæ, bursæ pastoris, & similibus.

Purgatio. Quarto, vacuantibus bilem, ut cassia fistulari, tamarindis, manna, rhabarbaro, myrobalanis citrinis, & aliis, si opus fuerit, valentioribus: ut ℞. medullæ cassiæ fistularis, & tamarindorum ana. ℥. ss. rhabarbari electi infusi per noctem in aqua endiuia 3. j. diaprunis solutiu 3. ii. syrupi rosarum 3. j. aqua buglossæ q. s. misce, & fiat potus.

Alteratio. Quinto, refrigerantibus hepar, renes, & totum corpus internis, & externis, ut electuario diatrium santalorum, diatrium donis Abbatis, diamargaritonis frigidi, conseruis rosarum violarum nenupharis, & acetosæ, & trochiscis de camphora, & aliis multis, ut hac mixtura: ℞. mucilaginis, seminis psyllij, aqua rosarum extractæ 3. j. conseruæ rosarum 3. ij. conseruæ acetosæ, violarum, & nenupharis an. 3. ss. trochiscorum de camphora, pulueris diatrium santalorum, & diamargaritonis frigidi, an. 3. ij. syrupi myrtillorum, quod satis est, misce, & fiat confectio. Dosis duo cochlearia quolibet die sum-

Balneum laudatur, mo mane cum aqua, aut decocto refrigerante. Balneum aquæ tepidæ est in hoc genere optimum auxilium bis in hebdomada ventriculo vacuo. Multi etiam viri prudentes bal-

Epithema. neum aquæ actu frigida ab umbilico ad partes inferas laudant: ego tamen nisi in iuvene, & assueto, & ætate non auderem eo uti. Hepati, & renibus admoveantur epithemata & vnguenta refrigerantia: ut ℞. aquarum endiuia rosarum, & portulacæ an. 3. iiij. aceti rosati 3. j. sandalorum omnium & trochiscorum de camphora an. 3. j. misce, & fiat epithema.

Vnguentum. ad hepar, & renes, quod post hoc, aut simile vnguentum sæpe admoveatur ætate frigidum actu: ℞. olei rosarum, & myr-

illorum ana. ʒ. j. s. vnguenti populeonis ʒ. s. pulueris mastichis, thuris, sanguinis draconis an. ʒ. j. ceræ, quod sufficit, misce, & fiat vnguentum.

Sexto, corroborantibus renes, vt lacte ouino, vel caprino Corroborat epoto, & per clysteres sæpe iniecto cum succo renum arietis, & lamina plumbi tenuissima, & perforata supra renes, & Vis lumbos posita curat non solum hoc vrinæ profluuium, sed ne plumbæ etiam gonorrhæam.

De Diabete. CAP. I.

Scholium.

Diabetes à quibusdam.) Diabetes variè nominatur, Diabetes à celeri vrinæ transitu: hydrops ad matulam, ob vrinæ quantitatem. Sicut enim in hydrope naturalis cavitatis atriæ, qua impletur, ita in hoc affectu matula: unde malè Vallesius existimat hydropem ad matulam dici ob sitim, cum propter hanc dyspnoeam appetatur. Diabetes est velox exitus per vrinam eius, quod potatum est, Diabetes eodem à sua qualitate non mutato. Vbi per qualitatem, speciem intellege: quia aqua epota suam seruans integram naturam excernitur, nec tantillum in colore, odore, aut consistencia mutata, Diabetes est symptoma in actione renum laesa: deprauate enim attrahunt, si immodicum eorum motum consideremus: Inde sequitur imbecilla retentio & alteratio, tantam enim vrinæ quantitatem non possunt continere renes, & ideo nec alterare, quia res, quæ alteratur, quæta sit oportet. Morbus, ad quem sequitur hoc symptoma, est intemperies calida renum, quæ vim habet attrahendi. Modus generationis is est. Renes multum appetentes, ex venis trahunt serum, hæc ex iecore, hoc ex intestinis & ventriculo. quo generosum autem ventriculi in anitum, & suctionis sensum sentiens, sic ratur hic immouet, hoc est appetitum potus: quo assumpto, statim à renis, iecore affectus. & renibus rapitur, suæque mole irritat renum expultricem. Hic affectus raro contingit, ita vt bis tantum eum viderit Gal. & ferè lethalis est effectus, quia cum cognoscitur, iam ægri in magnam imbecillitatem deuenerunt: quia in principio ægrè cognoscitur, cum sensim fiat, in augmento, quando iam cognoscitur, extenuatos videmus ægros, non enim possunt rectè nutriri, cum ob defectum vehiculi, alimentum non rectè distribuatur.

Multitudo vrinæ.) Auctor & alii quandam diabetelem non re- Error pri- ram fixerunt, & quod peius est, curant multam vrinam ex alimentis elicorunt, & aliis causis generatam: quæ, cum non sequatur affectum morbosum, non eget curatione. Neque paralysis musculi vesicæ multam efficiet vrinam, cum non excernatur vna vice multa.

Diabetes, seu transitus vrinæ.) Alimenta non solum frigida, sed crassa sint ex Alexandro, ne faciliè in vrinam mutantur, aut in diabete, à ren

D E C V R A N D. M O R B.


à remum calore attrahantur: Concedantur ergo caro siuilla, pedes arietini, poma, pyra, & similia.

Sanguinis missio. Secundò, auertentibus.) Sanguinem mittes, quando remum calida intemperies, ex calido humore orta erit.

Balneum. Quintò, refrigerantibus.) Balneum sit ex aqua, in qua malua, lactuca, oxalis, viola et aliz herbe frigidae sint decoctae. Quibus regionem renis fricabis, quam postea ceroto refrigerante Galeni inunges. Assumet æger per os ʒ. j. sacchari rosacei cum lb. j. aquæ hordei.

De Lumbricis.

C A P. L I.

*Differen-
tiæ.*  Vmbricorum (vt autor est Gal. 3. aphor. com. 26.) tres sunt differentia, quidam enim rotundi, seu teretes sunt, alij lati, alij, quos Græci Ascarides appellant. Rotundi, seu teretes in superioribus intestinis magis generantur magnitudine palmari, & aliquando maiori, & ad ventriculum ipsum nonnunquam ascendunt, ibique pessima excitant symptomata: in ipso tamen ventriculo vermes gigni non possunt, vt docent Aristoteles, & Hieronymus Gabucinus libro suo de lumbricis: quamuis in auribus, dentibus, renibus, & matrice aliquando fiant: intestinis tamen magis, & plures generantur: ego enim anno 1545. vidi puellam nobilem expulisse mille ferme vermes paucis diebus & spatio quatuor horarum quadringentos, quorum aliqui etiam viui, & alij mortui, & vixit, viuitque nunc incolumis, Deo fauente. Sæpe etiam per os & nares eiciuntur.

*Ab Aristotele, diffen-
tit Amatus Lusitanus centu-
ria I. curatione 6.
Historia.* Ascarides tenues sunt lumbrici, qui in parte inferiori crassi intestini magis gignuntur, & plurimi manifestè apparent in iumentis malè cibum concoquentibus, quorum malam concoctionem fætor indicat excrementorum. Latus lumbricus rarò accidit, longissimus tamen est, & sæpe per tota extenditur intestina. Paulus verò Aegineta lib. 4. cap. 57. & Aetius lib. 9. cap. 40. affirmant lati lumbrici generationem permutationem esse membranæ intrinsecus tenuia intestina ambientis in corpus quoddam viuum, quod continuos stomachi morsus infert. Generantur in humano corpore huiusmodi animalcula ex frigidis, & pituitosis humoribus putredini tamen accommodis, & vi caloris animatis, perinde ac externis cætera animalia videmus gigni, quæ non ex semine, sed ex putredine ortum habent. Signa, quibus singulas lumbricorum differentias cognoscas, ex Paulo, & Aetio in hunc modum desumpsimus. Teretes lumbricos habentes morsum ventriculi, tum etiam intestinorum corripuntur, & tussi item arida, & non magna: verum frequenter irritanti. Quidam

dam etiam singultiant, & dormientes tremunt, & præter rationem expergefiunt, quod nonnulli vociferantes faciunt, atque profilientes, sed rursus in soporem conuersi prosteruntur. Pulsus inordinatus habent febrēsque citra ordinē errantes, refrigeratis extremis partibus, augentur tertia interim quarta die, vel nocte, sine ratione accessionem habentes. Pueri verò, & grandiores natu linguam exerunt, atque oculis clausis silentium, & taciturnitatem amant, ideòque excitantibus irascuntur ob imbecillitatē vigilare nequeunt. Quibusdam, dum dormiunt, linguæ accidit manducatio & conformatio oris in modum lactentium, aut accipientium cibos: qui aliquando etiam dentibus strident, & conuiuent oculis, qui aliquando sanguine suffusi sunt, & habent faciem, maxime iuxtas malas rubicundam, quæ rursus mutato colore liuescit: breui verò hæc, & ex interuallis fiunt. Quibusdam in ventriculum ex intestinis ascendunt nausearum ibi, atque vellicationum causæ futuri: vnde laborantes cibum auersantur, quos si ad comedendum impuleris, nauseabundi, quod dentibus terunt, aut non deglutiunt, aut illi cò euomunt. Venter nonnunquam corruptos cibos excernit, & tympani modo intumescit: reliquum verò corpus tabe citra rationem consumitur, neque inedia, neque immodica vacuatione aliqua exinanitum. Multi quasi delirantes absurda in somno loquuntur, alij decubitus huc illuc mutant, ex loco ad locum sese vicissim proiciunt. Qui ab ascaridibus infestantur, vehementem habent ani pruritus, subindēque ad egerendum irritantur, & post excretionem, vt plurimū melius habent. Quibus verò lati lumbrici fiunt, ij morsus in ventriculo vellicantes sentiunt, & ad cibos potentem & cui corrigi non possit, appetitum habent: rapiunt enim, atque consumunt huiusmodi animalia quicquid alimenti oblatum fuerit: vnde denuò cibos assumi expedit, alioqui erodentur intestina: & ideo quædam puella (vt diximus cap. 33.) ob vermem duodecim cubitorum incidit in famem caninam. Consequitur sic affectos corporis gracilitas, *Historia.* & imbecillitas cum tarditate: minimè verò fallax signum erit, si cum recrementis quædam cucurbitæ semini similia *Curatio.* excernantur.

Duplex est lumbricorum curatio, prima eorum generationem prohibet, secunda eos genitos enecat, & expellit: de quorum omnium speciebus, & generationis locis multi multa scripserunt: inter quos edidit librum Hieronymus Gabu- *Præcautio* cinus Fanensis de lumbricis. *Præcautio* itaque fit per ea, quæ *Visus.* pituit

DE CVRAND. MORB.

pituitam gigni prohibent, à qua & cruditatibus putrescentibus fiunt vermes. Necessaria est tunc alimentorum pituitam generantium priuatio, nocetque immodicus eibus, & deprauata victus ratio, vt si cibus crassior præcedat tenuem, si a cibo animi & corporis labores adsint, vt coitus, præsertim si sit immodicus, & si manus & pedes a cibo lauentur a-

Vacuatio. qua calida. Frequens quoque vacuatio per picram simp. non solum enecat vermes, sed ipsos fieri prohibet, vacuando materiam pituitosam, & crudam.

Vera cura ratio. Lumbrici iam geniti curantur primò, victu tenui calido & sicco, acri & amaro. Aliquando eorum morsus, si fame sequantur, rebus dulcibus est placandus.

Victus. *Necantia vermes.* Secundo, medicamentis enecantibus à tota substantia, seu proprietate, vel à qualitate manifesta calida in tertio gradu, & amara, quæ sua vi natura eos enecat. Et horum quædam sunt simplicia, de quibus Hieronymus Gabucinus cap. 22. sui operis, & quædam composita, de quibus idem autor cap. 25. loquitur: in præsentia aliqua meliora, & probata scribã, quæ ventri admoventur, sunt tutiora, & infantibus, & pueris magis admouenda. Sed interna per os aliquando exhibentur, præsertim cum in superioribus intestinis reperiuntur: aliquando per clysteres, si locus vermium sint intestina inferiora.

Que tutiora. Calida medicamenta simplicia, quæ vermes enecant, sunt mentastruum fluuiiale, cordumeni, semen porri, nigella, nuclei, & folia persicorum, cortex arboris celli, & succus eius, radix silicis, myrrha, aqua rutæ, semen apij cum lacte aut syrupo acetoso, nasturtium, semine erucæ, semine Alexandrinum obtinet inter omnia principatû, quæ vermes enecant. Dosis eius cum aceto infusi 3. j. Absinthium vtrûque, abrotanum, allium, præcipue cum aceto, amygdalæ amaræ, amonium, aristologia, præsertim longa, calametum, radix camaleontis, eupatorium, gith, succus lapathij breuitempore, cetaurea, costus, enula, lupini, puluis marrubij statim, origani succus, polium, scabiosa valenter, semine vrtice, hyssopus, zedoaria, granum milij indû. Succus chelidonie, raphani succus, cardamomum, puluis dictami, santonicum valenter, gentiana, semen brassicæ valenter, omnis matricaria, herba, quæ a nostris Valétinis dicitur cuquera, seu lumbrigera, quæ in littoribus inuenitur, & sub aqua maris iuxta saxa nascitur, vt in oppido de

Calida simplicia.

Seminis Alexadrini excellētia.

Laus herbe contra vermes, quæ mo-

Xabea regni Valétini, & aliis multis locis: hæc enim vermes hominis non solum interficit, sed terrestres, si imposita ipsis fuerit, vt a pharmacopola fide digno accepi, & nos sæpe experti sumus hoc. Dosis in infantibus est scrupulus semis vsque

que ad scrupulum vnum cum melle & aqua portulacæ, seu *ficus mari-*
graminis. Errant nostræ formiæ Valentiniæ, quæ opinantur *nus à Dio-*
uius herbæ vsum vermes efficere, cum sit falsum, & ratio- *scorde di-*
ni cōtrarium: vulgo dicitur a quibusdam corallina, & a Dio- *citur.*
coride lib. 4. cap. 84. marinus moscus. vide quid de ea sentiat *Error fa-*
Anton. Musa lib. de examine simplicium. *minarum.*

Frigida medicamenta, quæ vermes interficiunt, sunt, gra- *Frigida*
num coriandri, si sæpe comedatur, sumac, acacia, hypoqui- *simplicia.*
tis, portulacæ semen, & aqua, & succus, malum granatum a-
cidum, cortex mali granati, flos, & radix ipsius, plantago mi-
nor, endiuia, cichorea, lactuca, acetosa, rubus, lac asinæ, suc-
cus citrangelorum, acetositas citri, & omnia acida, quæ pi-
uitosam materiam incidunt.

Composita medicamenta, quæ vermes interficiunt, multa *Composita.*
sunt, vt theriaca magna, mitridatū, syrupus de absinthio, siru-
pus de mēta, syrupus de prasio, syrupus de calamento. Et hic
syrupus valēter ipsos enecat: ℞. succi mētastrī, succi radices
enulæ, succi absinthij, succi rutæ, an. ʒ. iij. succi lactucæ asi-
næ, succi cichoreæ, succi graminis an. ʒ. vj. sumac, cornu cerui
adusti, seminis portulacæ, & corticis granatorū an. ʒ. iij. fiat de *Syrupus.*
coctum ad medietatē, de quo percolato, & sufficienti quan-
tate mellis, vel sacchari in ætate, & ægro bilioso fiat syru-
pus, cuius dosis ab ʒ. j. vsq; ad ʒ. ij. Hoc medicamentū poten- *Confectio.*
ter vermes interficit, & est vtile omnibus: ℞. theriacæ de ci-
ro ʒ. j. rasuræ cornu cerui adusti, seminis Alexandrini an. ʒ.
j. s. seminis portulacæ, corticis mali granati, an. ʒ. ij. nigellæ,
myrrhæ, an. ʒ. j. theriacæ magnæ ʒ. j. s. rasuræ eboris, corticis
nori celsi, an. ʒ. iij. syrupi de absinthio. q. s. misce, & fiat con-
fectio. Dos̃s est cochlearium vnum cum aqua portulacæ, vel
graminis. Hiera simp. Gal. a drachmis tribus vsq; ad vnciam *Hiera.*
vnam vermes enecat, & expellit. Agaricus trochiscatus ha- *Agaricus*
bet eandem vim, & rhababarum quoque vt ego expertus *Rhabar-*
sum. Et si prius bibat lac, vel per clysterem mittatur, citius *barum.*
peribunt vermes. Si infans habuerit vermes, & noluerit bi-
bere potum ex hiera simplici, vel ex aliis medicamentis ver- *Topica.*
mes enecantibus, ventri & vmbilico admoueat fel arietis,
vel bouis, cum pauco puluere aloes, lupinorum, centaureæ,
coloquintidæ & similibus. Hoc cataplasma ventri sæpe ad- *Catapla-*
notum vermes interficit: ℞. centaureæ vtriusq; absinthij, *sma.*
polypodij quercini an. ʒ. ij. centonicæ ʒ. s. decoquatur omnia
cū aceto, & postea cū felle arietis, vel bouis fiat cataplasma.
Hoc vnguentum valenter eos interficit: ℞. absinthij, colti, *Vnguen-*
umari, calamenti, origani, pulegij, persicariæ, foliorū persici, *tum.*
an.

an. m. j. decoquantur omnia in aceto, & post pīnsantur, & percolentur ad modum carnis cydoniorum, cui adde aloes agarici, an. vnciam vnam, coloquintidæ vnciam semis, olei amygdalarum amararum, & pellis bubuli, quod sufficit, miscce, & fiat ad formam vnguenti.

De Lumbricis. CAP. LI.

Scholium.

Lumbricorum vt autor est.) Non est quod in hoc loco immoremur, inquirentes, an elminthes vox significet omnes lumbricos: an vero duò tantum eorum genera. Neque an lumbrici in omnibus possint generari partibus. Sufficit enim ei qui rectè curare volet, scire ex Gal. lumbricorum esse tria genera. Tum lumbricos posse generari in vètriculo, renibus, vesica, vtero & aliis partibus. Quod quamuis ita sit, cum in intestinis frequentissimè, et in aliis partibus raro generentur, proinde Gal. lumbricos in intestinis generari in lib. de lumbricis affectis scripsit. Præctici in radice dentium, vermem generari existimant, decepti ex nervo ibi implantato. Lumbricorum ex 3. aph. com. 26. Primum tria sunt genera: Primum continet eos lumbricos, quos teretes, aut rotundi genus lumbricos ex figura nominamus: Qui in tenuibus generati intestinis, aliquando ad ventriculum ascendunt, ubi humores agitanes varia parant symptomata. Hos per nares & os aliquando excerni videntur quos melius esset infernè egredi ex 2. prog. sent. 17. quia gula nō est fabricata propter expulsione. Secundum genus est lumbricorum elatorum. Hi in duplici sunt differentia, quidam adeo magni sunt, vt eandem intestinorum figuram habeant, & appellantur tenia, hoc est fasciæ. Vidi ego à Ludouico Cucurbiti Collado præceptore accersitus fasciam adeo magnam, vt ferè vltra longi- tudinem attingeret, & adeo caua, vt totam manum includeret. Alii Generatio appellantur cucurbitini lumbrici, ob figuram, quam habent semini cuculato- rum ex curbitulæ similem. Generantur lumbrici lati, vt præctici scribunt sequi prædictorū t Paulum ex interna membrana intestinorum animata, & mutata sententia. in vermem. Cucurbitini verò, ea eadem membrana in latas, sed minores Refutatur partes animata. Quorum sententia falsa est, quia si interna intestino- præctici. rum tunica animari debet, ex putredine id fiet. Qua autem ratione poterit tam magnum vlcus viuente animali in intestinis excitari, & quod magis est, sine febre? Hi lati lumbrici cum raro generentur, proinde Gal. Tertium 3. lib. aph. com. 26. eorum non meminit. Tertiū lumbrici ascharides ap- pellantur, in intestino recto generari soliti. Qui similes sunt vermibus in stercore iumentorum & caseo oris, vehementissimos inducentes pruri- tus. Hi omnes lumbrici tribus differentiis inclusi, conueniunt in materia, Materia & in causa efficiente. Materiam habent pituitosum humorem putresca- lumbricorū. tum, cuius effectui digna quantitas (generatur enim in ventriculo) in in- testin

testinis coacervari solet. Causa efficiens calor est præter naturam, ex- Causa ef-
 citatus in pituita putrescente, at proinde Gal. lib. 3. de locis affect. com. ficiens.
 26. a magno calore eos fieri scribit. Si dicis, non videri rationi consonum, Obiectio,
 calorem præter naturam (cuius proprium est omnia corrumpere) rei ri-
 uentis esse causam. Respondeo, illum calorem respectu nostri, esse præ-
 ter naturam, at respectu materiae prædictæ esse naturalem, & in ea cer-
 to modo permiscere elementa, & ideo posse rem viuam efficere.

Secundo, medicamentis enecantibus.) Lumbricus pars est in Quomodo
 corpore addita toto genere præter naturam, ac proinde auferenda. Au- auferuntur
 feruntur à duobus generibus medicamentorum: Primum toto tempera- lumbrici.
 mento operatur, cum enim lumbrici animalia sint, habent sua venena,
 corallum, cornu ceruinum, lumbricos terrestres & similia, solo experi-
 mento cognita. Secundum genus medicamentorum, qualitate manife-
 sta lumbricos interficit amaritudine videlicet, 14. method. cap. ultimo,
 vel quia amarum non est esculentum, ac ideo eo assumpto ex defectu
 nutrimenti moriuntur vermes: vel quia amara eis infesta sunt. Aliqui
 ab acribus etiam, lumbricos interfici sentiunt. Quorum sententia nobis Acrida non
 non placet, quia si loquantur de acribus non esculentis, squamma æ-interficiunt
 ris, & aliis decipiuntur, cum hæc per os non assumantur: si de esculen- lumbricos.
 tis, alimenta sunt, poterunt ergo vermes nutrire. Sentio ergo acrida me-
 dicamenta non interficere lumbricos, sed mediis ipsis expelli, cum acrida
 irritent. Lumbrici teretes & lati medicamenti per os assumptis oppu-
 gnantur, at Ascharides clysterem infusus, decocto hordei cum lupinis,
 & aliis amaris (dummodo non astringant) addita hiera picra.

De hæmorrhoidibus. CAP. LII.

Hæmorrhoides, ut ex Acrio lib. 14. cap. 5. aliisque Descriptio,
 grauißimis autoribus colligere possumus, vena-
 rum in sede sunt explicationes, dilatationesque à
 crebro sanguinis defluxu sic appellatæ, qui nos à
 multis morbis lethalißis liberat, autore Hippocrate lib. 6.
 Aphor. quamuis Gal. lib. 6. de symptomatum causis, cap. 2.
 velit omnem sanguinis fluorem præter naturam toto gene-
 re esse, excepto eo, qui mulieribus ab utero defluit: hæmor-
 rhoidum tamen fluor, si ordinem seruet, & non sit immodi-
 cus, melancholicum morbum, affectionesque renum curat,
 & ipsæ longo tempore suppressæ hydropem, & tabem faciant,
 autore Hippocrate aph. 12. lib. 6. Quare idem pater, & magi-
 ster noster Hippocrates lib. 4. Aphor. 26. sanguinem supra e-
 missum, in alium esse, & infra conum vult: & Gal. in commet.
 confirmitans sententiam, dicit: si ab hæmorrhoidibus, & men-
 sibus fluat. Quidam putant aliquos ex genere Hebræorum
 hoc sanguinis fluore esse singulis mensibus affectos diuina

t

vit

DE CVRAND. MORB.

- Differen- tie.* atro abundare, & ideo hoc sanguinis defluxu indigere. Harum quædam sunt cæcæ, quædam apertæ: cæcæ a Græcis condylomata dicuntur, Manardus tamen lib. 7. epist. dicit, condylomata esse tubercula in ambitu matricis sanguinem fundentia a similitudine extremorum in pugno clauso in quatuor digitis nodorum. Nihil ex his, sanguinis euacuat, aut parum: perpetuò tamen intumescunt, & illarum variae sunt differentiae & species, si Arabibus, barbaris, & experientiae credimus, verrucæ videlicet, vuae, morales, & vesicales propter variam earum figuram, & naturam sanguinis. Apertæ vero sunt, a quibus certis temporibus defluit sanguis, aliquando seruat, ut diximus, ordine, sæpe non seruat, nec debita quantitate. Et omnes præsertim cæcæ, reperiuntur cum dolore, & aliquando sine ipso. Proueniunt utraque ex copia, & malitia sanguinis melancholici, cuius causæ externæ, & internæ solent esse variae, ut ex cap. 9. huius libri cognoscere possumus. Signa quibus hoc malum deprehenditur, sunt satis nota: cæcas tamen sæpe comitatur dolor ani, cum sterco excernitur.
- Curatio.* Hic fluxus immodicus curatur quatuor auxiliorum generibus: Primo, victu frigido astringente, & incrassante sanguinem, sensim tamen, & caute: nam si fuerit antiquus, non omnino est astringendus, cum ex doctrina Hippocratis Aph. 12. lib. 6. si una earum non fuerit relicta, periculum est, ne fiat
- Victus.* hydrops, vel tabes: neque enim Aetius 14. sermone. cap. 5. est audiendus, qui contra Hippocratem, rationem, & experientiam docet omnes has venas esse claudendas, post antiquum sanguinis profluvium, si ægri utantur debita victus ratione. Sit ergo victus similis victui illi, qui præscribitur in profluvio sanguinis e naribus, & sputo sanguinis, de quo cap. 21. & 28. dictum est: quamuis hic sit alius lenienda vis passis sine granis, prunis damascenis, iure mercurialis, & blitis, ne sterco sua duritie noceat.
- Aetius reprehendi- tur.* Secundo, auertentibus, ut secta vena iecoraria dextra vacuatione larga, & quæ respondeat plenitudini, & natura ægri. Et cucurbitulis hepatis, & partibus superioribus affixis, & vinculis, & frictionibus earundem & foribus, post sanguinis tamen missionem, vel sine ipsa, si ob virium defectum venæ rumpenda non sit.
- Aduerte.* Tertio, contrahentibus, & glutinantibus ora illarum venarum, & refrigerantibus, & incrassantibus sanguinem sumptis, & admotis, ut syrupo rosarum, malorum granatorum

myrtillorum, cydoniorū, aquis, vel decocto portulacæ, plantaginis, acetosæ, solani, & similium: Conferua rosarum antiqua, conferua cydoniorum, bolo Armeno, terra sigillata. Karabe, hæmatite lapide, sanguine draconis, spodio, & similibus. Hæc mixtura est utilis, & necessaria huic profluuiō: *Confectio*
 ℞. micletæ, conferuæ rosarum antiquæ. an. ʒ. j. β. corallij rubri præparati, lapidis hæmatitis, Karabæ, gummi dragaganti an. ʒ. ij. sanguinis draconis, thuris, mastichis. an. ʒ. j. syrupi cydoniorum. q. s. misce, & fiat confectio. Dosis cochlearium vnum summo mane, & omni hora cum aqua sanguinariæ, vel portulacæ, vel plantaginis. Aliquando necessaria sunt *Narcotica* narcotica, si fuerit immodicus fluxus hic. Si supradictis, & *ca.* similibus non curatur, inter quæ trochisci de Karabe, vel spodio, vel de terra sigillata a drachma semis vsque ad drachmam vnam sunt optimi, & athanasia, & requies magna ab scrupulo vno vsque ad drachmam vnam cum aqua, aut syrupo astringente aliquando seruatis legibus, & ordine capite 36. descripto de curatione scilicet diarrhææ est necessarium philonium maius, vel Persicum, vel Romanum ab scrupulo vno vsque ad drachmam vnam. Sistit hoc profluuium *Admonēda.* albumen oui mixtum aqua rosata, & puluere mastichis, sanguinis draconis, thuris, & aliorum medicamentorum astringentium ipsis venis actu frigidum admotum, de his tamen abunde diximus capite 21. de curatione profluuij sanguinis e naribus. Aliquando in hoc sanguinis profluuiō, quemadmodum in aliis, sunt necessaria cauteria, vel *Cauteria* medicamenta narcotica, vt suppositoria ex rebus astringentibus cum paucio opio, seruata tamen vna si antiquus fuerit fluxus, vt diximus cum Hippocrate. Si vero summa *Si fluxus* esset imbecillitas virium, totus est sistendus fluxus hic, & *fit cū im-* postea facultate per alimenta optima corroborata iterum *becillitate* posset scindi aliqua vena ex iis, ne hydrops, vel tabes, vel *cōiunctus* mania fieri possint.

Quartò, emendantibus sanguinem victu, & aliis: nam si *Emenda-* sanguis largior sit in corpore, victu tenui curatur, & sangui- *tio sangui-* nis missione. Si biliosus, victu frigido, & purgatione per *nis copiosi.* myrobalanos citrinas, rhabarbarum, tamarindos & cassiam si- *Biliofi.* stularé. Si pituitosus, victu sicco cū temperata caliditate, & *Pituitosi.* astrictione, & purgatione per myrobalanos Kebulos, agari- *Emendanti-* cum, & alia medicamēta phlegmagoga: dummodò ipsis mi- *tia sangui-* sceantur astringētia. Emendant sanguinem, postea electua- *nem post-* rium diatrion santalorū, diarhodonis Abbatis, cōsetua bu- *emendanti-* gloſæ, rosarū, & cydoniorū. Squāma ferri debite præparata, nam

DE CVRAND. MORB.

sæpe videlicet in aceto infusa, & decocta, & exiccata prodest: Eius drachma vna, vel duæ bis in hebdomada sumptæ ventriculum, & hepar roborant, & humorum malignitatem leniunt, & castigant.

Curatio doloris. Dolor hæmorrhoidum curatur per causæ abscissionem, quando nō est vehemēs, nec facultatem nimis resoluit: nam si vehemens dolor est, amouendus etiam erit per narcotica, vt sæpe dictum est, non habita ratione causæ. Dolor, si ab inflammatione fiat primò, curatur victu tenui, & refrigerante: Secundo, auertentibus, vt sanguinis missione per sectionem basilicæ, & vinculis, frictionibus, & fotibus partium superiorū: Tertio, repellentibus, vt aqua rosarū, portulacæ, plantaginis, & candido oui cum oleo rosato, mucilagine seminis psyllij, & cydoniorum. Quartò, in augmēto, & vigore repellentibus, & resoluentibus, vt oleo camomillæ, & rosarū mixto, vel hoc vnguento: ℞. olei rosarū, & camomillæ, an. ʒ. j. mucilaginis seminis psyllij, & fœnugræci, & seminis althææ an. ʒ. ij. ceræ, q. s. misce, & fiat vnguentum. In declinatione resoluentibus tantum curatur. Si inflammatio in suppurationem transeat, ab arte est natura corroboranda, & iuuanda: quæ tamē post primam dictā tutior est duabus aliis, nempe quæ in lapidificationem, vel corruptionem finiantur: pessimi enim, sunt hi duo vltimi modi omnium tumorū præter naturam, præsertim huius partis, cuius affectus, autore Gal. 9. de compositione medicamentorum secundum locos, difficulter curatur quatuor de causis: Prima, ob eius sensum: Secūda, propter vsum partis, excrementa enim sua vi acri mouent facultatem expultricem: Tertia, medicamēta vtilia non detinentur tempore necessario in ea parte: Quarta, ob caliditatem, & humiditatem partis huius, ideoque amat hic locus siccātia, & refrigerantia medicamenta, vt sunt metalla, præsertim tuthiam. Suppurata ergo inflammata parte a natura, & ab arte per medicamenta suppurantia, de quibus ferme omnibus Iacobus Hollerius lib. i. c. 5. de materia chirurgica abundè scripsit: mixtura tamen ex farina tritici sine fursure, aqua decoctionis maluarum, & oleo satis suppurationē efficit, est triapharmacum Galeni, & si addas parum croci, & vitellos ouorum, erit efficacior: deprehēdes pus genitum esse per febris, & doloris remissionem. Post, necessaria est puris extractio aperto suppurato loco ferro, aut igne. Tandem curatur absterfio abstergentibus & vltimò consolidantibus: sed in hoc consule doctum chirurgum, & sequere Iacobi Holerij librum secundum de materia chirurgica.

Quan

Quando dolor hic a sanguine implente has venas absque *Doloris à*
inflammatione, & fluxu fit, quod per tumorem, & colorem *sanguinis*
deprehendes, sanguis ab illis est mittendus, præcipue si æ- *plenitudi-*
groti soliti sint habere hunc fluxū, quod fiet, primo magnis *ne curatio.*
frictionibus partium infernarum, & pudendorum, secundo,
cucurbitulis admotis partibus internis coxarum, & parti,
quæ est inter anum, & testes. Tertio, secta vena saphena, vel
poplitis. Quarto, a pertione harum venarum lanceola, vel
ferro tenuissimo. Et si ipsæ non appareant exterius, magna
compressione versus inferiora, & magna cucurbitula fient
manifestæ. Ex ipsis vna, vel plures rumpantur, & secundum
tumorem vnus, vel plurium extrahatur sanguinis copia re-
spondens plenitudini, id fieri potest per hirudines. Quinto,
acubus argenteis, vel aureis, præsertim si fuerit sanguis te-
nuis, vel foëminarum. Sexto, frictionibus per medicamenta *Aperien-*
acria, qualia sunt calamentum, origanum, cyclaminus, pi- *tia orificia*
per, nitrum, & fel, quod est aliis potentius. Septimo, per me- *venarum.*
dicamenta excoarctantia, qualia sunt folia ficus, scylla, & alia
lacticia, & pulvis cantharidum, qui est aliis valentior in
hoc morbo. Octaua, per ignem, seu cauterium actuale: hæc
tamen a pertio non fit, nisi cum est initium corruptionis, &
gangrenæ. Tutius ab eis mittitur sanguis quarto & quinto
auxiliis sanguinem mittentibus. Emisso sanguine sufficien-
ti, locus affectus curandus est mundificantibus, & abster-
gentibus clementibus, & consolidantibus hoc, aut simili vn-
guento: ℞. vnguenti basiliconis ℥. ij. olei de chrysomellis, *Vnguenti*
terebinthinæ abietis, bene lotæ. an. ℥. j. camphoræ & tuthiæ *deurgens*
præparatæ an. ʒ. j. ceræ albæ ʒ. iij. misce, & fiat vnguentum. *& consoli-*
Quando dolor est ob earum magnitudinem, & fluxum im- *dans.*
modicum, & antiquum, curantur exsiccantibus, & resolu- *Doloris à*
tibus post debitas vacationes, & auersiones. Ligatura earū *fluxu im-*
in radice filo tenui serico sensim arctius alstringendo, donec *modico, &*
in totū abscindantur: est probata, & satis tuta a pertio earum *antiquo*
secundum longitudinē per cauteria parua admoendo por- *curatio.*
ci pinguedinem non salitam, donec eschara, seu crusta deci-
dat: & postea secundo, & tertio, & quarto eiusdem paruis cau-
teris eodem modo apponendo pinguedinem, donec crusta,
& tota substantia earum putrida consumatur. Aliqui in hoc
morbo laudant medicamenta corrodentia: sed ego non lau-
do ea, neque ignem actuale. Hæc sunt experta, & tutiora *Quorum-*
ad hæmorrhoidas has exiccandas, & ad curanda earum, & *dā opinio*
ani vlcera, & incisuras, drachmæ scilicet dimidium pulue- *improba-*
ris radice, vel floris lilij cum paucio vino rubro multis die- *tur.*

DE CVRAND. MORB.

bus sumptum. Eandem vim diuini drachmæ vnius pul-
ueris radicis pentaphilonis cum pauca aqua frigida in æsta-
te, & calida in hyeme sæpe mane sumptum. Idem fit squina-
tij puluere. Drachmæ duæ galbani ter sumptæ cum aqua
pro nostro frigida potenter exiccant has hæmorrhoidas. Ego hoc sum
probat. expertus. Pulvis capitis piscis saliti, & casei antiqui æquis
ponderibus: idem facit electuarium de scorïa ferri, & pilulæ
de bdellio valenter exiccant has hæmorrhoidas, si interius
sumantur. Multa quoq; sunt, quæ admota ano valenter exic-
cant, & sanant has hæmorrhoidas, quorum aliqua meliora,
Vnguen- & experta in præsentia aduicam: vt ℥. mellis ʒ. j. s. aceti ʒ.
tum. j. vitreoli viridis, floris æris, tuthiæ præparatæ, lithargirij,
plumbi vli, an. ʒ. ij. mel, & acetum prius feruifant, deinde
extra ignem misce pulueres, & fiat vnguentum: vel ℥. radi-
dicis hyari sine cortice. ʒ. ij. radicum liliorum alborum ʒ. j.
s. pulueris panis porcini, & pulueris panis furfuracei an. ʒ. j.
s. pulueris nucum cupressi ʒ. j. granorum myrti, seminis pla-
taginis, thuris, sandaracæ Arabum an. ʒ. s. farinæ fabarum ʒ.
ij. olei laurini, & de chrysomellis an. ʒ. ij. misce, & fiat ad mo-
Cataplas- dum cataplasmatiss, addendo parum decocti radicum præ-
ma, cedentium, antequam admoueaturo, fiat fotus cum vino
rubro, exiccat, & resouit has hæmorrhoidas, & repellit hu-
mores fluentes ad eas. Balnea naturalia, quæ habent vim de-
siccandi sunt optima in hoc, vt sulphurea, salsa, aluminosa.
Balnea. Balneum, vel fotus ex decocto, cannarum, filipendulæ, gra-
norum myrti, radicum hyari, & similium valenter exsiccat.
Supposito- Suppositoria, seu glandes ex radice peucedani, vel gentia-
ria. næ, vel hyari, vel ireos valde has hæmorrhoidas exiccat.
Suffitus. Suffitus etiam stercoris vaccæ, vel spoliij serpentis est in hoc
Vnguen- optimus, & suffitus huius pulueris: ℥. anacardi ʒ. ij. galba-
tum. ni ʒ. j. stercoris columbini, & stercoris vaccini an. ʒ. j. s. mi-
sce, & fiat pulvis. Hoc vnguentum, hæmorrhoidas has curat
exiccando, resoluendo, & aliquando aperiendo: ℥. melon-
genarum in partes paruas diuisarum ʒ. iij. radicum iridis in
partes paruas diuisarum ʒ. ij. olei li. j. fiat decoctum ad vini con-
sumptionem, cui percolato adde axungia anatis, & gallinæ
an. ʒ. j. olei scorpienæ ʒ. j. s. ceræ q. s. misce & fiat vnguentum.
Historia. Ego expertus sum quendam nobilem affectum his antiquis hæ-
morrhoidibus cum dolore vehemēti & rhagadibus, seu scissu-
ris post multas vacuationes, & auersiones incidisse ex crassa
natura, & constitutione corporis in satis macram: curatum
tamen fuisse fotu frequēti ex decocto rubi, & additione post
fotum pulueris eiusdem rubi, & vnguenti pompholygos.
Sed

Sed quia dolor in hoc morbo est grauissimum symptoma, & ad se omnem curationem trahit, nulla habita ratione causę eius, omni studio oportet ipsum curare. Quare considera be *Doloris* ne, quę Iacobus Hollerius scripsit cap. 5. tertij libri: in præ- *cursatio.* sentia tamē aliqua probata adducemus. Primò, curatur dolor hic & quicumque alius fotu, & lotionē frequentē ex decocto croci: Secundò, ex fotu, & vnctione sæpe: Tertiò, ℞. pulueris camomillę ʒ.ij. pulueris anethi ʒ.ij. croci puluerizati ʒ.ʒ. vitellos ouorum numero ij. sæpe. q. s. misce, & fiat cataplasma: quod valentiùs dolorem curat duobus prioribus auxiliis. Quartò, ℞. olei rosati ʒ.iiij. vitellos ouorū numero iiij. croci puluerizati ʒ.ʒ. misce, & fiat ad modum vnguenti, quod est præstantissimum remedium. Quintò, ℞. olei nenupharis, & camomillę an. ʒ.ʒ. succi lactucę ʒ.ij. farinę hordei ʒ.ʒ. simul parum feruefiant, & in fine adde croci puluerizati ʒ.ʒ. vitellos ouorum numero iiij. misce, & fiat ad modum cataplasmat. Si dolor fuerit maximus, adde iusquiami, vel mandragorę, vel opij ʒ.ʒ. Maximum hunc dolorem curabit etiam suppositorium ex solo philonio. Hoc vnguentum est *Vnguentum.* in hoc symptomate optimum: ℞. olei de nenuphare, & olei de papauere an. ʒ.ʒ. olei mandragorę ʒ.ʒ. croci puluerizati ʒ.ʒ. tuthiæ, cerusę lichargirij. an. ʒ.ʒ. amydi, terrę sigillatę an. ʒ.ij. opij ʒ.ʒ. vitellos ouorum numero iiij. misce, & fiat ad modum vnguenti in instrumento plumbeo. Hoc cataplasma *Cataplasma.* est valentissimum in dolore curando: ℞. radicū althęę lb. ʒ.ʒ. radicū liliorum ʒ.ij. foliorum m. duarum, & iusquiami an. m. ʒ. camomillę ʒ.ʒ. meliloti, seminis anethi an. ʒ.ʒ. farinę fœnu-gręci, seminis lini, & hordei an. ʒ.ʒ. lb. olei sesamini ʒ. iiij. opij ʒ.ʒ. misce, & fiat cataplasma cum decocto herbarum, & radicū præcudentium.

De Hæmorrhoidibus. CAP. LII.

Scholium.

Hæmorrhoides vt ex Actio.) Hæmorrhoids nil aliud signi- *Nomen* ficat, quàm sanguinis euacuationem: ac proinde, per quāpli- *explicatur.* bet partem contingant sanguinis euacuationes, si vim nominis consideremus, hæmorrhoides dici poterunt. Constat tamen veteres medicos, fluores sanguinis per venas ani tantum hæmorrhoides appellare, quia per has venas solent frequenter sanguis præter naturam excerni: Et ideo existimo Gal. lib. 6. epid. par. 5. com. 25. hæmorrhoides appellare sanguifluas venas. Et quatuor hæmorrhoides, quædam sunt cæcæ,

Et quedam reclusa, cum frequenter soleant esse reclusa, proinde huius affectui, nomen impositum est, euacuationem significans: sunt enim hæmorrhoides euacuationes per venas ani. Inde videlicet male aliquos, hæ-

Hæmor- morrhoides appellare disentiones venarum ani. Hæmorrhoides reclusæ symptoma sunt, in iis quæ excernuntur toto genere præter naturam

clusæ sym- Morbus est instrumentarius, in via, aut cavitare. Hæmorrhoides cecæ, ptoma sunt, dolorem inferunt: qui symptoma est, ortum, ex inflammatione illarum

Morbus venarum, & continentium parium, ut ex nimia earum mole colligi-

ceca. mus. Causa supradicti morbi in via, humor est varius tamen, & va-

Causa mor rio modo ad eam perueniens partem. Quia aliquando melancholia, aut

bi supra sanguis abundans, à natura expulsa per dictas venas euacuatur: ali-

dicti. quando verò ex Galeno 6. epyd. par. 5. com. 25. sine natura providetia, aut conatu, sanguis dilatans impetu orificium venæ excernitur. Hinc

varias intelligemus Hippocratis sententias. Quarum una est 33. lib.

6. Epyd. par. 3. altera verò 11. libri 6. aphorismorum: si enim per ani

venas sanguis fluens, optimus sit, & solum quantitate peccans, libe-

rabitur æger à pleuritide & peripneumonia. Si sit cacochimia melan-

cholica, aut sanguis melancholicus, non patietur phagedenica ulcera,

id est, corrodenia, neque furunculos, neque exanthemata in cruribus

oriri solita, quæ similia sunt cum terebinti fructu: neque melancholiam,

nec nephritim à lapide (cuius melancholicus humor est materia) ortam.

Controuer- Solet quæri à medicis exortus, venarum ani, quas hæmorrhoides ap-

sa de ve- pellare solent Rondoletius, Altomarius & alii existimant, per partem

nis hamor exteriorem intestini recti, disseminari exiguas venas à caua ortas: at

rroidibus. per internam partem venas maiores, ex vena portæ procedentes. Un-

Sententia de colligunt hæmorrhoides venas, esse ramos venæ cauæ, & venæ por-

Rondole- tæ: & ita euacuatione humoris in toto corpore, iecore, & renibus con-

trii & alio- tenti, per venas exteriores intestini, qui à caua procedunt, excerni: at e-

rum. uacuationem melancholiæ ex liene per venas internas. Curtius in hæ-

Sententia morrhoidibus, per utrasq; venas sanguine excerni persuadet, raro ta-

Curtii. mē per ramos venæ portæ, quia hi non propter expulsionē, sed propter

Omnes su- attractionē fabricati sunt à natura. Certe si exacte rem consideremus,

pradicti videbimus omnes hos errare: quia venæ sanguifluæ se aperiant in ca-

errant. uitate intestini, aliter non possent sanguinem profundere. Et ideo so-

lum venæ à porta enatæ, hæmorrhoides dicuntur, quia habent ora in

cavitatem intestini patentia. Adde per hæmorrhoides venas copiosum

excerni sanguinem aliquando, quæ per propagines venæ cauæ per mu-

sculum disseminatas, & intestini partem exteriorem euacuari non pos-

Altomarii se ostendit earū paruitas. Id quod Altomarius scribit de euacuatione

lapsus. totius corporis per hæmorrhoides, fieri scilicet per venas à caua ortas,

falsum est. Nā præterquam quod per illas nō potest fieri (ut diximus)

copiosa euacuatio, nil impedit, quo minus per alias fiat, habentes cū ve-

næ portæ communia iunctione, ob quā frequenter natura scilicet totū expurgare

corp

us. Neq; Curtij ratio cōcludit, si aduertias Gal. in lib. de natu. fac. Curtij ra-
professo probare, per easdem venas, per quas distribuitur alimētum tio nulla.
corpus, fieri etiam humoris, aut excrementorum euacuationem.

Hic fluxus immodicus curatur.) Si in hæmorrhoidibus euacuatur plethora, aut peccans humor, cum liberentur homines à supralis malis, nihil efficiendum erit, quia euacuatio cum commodo animalis exercetur. Si sit excedens, solet cachexiam, & hydropem efficere Quæ se-
rigerato iecore. Si sit deficiens, & diminuta euacuatio, si supprima- quantur,
humor melancholicus: fit melancholia, & iecoris refrigeratio: si suppressis
sanguis, hydrops, & cachexia suffocato calore contingunt: sicut hæmor-
uritis, peripneumonia, aut in alia parte inflammatio, sanguine ad rhoidibus.
uram, pulmonem, aut aliquam aliam partem decumbēte. Cum ergo
immoderata, hæmorrhoidum euacuatione, aut suppressione, tot eue-
ant mala, oportebit diligenter occurrere. Si immodica euacuatio sit, Curatio.
ul & recens, tota supprimenda erit. Dubium autē est de inueterata. Dubium
ppterates 6. aphorismorum sent. 12. in antiquis hæmorrhoidibus, re- de inuete-
m apertam relinquit: at Aetius purgato corpore omnes claudit. Ve-rata flu-
r tamen est Hippocrates, quia in antiquis hæmorrhoidibus natura xione.

anum consuevit sarcinam deponere: quam consuetudinem si repen-
mutemus, supradicta mala excitabimus. Quod exemplo confirmauit
epy. sentent. 132. ubi Alippum (qui hæmorrhoidibus affectus erat)
ratum, insanum redditum scribit. Dices, nonne si vna vena aperta re-
quitur, totum corpus refrigerabitur? Respondeo maius malum, &
vorem mortem sequi, si eam statim supprimamus. Si hæmorrhoides
fluant, aut nunquam fluxerunt, aut aliquando fluxerunt: Si nun-
am fluxerunt, aperiendæ à nobis sunt, videntes hominem lienosum,
t melancholicum. Si fluxerunt aliquando, multò melius eas moue-
nus, potissimum si videamus ex earum suppressione aliqua mala iam
qui. In fluxu immodico hæmorrhoidum, victum frigidum & adstrin- Iacotius
ntem imperat auctor, & alii cum ipsi. Male tamen, quia ea quæ fri- reprehē-
da sunt, & adstringentia, stercus indurant: quod magno egens con- ditur.
, & forti expresse ad hoc ut expellatur, sanguinis fluxus augebi-
r. Sint ergo alimenta temperata, aut lenientia alium propter dictam
usam.

Secundò auertentibus.) Distinctione opus erit, si noluerimus er- Unde san-
re cum auctore. In immodica euacuatione humoris melancholici ex guinis mis-
ne, basilicam sinistram seca, quæ vasorum & naturæ habet rectitu- sio exercē-
tem: in ea verò quæ ex toto corpore, aut iecore fit, basilicam dextram. da.
em seruandum est in cucurbitularum applicatione.

Tertiò, contrahentibus.) Omnia medicamenta, quæ ab auctore Lapsus
e in loco, per os assumenda describuntur, omite: quia sua adstrictione auctoris.
reus indurant. Adde ab his non posse obstrui venam reclusam, quæ
ano posita multum distat ab ore: uti tamē poteris illis medicamentis,
quæ

que ab auctore ano applicantur.

Medica- Quartò, emendantibus.) Medicamenta ex squamma ferri pr. ep.
mentum rat, non est quod vitari per os: bene exterius applicando sequutus G.
ex squam lenum lib. 5. metho. cap. 10. qui eo exsiccat vlcera auris & ani.

ma ferri, Septimò per medicamenta excoriantia.) Fel taurinum co
rbi vile, uenientissimum anostomoticum est.

Ligatura Ligatura earum in radicem.) Si tenues sunt, ligatura mi
quando est: secus si crasse.


prodest. Aliqui in hoc morbo laudant.) Abstinentium à corrodenib
medicamentis, quia fluxionem mouent: Et ab igne actuali propter
cinas partes.

Vt ℥. mellis ʒ. j. & c.) Omittatur hoc medicamentum, quia
trivolum, & flus aris caustica sunt.

Error au- Vel ℥. radice hiari.) Si radix hiari, & liliorum, & puluis, p
floris. nis porcini aperiendi habent vim, cur ea miscet auctor in hac cōpositi
ne, in qua vlcera ani exsiccare insunt: suppositoria deme ab his acris.

Hoc vnguentum est in hoc symptomate optimum.) Opti
mum est, sed nō breuius oleo rosaceo, omi luteo, & opio id præstabit.

De procidentia ani. CAP. LIII.

Descriptio  Vm anus aut propter musculorum obliquorum se
dem sursum reuellentium imbecillitatem, & resolu
tionem, aut propter ingentem in egerendo cona
tum procidit, aliquando ab inflammatione, vel alio tumor
præter naturam, cuius curatio necessariò præcedere debe
reductionem intestini, malū fit nulli non notissimum quæ
procidentiam ani nominamus, barbari exitum ani, aut lan
gaonis dicunt.

Curatio. Si ani procidentia sit à sola intemperie, contrariis cura
tur sedi admotis in forma vnguenti, vel cataplasmatidis, ve
fotus: in omni tamen quiescat altis clunibus, & iunctis præ
cipue ano reducto in suum locum. Si sit ob imbecillitatem
vel resolutionem, seu paralysem musculorum, curabitur pri
mò, victu exiccante, & calfaciente, de quo cap. 13. Secundò
pituitam apparantibus: Tertiò vacuantibus medicamentis
conuenientibus, de quibus eodem 13. capite egimus: quartò
& vltimò, dissipantibus, & resoluentibus, vt hoc, vel homil.

Vnguentū. vnguento: ℥. olei costini, & castorei. an. ʒ. j. olei rutæ ʒ. j. i.
pulueris castorei, & anthos. an. ʒ. j. pulueris mastichis ʒ. ii. co
ræ. q. f. misce, & fiat vnguentum. Ante cuius appositionem
pars affecta fori huius decoctionis præparetur: ℥. camo
millæ, anthos, saluæ, balauftiarum, foliorum lauri an. p.
quicum cupressi, & gallarum an. paria. vj. fiat decoctum in li
bri

ris sex aquæ, donec tertia pars consumatur.

Si infans, aut puer laboret ani procidentia humidis, & rigidis corporis humoribus purgatis per hieram simp. vel garicum trochiscatum infideat decocto saluæ, absinthij, tachados, abrotani, rutæ, origani, roris marini, facto ex vino calybeato, & aqua aluminosa, vel sulphurea: & vngatur unguento superiori, vel simili, & quiescat multis diebus clunibus elatis, & clausis. Pix comesta curat ani procidentia, & eius suffitus parti affectæ immixtus. Folia porri, vel chapli barbati decocta cum vino, & ano admota valèter curant ani procidentiam. Suffitus ex corio anguillæ salito est optimus in hac ani procidentia curanda. Idè fit suffitu plumbi vsti. Cinis canceri fluuiatilis admotus ano curat eius procidentiam, & scissuras. Pilulæ de bdellio sumptæ idè faciunt.

De procidentia ani. CAP. LIII.

Scholium.

Cum anus aut propter.) Anus extremitas est intestini recti, Anus ubi tres musculi reperiuntur. Vnus transuersus, ipsi ano circumvolutus, dictus sphynx ab actione; quia confringendo anum in volutarium fluxum excrementorum impedit. Duo alij sunt obliqui, non catur magni, sed membranosi, & lati: vtraque ani parte supra prædictum sphynx, & rotundum musculum siti. Horum usus est in magnis contentionibus, & uersum sedem sursum retrahere. Est etiam in ano membrana, qua alligatur osi sacro, & lumbis, Ex his facile est intelligere, quæ hoc capite a doctoribus proponuntur. Procidentia ani tunc dicitur, cum extremitas intestini recti, foras delabitur: ita ut non lateat visum. Morbus est in situ vitato. Causæ eius erant omnia, quæ laxare possunt musculos, & ligamentum ani, qualia sunt humida: & quæ paralytim in musculis inducere possunt, ut frigida: & tertio magnus ad egerendum conatus, qualis tenesinum comitari solet. Practici aliam addunt causam, nempe inflammationem: decipiuntur tamen, quia inflammatio non relaxat, sed musculos tendit. Quod si in procidentia ani, intestinum inflammetur: non poterit reponi, quin prius inflammatio sedata sit.

Si ani procidentia sit a sola intemperie.) Procidentia ani nec In hoc morbo a calida, neque a sicca intemperie fit, quod debuit auctor distinguere. bonum per

Si infans aut puer.) Cum anus sit pars affecta, ei applicanda sunt os apoli-
medicamenta. Unde ea, quæ ab auctore per os exhibentur, cum eorum candor non perueniat ad anum, emittantur.

De procidentia vteri. CAP. LIIII.



Vado vterus ita euertitur, ut exterius emineat (auctore Aetio. lib. 16. cap. 78. malum fit, quod ipse procidentiam vteri nominat. Arabes autè præcipitationem

Descriptio

DE CVRAND. MORB.

Causa. nem matricis, & exitum appellant. Cuius causæ quamplurimæ sunt: nonnunquam enim accidit ob casum ab alto decidente scilicet muliere in coxarum vertebra: rumpuntur enim tunc membranæ quædā, quibus vulua propinquis partibus annectitur: vnde procidere ipsam necesse est sæpe oingentem conatum, quo premittitur mulier in laborioso, & difficili partu, maxime verò in abortu, vt secundam expellat.

Laborio- Aliquādo propter inconsideratam partus extractionem, au
sus partus nimiam spiritus detentionem, aut immensi ponderis eleua
Labor cor tionem, aut percussione vteri, aut animi vehementes affe
poris & ctiones hoc ipsum accidit: & ob humoris plurimi, ac tenaci
animi. defluxum, partuumque frequentiam: laxantur siquidem, atque soluuntur appendices profundo vtero superius inhærentes. Iam & sine vlla causa istarum hic morbus contingere solet, cum debilitato corpore membranæ, musculique vuluam sustinentes exoluuntur, quod ingrauescente ætate fieri consuevit. Morbus satis per se patet, cum vterus ipse procidens oculis cerni possit. Procidit autē secundum os eius, & quod pendet struthiocameli ouum similitudine refert, maioris tantum, & minoris ratione differēs. Causarum porro notæ tum ex agrotantis sermonibus, tum ex corporis constitutione notatæ intelligentur.

Note. Curatio. Similis est hæc curatio præcedenti: causa enim in illa & in hac est auferenda, si possit, & vterus loco natiuo est restituendus, nisi impediat tumor vteri magnus, quem dissipabis

Disipan- in hac est auferenda, si possit, & vterus loco natiuo est restituendus, nisi impediat tumor vteri magnus, quem dissipabis
tia flatum. fotu, & lotionem ex decocto cymini, anisi, baccarum lauri, carerū grāmomillæ, & similium facto vino rubro. Post insperges pulveribus stipticis, ne recidat, de quibus superiori capite dictum est. Suffitus rerum graue olentium, vt pennarum perdicis, assæ foetidæ, castorei soleæ combustæ, capillorum, sulphuris, & similium exceptus per vuluam in fundibulo, vel cathedra perforata est necessarius. Ouum sub gallina fractum, agitatū, lanis inuolutum, & vuluæ admotum vterū reducit ad proprium locum: quia vterus maxime abhorret foetida, & ab iis fugit. Amat non parum redolentia, quare naribus admouenda sunt, vt moschus, ambra, vel alia minoris pretij, vt galia, & flores citranguli, rosæ, violæ, & similia. Cucurbitula magna fixa vmbilico vterum ad proprium locum trahit, & conseruat. Reducto vtero ad proprium locum cubet clunibus sublatis in sublime aliquot diebus, & vmbilico imponatur hæc mixtura: cōseruat enim vterum in propria sede, cōfert etiam suffocationi, & omni inordinato motui vteri: ℥. alitæ muscata, galia muscata. an. ʒ. iij. ambræ, musci,

ulsci, an. g. v. vtriusque thoracis an. 3. ij. ʒ. resina electa, 3. ij. annia cum oleo ex sthorace misceantur, & extendantur super pannū coccineum forma rotūda ad præsidium vmbilici.

De procidentia vteri. CAP. LIIII.

Scholium.

Vando vterus.) Vterus situs est inter intestinum rectum vteri & vesicam lotii: Qui locus maxime accommodatus est ad recipiendum semen, ad factum vsque ad iustam magnitudinem seruandum, & cum vsus postulat, excernendum. Habet vterus tria ligamenta. Recto intestino, & vesicæ fibrosis quibusdam, & te-
Annexus.
 nibus ansulis alligatur, sacro ossi (vt multi sentiunt) quibusdam ner-
 uosis, & musculosis vinculis, lumborū etiam vertebrae ex Galeno, quod medio peritonæo intelligendum est. Prædictis ligamentis suo loco ser-
Quomodo
 uatur vterus, quæ si laxentur, mutabit situm ad vnum, aut alterum fiat vteri
 utus declinans, aut prominens exterius. Nunquam tamen, vteri pro-
 cidens contingit eius fundo per os egrediente, vt multis placuit: hoc e-
tia.
 im ab oris vteri angustia impeditur. Si obiciis factum maiorem per Obiectio
 anc egredi partem: Respondeo non esse parem rationem, quia factus soluitur.
 onderosus est, & à natura expellitur. Curationem pete ab autore, so-
 um adde, modum, quo vterus debet restitutus seruari, ne procidat. Quomodo
 seruabitur ergo vterus repositus armilla, aut circulo ex are facto, in vterus re-
 uoluitur immisso, ita vt cerea candela per ipsum circumuoluatur, ne stitutus
 is carnem contingat. Aduerte etiam auctorem, non rectè animi ve-
 seruatur.
 ementes affectiones, & imbecillitatem corporis prolapsus vteri cau-
 is statuere, quia ab his non possunt vteri vincula laxari.

De immodicis mensibus. CAP. LV.

Immodicè fluere menses in fœminis tunc dicimus, Quid mē-
 autore Aetio, quando conferta sanguinis menstrui sum im-
 copia pluribus diebus effluxerit, quod multis de modicum
 causis accidit. Prima: quia iusto tenuior redditus sit sanguis: profluuiū.
 quæ res ab externis vt plurimum causis euenire solet, tam-
 et si ab internis etiam contingat. Etenim & legimus ipsi, & Cause.
 vidimus aliquando in muliere, quæ se plus æquo exercuis-
 set, huiusmodi mensium defluxum cōtigisse, qui multis me-
 dicorum prædiis sisti non potuit, & in mulieribus tempe-
 ramento bilioso hoc ipsum accidere quotidie experimur.
 Porro quæ sint causæ tum externæ, tum internæ, quæ san-
 guinem possint attenuare, superfluum esset recensere, cum
 sæpius dictæ sint, & per se lector facile inuenire possit. Ac-
 cidit præterea symptoma propter vasa aliqua aut aperta, aut
 fracta, aut etiam erosa, siue magna ea sint, siue parua: Non-
 nunq

nunquam etiam ob partus grandiores, & post abortus, quo
vt plurimum mensium immoderatæ purgationes soles
consequi. Caterum si à sanguinis tenuitate oriatur hæc af-
fectio, considerare oportet anteaactam vitam, & eas omne
causas tam exteriores, quam interiores, quæ sanguinem te-
nuiores solent reddere. Si verò vasorum acciderit vitio, ve-
quia fracta, aut erosa sunt, erumpentis sanguinis multitudi-
nem (vt inquit Aetius) conuenit considerare: cuius verb.
hæc sunt: amplioribus valis fractis, aut apertis, magna & cō-
ferta sanguinis copia defluit: ab angustioribus verò opposi-
tum accidit, sicut ab erosione paulatim, & cum maximo do-
lore delabitur. Ab aliis causis si acciderit, facile ex ægroti ser-
monibusprehendetur. Consequitur sic affectos cutis de-
coloratio, appetitus imbecillitas, concoctionis difficultas
nonnunquam pedum, & totius corporis tumores quidam
laxi, & generatim ea omnia, quæ excedentem hæmorrhoi-
dum defluxum consequuntur.

Nota.

Curatio

quando est
à sangui-
nis copia.

Victus.

Sectio ve-
ne.

Si à bile
viatus.

Purgatio.

Si immodicus fluor mensium est à sanguinis copia, cura-
tur victu tenui, & astringente, vt cydoniis, pyris, agresta, a-
cetosa, amydo, & oriza cum lacte amygdalarum, vel capra-
rum calybeato, fuga carnium, ouorum, & sanguine augen-
tium. Secetur vena interna dextra, extrahaturque sangui-
respondens plenitudini, & viribus ægri. Si ob bilem mixtam
sanguini, præcedenti victu frigido, & astringente, de quo ca-
pitibus vigesimo primo, & vigesimo octauo, de sanguinis
profluuiio e naribus, & de sputo. Vacuetur bilis cholagogis,
vt myrobalanis citrinis, rhabarbaro, tamarindis, cassia fistu-
lari, & similibus, vt ℞. medullæ tamarindorum, & medulla
cassie fistularis recens extractæ an. ʒ. ss. pulueris corticum
myrobalanorum citrinorum, & rhabarbari electi infusi per
noctem in aqua endiuie an. ʒ. j. syrupi rosarum ʒ. j. aquæ por-
tulacæ quod satis est, misce, & fiat potus.

Quæ si-
sunt san-
guinem.

Purgatio
pituam.

Deinde sanguis refrigeretur, & sistatur syrupo rosarum,
granatorum, myrtillorum, cydoniorum, de agresta, & de ri-
bes, & aquis portulacæ, plantaginis, sanguinaræ, & similiu.
Dosis quolibet die summo mane syruporum vnciæ duæ, &
aquarum vnciæ quatuor. Si ob mixtam pituitam (quod co-
lor sanguinis albus ostendit, quemadmodum flauus bilem)
phlegmagogis vacuetur, vt myrobalanis chebulis, agarico.
& aliis: vt ℞. diacatholiconis ʒ. ss. corticum myrobalano-
rum chebulorum, & agarici trochiscati an. ʒ. j. diaphænico-
nis ʒ. ij. rhodomellis ʒ. j. aquæ fœniculi q. s. misce, & fiat po-
tus: præcedenti tamen pituitæ aquosæ concoctione per sy-
rupum.

apus de absinthio, & rhodomel. cum aqua fœniculi, & ab-
 athij. Si ob atram bilem militam, quod niger color indi- *Atram bi-*
 ut: vacuetur epythimo, myrobalanis indis, sero, & aliis: vt *lem pur-*
 ℞. confectionis diasenæ 3. iij. pulueris epithymi, & corti- *ganist.*
 um myrobalanorum indorum an. 3. j. syrupi buglossæ 3. j.
 quæ borraginis. q. s. misce, & fiat potus, prius tamen appa-
 etur bene atra bilis per medicamenta dicta cap. 1. & cap. 9.
 le curatione melancholiæ. Facta iam corporis euacuatio- *Auerter-*
 ne, & factis etiam auersionibus omnibus tum per sanguinis *uia.*
 missionem, tum per purgationes, per frictiones partium su-
 periorum, & ligaturas dolorificas, & fotum earundem, &
 per frequentes cucurbitulas scapulis, & potius mammis af-
 fixas. Sanguis omni studio refrigerandus, & incrassandus *Refrige-*
 est, vt quiete animi, & corporis. Scimus enim vicecomitem *ratio, &*
 ipsam Castri boni periisse menstruorum immodico fluore, *quies.*
 cuius causa fuit magnus motus: confecit enim pedibus iter *Historia.*
 trium leucarum, vt vocant, ad visendam imaginem virginis *Stiptica*
 Mariæ de Serrançã. Et aliis etiam omnibus internis, & ex- *sanguinẽ*
 ternis stipticis, & refrigerantibus est incrassandus, vt drach- *incrassan-*
 ma vna pulueris Karabæ, & corallij rubri multis diebus *ita.*
 sumpta cum paucò syrupo, vel aqua frigida, & astringente, *Mixtura*
 vel iure arietis, vel pedum suis, vel vituli, vel amydo prædi- *maximè*
 cto iure decocto, vel lacte calybeato. Dimidium vnciæ con- *astringēs.*
 seruæ rosarum vetustæ cum syrupo, vel aqua astringente per
 aliquot dies sumptum sistit hunc fluxum sanguinis. Idem sit
 drachmis tribus micetæ: vel ℞. micetæ, conseruæ rosarum
 antiquæ, an. 3. j. ℞. pulueris spodij, sanguinis draconis, Kara-
 bæ, lapidis hæmatitæ præparati, balaustrarum, rosarum, co-
 rallij rubri præparati, maltichis, cornucervi vlti, thuris, a-
 caciæ, gummi dragaganti, & gummi Arabici ana. drach-
 mas duas syrupi myrtillorum, quātum sufficit, misce, & fiat
 confectio. Dosis est cochlearium vnum cum aqua plantagi-
 nis, portulacæ, vel sanguinariæ. Vteri loco anteriori, vt & *Vtero ad-*
 posteriori medicamenta astringentia, & frigida actu & po- *mouenda.*
 tentia admota sistunt hunc sanguinis fluorem: vt sunt suc-
 ci, vel aquæ plantaginis, portulacæ, solani, & similium cum
 aceto, & bolo armeno, & aliis pulueribus astringentibus.
 Stercus alinum non solum interiùs sumptum cum syrupo *Asini ster-*
 aliquo, & aqua astringente: sed exteriùs admotum cum a- *cus.*
 qua calybeata, & paucò aceto sistit hunc sanguinis, &
 quemcunque alium fluorem, vt ego expertus sum. Hoc vn-
 guētum est in hoc genere probatum: ℞. olei myrtillorū, cy- *Vnguen-*
 doniorū, & maltichis an. 3. j. pulueris boli Armeni præparati, *tum.*
 fung

DE CVRAND. MORB.

sanguinis draconis, & trochiscorum de Karabe an. 3. j. acco-
Quæ in v- cochlearium vnum ceræ. q. s. misce, & fiat vnguentum. In
terum in- teri cavitatem necessarię, & vtilissimæ sunt iniectiones ma-
ius admo- dicamentorum altringentium, glutinantium, & ora vena-
uenda. rum ruptarum consolidantium, quales sunt aquæ, vel succo
Galenî me- portulacæ, plantaginis, solani, sanguinariæ, & similia: Ga-
dicamētū. lenus enim diebus quatuor solo succo plantaginis infuso pe-
 metrenchitas curauit antiquum mensium fluorem, qui nul-
 lo alio auxilio curari potuit. Si his liquoribus addas pulue-
Pessalus. res astringentes, erit auxilium efficacius. Pessalus, seu pessa-
 rium longum ex supradictis succis, & pulueribus astringen-
 tibus cum terebinthina, vel pice & lana pudendo mulieris
Suffitus. affixus valenter sistit hunc fluorem. Suffitus stercoris ouini,
Historia. vel asinini per vuluam susceptus inhibet hoc sanguinis pro-
 fluuium. Suffitus ranarum combustarum egregie retinet
 hunc defluxum sanguinis, vt ego expertus sum in excellen-
 tissima domina mea duce Cardonæ & Sugurbi anno 1544.
 hoc fluore affecta septem ferme mensibus, quæ diuino fauo-
Vngula re ad pristinam restituta est valetudinem. Suffitum vngulæ
mula. mulæ sistere mirifice hunc sanguinem expertus sum: quam-
 uis ab eo fiat per mensem sterilis fœmina, vt quibusdam
 placet. Hoc medicamentum multas nobiles Cortalanas la-
 borantes hoc affectu satis antiquo curauit: R. corticum duo-
 rum ouorum recentium adustorum, thuris, maltichis, an. 3.
 s. margaritarum electarum, corallij rubri præparati, Kara-
 bæ, ana. 3. ij. lapidis hæmatitæ, & sinaragdi præparati an. 3.
 s. farinæ hordei sine furfure. p. ij. albumina quatuor ouorū,
 & si opus fuerit, adde parum aquæ calibeatæ, & fiant duo
 panes, seu placentæ, & coquantur in furno, vt possint in pul-
 uerem redigi: dosis huius pulueris est à drachma semis vs-
 que ad drachmam vnam cum iure pedum arietinorū sum-
Narcotica mo mane. Vltimò curatur hic fluor, vt cæteri narcoticis ser-
ultima an- uatis omnibus, quæ sæpe diximus, præcipue capite 40. de
xilia & curatione colici doloris: quia periculosiora sunt narcotica
externa interiori sumpta iis, quæ iniiciuntur, vel admoventur parti
minus pe- inferiori, & omnibus minus periculosa sunt exteriori admo-
riculosa. ta: inter ea quæ sumuntur, requies magna vt clementius nar-
Ordo inter coticum, deinde athanasia, postea trochisci de Karabe, de
norum. spodio, & de terra sigillata, postea philonium maius, vel Ro-
Monitio. manum, vel Persicum, vel Tharsense: hæc tamen nullo mo-
 do sunt admouenda, neque exhibenda, quando facultas est
 imbecilla, ne paucus natiuus calor extinguatur à medica-
 mentis tam frigidis, sed potius facultas est roboranda succo
 carniū

arnium & iure optimo cum succis cydoniorum, acetosæ, & grestæ. Sed quia hoc sanguinis fluore, & aliis omnibus venriculus imbecillior redditur, prudenter alimentis frigidis sit nutriendus æger, ne magis debilitetur, & externis dictis *Ventrici-* apit. 31. est corroborandus, & nullo modo internis, ne san- *li corrobo-* uis calefactus aptior sit motui. *ratio.*

De immodicis mensibus. CAP. LV.

Scholium.

Immodicè fluere menses.) In ea sanguinis euacuatio-
ne, quam singulis mensibus utiliter in mulieribus experi-
mur, hæc omnia considerare opus est. Primò substantiam, Considerã
quæ euacuatur: Secundò locum, per quem euacuatur: da in men-
Tertio tempus, in quo incipit, & desinit euacuatio: Quartò quantita-
tum flu-
em sanguinis euacuat. Vltimò an possunt concipere mulieres illæ, in xu.
quibus non fluunt menses. Quenam sit substantia, quæ in menstrua Quis san-
urgatione excernitur, ex Galeno facile colligimus: fæmina enim ex quibus pro-
lib. 14. de usu par. capit. 6. ratione sexus mare est frigidior, eò usque, ut fluat.
alimentum, quod conficit, totum discutere non possit: domi etiam agit,
neque vehementibus motibus exercetur, aut sub claro sole vivit lib.
le venæ sec. aduer. Eras. cap. 7. ac proinde in venis copiosum sangui-
nem coaceruat: qui, tempore, quo non concepit, à natura (multitudine
eius grauata) per uterum (qui pars languida est) salubriter expelli-
tur: at tempore, quo utero gestat, idonea est ipsi fætui materia. Vnde
colliges duo: Primum sanguinem menstruum optimum esse, & ex
quatuor humoribus constitutum: quem natura consilio per uterum
expellit, quia est alterum principium nostræ generationis, & alimen-
tum seminis & fætus. Secundum, ridicula esse, quæ Plinius lib. 7. Plinii la-
nat. hist. cap. 15. de sanguine menstruo scribit, cum nititur probare, p. sus.
nil mulierum profluvio, magis monstificum esse: locus per quem
sanguis menstruus excernitur, uterus est: ad ipsum enim perueniunt
venæ magnæ, & arteriæ ex vasis, quæ sunt iuxta os sacrum. Ex qui- Venarum
bus quædam inseruntur in uterum, per quarum orificia in eius cavi- uteri va-
tatem patentia (corylidonas Græci, & Latini acetabula appellant, rius locus.
quibus venæ & arteriæ umbilicales dictæ adhærescunt) sanguis ex-
erni solet in virginibus, & mulieribus quæ non conceperunt. Quæ In graui-
dam verò in collum uteri, & pudendum disseminatur, per quas tem- dis per
pore conceptus, solet fieri in aliquibus gravidis menstrua euacua- quas re-
tio. Non ab interioribus, quæ sunt in cavitate uteri, quia ab his se- nas sit hæc
cundæ pendent, & ideo nil possunt in uteri sinum immittere, ut au- euacuatio.
etor est Gal. lib. 5. aph. com. 60. Ex his intelligemus, an, quæ Iacotius
in suo scholio scribit, vera sint: duo enim persuadere conatur. Pri- Sententia
mum est, in gravidis fluere aliquando sanguinem menstruum non per Iacotii.

coll

collum vteri, sed per eius cavitatem: in primo tamen mense, in quo os vteri multum non est constrictum, ut ostendit superfetatio, quæ tempore fieri solet. Secundum est euacuationem sanguinis factam per venas, quæ sunt in collo vteri, non esse menstruam, sed hæmorrhoidalem, quia sanguis ille crassius est, & venæ sunt iuxta anum, & habent orificia in cavitatem patentia. Ex curatione hæc ipsum probat quia si hæc euacuatio per vteri collum facta supprimatur, curatu sanguine misso non ex pede, ut in suppressis mensibus: sed ex brachio ea ratione, quæ in hæmorrhoidibus suppressis, facere solemus. Hæc Iacotius

Iacotius cotius, qui maximè & crasse decipitur. Primò quia si orificia venarum in cavitatem vteri patentia, tempore conceptus, adherent orificiis vasorum, quæ per chorion disseminantur, non poterit, ut rectè docuit Galenus, sanguis per illas in cavitatem vteri excerni. Neque ita rectè ex superfetatione probat, quia hæc non solum in primo mense

Historia. sed & in quarto, & quinto contingit: ut enim multa taceam exempla vxor cuiusdam doctoris, qui hinc Valentie regie cancellarie præsedebat Gallart appellati, post quatuor menses ab obitu viri filium peperit, & deinde nono mense alterum. Neque enim causa superfetationis consistit, in eo quod orificium vteri sit apertum aliquantulum (ut simul etiam voluit Vallesius lib. 5. epy. comm. II.) quæ semper euenit orificio ita clauso, ut ne specilli cuspidem admittat: sed in vteri attractione, quæ tunc contingit, quia dilatatur in coitu a frictione, & calore orificium vteri, & ita semen attractum potest vteri cavitatem subire. Altera Iacotii sententia manifestam habet redargutionem, quia

Causa superfetationis. si sanguis per collum vteri euacuatus, semper ex vena caua fluit, & euacuatur non per venas in ani cavitatem patentem, quomodo erit hæmorrhoidalis? Præsertim cum non sit sanguis crassius (ut ipse sentit) sed optimus venas quantitate grauius. Ratio ex curatione desumpta nil concludit, quia si supprimatur illa euacuatio, quæ in grauidis per collum vteri contingit, si lædi: non mouemus eam, secantes venâ peius, Nō omni- ne multo sanguine euacuato, qui inferne habet impetum, fœtus mori-

tus incipit tur, sed ex brachio, ut euacuemus redundantiā. De tempore quo incipit, eodē tempore & definit hæc euacuatio, nil certi diffinire possumus, quia pro quantitate sanguinis, & eius consistentia maximè euariat. In quibus enim euacuatio. mulieribus, multus est sanguis, aut tenuis, citius incipit, & tardius desinit menstrua euacuatio: contra verò in quibus crassius est aut paucus.

Quod quamuis ita sit, maiori tamen ex parte incipiunt menses 13. aut 14. anno, eo quod tunc iam non absumunt famina tantum sanguinem in corporis augmentum: desinunt autem 45. aut 50. quo tempore

Quantitas iam sanguis ea copia nō generatur, quæ possit abundare singulis mensibus. Quantitas sanguinis, qui solet euacuari singulis mensibus, non euacuandi est certo diffinienda: quia pro natura & victus ratione mutatur.

incerta. Ad vltimum (quod in hac disputatione inquirendum diximus) respond

bondet Aristoteles, bene posse concipere mulieres, antequam menses
luant. Aliqui experientiam ad id confirmandum addunt. Ceterum Gale. Ari-
staleum habet contrarium Aristoteles, qui libro de vteri disc. capite stoteli con-
o. ante mensium eruptionem non posse fieri conceptum scribit, quia se-
trarius, non caret vero alimento, sanguine videlicet: Tum quia lentis vietus
st, ob vasorum occlusionem, & sic decidit semen: aptius enim est ad
oncretionem asperum quam leue: quod in lignis & lapidibus videre
st, quæ si volumus vire, prius (ut recte dixit Diocles) scalpello exa-
peramus. Neque experientia potest dicere contrarium, quia in femi-
nis, quæ sine precedentibus mensibus conceperunt, tempore coitus mo-
tum habuerunt. Prædicta ergo euacuatio mensiua si tempestinè fiat,
utilis est: si verò immodica (quam ex noxa colliges) mala, ut docuit Hi-
ppocrates 5. aphorismorum, sententia 57. mensiuis enim largius fluen-
tibus morbi fiunt, refrigeratio totius corporis habitus, fædus color, tu-
mor pedum, omnium virium imbecillitas, animi etiam deliquium, &
conuulsio libro quinto aphorismorum, sententia 56. Quod si immodi-
catus hic fluor in gravidis contingat, fœtus afficitur iuxta Hippocra-
tem, eodem libro, sentent. 60. Hæc immoderata sanguinis per vterum symptoma
euacuatio, symptoma est in his, quæ excernuntur, quantitate peccan-
tia. Eius causæ ex libro quinto aphorismorum, commenta. 53. tres sunt: Causæ im-
Aperio orificiorum eorum vasorum, quæ in vteri cavitatem desinunt, modici flus
sanguis calidus, & tenuis, & totum corpus (propter malum habitum, & ius ires.
hoc est, imbecillitatem à sanguine etiam moderato aggravatum) ex-
pellens ad venas vteri. Prima causa est morbus instrumentarius causa.
in via: Secunda intemperies calida iecoris, multam bilem generans: Secunda.
Tertia intemperies est totius habitus corporis valula tamen, aliter i-
psius vires non deiecerit. Præter hos morbos, nullus alius prædictum
efficit symptoma, & ideo auctor, Rondoletius, Alcomarins, & alii
Aetium sequuti decipiuntur, existimantes erosionem, & venarum Error mul-
rupturam menses immodicos efficere: quia immodica mensium e-
ruptio, consueto naturæ tempore fit, ea verò quæ ex erosionem, aut
ruptura procedit, quolibet tempore contingere potest. Unde hæc
sanguinis euacuatio per vterum nominabitur, non mensium im-
modica euacuatio. Ea autem sanguinis præter modum euacuatio,
quæ post partum aut abortum, aliquando euenit, ut ex Galeno li-
bro tertio epyd. parte 3. comment. 35. colligimus, mensiua euacua-
tio appellatur, quia quod expellitur est sanguis mensiuis propter
fœtum in vterum immoratus: quamvis ille sanguis distinguatur ab
eo qui singulis mensibus euacuatur, ut libro de atra bile cap. 8. docet
Galenus: ille enim qui post partum expurgatur, purior est deterrima:
(nam optimum sanguinem fœtus attraxit) non solum peccans quan-
titate, sed & qualitate: & ita in epydmiis supradicto loco, hunc san-
guinem melancholicum esse scribit.

D E C V R A N D. M O R B.

Si immodicus fluor mensium.) Si ex imbecillo corporis habitu partes grauatae expellant ad vterum sanguinem, & hac ratione Venæ se- fiat immodicus mensium fluxus, secabimus venam basilicam dextri Etio quan aut sinistri brachii, nihil enim refert. Cucurbitulam etiam magnan- do est exer sub mammis insigemus, iuxta Hipp. 5. apho. sent. 50. sunt enim com- cenda. munes vtero & mammis veng: hac enim ratione reuellemus sangui- nem à parte affecta. Alimenti quantitatem minuemus, & corpora habitum roborabimus.

Si ob bilem mixtam sanguini.) Bilis sanguini mixta ipsam tenuem reddet, & fluxioni aptum. Sanguinem ergo mittemus & v- temur cucurbitulis, vt reuellemus. Alimenta frigida sint, aut tem- perata, frigidis tamen alterata.

Melancho Si ob mixtam pituitam.) Si melancholia & pituita sangui- lia & pi- nem crassum reddunt, quomodo immodicos menses efficiunt.

tuita non Facta iam corporis euacuatione.) Tota ratio curandi hoc sunt cau- symptoma hac ratione procedat. Symptoma hoc aut vrget, aut non vrget: Si vrget, ei prospiciendum est alimentis & medicamentis in- Ratio tota crassantibus sanguinem: Auxiliis etiam repulso- riis. Si verò non vr- curadi hoc get, causæ remedia applicabimus, habitum corporis roborantes, san- symptoma. guinem tenuem incrassantes, & intemperiem, à qua procedit corri- gentes. Vltimo etiam meatuum laxitatem constringentes.

De suppressis mensibus. C A P. L V I.



Vemadmodum menstruæ purgationes cum modum excedunt multarum ægritudinum causæ sunt, ita quoque cum in totum supprimuntur, multos pariunt morbos, vt ex aphor. 57. sectionis quintæ colligitur:

Descriptio de suppressis igitur mensibus pauca dicamus. Suppressos Quibus autem menses tunc dicimus esse, quoties cum secundum na- turam fluere deberent, non fluunt: debent autem secundum fæminis naturam fluere in iis, quæ neque grauidæ sunt, neque infra menses nō naturam fluere in iis, quæ neque grauidæ sunt, neque infra fluant.

decimum quartum annum, aut supra quinquagesimum cō- stituuntur, & præter has etiam illæ, quæ aut cātatrices sunt, aut saltatrices, aut immodicè se exercent, menstruis purga- tionibus naturaliter carēt. Atque vt summatim dicam iux- ta sententiam Aetij mulieres calidioris temperaturæ, vali- disque exercitationibus addictæ, & agrestes parum admodum purgantur. Præter has quæcunque suppressos habent men- ses ægrotare necesse est: supprimuntur autem menses, vel quia summa adest sanguinis plenitudo venas replentis, at- que obturantis, vel quia sanguis sit crassus, viscidus, ac len- tus, à quo etiam venas obstrui necesse est. Non purgantur etiam mulieres, quæ longa aliqua ægritudine, aut acuta la- borant

borant, vt phthifi, quartana, hectica febris, ardēti, atque aliis
 id genus. Præterea quæ insigni aliqua vacuatione sunt exi-
 nant, vt sanguinis missione, vomitu, sudore sanguinis e
 naribus profluuium, alui fluore. Ad hæc & quibus puris copia
 illicunde emanat, & pustulæ in cute effloruerunt. Ob pecu-
 liare vteri vitium menses quoque interdum retinentur, ver-
 o gratia ob pinguedinis copiam, aut carnis excrescentiam,
 aut callum, aut cicatricem ex vlcere, quod in vtero anteces-
 sit. Hæc enim vasorum vteri ora obstruere possunt. Causæ *Nota.*
 facile patere possunt: generaliter verò quibus menses præ-
 ter naturam retinentur, dolores circa lumbos, femora, collū,
 inciput, & oculorum radices accidere solent. Corporis præ-
 terea grauitatem, quæ sic laborant, patiuntur, nauseant ci-
 bum, auersanturque, fastidiunt, & horridos quosdam per v-
 niuersum corpus discursus habent, quales iis, quæ concepe-
 runt, accidere solent: vrina interdum in nonnullis difficul-
 ter redditur, interdum plane suppressitur. Cæterum men-
 sum suppressio si à pituita copiosa, & venarū ora obstruen-
 te contingat, videre est laboratē somnolentam, ad omnem
 motum segnem, colore cādidam: plumbi quoque interdum
 colori similem pituitam assidue excreantem, & aliquando
 euomentem. Vrina quoque aquosa esse solet.

Menses si ob sanguinis inopiam ex inedia, aut victu par- *Curatio*
 co, aut longo morbo, aut alia vacuatione per se constiterint, *quando ex*
 proprie non sunt suppressi, cieri possunt, antequam mulier *sanguinis*
 redierit ad propriam naturam. Si verò alia de causa suppressio *defectu sit*
 si sint, per abscissionem causæ euocantur, vt si a siccitate fiat, *A siccitate*
 rebus humidis curatur, non calidis, & exiccantibus, ne au- *te.*
 geatur morbus. Si ab obstructione, à qua fere semper fit, cu- *Ab obstru-*
 ratur primò victu tenui attenuante & aperiente, de quo ca- *ctione vi-*
 pitibus 42. & 45. de obstructione hepatis, & lienis. *etius.*

Secundò abigentibus causam suppressionis, & obstructio- *Sanguinis*
 nis, quæ si sanguis fuerit per sectionem saphenæ, aut vena- *missio.*
 rum pedum abigetur: quamuis Matthæo de Gradi videatur *Matth. de*
 primam sanguinis missionem esse faciendam ex basilica, *Gradi.*
 quando corpus est multo sanguine plenum, ne attracto san- *Euocatio*
 guine multo ad infernas partes augeatur obstructio. Deinde *mensum.*
 euocandi sunt menses frictionibus, ligaturis, & cucurbitu-
 lis partium internarum, & coxarum, lotionibus, & fotibus
 earundem. Vltimò, per medicamenta aperientia, & diureti-
 ca, de quibus statim dicemus: clemētiora tamen in hac con-
 ueniunt, quam in facta ab humoribus pituitosis, & crassis,
 quæ primò curatur victu tenuante, & aperiente, vt diximus.

DE CVRAND. MORB.

Apluita Secūdo apparantibus pituitam rhodomelle, oxymelle simp
Viētus cō syrupo de duabus radicibus, & aliis dictis r. cap. cum deco-
coctio. cto, vel aquis eodem cap. dictis ad concoquendam pituitam

Purgatio. Tertio vacuantibus phlegmagogis eodem l. cap. dictis, vt a-
 garico, turbit, diaphænicone, electuario, indo maiori, & aliis
 similibus: vt ℥. pilularum de agarico, & cochiarum an. 3. s.

Quæ men cum aqua fœniculi fiant pilulæ septem. Quarto menses o-
ses euocāt. mni arte sunt euocandi, cucurbitulis videlicet coxis affixis
 frictionibus, ligaturis, & fotibus partium infernarum, vt sy-
 rupo capilli Veneris, de artemisia, de duabus, & de quinque
 radicibus quantitate duarum vnciarum quolibet mane
 sumpto per multos dies cum aquis duplis, vel decocto radi-
 cum diureticarum croci, cinnamomi, calamenti, artemisiz

Potus, & fauinæ, & similibus. Forus, & infessus ex decocto medica-
infessus. mentorum si prædictorum aperientium in tempore consue-
 tæ purgationis valenter ciēt menses, præcipue, si sumatur
 tunc potus, hic aut huic similis: ℥. hæmagogi 3. j. aquæ ca-
 pilli veneris, & fauinæ, ana. 3. ij. syrapi de artemisia vnciam

Potus va- pilli veneris, & fauinæ, ana. 3. ij. syrapi de artemisia vnciam
lenter mē- vnam, misce,

ses educēs. Et si menses inceperint, sanguinis missio ex poplite, ve-

Suffitus. pede valenter euocat menses. Suffitu per vuluam excepto
 rerum aperientium, & redolentium cum Hippocrate quin-
 to aphorismorum 28. aphorismo menses euocantur. A foru,

Vnguentū & infessu vngatur locus anterior, & posterior vteri hoc vn-
 gueto: ℥. olei de lilio, sesamini, & scorpionum, an. 3. j. axun-
 giæ cuniculi, & gallinæ an. 3. ij. pulueris croci, spicæ, & faui-
 næ an. 3. j. ceræ quod sufficit, misce, & fiat vnguentum. Hoc


Mixtura na an. 3. j. ceræ quod sufficit, misce, & fiat vnguentum. Hoc
optima in medicamentum valenter menses euocat: ℥. diacurcumæ, &
hoc genere dialaccæ an. 3. j. trochiscorum de myrrha, de capparibus an.
 3. ij. pulueris spicæ, croci & cinnamomi an. 3. j. s. syrapi de
 artemisia quod sufficit, misce, & fiat cōfectio. Dosis cochlea-
 rium vnū quolibet die mane cum vnciis tribus decocti, vel
 aquæ capilli veneris, vel artemisiz, vel fauinæ, drachma vna,
 vel duæ theriacæ diatessaron cum decocto: vel aqua prædi-
 ctarum rerum menses prouocat, valentius tamen theriaca
 magna, & mithridatus id efficiunt cum electuario hæma-

Alia mix- gogo. Hoc medicamentum optime menses excitat etiam
tura in hoc suppressos septem anni: ℥. myrrhæ, calamenti montani, an.
potentissi- 3. ij. mellillæ passularum 3. ij. rutæ recentis 3. iij. fauinæ 3.
ma. vj. Ex omnibus contulis bene, & sufficienti quantitate mel-
 lis fiat cōfectio. Dosis drachmæ duæ cum decocto ruberæ
 zinziborum. Pessi longi ex superiori cōfectione, & felle tauri
 cum lana in vuluam & vterum affixi aperiendo venarum
 ora

ra menses prouocant. Pessus ex radice rubeæ tinctorum *Pessi.*
 um felle tauri, vel alicuius animalis rapacis clemēter men-
 ses euocat. Idem facit hic: ℥. pulueris castorei 3. j. ℥. musci
 rana iij. olei sambucini, & terebinthinæ, an. quod sufficit,
 misce, & cum lana fiat pessus longus: vel ℥. medullæ cari-
 arum 3. ℥. succi mercurialis 3. j. pulueris radice gentianæ,
 & pulegij an. 3. ij. pulueris nigellæ 3. j. cum pauca terebin-
 thina, & lana vel gossypio fiant pessi, seu pessarij duo, vel tres
 ongi. Pessi facti ex armoniaco, opopanace, galbano, sagape-
 io, & euphorbio sunt valentiores ad menses euocandos a-
 iis dictis superius, præcipuē si addas cyclaminum, cuius ra- *Radix cy-*
 dix valentissime menses ciet, & vt quibusdam videtur, si su- *clamini.*
 ber eam foemina transeat, etiam menses euocat. Si vulua, &
 uterus ab his, & similibus pessis, & aliis medicamentis cali-
 dis aperientibus afficiantur calida intemperie, initio vlce- *Caliditate*
 rum necessarium erit consilium docti chirurgi. Interim fo- *Evulsus*
 cus & lotio ex decocto plantaginis, & maluarum iuuat mul- *curantia.*
 tum hoc affectu vexatos, & vnguentum album camphora- *Pilula.*
 tum. Pilulæ hæ valenter menses euocant: ℥. musci, myrrhæ
 an. 3. ij. stechados, rubeæ tinctorum, pulegij, corticum citri,
 piperis longi, corticis cassiæ lignæ, granorum pœoniæ, ca-
 lami aromatici an. 3. iij. spicæ nardi 3. j. cum aqua artemisiæ,
 fiant pilulæ septem pro drachma: dosis drachma vna: syru- *Syrupus.*
 pus hic egregie menstrua mouet: ℥. rubeæ tinctorum, ar-
 themisiæ, saumæ ana. man. ℥. mentæ, absinthij, radicum fœ-
 niculi, radicum acori, squinantij, anisi, origani, nepitæ, ma-
 tris syluæ ana. 3. ℥. gariophyllorum, melissæ, linguæ bouis an.
 3. iij. cyperi, galangæ, calami aromatici, fœniculi, ameos, cy-
 mini rustici an. 3. ij. cinnamomi, medullæ passularum an. 3. v.
 fiat decoctum secundum artem, cum quo percolato, & melle
 sufficienti fiat syrupus: Dosis vnciæ tres.

De suppressis mensibus. CAP. LVI.

Scholium.

 Vemadmodum menstruæ.) Ex Hippo. lib. 5. apho. sent.
 57. Si menstrua non sunt, ex vtero morbi contingunt, quia
 ex sanguine detento processu temporis vterus patitur affe-
 ctionem similem aut inflammationi, aut æri sypelati, aut schirro, aut
 cancro, ex quibus lege consortii afficitur totum corpus. Et quamuis
 mensium suppressio noxia sit, magis tamen noxia est ea, quæ a par-
 tis contingit, eò quod hæc non solum abundantiam, sed insignem

v 4 etiam

DE CVRAND. MORB.

Sanguinis etiam humorum pariat prauitatem 3. epy. par. 3. com. 73. quia pos-
mensurum partum, ut auctor est Galenus lib. de atra bile, euacuatur portio san-
suppressio guinis deterrima. Solet menstrua euacuatio, in quibus consue-
causa. cessare, ob defectum materiae, nempe sanguinis: in his quae morbo a-
De qua liquo laborant mulieribus, quae multum se exercuerunt, & in quibus
suppressio copiosa sanguinis euacuatio praecedat. De hac mensium suppressione
ne hic sit non loquimur modò, quia suppressionem menstruam illam appella-
sermo. mus, in qua sanguine in venis non deficiente, eius per uterum fluor,
Prima ab aliqua affectione impeditur. Affectio haec aut est in utero, aut in
causa va- sanguine. In utero varia esse solet: Prima est, angustia venarum v-
terii, à prima conformatione contracta: Quam affectionem morbosam
Secunda non licet appellare, cum à natura indita sit, & morbus innatus non
causa. detur: erit autem morbus simpliciter, qui est intra limites sanitatis.
Tertia Secunda est uteri densitas, quae à frigidityte contrahente corpus ute-
causa. ri, & vase in eo contenta ortum habet, & ideo non fluit sanguis, vel si
Quarta fluit, tenuis & aquosus. Quod considerans Hippocrit. lib. 5. aphor. sent.
causa. 62. mulieres uteros densos habentes, non concipere scripsit. Tertia est
Quinta compressio vasorum uteri. Quae fit aut à tumore praeter naturam cir-
caus. cumiacentium partium, aut ab omenti multa pinguedine, ut in obes-
Sexta mulieribus, in quibus descendit omentum usque ad os uteri: non cu-
causa. rantes hac in parte Vesalius, qui omentum non posse usque ad os v-
Quid per uteri descendere sentit. Quarta est obstructio, quae fit à crasso, glutino-
robore ute- so, aut multo humore. Quinta intemperies uteri frigida densans ute-
ri intelli- rum: aut sicca eum indurans. Sexta affectio suppressio mensis, tra-
gat Gal. ditur à Galeno lib. 5. aphor. com. 57. est autem robur vasorum uteri, adeo
ut quod influit, non admittant. Quod certè difficile mihi videtur, con-
sideranti uterum à natura esse fabricatum languidum, ut sarcinam
Aliae cau per ipsum deponeret: ac proinde per robur non natum, sed factum à
sa à pra- medicamentis adstringentibus intelligo. Aliae causa (quae sunt cal-
eticis tra- lus, oris uteri distortio, aut inflammatio, carnis excrescentia, & pelli-
dite nullę. cula supra os uteri generata in his, quas vulgò cleses appellamus) à
practicis adductae nobis non placet, quia non possunt impedire mensium
euacuationem, quae etsi per os uteri non fiat, potest tamen fieri per venas
ad eius collum peruenientes. Tum quia non possum mihi persuadere,
tam magni callum in utero posse generari, ut omnium venarum orificia
occludat. Affectus sanguinis est, cum est crassus aut glutinosus. Quae
causa non est distincta ab obstructione, quia si nullus sit in venis impe-
dimentum, sanguis etsi crassus & glutinosus, fluet, & excernetur. Dices,
cur ergo Gal. obstructione causam distinctam, à sanguine crasso & glu-
tinoso statuit? Respondeo, quia aliquando est obstructio, sine tali san-
guine. Quamuis varia sint istius suppressionis sanguinis causae, ut in
plurimum tamen fit ab obstructione à sanguine crasso orta: ac proinde
li. 5. aphor. com. 36. ad excitandum menses suppressiones, duos scopos
deser

describit Galenus, aperitionem orificiorum vasorum ad iterum peruenientium, & sanguinis extenuationē. De hac ergo suppressione, est praesens caput.

Secundò, abigentibus causam.) Ut sanguinem menstruum retentum moueas, non euacues ex brachio, quia eum reuelles, & contrarium motum ab eo, quem molitur natura, induces: sed ex pede, cum sanguis per uterum faciat impetum. Vnde male multi ex medicis sequuntur Aetium, prius secant venam brachii, ut euacuent venas, & deinde pedis, ut moueant menses. Quasi euacuatio ex pede, plenitudinem ex Vbi exercit venia causa non euacuet? Vbi nomine pedis intellige totum illud, quod cenda san- est ab articulatione coxae usque ad digitos. Euacuatio ergo (quam, ut guinis missi- missione. Scarificatione fiet, quando mulier candida est, aut simul can- In mulie- dida & obesa. Ratio hac est: Mulier candida habet tenuem, & aquo- re candida- sum sanguinem (& ideo Hippocrates 6. epyd. par. 1. sent. 6. has mulie- scarifica- res appellat aqua laborantes) & ita poterit per locum scarificatum tione mo- recte egredi. Dices, nonne melius egredietur secta vena? Respondeo verum uendi men- esse, sed ex ea sequi aliud malum, quod est multos spiritus euacuari: at ses. scarificantes, praeterquam quod commodè fluit sanguis, exigua spirituum fit iactura. In muliere obesa, cum habeat exiguas venas in cruribus, etiam si eas probe inscindamus, non poterit sanguis nec mediocriter fluere: ac proinde eam scarificare oportet. Sanguis missione euacuabimus ex pede, si mulier sit nigra, et magis, si magnas habuerit venas. Nigrae e- Nigrae cur- nim mulieres, sanguinem habent crassum, qui per scarificatum locum, non scarifi- commodè non euacuabitur. Hac Gal. in lib. de curat. per sanguinis mis- cetur. sionem cap. 11. videant ergo qui in hoc affectu semper venam secant, & nunquam ex poplite euacuant, an secundum artis praecepta operentur. Euacuatio autem sanguinis missione, siue scarificatione ex pede facta, non debet exerceri, quando iam fluunt menses, sed duobus aut tribus diebus antea, quo tempore futura expectatur euacuatio, ut libro de curat. ra. per sang. miss. cap. 17. docet Galenus, & hoc fecisse medicos Romae medentes in libro de vena sec. aduersus Erasistratos cap. 7. scribit. Rationem huius rei hanc esse existimo, Cum in missione sanguinis soleat sequi animi deliquium (in quo sanguis recurrit ad cor) si quo tempore fluunt iam menses, ex missione sanguinis, animo inqueret mulier, euacuatio supprimeretur: quod cum non timeamus antequam fluant, ideo tunc euacuare oportet. Hoc verum est cum deficientem euacuationem curamus. Ratio videtur sit extenuans.

Deinde euocandi sunt menses frictionibus.) Amara calida Viscus ra- cum sint, & tenuium partium, menses mouent, quamuis etiam habeant: tio. partes adstringentes (ut in absinthio videre est) quia hac adstrictio po- Qua cur- ros internos, qui magni sunt, non occludet. Omnia etiam medicamenta, conu menses, quae habent vim inscindendi, & attenuandi, praestant, ut nulla in-

per

DE CVRAND. MORB.

persa pulueri nepitæ, aut pulegii. Possumus mane hac vii porione: ℥. mitchridati 3. j. syrupi capillorum veneris 3. j. misce cum aqua cap. veneris, & fiat potio. Hæc confectio accommodatissima est: ℥. diacurcumæ 3. ii. trochiscorum de absinthio, de rhabarbaro, & de myrrha, aut de capparibus an. 3. j. s. quatuor sem. frig. an. 3. j. pulueris diarrhodon. Abbatis 3. iii. pulueris soliorum sabina 3. ii. cum syrupo capillorum veneris fiat confectio. Cuius singulo mane assumet ager cochlearium vnum, cum aqua sabina & borraginis, & deinde se exercebit quoad incipiat sudor, aut difficilis respiratio. Solemus in hac Valentini ciuitate, in hoc affectu exhibere medicamentum ex scobe ferri paratum, cum felicissimo successu. Debet autem hac ratione parari: ℥. trochiscorum de absinthio, & de rhabarbaro ana. 3. j. antidoti hæmagogi 3. j. s. artemisiæ, cinnamoni, ana. 3. j. limatura ferri præparati 3. j. cum syrupo capillorum veneris fiat confectio. In hac compositione, quamuis limatura ferri videatur basis, ei tamen non debetur medicamenti totius actio, sed aliis, quæ propter hanc limaturam melius agunt, cum enim sit crassarum partium, in causa est, ut immorentur, & ita tota compositio, propter limaturam reddatur anostomoticum medicamentum. Aduerte vltimò ex Galeni 4. method. cap. 7. oportunitatem tempus exhibendi medicamenta menses mouentia esse, statim post balneum adhuc limbo inuolutis.

*Medica-
mentum
Valentini
vsitatum.*

De vteri suffocatione. CAP. LVII.

*Varia no-
mina.*

Apnæa.

Definitio.

Causæ.

Vteri suffocationem, alij stragulatam vteri, aliis hysteri-
cam suffocationem, alij spirationis ob vterum
ablationem, alij vterinam apnæam vocant (quam
animi defectio præcedit, ut docet Gal. de arte curatiua ad
Glaucōnē) quamuis Stephanus Atheniensis discrimen esse
inter apnæam, & vterinam strangulationem velit: fit enim i-
pso dicente, apnæa ex superfluitate seminis putrescentis, pra-
uâsq; quasdam exhalationes ac præsertim frigidas ad cor mit-
tentis ipsum, atque ita spirationem intercipientis. Contingit
verò quandoq; melancholicas exhalationes, quæ ex ipso
semine feruntur sursum ad cerebrum recurrere, symptoma-
tæque melancholica facere. Stragulatio apud eum fit ex spas-
mo matricis sursum tractæ, & per continuitatem intestina
ventriculū, septum transversum, ac respiratoria alia mem-
bra comprimētis. Sed quia frequenter ab vteri strangula-
tione fit morbus comitialis, & syncope per consensum, pro-
pria, & vera huius affectus definitio erit hæc: malū tunc ac-
cidēs, cum vterus vaporis copia ita intenditur, ut modò sur-
sum, modò in latus retrahi videatur. Eius duæ in vniuersum
causæ sunt, retentum scilicet semen genitale, & menstruæ
purg

purgationes cessantes. Et licet nunquam hæc affectio acci- *A semine*
 dat, quin alterutri horum accepta referenda sit, frequentius *sæpe eius*
 tamen euenire solet feminis detenti causa, & quæ ob hanc *sympto-*
 causam fiunt vteri suffocationes, vehementius solent affli- *mata.*
 gere, & symptomata multò seuiora inducere, vt copiosè Ga-
 len. disputat. 6. de locis affectis cap. 5. Quem locum si quis o-
 ptime consulat, multa quæ ad hanc affectionem pertinere
 videntur, & speculatione digna sunt dilucidè a Galeno tra-
 ctata comperiet: eos igitur ad eum librum remittimus, qui-
 cunque diligentes naturæ inquisitores magna interdum ad-
 miratione tenentur, quærentes qui fiat, vt cùm in hac affe-
 ctione intercepta nōnunquam respiratio in totum sit, & ar-
 teriarum pulsatio intermissa: ægrotans tamē viuat, & paulò
 post ad solitas operationes, perinde ac si tale quippiā nō ef-
 set passa, reuertatur. Cur præterea tāta varietas accidat sym-
 ptomatum pro intentionis remissionisq; modo differētium,
 & quomodo detentum semen, cum mole quam minimum
 sit, tam grauium symptomatum sit causa. Quarum omnium
 quæstionum causas ibi leges: nos enim breuitati studentes
 maluimus his omnibus prætermisissis ad signorū enarratio-
 nem conuertri, quàm in iis, quæ ad artis opera non sunt ne-
 cessaria, diutius immorari. Ex signis igitur alia sunt, quæ i- *Notæ.*
 psam accessionem solent præire, alia quæ comitari. Præire
 solent, & maxime cùm accessio proxima est, mentis torpor,
 pigritia, crurum imbecillitas, faciei pallor, aspectus mæstus.
 Comitantur hæc, quæ sequuntur laborantes. Interdum ia-
 cent sine sensu immobiles cum obscuro paruòque pulsu, vel
 omnino sine vllò. Interdum sentiunt quidem, & mouentur,
 integraque sunt ratione: cæterum animi defectione, & diffi-
 cili spiratione laborant. Interdum verò, & crura, & brachia
 contrahuntur. Adest præterea inclinatio ad somnū, desipien-
 tia detentio instrumētorum sensus, vox obmutescit, & con-
 uelluntur nonnunquam. Cum iam inclinat accessio, rubore
 suffundi malæ incipiunt, & oculi attolli, atque aperiri. Hu-
 miditas præterea quædam perceptibilis è mulieribus locel-
 lis excurrit: Intestina immurmurant, atque vterus ipse pau-
 latim laxatur mēte scilicet, sensu, ac motu iam redeuntibus.
 Per circuitus malum hoc solet corripere infirmas, præcipuè
 eas, quæ viduæ sunt, aut alias viri concubitu sunt vsæ, & cū
 omni tempore possit, maxime inuadit hyeme, & autumnò.
 Reliqua ex Gal. Paulo, & Actio sunt petenda. In accessione *Cirratio in*
 oportet vniuersum corpus perfricare, & extrema præcipuè *accessione.*
 partes infernas ligare, ægrotantq; collocare, ceruice, & sca-
 pulis

DE CURAND. MORB.

pulis accliuoribus, & femoribus, & inguinibus decliuoribus. Naribus eius sunt admouenda foetida, vt funiculus lucenę nuper extinctus, plumę maxime perdicę, laneę soleę combustę, capilli, cornu caprę vstum, pix eliquata super carbonibus, galbanum, castoreum, assa foetida, vrina multorum die-
In accessio ne est va- rum, & sulphur, quod valentissime excitat ab accessione: in-
cuandum qua raro facienda est vacuatio, nisi timeatur suffocatio &
aliquando. mors repentina: nam ad prohibendā eam necessaria esset san-
 guinis missio ex saphæna, vel vena pedis, præsertim si ex sup-
 pressis mensibus sit morbus. Quæ etiam sternutamentum fa-
 ciunt, naribus sunt admouenda, & vacuatio per acres clyste-
 res non est negligenda, de quibus cap. 12. de curat. apoplexię.
Si causa Si a detento semine sit, curabit maritus, vel si non habet, nec
est semen. possit, obstetrix suis digitis, & rebus aromaticis ad inferiora
 euocet vterum, & per vuluam frictionibus purget semen, si
 citra peccatū fieri possit hoc. Hęc mixtura est optima huic
Optima rei: ℞. olei de lilio, nardini, & cheyrini an. 3. j. galie musca-
mixtura. tæ, & alitæ muscatæ an. 3. j. musci, & ambre an. 3. j. zibeti
 3. ss. misce. In omni tamen causa in ipsa accessione pili pecti-
Medica- nis radicitus, & vi magna sunt auellendi ad excitandum. I-
mentum o- dem præstant cucurbitulæ coxis & tibiis affixæ, quæ si ma-
decrum, va gna fuerit vmbilico affixa, vterum reducit ad propriam se-
lenter tra- dem, vaporésque à capite, & partibus superioribus auertit,
hës ad pro trahitque ad inferiora: sed reducto vtero ad suum locum ad
prium lo- illius conseruationem debitam vmbilico sunt admouenda,
cum vterū quæ diximus cap. 54. de curatione procidetiæ vteri. Vel hoc:
Et conser- ℞. emplastri stomaticonis quod s. galbani 3. ij. galie musca-
uans. tæ 3. j. musci & ambre an. 3. j. misceantur omnia cum oleo
 sambucino, & extendantur super pannum coccineum ad for-
 mam rotundam pro vmbilico. Morbus comitialis, & synco-
 pe, si cum hac vteri suffocatione coniungantur, vt sæpe fit,
 curantur eo modo, quem diximus cap. 8. & 30. semper ta-
 men habenda est prima curandi ratio partis eius, quæ prius
 affecta est, post aliarum quæ per consensum laborant.
Extra ac- Extra accessionem ipsam curatur per causę abscissionem,
cessionem vt si ex suppressis mensibus nascatur, adhibeantur, quæ di-
curatio. ximus capite superiori. Si verò ex semine detento & corru-
 pto, vocetur maritus. Si non possit viro vti, precibus, & ieu-
 nio curabitur. Nutriatur ergo pane, & aqua: menta tamē &
 ruta, & agnus castus semē minuunt. Ad purgationem vteri
 iniectus hic liquor ad modum clysteris instrumento argen-
 teo est efficax remedium: ℞. aquæ naphæ, seu florum aran-
 ciorum lb. i. aquæ ocymi 3. iij. galie muscatæ 3. ij. galbani

.iij. musci, & ambræ an. ḡ. v. syrupi de artemisia ḡ. iij. croci
puluerizati, cinnamomi & gariophyllorum an. ʒ. ḡ. misce.

De suffocatione vteri. CAP. LVIII.

Scholium.

Vteri suffocationem.) Per vterū singulis mensibus excer- Vteri re-
ni solet sanguis, vt superius docuimus: solet etiam & ex re- tractio
stibus sēminæ semen in eius cavitatē immitti, vt ex his duo- quomodo
nus principiis (quæ vicem habent causæ efficientis & materiæ) gene- fiat.
ratio omnis fieret. Inde in corpore solent consortii lege ex vtero tanquam
ex radice varii morbi prodire, cum aliqua ex dictis substantiis in vte-
ro abundat. Si substantia, quæ abundat, sit sanguis mēstruus ob aliquē
affectū retentus, cum vteri venæ, quæ multæ sunt, & magnæ replean-
tur: vteri sequetur retractio, recta, si ex æquo venæ sanguine abundant,
si verò non ex æquo, sed solum vnius partis venæ, versus illam partem
vterus retrahetur, ita vt semper vterus sursum aliquantulum recur-
rat. Addo aliquantulum, quia eius ligamenta non patiuntur ipsum
multum eleuari. Hic sanguis detentus si putrescat, febrem synochum Sanguis
accendit, quæ ex hac sola parte accidit, ob venas quæ multæ & magnæ menstruus
sunt, vt docet Gal. lib. 6. epyd. par. 1. com. 2. Si sine putredine corrumpa- putrefa-
tur sanguis, si sit biliosus & acris, solet ad principium nervorum mitte- tus & de-
re vapores, & eo nomine motus conuulsuos efficere: aut ad cerebrum tētus feb,
eos mittens, conuulsionem vniuersalem quæ dicitur epylepsia. Quod si synochum
aliquando vera eneniat conuulsio, id proueniet, quia in corpore disposi- parit.
to, agitatione humor motus & fluxus replebit nervosa corpora. Si san- Sympto-
guis sit melancholicus, ex vaporibus eius cerebrum petentibus, melan- mata quæ
cholica deliria excitantur, sicut ex pituitoso sanguine sopores. Quod si sequantur
multi vapores septum comprimant, efficiunt (sicut in gravidis, & his ex isto san-
qui ob alimenti copiam distentum habent ventriculum) difficilem re- guine bi-
spirationem, nō autem suffocationē, quā à vaporibus gutturis muscu- liofo.
los replentibus, fieri existimo. Quod colligo, quia quæ hāc affectionem Quomodo
patiuntur mulieres, eas partes habent eleuatas, & manus ipsis adhi- suffocatio
bent, indicantes molestiam & suffocationem. Refrigerationem totius vteri con-
corporis, quam comitatur respirationis (quoad sensum) priuatio, san- tingat.
guis detentus nunquam efficiet: neque Galenus lib. 6. affectorum loc.
ubi ex professo de hac materia disputat, id significauit, nisi dixerimus
sanguinem aliquando venenatam induere naturam, & eius vapores
cordis caliditatem celeriter extinguere. Nam si aliter sanguis men-
struus detentus refrigerare posset cor, cum frequenter supprimatur,
frequenter etiam cor refrigeraret. At rarissimè, aut nunquā contingit
vni medico etiam multis annis exercenti medicinam eam videre, &
tunc in vidua, aut virgine. Si substantia, quæ in vtero abundat, semen
sit, tunc non contingit retractio, quia vasculum spermatiorum sola di-
stent

DE CVRAND. MORB.

stentio id non poterit prestare, ut ex affec. 6. colliges, quod non recte con-
Rondoletii sideravit Rondoletius. Neque retrahetur uterus (ut sentit *Vallesius*)
error. eo quod ob appetitum, venter extendatur, sicut pene in viris: quia ob
Vallesius talem appetitum non retrahitur, imò descendit versus collum uteri,
 reprehenditur ut cum virili membro iungatur: Quod similitudine ostendit Galenus
 diu. libro 1. de semine cap. 5. ex ventriculo desumpta: hic enim quando appe-
 Semen put- tit cum fundo suo ad stomachum recurrit. Si ergo semen retentum pu-
 trefactum trefiat venenata puredine, vapores ex eo ascendentes cum toto tempe-
 que sequa ramento contrarii sint, & corruptrices, calidum innatum cordis extin-
 guunt.

guentes, totum corpus refrigerant, ita ut sequatur respirationis (quoad
 sensum) abolitio, quæ omnino viuenti animali non potest cessare. Quod
 si semen non ita prauè corrumpatur, prout fuerint vapores ex eo ascen-
 dentes, aut acres, aut aliam habentes qualitatem, sequentur animi de-
 liquium & alia symptomata peiora, quam sent illa, quæ ex sanguine
 retento afficiunt: quia corruptio seminis peior est sanguinis corruptio-
 ne, ut experientia docet in symptomatis, quæ viduis euenire solent. Ex
 his, quæ diximus, intelliges, quam male *Altomarius*, *Rondoletius*, &

Error Pau alii sequuntur *Paulum* suffocationem uteri appellant uteri retractionem:
 li & alio- cum neque ex retractione suffocatio sequatur, neque in ea suffocatio-
 rum de v- ne, quæ ex semine retento fit, retractio contingat. Nec minus errant
 teri. suffo- existimantes symptomata in suffocatione uteri euenientia fieri, ex eo
 catione.

quod semen, aut sanguis menstruus ex retentione, & mora refrigeretur,
 refrigerenturque uterum, & simul alteratione, aut vapore medio cor,
 et cerebrum. Non enim est necesse, ut semine, aut sanguis refrigerentur,
 quia hac ratione semper in suffocatione uteri sequeretur corporis re-
 frigeratio, quod falsum esse supra vidisti. Adde ex prædictarum sub-
 stantiarum frigiditate, non posse sequi tantam corporis refrigeratio-
 nem, quæ ad pituitam vitream, quam frigidiorē esse certum est, nun-
 quam sequitur. Et ita tam magna in corpore frigiditas, maiorem cau-

Rondoletii sam arguit. Posset quis per contrarium dicere, semen uteri suffocatio-
 nem efficit, ubi immoratur. Respondet *Rondoletius*, non retineri semen

in vasis spermaticis, quia ibi conseruatur, aut in eorum alimentum ab-
 sumitur: sed in cavitare uteri, ubi quando grauat quantitate sua, in-

Rondoletii ter somnandum expellitur. Hæc sententia mihi videtur falsa, quia in
 sententia viris ex retento semine in vasis spermaticis, videmus sequi capitis gra-
 uitatem, corporis pigritiam, inappetentiam, & alia symptomata. Se-

falsa. cundo, si semen in cavitare uteri continetur, ergo per eius os effluet,
 neque enim retinebitur ab utero, cum solum non possit conceptum ef-
 ficere, sine maris semine. Tertiò etiam si non somniet mulier, si semen
 peccat quantitate poterit expelli. Dicendum ergo erit semen retineri
 in vasis spermaticis & glandulis illis, quarum meminit *Fallopius*,
 quæ ad seruandum semen videntur factæ. Symptomata varia, quæ in
 uteri suffocatione apparerent, quem morbum uteri sequuntur. *Altoma-*

rius

rius vteri suffocationem dicit esse morbum in situ. Quæ maximè de- *Alromaria*
 ricur, quia ea vteri retractio non lædit actionem, neque ex ea sym- *error.*
 ptomata prædicta lege consoriii sequuntur. Alii eam, intemperiem Alii ta-
 rigidam esse fatentur. Qui etiam errant, quia ut iam probauimus, xantur,
 vterus non refrigeratur in vteri suffocatione. Obiicies, nonne in suf-
 focatione vteri eleuantur flatūs, qui à diminuto calore ortum habet?
 Respondeo, vteri calorem, comparatum ad multam substantiam ibi
 detentam, dici languidum, non quod talis sit in sua essentia. Ego in
 vteri suffocatione, in vtero non vnum morbum, sed multos esse exi-
 stimo. Si vteri suffocatio, à sanguine retento eueniat, varios poterit ha- *Auctoris*
 bere morbos, quos capite de menstrua retentione videbis. Si à semine sententia
 oriatur, distinguere oportet. Non enim semen retentum & corru- de vteri
 ptum (etsi ex eo sequantur aliqua accideria) semper est morbus, sicut suffocati-
 neque cibus corruptus in ventre, etsi ex eo vertigo dolor capitis, & ne-
 alia sequantur: Quia quando accideria sunt exigua, videntur esse
 intra limites sanitatis: & tunc semen, & cibus afficiunt nos ea ra-
 tione, qua causa externa. Quomodo verò symptomata magna sunt,
 molesteque afficiunt, sequuntur tunc morbum in numero addito,
 semen enim est pars addita præter naturam ea ratione, qua cibus
 corruptus in ventre, & humor in atheromate, steatheomate, & me-
 liceride.

In accessione oportet vniuersum corpus perfricare.) Ante In suffoca-
 accessionem proposuit auctor aliqua signa ex Aetio desumpta: quæ rione à se-
 non sunt inseparabilia, nam aliquando videntibus, & ludentibus fa mine san-
 minis, repente præhendit accessio. In accessione si sit corporis frigidi-
 tas, non licet sanguinem mittere, quia illa non est sine animi deli-
 quio. Ea non existente, ex pede sanguinem educes.

Si à detento semine sit.) Si suffocatio proveniat à detento se-
 mine, non mittes sanguinē, quia sanguinis missio non euacuat semen.
 An verò liceat fricatione facta in pudendo, irritare naturam, ad ex-
 pellendum semen, Theologis discutiendum relinquo. Solum illis ad-
 uertendum propono (ut melius iudicare possint) semen quod eo tem-
 pore irritatione excernitur, faminis inuitis, aut saltem non consen-
 tiens excerni.

Et secundo illud semen, iam non esse prolificum, imò venenum, &
 corporis excrementum inutile, & multorum malorum, imò sæpe cer-
 te mortis occasionem.

De Mola in vtero. CAP. LVIII.

Mola, autore Galeno, informis quædam caro est, aut *Descriptio.*
 si maius cum Aetio, & Paulo, affectus quidam vte-
 ri ad scyrrhi naturam tendens nunc in vteri ostio-
 lo, nunc in toto ipso ad tactum lapidosus apparens, a motus
 autem

- Causa.* autem difficultate, & grauitate molæ nomen assumpsit. Fit hoc mali genus interdum post inflammationem præcedentem euentens, interdum post locale vlcus, cui caro supercreuerit: Nascitur etiam a semine muliebri, & sanguine menstruo ad vterum utroque fluente, atque retento ibique caloris immodici vi tum coacto, tum in carnis formam transinurato. Signa ab Aetio sic ponuntur. Affectum tumor immitis consequitur cum hypochondriorum retractione, gracilitate, decoloratione, appetendique deiectione, ac primo conceptionis opinio suboritur: nam & menses supprimuntur, mammae intumescunt, stomachus euertitur, lumbi grauantur, venter attollitur: temporis verò progressu discernitur: molam enim dolor punctiōis sensum inferēs subsequitur, nec in ea motus vllus, sicut in vero conceptu percipitur, post toto corpore diminuto, & ventre ampliato certa hydropis imago deprehenditur, a qua tamen distinguitur: neque enim hic vt in hydrope manus impulsu tumor recedit, aut excauatur, aut tympani sonum reddit, neque eiusdem manus concursu vlla fluctuatio percipitur: interdū tamen tempore præcedente iecur refrigeratur, & hydrops superuenit.
- Historia.* animaduertere tamen oportet, hæc omnia signa, ne cum senne 135. annos nato Auenzoar, & doctissimo Mattheo de Gra di, decipiamur: ille vxorem vterum gerentem purgauit sexto mense: hic verò vxoris partum ad decimum tertium mensem expectauit: quæ post mola laborare inuenta, optime ab eodem curata fuit.
- Historia stupenda.* Curator vteri mola victu earum, quæ mensibus detentis laborant, de quibus cap. 56. diximus: post remediis euocantibus menses, de quibus eodem cap. Si ob flatum fiat mola (vt contigit cuidam fœminæ Iudææ Olysiponensi, quæ arbitrata se fœtum in vtero habere, ventum tantum peperit) curatur primo frequenti vacuatione per elephanginas pilulas, quæ in hac & omni ferme causa obtinent principatum. Euacuato corpore flatus dissipandus est, diacymino, diagalanga, dianthos cum decocto camomillæ, seminis fœniculi, capilli veneris, & artemisiæ. Clyster hic valenter dissipat flatum: ℥. camomillæ p. j. baccharum lauri, anethi, cymini, seminis fœniculi, & anisi an. ʒ. j. anthos, stichados calendulæ an. p. j. fiat decoctum, de quo percolato accipe ʒ. x. cui adde diamusci dulcis, & diagalangæ an. ʒ. ʒ. misce, & fiat clyster. Si in vterum iniiciatur aliquid prædictæ mixturæ purgabit flatum vteri. Pessi ex rebus dictis cap. 56. sunt oprimi huic quoque morbo: vt ℥. pulue. seminis melanthij cardamomi ana.

j. pulueris euphorbij, & castorei an. 3. ss. succi mercurialis, terebinthinæ, an. quod sufficit, misce, & fiant cum lana, el gossypio duo pessi longi.

De mola in vtero. CAP. LVIII.

Scholium.

Mola auctore Gal.) Nomine molæ non intelligimus cum Quid nq= Paulo tumorem vteri, sed cum Gal. 14. de vsu. par. cap. 7. mine molæ carnem inutilem, atque informem. Quæ inutilis dicitur, quia intelligens est pars corporis, nec ex ea animal fit: informis verò, quia hominis, dum, nec alicuius animalis figuram seruat. Hæc mola ex Sylui sententia in libro de hom. natura, in Scholio illius sententiæ, quæ sic habet. Primum igitur necesse est, &c.) Fit à sola femina, sine masculi semine, & ratione, quæ oua hypememia, hoc est subuentanea appellata, ex galina sine galli coitu. Errat tamen Sylius ut ex prædicto Galeni loco intelliges, in eo enim probat bene posse in volucribus animalibus, solam feminam formam artificiosam induere, ob eorum caliditatem & siccitatem: non autem in gressilibus, in quibus, ob humiditatem femine corpus omnino est imbecillum. Mola morbus est in numero, est enim pars addita in corpore toto genere præter naturam ex 14. method. cap. 13. morbus. Quod videtur falsum, quia si mola est caro, erit ergo pars addita totum genere secundum naturam ea ratione qua sextus digitus. Respondeo, solam non esse veram carnem, aut si concedamus esse carnem, Galeum eam appellare toto genere præter naturam, quia non habet formationem, quam sextum digitum habere videmus. Mola non fit sine coitu, ita tamen, ut viri semen sit modicum, & morbosum, quod incipiat totum conceptui tribuere, & non perficiat. Ab hoc semine fit membrana chorion, quæ multis vasibus adheret vtero, quibus mola viuens attrahit sanguinem, quo nutritur, & augetur, ita ut vteri conceptus spem non adimat: proinde non rectè Vega existimat, molam augeri non nutritione, sed appositione & agglutinatione. Solet tamen mola, ex venis Mole manul:um attrahere (potissimum in principio) & hac ratione iecore regna attraherit (sicut in copiosa euacuatione) hydrops sequi. Ex hac etiam va etio. Mola mola attractione fit, ut in principio sue generationis in mammis non coaceruetur lac, quamuis deinceps copiosum generetur. Ex his colliges difficile esse cognoscere, an mulier conceperit necne: videmus enim in mola generatione, & suppressione mēstruorum, sequi generationem lactis, augmentum mammillarum, tumorem in ventre, & flatum in eonotum. Ac proinde non est mirum, si libri 4. epyd. vxor Antigenis ignoraret, an prægnas esset: & similiter Himene soror, quæ ex suppressis mensibus intenta habebat hypochondria. Alomaribus & alii molæ causam materialem, semen & sanguinem: at efficient in modicum calorem statuunt. Errant tamen, quia calor est instrumentum molæ, quæ Mola non

x

a rem

à calore à temperamento seminis, & sanguinis ea ratione, qua verus conceptus fit, & vult generatur, aliter enim non videret, quia quæ à calore concrefcunt, non viuunt. Curabitur mola, si auferatur, cum sit res inutilis ad uitam. Alioquin, sed à feretur vero medicamentis eis, quibus secundas retentas expellimus. tempera-
men o se-
minis.

De partu laborioso, & secundis detentis.

CAPVT LIX.

Causas & notas partu à Rhodione.



Vius rei copiosam, & necessariam doctrinam scriptam reliquit Eucharis Rhodius suo lib. de he-
minis partu, in quo cuiuslibet partus naturalis & non naturalis formas depinxit: nos tamē omni-

Curatio. sis causis, & signis breuitati studentes, & suo ordine curatio-
nem tantum indicabimus. Quando tēpus pariendi accedit
Ante par-
tū victus. vterum gerens vtatur exercitatione moderata, nutriatūre
alimentis facilibus concoctu, & mollientibus, quales sunt
vua passæ sine granis, carica, pruna, vua, butyrum, malua
ius pingue. Balneum quoque ex decocto rerum mollientium
Fotus. est optimum, & necessarium, & fotus partis inferioris vteri
proximæ cuiusmodi sunt malua, bismalua, semen lini, foenu
græcum, vua passæ sine granis, carica, melilotum, & similia

Quæ faci-
lem partū
faciant.
Impedien-
tia partū.

Amet ea quæ partum faciem, cuiusmodi sunt lapi-
smaragdus, iaspis, corallus, storax, radix cyclamini, & radi-
artemisiæ sinistra coxæ alligata. Abstineat ab iis, quæ parti-
impediunt, vt est aer frigidus comprimendo, & intense ca-
lidus vires matris, & foetus dissoluendo. Pyra a tota substan-
tia impediunt partū, etiam si nō comedantur. Cū tempu
pariēdi appropinquat, prægna ambulet pedetētim per loca
decliua, & initio partus bibat ius pinguis gallinæ cū facul-
tate seminis lini, vel foenugræci, addendo parū croci, vel cin-
namomi, & parū vini albi generosi, vel rubri mediocris sub-
statiæ. Partes etiam vētris inferioris, & pudēda hoc vnguen-
to bene calido vngatur. ℥.olei sisamini, & amygdalarū dul-
cium, & de semine lini. an. ʒ. j. vtriusq; dialthææ, hysopi hu-
midæ an. ʒ. ʒ. mucilaginis foenugræci, & seminis lini, an. ʒ. ij.
axungie gallinæ, & anatis an. ʒ. j. croci puluerizati ʒ. ʒ. ce-
ræ. q. s. misce, & fiat vnguentū. Comprimere anhelitū versu
inferiora faciem partū reddit. Lapis aquilæ suspēsus de co-
xa parturientis valēter trahit foetus non solum viuum, sed
mortuum, & secundas ipsas: oportet tamē post partū statim
lapidē amouere à coxa, ne attrahat ad se vterū. Difficilis par-
tus fit vel ob defectum matris, vel vitium foetus, vel secun-
darum. Si vitio parientis, quia nimis crassa sit, vel animo pu-
fillo, aut in experta dolorem, aut suapte natura imbecilla, au-
hab

Iuxta par-
tū victus.

Vnguen-
tum.

Lapis a-
quilæ.

Causæ la-
boriosi par-
tus.

abeat vterum exiguum ob ætatem, aut propter errorem in
 ompositione, aut quia laborat vteri inflammatione, vel a-
 arum partium vtero proximarum. Si ob primam causam,
 nte partum est emacianda ciborum paucitate, & multo la-
 ore, multis vigilis, & curis. Si sit timida, animus addendus
 sit. Si doloribus non assuefacta, validissime spiritum compri-
 nat, & locus vteri superiori vnguento, vel huic simili bene
 ngatur. Si imbecilla sit, optimo iure caponum, vel gallina-
 um, & aqua carniuum, vino bono, & odoribus nutriatur. Si *Curatio*
 ob paruitatem vteri, superiori vngueto, vel oleo cõmuni, vel *per causa-*
 ure pingui, & similibus mollientibus partes pudendæ vngan *rum abs-*
 ur sæpe, bene humectatæ, & mollitæ extendatur satis, & a- *sionem.*
 beriantur in partu. Si ab inflammatione, vel alio vteri morbo
 propriam pete curationem. Si vitio fœtus difficilis reddatur
 partus, quia magnus sit vterus, & pudendū fotu balneo, vn-
 guento vterū mollientium egēt, vt diximus, in exiguo vtero:
 si ob figurā naturæ aduersam, educatur ad naturalē figurā: *Figura na-*
 est enim naturalis figura partus, quādo caput fœtus a prin- *turalis*
 cipio, deinde reliqua mēbra manibus super fœtoribus por- *partus*
 rectis, & capite in neutram partem declinante egrediuntur.
 Proxima huic figura est, quando pedes ambo priores ap-
 parent, & manus non supra femora, sed in sublime erectæ
 fuerint. Aliæ omnes figuræ præter has duas a natura abhor-
 rent, quas omnes Eucharius Rhodio exactissimè suo libro
 demonstravit. Quando igitur est figura naturæ contraria, &
 docta obstetrice habente manus, & digitos longos, & graci-
 les, vel à pastore prudenti, & sene reducatur in primam fi-
 guram naturalem & omnium optimam, vel in secundam ei
 proximam, si figura non naturalis sit ei propinquior. Deinde *Admoni-*
 expectabis partum naturalem, & verbis blādīs bonam spem *tio.*
 fœlicis partus, & masculi, quo omnes ferè mulieres gau-
 dent, dabis: & si opus fuerit, vterū & vias omni arte aperies,
 partūque facilem reddes. Inter alia tamen excitanda est
 sternutatio parienti. Multa sunt præterea, quæ partum faci-
 lem reddunt præter superius dicta, quorum aliqua a multis
 experta, & laudata in præsentia adducam. Si ob fœtus im-
 becillitatem fiat difficilis partus, corroborandus est per re-
 stauratorem matris, de qua superius dictum est, & præter
 illa pariens hoc puluere cum optimo iure corroboranda est: *Pulvis.*
 ℥. cinnamomi electi, cassiæ lignæ, & croci an. ʒ. j. ossium de
 corde cerui, & spicæ an. ʒ. ʒ. ambræ, & musci an. g. x. sacchari
 optimi ad pondus omniū, misce, & fiat pulvis: Dosis scrupu- *Fœtus mor-*
 lus vnus. Si fœtus fuerit mortuus, quod cognosces frigidita- *tui signa.*

Expellen- te ventris inferioris, motu rei grauis ad motū matris, & fœ-
ria mortuū tore narium, & oris matris, hoc potu expelletur: ℥. pulueris
ætum. affæ fœtidæ, & castorei an. ʒ. j. aque fauinæ ʒ. ij. syrupi capil-
li veneris ʒ. j. ʒ. misce, & fiat potus. Hoc quoque medicamē-
tum valenter educit fœtum viuum, & mortuum: in viuo ta-
men educendo mitiora sunt necessaria: ℥. myrrhæ, castorei,
storacis an. ʒ. j. ʒ. cinnamomi, seminis, vel foliorum fauinæ
an. ʒ. j. mellis. q. s. misce, & fiat confectio. Dosis ʒ. ij. cum vino
albo, vel aqua quinque radicum diureticarum, vel alia simi-
li. Hoc medicamentum fœtum expellit, clementius tamen
quam duo superiora: ℥. affæ fœtidæ ʒ. ʒ. rutæ siccæ ʒ. ij. myr-
rhæ ʒ. ij. misce. Dosis ʒ. j. ʒ. cū generoso vino. Lac humanum,
si bibatur, expellit fœtum autore Arnaldo de Villanoua: est
Dictamus enim tutissimum auxilium, & clementissimum. Drachmæ
Euphor- duæ succi dictami, vel pulueris eius cum vino vel aqua cali-
bium. da expellit fœtum sine violentia. Drachma vna euphorbij
Suffitus. abortum inducit, & fœtum violenter extrahit. Suffitus hu-
ius medicamenti frequens, & instrumento conueniente im-
missus educit fœtū viuum, & mortuum: ℥. timiamat. ameos,
opopanacis, galbani, sulphuris viui an. ʒ. ij. cum selle vaccæ
fiant formulæ cicerales, vel ad formam lupinorum: Suffitus
Vngula, vngulæ asini, vel stercoris eiusdem fœtum educit. Suffitus
Et stercus spoliij serpentis similiter fœtum educit. Hi pessi molam vte-
asini, spo- ri dissipant, & expellunt valenter, & fœtum quoque. ℥. ar-
lium ser- moniaci, opopanacis, hellebori nigri, saxifragiæ aristolo-
pentis. chiæ longæ, & rotundæ, pulpæ coloquintidæ an. ʒ. j. succi ru-
Pessi. tæ, cucumeris syluestris, & fellis vaccini an. partes æquales,
terebinthinæ parum misce, & cum lana, vel gossypio fiant
pessi longi. Pessus ex succo rutæ, & scammonio educit fœ-
Succus cal- tum, sed minus valenter quam superiores. Succus gallitrici
litrici. iniectus in vterum sanguinis profluuium illius prohibet,
quod partum laboriosum præcipue post acria medicamen-
ta, sequi sæpe solet. Si ob secundarum crassitiem partus sit
Obsterrix. difficilis, quia nō auelluntur, neque abrumpuntur, obsterrix
prudens digitis propriis, vel forcipibus eas scindat, vt fœtus
egredi possit. Si verò ob earū tenuitatem ante debitum tem-
pus rumpantur, & humor collectus in vtero fluat, & tandem
vulua, & viæ sicciore factæ partum difficilem efficiant, o-
portebit pudendum, & partes iuxta vterum vnguentis, foti-
bus, incessibus, & balneis iam dictis humectare, & vias a-
Ad secun- perire.
dinā expel- Si a partu in vtero secundina derenta sit, summo studio e-
lendam. ducenda est, non tamen subito & violentè, vt multi impe-
riti

riti faciunt: enixa enim fatigata labore partus benignè tractanda est, ne simul anima, & secundina educantur, vel prius anima agatur, multis enim diebus viuunt enixæ non expul-
 sis secūdis, quas potest natura sensim, & multo tempore expellere. Quiescat ergo enixa, & mente cōfirmetur, & statim *Oleum.*
 a parte bibat libram semis olei communis, cum drachma vna croci puluerizati, pōst, vomitu, tussi, sternutatione, & *Vomitus,*
 anhelitus compressione excitetur expultrix facultas ad ex-
 pellendam secundinam. Si tamen his non educatur, enixa *nutritio,*
 nutriatur iure optimo caponum, vel gallinarum, aqua car-
 nis, ouis recentibus, vino optimo, & auibus montanis. Vteri *anhelitus*
 locus in sessibus, vnctionibus, & fotibus renum mollientium
 est parandus, vt dictum est superius in partu difficili. Post,
 quæ fœtum mortuum expellunt, conferunt, qualia sunt su-
 perius dicta, & præter illa, infessus ex decocto foliorū, & gra-
 norum, alliorum, foliorum vsnē (est herba similis vermicu-
 lari sapore salso, ex qua fit sal) camomillæ, & foliorum ebuli
 educit secundinam. Pessus, & vnguentum ex leporis coagu-
 lo, & croco pudendo admotum secundinam educit. Suffitus *Pessus.*
 spoliij serpentis idem præstat, & cataplasma ex eodem spo-
 lio serpentis cū ruta, artemisia, & absinthio coxæ admotum, *Vnguentū*
 & vuluæ secundinam educit. Suffitus vngulæ asinæ, & capræ, *spolium*
 stercoris bubuli, columbini, seminis porri, allij corticis, mi-
 noris pini, hellebori, aristolochiæ longæ, nigellæ, & similium
 educit valenter secundinam. Infessus, vel suffitus, seu euapo-
 ratio ex decocto rutæ, prassij, abrotani cum oleo de lilio ex-
 trahit secundinam. Pessij, & clysteres ex allio, aspalto, assa fœ-
 tida, balsamo, stercore accipitris, galbano, gentiana, serapi-
 no, scammonio, vite alba, ireos, & succo dictami: omnibus
 simul vel aliquo ex his secundinam educunt. Vaciæ duæ suc-
 ci ex aliquo horum medicamentorum valenter educunt se-
 cundinam dictami scilicet, artemisiæ, polilitrichi, petroseli-
 ni prassij, mercurialis, verbenæ, porri, rutæ, pulegij, hyperi-
 conis, & similium. Drachma vna pulueris huius cum vino
 optimo, vel aqua diuretica valenter educit secundinam: ʒ. ʒ.
 myrrhæ, castorei, seminis dauci, dictami, seminis porri, pul-
 ueris lumbricorum terrestrium an. ʒ. ij. misce, & fiat puluis, *Puluis po-*
 qui obtinet principatū in hoc morbo. Balsamum sumptum *terribimus.*
 secundinam expellit, & efficit fœminam sterilem, vt quo-
 rundam fert opinio. *Balsamū.*

De partu laborioso, & secundis detentis.

CAPVT LIX.

x 3

Schol

Scholium.

H Vius rei copiosam.) Ex Gal. 3. de nat. fac. cap. novem mem-
bris plerisque mulieribus perficitur in utero fetus. Vbi nomi-
ne perfecti quis fetus, non generationem, sed eius augmentum intell-
git, quod est finis retentionis uteri. Fetus absolutus, cum iam per
Quomodo fiat par-
tus, nutriti possit 15. de usu par. cap. 7. molique sua molestus sit utero, ma-
nibus & pedibus motis membranam primo internam (quæ ei conti-
gua est) rumpit, & deinde alias: quo tempore posulante usu, os uteri
dilatatatur, à vinculisque absolutus foras procedit suo pondere, & ni-
xi, expulsus etiam ab utero, & matre adiuvante contrahendo muscu-
los abdominis. Unde ad optimum & facilem partem hæc omnia con-
Parvus fa-
cili causa, currens opus est. Primo officium uteri expeditum. Secundo motus fa-
cili causa, tus, quo rumpat membranas: figura eius accommodata, ita ut prius
caput, & deinde totum corpus, manibus ad luteria adhaerentibus egre-
diatur, aut prius pedes, manibus sursum elevatis: numerus etiam fæ-
tus, si unus egrediatur: & ultimo magnitudo mediocris, ut possit per o-
uteri egredi. Tercio necessum est ut membranae fætum obvoluentes, ne-
sint nimis duræ, nec molles. Quarto uteri robur: ultimo robur matri
ad tollerandos dolores, & comprimendū abdominis musculos. Hinc par-
Difficilis tus difficilis varias causas colliges. Prima in uteri ore consistit, quan-
partus va-
ria causa, do angustum est, distortum, tumore affectum, aut aliquam contraxit
duritiem. Secunda, in fetus traua figura, qualis est omnis alia à su-
pradietis: in anisso, aut languido eius motu, cum mortuus est aut im-
becillus: in magnitudine modum excedente; & in numero cum multi fæ-
tus in utero continentur: vixit enim adhuc hoc anno qui est 1579. mu-
Historia
mira. lier Salustia nomine, obesa, & stature humilis, quæ novem vno partu
enixa est, quod non nullis semel, sed bis ei euenisse certissimè scio. Ter-
tia causa est, membranarum durities, quæ difficulter rumpuntur, aut
mollities, ob quam eis ante tempus ruptis egressaque vrina, tempore
partus via non est lubrica, simulque deficit utero humor ipsum ad ex-
pulsionem etiam irritans. Quarta imbecillitas expultricis uteri, quæ
ab intemperie oriri solet. Vltima verò causa, in femina patiente con-
sistit, cum languida est, aut male tollerat labores.

Amnios Si à partu in utero secundina detenta sit.) Tribus membra-
membrana, nis tenuibus obvoluitur fetus, dum est in utero.

Prima quæ eius adhæret cuti. Amnion appellatur, à mollitie. Hæc
veluti sudorem fetus excipit, in quo veluti innatans velitur, ita ut mi-
Allantoi- nus grauis utero sit. Altera subsequitur tenuissima, quæ allantoidem
des mem- nuncupant, à similitudine farciminis quod allas dicitur. Hæc ad reser-
brana, cam est peruia, & ideo facta, ut vrinâ pueri coaccruet. Tertia & ex-
Chorion terna tenuis, sed fortis, reliquas duas & fætum ambit. Hanc Græci cho-
membrana. rion (quod est radicatio) appellant, quia in ipsâ innumera ræna radi-

cahiat

atur. Latini secundam, aut secundas, quia videntur esse secundū domicilium fetus ab utero. Hæc fulcrum est venarum, & arteriarum, quæ tandem in venam umbilici degenerant, & respondet venis, & arteriis uteri, ita ut ora oris adhæreant, quibus fetus utero alligatur. In huius membrane historia, Vesalius duplici nomine reprehendit Galen. Primò quod putarit Galenus hæc membranam ex semine fieri, cum fiat potius ex sanguine, & eius substantia non sit membranosa, sed carnosæ, carni lienis simillima. Secundò, quod dixerit hanc membranam totum fetum obvoluere, cum tantum a mucronata cartilagine, usque ad os pubis fetus obducatur. Malè tamen reprehenditur Galenus à Vesalius, quia chorion membrana ex semine ortum habet, & totum obvoluit reprehendit fatum. Deceptus autem fuit Vesalius, existimans membranam hanc Gal. non esse rem distinctam à substantia carnosæ ei adhærente, quam distinetam esse exprimo de semine, & 4. de usu par. colliges. Hæc ergo est ut Gal. membrana, quæ fetu uterum iam egrosso, aliquando interius remanet, quam oportet extrahere ea ratione, quæ docet auctor.

De ramice, seu hernia. CAP. LX.

Quum peritonæum (quam Arabes membranā sifach *Descriptio.* nominant) qua parte vasis seminariis peruium est, aut laxatur, aut etiam rumpitur, ita ut aliquid vel in inguina, vel in scrotum descendat, ægritudo sit, quæ Græcis cele, Latinis tum ramex, tum hernia dicitur, barbaris ruptura. Porro cum varie hæc affectio contingat: plures enim *Differentiæ* numerantur differentiæ pro corporū, & substantiarum *varie.* ad scrotum, aut ad inguina deuolutarū natura, iis omnibus nomina imponuntur: nam si intestinum descendit, enterocoele, hoc est intestini ramex: si omentum, epiplocele. i. omenti ramex: si aqua, hydrocele, hoc est aquosus ramex: si melancholicus sanguis in vasorum anfractibus colligitur, circocele, id est, varicosus ramex: si spiritus, pneumatocoele, hoc est, flatuosus ramex: denique si caro dura intra testium tunicas increfcit, sarcocele, hoc est, ramex carnosus dicitur.

Fit hoc morbi genus multis de causis: nam quod in ingui- *Causæ.* na, aut in scrotum, tum intestina, tum etiam omentum descendant, perinde ac in enterocoele, & bubonocoele contingit, occasione præbere solent multa: cuiusmodi sunt ictus, saltus, clamor, immensæ alicuius molis sublatio, & quicquid huiusmodi corpori, aut extrinsecus, aut intrinsecus potest accidere: ab his enim causis facile peritonæum aut extenditur, aut laceratur. Communes autem notæ utriq; intestinorum *Notæ.* inquam, & inguinis ramici hæc sunt. Tumor in inguine, vel scroto conspicuus cernitur, & in exercitationibus, itine-

re, spiritus retentione, & aliis occasionebus maior quàm arte apparens, qui si comprimatur, tardè quidam recurrit, celeriter autè rursus deuoluitur. Cæterùm quò diiudices, nun propter peritonæi extentionem ramex sit factus, an propter eiusdem ruptionem animaduertere oportebit, quoties o extentionem peritonæi ramex obortus sit, intestinum non vniuersim, sed particulatim temporis spatio, & ob causa quaslibet deuolui, tumorémque æquabilem, ac profundum apparere intestino, quod deuolutum est, peritonæo constricto, secus sit, quum vniuersim deuoluitur, idque ob causa violentas duntaxat. Tumor præterea immensæ magnitudinis, inæqualisque in cute protinus eminet, quod scilicet intestina extra peritonæum elabuntur. Aquosi ramicis causa simul ac notæ, & differentia apud Aetium lib. 14. & 22. hunc in modum leguntur. Hernia aquosa quandoque ex occulta, quandoque ex manifesta causa contingit, ex occulta quidem quum aquosus humor circa partes corpusculorū, quæ scrotum contexit, ac implicat sanguini admixtus collectus fuerit. Ex manifesta verò, quum ex plaga collisis aut fractis vasis sanguis affluens ad aquosam substantiam transmutatur. Vbi igitur sponte cōstiterit aquosus humor collectus, subflauus, aut suppalidus inuenitur. Vbi verò ex plaga, cruentam, ac fœculētam materiam reperies. Humor autem vel intra rubicundam testiculi pelliculam consistit, vel extra ipsam inter eam & pelliculas adjacentes, vel in propria pellicula velut vesica quædam continetur, atque hoc genus herniam in tunica superagnata vocamus. Aliquando verò duplex hernia oboritur, cum collectio & in rubicunda tunica, & in superagnata consistit: si quidem igitur in pellicula rubicūda humor collectus fuerit, tumor vnius coloris apparet sine dolore, in principio dū adhuc parua est collectio ad contactum cedens: postea verò aucta collectione testiculus humore vndique circūdatus occultatur: at tumor in ambitu extentus ac renitens ad tactum herniæ carnosæ suspicionem imperitis exhibet, possunt tamē tactu discerni: nam hernia carnosa omnino renititur, sed aquosa digitis cedit. Si verò in superagnata tunica humor colligatur, tumor ipse siue magnus, siue paruus fuerit omnino circumscribetur: at si simul quoque in rubicunda tunica collectus fuerit, duo tumores deprehenduntur, alter in superagnata, alter in rubicunda pellicula.

Quod si extra rubicundam pelliculam collectio fiat, testiculus tactui occurrit. Cæterùm ab hernia aquosa differt hernia

hernia intestinorum, quoniam in aquosa tumor eiusdem per-
nitus magnitudinis semper, & quolibet corporis situ persi-
stet: neque enim humores velut intestina transferuntur. In-
guen præterea in hernia aquosa secundum naturam se ha-
bet, qua nota vel maximè aquosa ab omenti hernia distin-
guitur: nam in hernia omenti semper in scroto omentum
persistit, neque vnquam transfertur, id quod etiam in aquo-
sa contingit. Verùm in omenti hernia inguen rarefactum
deprehenditur. Atque hæc de ramice sunt satis: nam quæ
de aliis speciebus dici poterant, cum vix ex iis, quæ supradic-
ta sunt patere possint, superuacaneum esset hîc scribere:
qui plenior tamen disputationem desiderant, adeant Ae-
tij librum 14. & Galeni medendi methodum.

Flatuoſa hernia curatur primò, victu calſaciente ægri, & *Curatio*
nutricis si fuerit infans: secundò dissipantibus flatum inter- *flatuosa.*
nis, & externis, qualia sunt rosata nouella, armoniacum, ro-
satum, diacyminum, diagalanga, dianthos, electuarium de *Infans.*
baccis lauri. Infans, qui non potest omnia medicamenta ne-
cessaria sumere, cum lacteumat semen fœniculi, vel anisum
mansum, vel parum aquæ nasæ, & parti affectæ admoueat
carica affata cum puluere cymini, vel carui, vel arancium
affatum cum eodem puluere, vel mel parum decoctum cum
stercore bubulo. Si æger fuerit puer, iuuenis, vel senex va-
lentioribus eget, de quibus cap. 31. de curatione inbecillita-
tis ventriculi.

Aquosa hernia curatur primò victu calido & exiccante, *Aquosa.*
de quo diximus cap. 44. de curatione hydropis.

Secundò, apparantibus humorem aquosum, vt rhodo-
melle, oxymelle simp. syrupo de duabus radicibus, & aliis di-
ctis cap. 1. & multis aliis locis.

Tertiò, phlegmagogis: vt agarico, puluere heræ simp.
turbis, diaphanicon, & aliis, de quibus eodem 1. capit. sed
frequenter oportet purgare pilulis elephanginis, & de hiera
simp. & agarico trochiscato: quia euacuant sine molestia.

Quartò, dissipantibus flatum medicamentis internis &
externis dictis cap. 44. de curatione ascitæ. Vitimò verò o-
mnis aqua euacuanda est filo transfixo in scroto, qua emissa
ulcera exiccantibus, & glutinantibus sunt curanda, adhiben-
do tamen medicamenta partibus primò affectis, vt hepatis,
lien, & aliis.

Carnosa hernia, si antiqua non fuerit. & minùs dura, cu- *Carnosa.*
ratur rebus emollientibus, & dissipantibus carnem, vt hoc
præcedenti tamen debita victus ratione & corporis purga-
tione

DE CVRAND. MORB.

tionē: ℥. i. g. i. t. oleorum camomillæ, anethi, sesamini, & amygdalarum luleium an. 3. j. mucilaginis seminis lini, & fœnugræci. an. 3. j. pulueris rosæ nouellæ, camomillæ, & croci an. 3. j. s. empastri de meliloto, quod sufficit, misce, & fiat vnguentum. Vtrumque diachylon cum armoniaco hanc herniam longo amen tempore dissoluit.

Varicosa. Varicosa hernia non sine magna difficultate curatur. Primò, victu dicto cap. 9. de melancholia. Secundò, apparantibus atrum humorem conuenientibus medicamentis, de quibus eodem cap. 9. Tertiò, vacuantibus, vt confectione diasenæ, cōfectione medicaminis hamec sero caprino, epithymo, pilulis de fumo terre, Indis, & de lapide laxuli. Quartò, mollicantibus, & dissipantibus, vt medicamentis dictis superius in curatione carnosæ herniæ.

Aliarum specierum curatio difficilis. Vltimò verò varices eximantur more cancrorum ferro candenti, quamuis hoc opus non ab omnibus ferri possit. Alij omnes nodi, & differentiæ earum, quæ fiunt ex laxato dydimo, aut rupto peritonæo, siue omētum decidat, siue intestinum in infantibus, & pueris sunt faciliores curatu, præsertim si recentes fuerint: antiquæ enim sine opere manuum non possunt curari.

Intestina. Hernia, quæ curatur primò victu adstringente, & glutinoso, de quo cap. 28. de curatione sputi sanguinis, & somno, & quiete, si quæque cibi flatuosi, vehementis, saltus, & clamoris. Postea si intestinum fuerit extra peritonæum agro resupinato, sublati cruribus sensim reducatu intestinum ad locum proprium, nisi stercus, vel flatus hoc impediatur, quo tempore flatus est dissipandus iam dictis, & stercus mollius factum fotibus, vnguentis suppositoriis, & balneis ex butyro, muscilagine fœnugræci, seminis lini, oleo sisamino, & amygdalarum luleium est euacuandum: intestino tamen in scro-


Clyster periculosus habentibus intestinum extra. tum lapsò, vel extra peritonæum iniectione clysteris est suspecta, & maximè timenda: quum multi nostris temporibus sine voce subito perierint excepto clystere post motum intestinum à proprio loco, ad quem reduci non potest plenum postea substantia clysteris.

Intestino ad locum suum reducto à chirurgo docto, & prudenti, conserua ipsum idoneis instrumentis, & ligaturis. Scissuram quoque astringe, id tamen fiet a viris in hoc in lapidibus à vesica extrahendis exercitatis, & probatis. Et incisioni impone medicamenta glutinantia, & constringentia, vt emplastrum contra rupturam in omni regione satis cognitum, & ab omnibus pharmacopolis confectū. Hoc quoque est

Opus per Quando supradictis auxiliis hernia non curatur, oportet
instrumē- ad opus chirurgicum aggredi. Aliqui partem, per quam di-
ta. scendit intestinum, contrahunt ferro candenti: alij caustici
potentia admouēt: ab aliis acu perforatur, & meatus astrin-
gitur, ne intestinum vel omentum descendat. Sed quia ac-
modum difficile est laxationem, vel peritonæi incisionem
antiquam curare sine testis extractione, ab erudito, & in hoc
exercitato diu viro testis, vel testes cum dyndimo abscin-
dantur, & extrahantur, cuius modum & formam Paulus li-
bro 6. cap. 62. & Albumasis scripserunt.

De Hernia. CAP. LX.

Scholium.

 Vum peritonæum.) Ramicis differentia, quædam à lo-
co, & quædam à materia tumorem efficiente desumuntur.
A loco cum humor est in inguine, qui dicitur bubunocèle, au-
scroto, & appellatur ocheocèle. A materia, si sit aqua, dicitur hydro-
cèle. Qui sua tentione carnosam herniam repræsentat, quod ex testis
Varia her pelluciditate (quæ in aquosa apparet) in loco obscuro accensa cere-
niarum candela, distingues. Si sit flatus, appellatur pneumatocèle, in quo ra-
species cõ- mico etsi testis lumine appposito sit perlucidus, est tamen testis lenior,
numera- quàm in supradicto. Si sit caro, sarcocèle nominatur, qui tumor est du-
tur. rus, & longus formam habens testiculi, & qui longo tempore sensim
increuit. Fit à carne duriori, in aliqua scroti parte nata, aut ut voluit
Gal. ab schirro, per schirrum non eum, qui ab humore, sed carnem du-
ram intelligens. Si sit varix, cirsocele nominatur, qui ramex à tumore
venarum nutriendum testiculum fit. Quem cognoscimus ex inæqua-
litate, quæ tactu sentitur in multis exiguis extuberantiis apparenti-
bus. Si intestinum enterocèle dicitur. Vbi per intestinum non intelli-
gitur rectum, quod cum relaxatur, in anum delabatur, neque colon,
ab ileo solo quia hoc renibus adhæret, neque ieiunum aut duodenum, quia hæc sub-
limiora sunt, sed ileon, ut recte docuit Paulus. Hic ramex cognoscetur
ex tumore molli repente nato, augetur clamore, & multo cibo, & in eo
tactu sæpe deprehenduntur indurata excrementa. Si tandem ramex
fiat ab omento tanquam ex materia, appellatur epiplocèle. Quem co-
gnosces ex tumore peritæo, eodem modo semper apparente tactuque mol-
liusculam senties substantiam. Hunc ramicem non admittit Vallesius
2. epy. sec. 1. comm. 19. deceptus à Vesallio, qui omentum usque ad pu-
berem non posse descendere scribit. Iacotius duas hernias, quæ veræ non
sunt, sed apparentes tantum describit. Quarum una est, cum transla-
tus est testis ad inguen: Altera cum ex vehementi imaginatione in li-
bidinosis colligitur semine inter iunicas testiculi. Difficile tamē videtur,
imò

est impossibile, testem posse in regione inguinis sibi cavitatem parere: sicut & alterum quod de semine scribit, cum nulla pateat semina, per quam intra membranas possit colligi. In ramice intestinali, omentali, morbus est in situ. In aliis morbus est intemperies cum fluxu humoris, hoc est tumor præter naturam. Reliqua ex auctore re.

De Arthritide. CAP. LXI.

Arthritis tunc fit, cum in vniuersum omnes corporis articuli propter alienum à natura humorem confluentem dolor occupat. Latini hunc morbum articulare appellat, barbari arthreticam passionem: verum animaduertere oportet arthritidem, podagram, & ischiadem affectiones esse genere easdem loco tantum differre, cum alioqui vna sit communis omnium origo: est enim arthritis, cum in omnibus articulis dolor insidet, podagram in pedibus tantum, quemadmodum chiragra cum manus obsederit dolor. Ischias autem cum eam iuncturam, quam Græci ischiam, Latini coxam nominant. Quare non breuiter fuerit, nobis præsertim, qui breuitati studemus, harum omnium affectionum curationem hoc cap. comprehendere: metum de arthritide caput tantum inscribatur. Fit autem arthritis multis de causis, quarum quædam internæ sunt, quædam externæ. Externæ sunt casus, percussio, corporis immodica exercitatio, vt lucta, cursus, aliæque id genus, præsertim si statim a cibo fiant, articulorum præterea luxationes, & quicquid extra incidens articulos ita potest debilitare, vt ad recipiendos deriuatos aliunde humores idonei sint: inter quæ veneris immoderatus vsus, & solitæ exercitationis intermissio numerantur. Mærores præterea, curæ & vigiliæ, cæteræque animi perturbationes ex eorum genere sunt, quæ arthritidem, podagram, & cæteras articulares affectiones possunt efficere, non modò quod corpus imbecillius redant, sed quòd noxios quoque humores procreent. Inter alia quoque, quæ maxime hanc affectionem inducunt, sunt assidue cruditates, crapulæ, & eorum alimentorum vsus, quæ & difficilia costu sunt, & pituitosos insuper humores generant. Docet hoc Galen. comm. 28. lib. 6. aphor. dicens, ætate quidem Hippo. pauci podagra laborabant propter vitæ moderantiam, nostris verò temporibus vsque adeo auctis eduliis, vt nihil addi posse videatur, infinita est podagrarum copia, cum nonnulli sint, qui non exercentur, & cruditatibus atque ebrietate obruuntur, & ante cibum assumptum bibunt.

Descriptio.

Species.

Causæ.

Quare tē

pore Hip-

pocratis

pauci la-

borabant

arthritide.

DE CVRAND. MORB.

bunt vina generosa, ac venere vtuntur immoderata: nonnulli vero etsi non in his omnibus, in aliquibus saltem eorum, quæ dicta sunt, delinquant, sed cum peccatum fuerit magnum, sæpius in vno eorum, quæ diximus deliquisse satis erit. Ob hanc igitur causam etiam eunuchi podagra corripiuntur, quamuis non vtantur venere: talis enim est eorum desidia, insatiabilitas ebrietasque, vt etiam sine vene-

*Galen. vi-
dit eunu-
chos labo-
rantes po-
dagra &
non pue-
ros: nostro
tempore
visus est
puer poda-
gra labo-
rans.*

reorum vsu podagra possint corripi. Confirmans hanc sententiam Gal. com. 30. eiusdem libri, eunuchos, inquit, itaque videmus quosdam podagra laborantes, pueros vero non vidimus: quia illis venus non nocet, nec vitæ immoderantia in cibis ob caloris copiam: sed ego vidi, quod Hippo. & Galen. non viderunt, nobilem videlicet puerum septem, aut octo annos natum Vallesium laborantem non tantum podagra, sed arthritide vere & autumno, cui non fuit hæreditarius morbus articularis, & satis ille biliosus erat. Vfus etiam vreticorum præsertim a cibo multo, & difficili concoctu hanc generat affectionem. Compertum quoque est vini meracioris præsertim vetusti, assiduum vsum huius affectionis causam quam maximam esse: ac proinde medicorum omnium decreto huic malo obnoxius vini vsu quamprimum interdicitur. Sed neque silendum erit, quod sæpe a parentibus hoc vitium in posteros dimanarit, vnde hæreditarij morbi esse consueuerunt arthritidis, & podagra, quod nec diffitetur Gale. 6. apho. com. iam dicto 28. multos dicens laborare podagra, quod auos & patres podagricos habuerint. Porro internæ causæ sunt humorum multitudo, aliquando sanguineorum, biliosorum nonnunquam, atque melancholicorum: frequentius tamen crudorum, atque pituitosorum: qui articularum cavitates replentes tumores & dolores, quales in inflammationibus reperiuntur, excitant: quam rem plurimum iuuat tum articularum ad recipiendum propter imbecillitatem aptitudo, tum cæterorum membrorum ad expellendum fortitudo, quo fit, vt qui in vniuersum causas colligere vellet, in tria genera partiretur, humorum, inquam, copiam, articularum imbecillitatem, & cæterorum membrorum robur: hoc tamen admonere vellem prius quam ad signorum enarrationem, & curationem deueniatur, frigidos, crassos, & pituitosos humores ad ipsos articulos facile deferri non posse, & neruorum compactæ substantiæ insinuari, nisi ab aliquo humore, cuiusmodi est bilis, deducantur, cuius beneficio fit, vt tametsi crassi consistentia sint, angustissimos tamen meatus permeent tenuissimo scilicet humore

*Morbus
hæredita-
rius.
Causæ in-
terne.
Tria sunt
causarum
genera
huius mor-
bi.*

Bilis vis.

viam

iam aperiente. Vnde veræ curandi methodi præceptum est medicamentis, quæ ad hos humores vacuandos propinâtur, liquidum misceri debere, quod bilem educat. Signis, quibus *Note,* morbus cognoscitur, non est opus, cum vel dolor ipse articulis innitens morbi speciem statim exprimat. Causæ verò humores scilicet abundâtes, quicunque sint, sive biliosi, sanguinei, melancholici, aut pituitosi: nam procatarcticæ causæ ex ægrotantis sermonibus sunt petendæ, & per traditas superius methodos, maxime cap. de cephalalgia dignoscuntur. Cum Paulo verò Aegineta hunc in modum inuestigabis, libet autem verba eius hic subscribere. Variæ itaque sunt *Paulus* affectionis huius, ceu dictum est, causæ: humorum tamen *Aegineas* negotium facientium differentia haud difficulter locis quibus impacti sunt perspicuæ redduntur, tum coloribus, tum cæteris accidentibus prodita. Biliosus namque fluxus colore sublurido, & rufo deprehenditur. Idem caloris insuper sensum ingerit, cruciatumque acerbiorē efficit, & protinus ad supremam cutem circa amplum tumorem erumpit, calidarum rerum imposito magis exacerbat, quemadmodum e diuerso dolorificis placatur: quod quidem cæteris ferre omnibus magna ex parte, peculiariter verò aliis biliosis euenit. Febris item sepe numero in accessionum summis vigoribus accedit, valdeque sitibundi redduntur. Consimili modo, & in melancholicis atrioris coloris corpus deprehendas, sicut in pituitosis album & aquosum corpus cernitur, vnde minus cruciantur, & seriùs tument particula: perinde atque si sanguineus humor in corpore abundat, cruentum colorem membra præferunt. Sed ad exactiorem iudicationem iuuabit te superior victus ratio, &c.

Dolor iuncturarum a causa calida cum humore curatur *Curatio* sex remediõrum generibus. Primò, victu tenui, & refrigerante, *calida.* & calidorum abstinentia, præsertim vini & veneris: hæc enim in causa etiam frigida nocent.

Secundò, phlebotomia partis opposita: vt in arthritide dextræ manus, venam cubiti sinistri secamus, & in podagra dextri pedis venam cubiti dextri incidimus: quamuis aliqui cum Galeno venam poplitis sinistris secandam esse volunt. In dolore tamen iuncturæ dextræ coxæ (a Græcis dicitur ischias) vena poplitis dextri est secanda, vt Galen. ostendit in libello de curandi ratione per sanguinis missionem, & in plerisque aliis locis. Multi initio, & corpore pleno existente venam cubiti eiusdem partis secant, quod Galenus visus est docere 10. de cõpositione medicamentorum secundum locos.

Tertiò

DE CVRAND. MORB.

Tertiò, remittentibus sanguinis feruorem frigidis & astringentibus, v. syrupis rosarum, granatorum, myrtillorum, cydoniorum cum dupla aqua portulacæ, plantaginis, aceto-

Quando va- sæ, & solari per tres, aut quatuor dies: in dolore tamen ma-
cuadus est gno absque syrupis, & concoctione euacuanda est bilis: quã-
humor uis non sit turgida proprie, nam quemadmodum in vehe-
absque cõmentissimo colore narcotica sunt necessaria, quæ dolorem
coctione in non auferendo causam curant, ita coacte vacuandus est hu-
hoc sym- mor dolorem pariens vehementem sine concoctione, quia
promate maius est auxilium nocumento.

Quartò vacuantibus bilem, vt pilulis hermodactylorum minorum à drachma vna ad scrupulos quatuor, vel drachmis quatuor electuarij de succo rosarum, aut diaprunis solutiui.

Adina. Quintò, anodynis, à quibus incipiendum aliquando est, & repellentibus, vt cassia fistulari dissoluta in oleo rosato, farina hordei, mucilagine psyllij, vel cydoniorum extracta aqua rosarum, & pauco aceto ad penetrandum magis, vel succo, aut aqua solani, plantaginis, vel portulacæ. Prodest quoque panis medulla, lacte macerata, & parum cocta addendo vitellos duos ouorum, & oleum rosatum, cum quo vermes terreni sint cocti, frigidum applicetur. Hæc omnia dum calescunt, sunt mutanda, & sæpe. Si dolor est intolerabilis, prædictis addes opij drachmam vnā, croci ad penetrationem parum. Hoc cataplasma est optimum in doloribus iuncturarum intolerabilibus à causa calida: ℞. farinæ hordei sine furfure, & medullæ panis. an. p. ij. foliorum iusticiamini, maluarum, & violarum an. m. j. florum camomillæ & corticis papaueris albi. an. p. j. Ex his decoctis fiat cataplasma addendo oleorum lumbricorum, & papaueris. an. ʒ. j. opij, & croci. an. ʒ. ʒ.

Cataplas- trationem parum. Hoc cataplasma est optimum in dolori-
ma ad ma- bus iuncturarum intolerabilibus à causa calida: ℞. farinæ
gnum do- hordei sine furfure, & medullæ panis. an. p. ij. foliorum iust-
lorem. quiamini, maluarum, & violarum an. m. j. florum camomillæ
Disipatia & corticis papaueris albi. an. p. j. Ex his decoctis fiat cata-
decoctum. plasma addendo oleorum lumbricorum, & papaueris. an. ʒ. j. opij, & croci. an. ʒ. ʒ.

Sextò, dissipantibus id, quod fluxum est, vt oleo camomillæ, de lilio, anethi, decocto camomillæ, radicis althææ fœnugræci, & meliloti, vino austero facto, vel aqua marina stercore vaccino, vel hoc, aut simili vnguento: ℞. olei camomillæ ʒ. ij. olei de lilio & de semine lini an. ʒ. j. mucilaginis fœnugræci, & seminis althææ an. ʒ. ij. pul. rosatæ nouellæ, & stercoris bubuli an. ʒ. j. ʒ. ceræ. q. s. misce, & fiat vnguentum.

Frigida. Arthritis à causa frigida pituitosa curatur primò victu pa-
Vinum. rum calido cum astrictione, quare vinum in ea nocet, quia crudos humores ad iuncturas trahit, in quibus, vt & in nervis facile in acetum cõvertitur. Bibat ergo laborans ex hoc dolore aquam cinnamomi, vel decoctum seminis fœniculi,

vel

el anisi. Quod si vinum valenter appetat, sit rubrum, & aringens, vt Saguntinum, & aqua multa dilutum.

Secundo, apparantibus pituitam, vt rhodomelle cum a- *Admonitio*
uis, aut decocto fœniculi, melissæ, & similibus, dummodò *tio*
alentia diuretica non sumantur, præcipue ante purgatio-
em, quia humores ad iuncturas ducerentur, & ideò calculo-
num, aut vesicæ affecti ex vsu longo diureticorum in ar-
tritidem incidunt.

Tertio, vacuantibus pituitam à iuncturis, vt drachma v-
a pilularum hermodactylorum maiorū ad scrupulos qua-
tor, vel drachmis quinque diacarthami ad drachmas sex. *Frequens*
in hac causa, quia est diurnus dolor, bis, vel ter in mense *Purgatio*
at vacuatio per has pilulas: ℞. pilularū artheticarū maio- *Pilula*
rum, & agarici trochiscati an. 3. j. turbit electi 3. ij. diagridij
primi 3. j. cum aqua vix arthetica fiant pilulæ triginta: *Confectio*
pro dosi tres. Vel si non potest transglutire pilulas, hæc mix-
tura fiet: ℞. diacatholiconis 3. j. ʒ. diacarthami 3. j. agarici
trochiscati, & turbit electi an. 3. ij. conseruæ buglossæ 3. iij.
pulueris rosarū nouellæ 3. j. ʒ. rhodomellis q. s. misce, & fiat
confectio. Dosis, cochlearium vnum qualibet hebdomada. *Admonitio*
in hac, & in omni materia arthritidis utilis, & necessaria est in præser-
uacuo in vere per sanguinis missionem, & per medica- *uatiōe*
nenta purgantia, etiam si non actu dolore efficiantur, vt do-
cet Hippocrates aphoris. quadragesimoseptimo lib. 6. & Ga-
enus in comment.

Quartò, dolorem sedantibus statim principio adhiben-
tis, vt oleo camomillæ, oleo lumbricorum, de terebinthina,
de semine lini, de lilio, de vulpe, & similibus. Cataplasma ex *Quæ hunc*
arina camomillæ, meliloti, fœnugræco, semine lini, & pul- *tollunt do-*
uere stercoris vaccini cum oleis supradictis valde sedat do- *lorem.*
lorem. Cataplasma ex mucilagine seminis fœnugræci extra-
cta cum aceto, & aqua cum melle est probatum, & efficax
auxilium, si per tres dies hæreat loco dolenti.

Quintò, dissipantibus, corroborantibus, & resoluentibus *Dissipantia*
moderate, ne tenui dissoluto crassum duritiem lapideam sus-
cipiat. Hæc omnia quoque dolorem mitigant, qualia sunt
licta in quarto genere auxiliorum, & hoc vnguentum: ℞. o-
eorum camomillæ, vulpini, & de lilio an. 3. j. vnguenti Ara-
gon, & marciaton an. 3. ʒ. mucilaginis seminis fœnugræci, &
seminis lini, an. 3. iij. pulueris mastichis, & rosarum an. 3. ʒ.
teræ q. s. misce, & fiat vnguentum. Præstantissimum quoque *Præstanti-*
est partes dolentes ab hac frigida materia oblinere sæpe adipe *tissimum*
anseris pinguis exenterati & farti lumbricis terrestribus, fœ- *auxilium*

DE CVRAND. MORB.

nugræco, croco, terebinthina, confuti & tolli. Secundus a
 deps, qui defluit in vas aceto albo plenum est melior fotus
 & balneum ex decocto camomillæ, meliloti, fœnugræci, y
 uæ arthetica, roris marini, seminis lini cum aqua falsa, ve
 qua chalybs, aut ferrum candens exstinguitur, est efficax re
 medium. Longus vsus pilularum terebinthinæ abietis de
 thina laus cics lotæ cum aqua yuæ arthetica curat hanc arthritiden
 antiquam, si curabilis est, quia soluere nodosam nescit me
 dicina podagram. Dosis tertio quoque die tres magnitudi
 Lignum ne ciceris. Potus aquæ ligni guaiaci per triginta, vel qua
 guaiacum draginta dies euacuato corpore solet curare hanc antiquam
 arthritidem: muta tamen eius facultatem secundum varian
 Ischias va naturam ægri & morbi. Dolor iuncturæ coxæ, quæ a Græci
 lentioribus dicitur ischias, & a barbaris sciatica, valentioribus indige
 curatur. remediis propter huius iuncturæ magnitudinē, qualia sunt
 pyrethrum, costum, nasturtium, sinapis, nitrum, stercus bu
 bulum, ciconiæ, & leporis. Cataplasma ex his omnibus, ve
 aliquibus cum oleo scorpionum, vulpino, & foliis lauri, ru
 tæ, cyclamini, & squillæ est optimum, vel vnguentum. Ca
 taplasma ex pice, sulphure admotum huic magnæ iuncturæ
 antiquam ischiadem curat. Aliquando sunt necessaria maxi
 mē attrahentia, & quæ vesicas efficiunt & adurunt, vt et
 Vrtica. cataplasma ex foliis vrticæ bis in die loco dolenti admotū, po
 lauetur locus decocto saluæ, & roris marini cum aqua falsa
 Cataplas- Cataplasma ex ruta viridi, & scordeon cum pinguedine
 ma. porci, & aceto valet multum sua facultate in hoc morbo
 Cucumer Maioris vis est cataplasma ex radice cucumeris syluestris cu
 syluestris. pinguedine suilla, vel ex alio. Hoc etiam est optimum & ex
 Aliud va- pertum: ℞. absynthij, radice ebuli, fursuris ana. p. j. stercori
 lentius. colubini ℥. j. & β. salis cōmunis ℥. j. omnia in aceto decoqua
 Canthari- tur, & fiat cataplasma, vel fiat ex sinapi, & ficis. Omnium qu
 des. diximus est potissimum cataplasma ex cantharidibus & fer
 mento, & staphisagria factum, a quo fiant vesicæ, quæ aper
 tæ per dies aliquot conseruentur foliis brassicæ, vel fermento,
 Mel ana- to, & pinguedine porci. Cataplasma ex melle anacardonum
 cardorum. est valens causticum in hoc probatum a quodam doctissimo
 medico, fit hoc modo. Anacardi pisti infundantur in aceto
 per septem dies, postea sensim, & igne paucō decoquantur
 donec tertia pars consumatur. Post caloris absentiam, quod
 supernatat, collige, quia illud est mel anacardonum anti
 Expertum quorum.
 & potens Sapiientissimus quidam medicus multos suo tempore la
 auxilium. borantes coxendico dolore curauit, & vnum affectum eo
 per

per annos decem & octo caustico facto ex capitulo vine cal-
is, & aluminis, cuius crusta butyro, vel axungia porci non
alita est amouenda: deinde locus apertus a docto chirurgo
est conseruandus salsa carne, vel ligno busti per sex menses,
ut possit materia per vlcus euacuari.

Aliqui medici satis eruditi igne actu aperiunt locum su- *Ignis.*
ra iuncturam, primo, & secundo supra coxam, & tertio sub
enu: semper tamen particularia auxilia sequantur vacua- *Admoni-*
ones totius corporis: quamuis tutius esset, si sex digitos *tio.*
infra iuncturam dolentem aperiretur locus igne, & apertus
per aliquot menses conseruaretur. Sed si de his auxiliis o-
mnibus pyroticis perfectam, & integram doctrinam accipe-
re cupis, lege caput quintum libri tertij Iacobi Hollerij de *Hollerij*
materia chirurgica.

De Arthritide. CAP. LXI.

Scholium.

A Rthritis tunc fit.) *Ut quæ in hoc scholio dicenda sunt,*
recte intelligantur, supponere oportet. Primò articulum esse
naturalem ossium compositionem; ad motum voluntarium *Quid ar-*
factam. Secundò, in articulis cum caput vnius ossis, ingrediatur cavi- *ticulus.*
tatem alterius, maximam esse in hac re varietatem; quia aliquando
caput ossis magnum est, & cavitatis profunda ut in coxæ articulatione
videmus: aliquando verò caput in superficiariam cavitatem recipitur,
ut in articulationibus digitorum. Tertiò ex articulis, aliquos habere
multas partes suprapositas, ut est supradictus coxæ articulus, qui ha-
bet musculos tibiæ, femoris, membranam carnosam, cutem, nervos, &
tendones, aliquos nudos esse, quales sunt illi, qui in manibus & pedi-
bus sunt. His suppositis ad arthritim descendamus, quæ nomen assu-
psit à symptomate, & loco affecto. Est enim dolor articulorum, non *Quid ar-*
quolibet, sed factus à fluxione humoris. Cum diximus arthritim *thritis:*
esse articulorum dolorem, intelligimus aut omnium, aut multorum.
Quare si in vno articulo est dolor, etsi à fluxione humoris fiat, non
arthritim, sed articuli dolorem appellamus: nisi in manu, pede, &
ischio, ubi dolor hic proprio nomine dicitur chiragra, podagra, & is-
chias. Arthritis est symptoma sensus tactus, actio scilicet eius de-
prauata. Morbus, ad quem sequitur, est tumor præter naturam ar-
ticulorum, distendens partes in eis contentas. Aduerte tamen hunc
tumorem factum à fluxione humoris, esse distinctum à veris tumori-
bus: non enim tumor continetur in poris partium similariis (nam
sequeretur ad arthritim conuulsio nervo aut tendone distento) sed
in cavitatibus articuli, aut iuxta articulum, à quo supra posita corpora,

quæ vim habent sentiendi, distenduntur, & ita dolent. Unde morbus hic erit referendus ad tumorem præter naturam, ut ex 6. aphor. com-
 Causa pri- men. 49. colliges. Hic autem tumor fit à dualibus causis. Prima est im-
 ma arthri becillitas articuli, quæ in epi à natura habeat, imbecillior tamen se-
 tidis. pso reddi potest, aut in prima conformatione, cum à semine languido
 formatur: & ideò aliquando arthritidis videtur morbus hæreditarius:
 aut secundò, extra uterum, cum intemperiem aliquam validam con-
 traxit. Secunda causa est fluxio humoris ad articulos. Fluxio duas
 causa. habet causas. Una est plethora, siue sit ad vires, siue ad vasa: altera est
 Iacotius cachochymia: ab his enim solet natura aggravari & irritari. Neque
 labitur. Iacotius recte sentit, cum scribit, arthritim fieri sensim in articulo con-
 gesto humore ob malam partis nutritionem: hæc enim non erit arthri-
 tis, cum neque à sanguine, neque ab alio humore naturali fiat. Hu-
 mor enim, qui sensim coacervatur, sensim etiam mutat naturam, ut in
 atheromate & meliceride videmus. Neque in morbo gallico fit ar-
 thritis ex congestione sine tumore, ut voluit Rondoletius. Quia si hu-
 mor in articulo inclusus non facit tumorem, neque distentionem effi-
 ciet, ac proinde non erit arthritidis, in qua ob distentionem excitatur do-
 lor in articulo. Dices, in arthritide cuius partis distensio excitat do-
 lorem? Rondoletius respondet, ligamentum esse duplex, unum quod ab
 osse ortum habet, & hoc non sentire, alterum à periostio, & hoc sen-
 sum habere, & ideò huius ligamenti distentionem in arthritide dolo-
 ris esse causam. Decipitur tamen, quia ligamentum ex periostio or-
 tum in nulla corporis parte reperitur. Verum quidem est, aliquando
 tendonem vicem habere ligamenti, ut in lato tendone in genu ap-
 paret.

Quæ pars Dicendum ergo est supra articulos transire nervos & tendones
 doleat in musculorum, qui dolent à tumore distenti, ut constat ex 6. aphor. com.
 arthritide. 49. hæc enim partes acutè sentiunt, nervus, quia defert vim sentien-
 A melan- di, endo verò, quia fit ex fibris nervorum. Humorem facientem arthri-
 cholia ra- tim ex multis cognoscet, ex natura agri, ex colore articuli, doloris sen-
 rò fit ar- su, iuvantibus & nocentibus. Arthritidis à melancholia rarò fit, & i-
 thritis. deo non describimus eius notas, ut in plurimum tamen fit à pituita,
 quia articuli pituitoso sanguine nutriuntur, quæ etsi non fluat, & do-
 lorem non efficiat sua frigiditate sensum auferens articuli, tamen
 mixtam cum sanguine aut bile fluere ad articulos experimur, frigi-
 Quibus ditatæque eius retusa tensione dolorem efficere. Cognoscemus arthriti-
 signis ar- dem ortum habere ex pituita ex natura pituitosa, colore articuli albi-
 thritidis cante, dolore obtuso & persenerante, & quòd lædatur à frigidis, &
 causæ co- quòd talem habuerit victus rationem qua multam pituitam genera-
 gnoscatur. nit, & ultimò quia singulis diebus habet accessionem. Cognoscemus ar-
 thritim fieri ex sanguine, ex natura agri, si sanguinea sit, ex rubore
 articuli simul cum gravi dolore, addo simul, quia signum ex rubore
 artic

articuli in principio arthritidis non habet magnam vim: ex antea cō-
 ita, si multum sanguinem generauit. Si arthritidis fiat ex bile, cogno-
 scetur ex natura ægri biliosa, ex colore articuli ad flauum tendente,
 ex dolore acuto rei pungenti simili, præcessit ratio victus bilem gene-
 ans, & exacerbationes doloris fiunt de tertio in tertium. Arthritidis
 quo plures afficiet articulos, aut maiores, maiorem arguet causam,
 quo pauciores, minorem.

Dolor iuncturarum à causa calida.) Etiam si à bilioso humore
 oriatur arthritidis, non tamen solus est, sed permixtus cum pituita, &
 deò vide, ne nimius sis in frigidis alimentis.

Secundò, phlebotomia.) In dolore Arthritico semper secanda In arthri-
 est vena, idque non semel, nec bis solum, sed aliquando ter, quater, & tunc sem-
 decies, & amplius, si opus fuerit, inspecto virium robore, quod consen- per san-
 tit: & fluxione quæ est affectus postulans euacuationem omnium guis mit-
 humorum, quoniam hi fluunt ad locum tumore affectum, ac proinde tendus.
 reuellendi sunt. Ex loco autem affecto collige vtendi modum in san- Locus affe-
 guinis missione. Si enim omnes articuli afficiantur, secabis basilicam Etus locum
 dextram, aut sinistram. Si articuli dextri brachii affecti sint, ex sin- sanguinis
 stro euacuabis, & contrà. Si sit podagra dextri pedis, seca venam bra- mittendi
 chii dextri, aut pedis sinistri, quia hæ partes eandem habent vasorum demonstrat.
 rectitudinem cum loco affecto. Si dolor sit in coxendice, distinguendum
 est: nam in principio, quia scopus reuulsivus magis vrget, ex brachio
 eodem secabimus venam, aut ex altero crure, potissimum in mulieri-
 bus, in quibus suppressi sunt menses: tunc enim reuellemus, & eua-
 cuabimus ex parte, magis tamen reuellemus. Quòd si in principio, ex
 eodem pede venam secare ausi fuerimus, magis attrahemus humore, (deorsum
 impetum habentem) ad partem affectam. Facta reuulsione victus
 quando iam humor ex parte euacuandus est, quod indicat affectus sa-
 qualis. Etus, tum ex eodem pede secanda est vena.

Tertiò, remittentibus sanguinis feruorem.) Non est quod
 his frigidis & adstringentibus vtaris, quia hæc neque fluxionem si-
 stent, & causam arthritidis augebunt, quoniam plures humores cru- Purgatiua
 dos generabunt, qui semper solent esse arthritidis causa.

Quartò, euacuantibus bilem.) Non est euacuanda sola bilis,
 sed opus est permiscere Agaricum, aut diaphæniconem ob pituitam.

Quintò, Anodynus.) Dolor aliquando vrget, quando scilicet
 deicit vires, aut auget affectum, & tunc trahit ad se curationem 12.
 metho. cap. 1. Quòd si aliquando Gal. dicit symptoma indicare curatio-
 nem, cum affectui officit: per affectum tunc non morbum, sed sanita- Quando
 tem intelligit, quæ continetur etiam in genere affectus, vt patet ex anodinis
 Galen. 1. de diff. morb. Si ergo in arthritide ex dolore sequatur noxa vtendum,
 in viribus, cum sedabimus anodinis medicamentis, quæ nec multum
 calida sunt, quoniam hæc reddunt humorem coctum difficilem. Vt etis

DE CVRAND. MORB.

ergo cataplasmate ex lacte cum croco & pane constructo, aut ex floribus & sapa addito rosaceo, aut oleo de lateribus, aut alio tenuium partium quod rarij sternat anodyna facultati. Quod si vehementissimis sit dolor, solent medici ad philonium persicuni, & alia narcotica tendunt. quæ anodyna improprie dicuntur, descendere. Existimo autem ego melius esse abstinere ab his, quia si ingentissimus est dolor, signum est fieri a sanguine bilioso, is autem, cum tenuis sit, cito feretur ad cutem, tendones & nervos sine tensione relinquens. At opium & alia narcotica bilem impingendo, & impediendo eius motum ad externa longiorem dolorem efficient, nisi ad tempus ipsum sedent.

Arthritis a causa frigida.) Esi pituita sit arthritidis causa, semper tamen cum ea permixta est aliqua portio humoris biliosi, ut supra docuimus. Hoc loco autor exhibet alimenta aliquantulum adstringentia, alii non solum alimenta adstringentia perscribunt, sed cum medicamentis attenuantibus adstringentia miscent, ne attenuantia humorem ducant ad locum affectum, qui videntur ignorare occasionem exhibendi attenuantia: nam non est utendum eis, nisi sedata fluxione.

Purgans Tertio, euacuantibus pituitam.) Cum medicamentis pituitam purgantibus misce quæ euacuent bilem hoc modo: ℞. Syrupi rosarum Alexandrinarum ex nouem infusionibus. ℥. iiii. Electuarij de succo rosarum, & diaphaniconis an. ℥. iiii. cum decocto communi fiat potio. Possumus purgare pilulis de fumo terræ, aggregatiuis, & arthriticis: neque in hoc affectu sufficit semel purgare, & sic per intervalla possumus purgare pilulis, aut confectione aliqua, aut sumentes ℥. ii. terebentine prout purgauerit aucta aut diminuta quantitate.

Curatio arthritidis, turam referatur, eadem ratione curabitur, qua tumor in principio, & qualis tentes repellentibus medicamentis, quod potissimum præstabimus in mori præarthritide à bilioso humore facta perfundentes articulum aqua frizer natu- gida 5. aphorif. sen. 25. ubi Gal. in commentario duplici nomine aquam ram, dolorem sedare scribit. Primò quia doloris causam remouet repellendo. Secundo, quia sua frigidaitate sensum torpidum efficit, quod idem scribit Galenus decimo de comp. secundum locos. Neque existimes in

In ischia- arthritide semper repellendum esse, quia si dolor sit in ischiade, non lide cur non cet repellentibus uti, quia cum hic articulus tegatur à multis musculis, repellentium medicamentorum vis ad articulum non perueniet, & repellentis augebimus affectum, quia ex venis per partes suprapositas disseminabimus. tis repellemus humorem ad articulum. Neque utendum est repellentibus.

In critica tibus in arthritide critica, quia in febre melius est humorem ad articulum fluere, quam ad partem principem. Neque repellendum est cum & in ea in ex parte principe sit fluxio, nisi fiat ad partem, quæ habeat insignem quæ pars usum, qualis est oculus, tunc enim repellentibus utemur: quod non fa- princeps ciemus, si fluxus humor ad articulos, quia magnum incommodum est ferri hum

humores ad partem principem. At si ex venis ad articulos fluat humor, humorem
 ista reuulsione repellentibus venitur, nullum enim sequitur incom-
 modum, imò humor ad venas repulsus concoquetur. Hoc loco Galenus ait, ne re-
 bi videtur contrarius, quia ut diximus ex IO. de comp. secundum lo-
 pus, & 5. aph. in arthritide repellere licet: at libro secundo de hominis
 natura commentario II. in fine contrarium videtur sentire. Iam (in-
 nit) non raro cum in morbo articulari & podagra artus humores pe- Galenus
 erent, & illinc repulsi in principem aliquam partem inuasissent, ab iniuria
 morte conspeximus hominem affectum esse, vnamque restare spem sã vindica-
 tis, si ad artus retrahere eos valeamus: Hæc Galenus. Vbi videtur tur.
 sentire ex articulis non esse repellendos humores. Respondeo repellere
 & corroborare esse res distinctas: corroboramus enim in sanitate,
 robor addentes parti, ne recipiat: repellimus verò in morbis hu-
 morem fluentem ad partem, & eum, qui iam fluxit. Iam nobis non
 licet articulos roborare, ne recipiant, quoniam sunt partes langui-
 dæ, ad quas melius est humorem fluere, quàm ad aliquam, quæ necessa-
 ria est: possumus tamen repellere ex articulis facta prius reuul-
 sione, eo modo quo supra diximus, quod idem in cute etiam
 efficitur. Ex his facile liberatur Galenus à contra-
 dictione, quia in libro de hominis natura de re-
 pulsione, quæ medicamentis robo-
 rantibus articulus fit,
 loquitur.

FINIS PRIMI LIBRI.

Y 4



PETRI PAVLI PEREDÆ

S E T A B E N S I,

Doct̃oris Medici: & apud Valentiños
publici medicinæ professoris, in ij.

lib. Michaëlis Ioan. Paschalij

de curatione Febrium,

Schol̃ia.

*De Febre sanguinea, seu continentia, quam syno-
chum cum putredine appellant.*

C A P V T I,

Definitio.

Diuisio.



Yñochos Græcis continens Latī-
nis, est febris, in qua vna accessio ab
initio ad finem perpetuò manens in
multos dies porrigitur. Hæc duplex
est, altera sine putredine, quæ simi-
lis est diariæ, de qua in præsentia
non agimus, cum raro medicus ad
curandas diarias vocetur: quomodo
autem solus sanguis non putris fe-
brim efficere possit, quando calidus, & humidus existens
putredini magis expositus videtur, non est hoc loco & tem-
pore explicandum. Altera est synochus cum putredine,
de qua nunc agimus, cuius tres sunt differentiæ. Nam quæ-
dam à principio ad finem æquali magnitudine perdurant,
has Græci omotonas vocant, in eodem vigore permanen-
tes: alia enim tria tempora occulta sunt: quædam verò sem-
per augmentur, eas Græci acmafticas, id est, incrementū su-
scipientes, aut inualescentes nominant, principium, vigor,
& declinatio in his occulta sunt, quemadmodum in vlti-
mis tria tempora priora. Aliæ paulatim diminuuntur, & de-
cresc

rescunt, paracmasticas, hoc est decrefcentes appellant: de
 s fufius Galen. 9. method. & lib. 2. de differentiis febrium,
 p. 2. lib. 2. de crisi bus cap. 7. agit. Quare fallitur Auicennas, *Error A-*
 edens Galenum negasse dari febrem sanguineam putri- *uicennæ.*
 um. Fit synochus ex putredine ciborum multorum, & san- *Causæ.*
 lineorum, multa exercitatione, præsertim a cibo & vere,
 iuvene carnofo: otium immodicum auget sanguinem, &
 umores omnes, a quibus in valis maximis potissimum (que
 rea alas & inguina existunt) putrescentibus synochus hæc
 eri solet, præcipue si obstructions adsint, quas Venus gi-
 nit a cibo, & ebrietas. Signa huius febris ponuntur a Ga- *Notæ.*
 lio 9. methodi, quæ multa sunt, rubor scilicet faciei ma-
 nus, & totius corporis somnus immodicus, calor magnus,
 ui acrior est eo, qui sequitur synochum sine putredine, mi-
 us tamen mordax, quam in ardenti. Pulsus iis maximus, ve-
 mens, celer, creber, & inæqualis, tamen si cum aliis febris
 us putridis comparatur: Urina rubra & crassa.

Curatur hæc sex remediorum generibus. Primò, victu fri *Curatio.*
 ido & humido, minus tamen humido, quam biliosæ febres,
 tenui, vt succo malorum granatorum, cremore hordei, la- *Victus.*
 e amygdalarum dulcium, cichorea, lactuca cocta, si ventri-
 culus est imbecillus, vel cruda cum aceto & saccharo, si est
 alidus, carne cydoniorum saccharo condita, radice buglos-
 e saccharo condita, pyris, & malis cotoneis assatis, pane lo-
 o. Si facultas sit imbecilla, vel post sanguinis missionem, &
 ias vacationes, nutriatur iure, & carne pulli gallinacei
 refrigeratis agresta, acetosa, hordeo decorticato, semper ta-
 men considerata est natura agri, ætas, regio, consuetudo,
 anni tempus in quantitate, qualitate, & numero cibi su-
 mendi, vt Hippocrates docet 17. aphorismo primi libri. Po-
 us sit aqua hordei, & in declinatione vinum album bene di-
 utum, præsertim si ventriculus fuerit imbecillus.

Secundo, secta basilica dextra, & misso sanguine vsque ad *Sectio re-*
 nimi deliquium, si vires adsint: ego semper nostris tempo- *ne.*
 bus extraho sanguinem non semel, sed bis aut ter, & quan- *Observa-*
 oque quæter vno, vel duobus diebus: numerus tamen die- *tio.*
 um non est semper inspiciendus. In hac tamen febre a prin-
 pio oportet mittere sanguinem, ita tamen vt respondeat
 lenitudini, & robori virium. Ante tamen sanguinis missio-
 em si non times subitam suffocationem, & semel in ipso
 uoque febris die hoc aut simili clystere alius lenienda est, *Clyster.*
 intestina purganda: ℥. foliorum maluarum, violarum, &
 ercurialis an. m. j. furfuris, & hordei sine cortice, an. p. j. fiat
 decoct

DE CVRAND. MORB.

decoctum, de quo percolato accipe lb. j. & ʒ. iij. cui adde cassia fistulæ præparatæ, & diacatholiconis. an. ʒ. ij. misce, & fiat clyster.

Potus aquæ frigida. Tertiò, potu magno aquæ frigida, qui Galeno autore method. post sanguinis missionem in hac febre maximum est præsidium, nisi quæ illum impendant, æger habeat, vt sunt tumor, partis principis obstructio, magna inflammatio, & imbecillitas alicuius visceris, defectus caloris innati, & n.

Impedientia potum aquæ frigida. tura contraria potui aquæ frigida: solet enim potus multus aquæ frigida hanc febrem præsertim non putrem & pituitam quoque post sanguinis missionem, & humoris bilio concoctionem curare sudore, vel ventris profluuiio, vel aliquando febrem hanc & ardētem in pituitosam mutare: quod autem modo id fiat, non est præsentis instituti, nec sanguinis nec bilis possunt in pituitam verti, cum coctum non possit fieri crudum.

Concoctio. Quarto, concoquentibus, refrigerantibus, & bilis, quæ sunt ex sanguine tenuiori, acrimoniam remittentibus, vt syrupus granatorum, acetosæ. S. violarum, rosarum, & endiuia S. & comp. & similia cum aquis, vel decocto duplo endiuia, cichoreæ, acetosæ, scariolæ, & similia sumptis per duos vel tres dies.

Purgatio. Quintò, vacuantibus bilem, vt cassia fistulari, tamarindis, rhabarbaro, myrobalanis citrinis, manna, diaprunis solut. & electuario de succo rosarum. vt ℞. medullæ cassiæ fistulæ recens extractæ, & medullæ tamarindorum an. ʒ. ss. infusionis rhabarbari in aqua endiuia per noctem factæ ʒ. j. squinanti ʒ. iij. diaprunis solut. ʒ. iij. syrupi violarum ʒ. j. decocti florum cordialium q. s. misce, & fiat potus: vel si est diuresis, ℞. mannæ electæ ʒ. j. ss. rhabarbari electi infusi per noctem in aqua endiuia, deinde eiecta substantia ʒ. iij. decocti florum cordialium q. s. misce, & fiat potus. Si tamen abhorret liquida medicamenta purgantia: ℞. pilularum de rhabarbaro ʒ. j. cum aqua cichoreæ fiant pilulæ septem, & aurentur. Sed ego in hac, & in aliis biliosis, non laudo pilulas: quia præterquam quod omne medicamentum purgans (autore Galeno comm. 24. primi aphorism.) per se calfacit vehementer, forma pilularum magis calfaciet propter siccitatem coniunctam, quæ simul cum caliditate non potest minui, quemadmodum in mixta cum syrupo, & decocto, & cassia, & tamarindis in potibus fieri solet. Quare post potiones magis laudo bolos, seu bucellas: vt ℞. rhabarbari electi pulverizati, & pauca aqua endiuia madefacti ʒ. vj. sacchari.

Pilulæ. horret liquida medicamenta purgantia: ℞. pilularum de rhabarbaro ʒ. j. cum aqua cichoreæ fiant pilulæ septem, & aurentur. Sed ego in hac, & in aliis biliosis, non laudo pilulas: quia præterquam quod omne medicamentum purgans (autore Galeno comm. 24. primi aphorism.) per se calfacit vehementer, forma pilularum magis calfaciet propter siccitatem coniunctam, quæ simul cum caliditate non potest minui, quemadmodum in mixta cum syrupo, & decocto, & cassia, & tamarindis in potibus fieri solet. Quare post potiones magis laudo bolos, seu bucellas: vt ℞. rhabarbari electi pulverizati, & pauca aqua endiuia madefacti ʒ. vj. sacchari.

ari. q. s. misce, & fiant boli quinque vel septem: & ideo in
s, & biliosis febribus medicamenta purgantia valenter, &
salubria etiam castigata nocent, vt est scammonium, co- *Quæ no-*
cynthis, helleborus, & similia: solebat dicere eruditissimus *ceant.*
ornamira, medicos eis in his febribus videntes non esse cu- *Dictum*
tores, sed interfectores. *Tornami-*

Sexto, refrigerantibus, & corroborantibus cor, iecur, & ra.
otum corpus internis & externis, vt electuario diatrium *Alteratio*
santalorum, diarhodonis Abbatis, diamargaritonis frigidi, *et corrobo-*
onserua rosarum, conserua violarum: vel hoc electuario: ratio.

℞. pulueris diatrium santalorum 3. ij. pulueris diamargari-
tonis frigidi 3. j. conseruæ acetosæ 3. iiii. sacchari dissoluti in
qua rosarum q. s. misce, & fiat electuarium in tabellis pon- *Sumendæ*
ere 3. ij. Dosis quolibet mane 3. iiii. cum 3. iiii. aquæ cicho- *electuariis*
eæ, vel acetosæ, vel endiuæ, vel decocti hordei sine cortice, *cum aquis.*
el cum vino albo bene aqua diluto. Cordi sæpe admouea- *Admonē-*
ur hoc epithema tepidum, vel actu frigidum in æstate, & *da cordi.*

egro iuvene: ℞. aquæ rosarum 3. iiii. aquæ acetosæ, & bu-
glossæ. an. 3. ij. aquæ melissæ 3. ij. pulueris diamargaritonis
frigidi, & trochiscorum de camphora. an. 3. j. misce, & fiat e-
pithema cordi admouendum omni tempore ante & post va-
cuationes, quia cor non potest obstructione affici. Hoc vn- *Epithemæ*
guentum bis admoueat cordi, quod in omnibus febribus *Unguenti*
biliosis, & pestilentibus est optimum, eoque Carpetani me- *biliosis, &*
dici vtuntur, & est Gainerij: ℞. olei nenupharis 3. iij. pulue- *pestilenti-*
ris nenupharis 3. ij. santalorum rubrorum, seminis acetosæ, *bus febr-*
coralli rubri præparati. an. 3. j. margaritarum electarum, of- *bris.*
fis ex corde cerui. an. 3. ss. camphoræ. ʒ. iij. misce, & fiat vn-

guentum. Hepati bis in die ventriculo vacuo admoueat *Hepati e-*
vnguentum santalatum, vel cerotum santalatum & hoc e- *pithema.*
pithema tepidum: ℞. aquæ endiuæ, & cichoreæ, an. 3. ij. a-
quæ rosarum, & absinthij, an. 3. ij. santalorum rubrorum 3.
ij. spodij 3. j. acetæ rosati cochlearium vnum, misce, & fiat e-
pithema. Balneum aquæ tepidæ in hoc genere auxiliorum *Balneum*
est optimum huic, & aliis febribus, præsertim hæcticæ, vt di-
cemus capite octauo huius libri. Totum enim corpus refri-
gerat, & reliquias materiæ resoluit.

De febre Diaria, & Synocho.

CAPVT I.

Scholium.

Synoch

Quid fe-
bris.

SYnochos Græcis, continēs Latīnis.) Febris est inten-
peries calida, in toto corpore, aut saltem pluribus, aut pro-
cipuis partibus existens, & actionem ladens. In hac defi-
nitione, intemperies est genus, quo communicat febris cum aliis intem-
periebus. Reliqua, quæ in definitione continentur, differentie sunt. Cū
dicimus hanc intemperiem esse calidam, separamus eam ab aliis tri-
bus intemperiebus frigida, sicca & humida, cū eam collocamus
toto corpore, separamus febrem ab intemperie calida vnius partis. Vlti-
mo definitionis membro, febris distinguitur ab aliis intemperiebus
quæ includuntur intra limites sanitatis. Singulæ partes istius defini-
tionis breuiter explicandæ veniunt. In primis febris est intemperies ca-
lida, vt Gal. lib. de causis morborum, & 6. aph. com. 16. & aliis locis.

An febris docet. Qua in re videtur contrarius sibi, & Hippocrati. Sibi contra-
fit intempe- rius est, quia 2. acutorum com. 24. calorem febrilem siccum, et 1. aph-
ries sicca. com. 16. febrem passionem calidam siccam nominat. Vnde febris non
in solo calore, sed simul cum siccitate consistet. Hippocrati contraria-
tur, quia hic supradicto aphorismo victum humidum febricitanti
Controuer- bus consulit, sentiens febrem esse affectum siccum. Respondeo febrem
sia solutio. solum esse positum in calore præter naturam, neque coniunctam ha-
bere siccitatem. Quod vltimum confirmat Vallesius, quia si aliquis
vtatur victu humido, ita vt factus sit humidior quàm pro natura,
& febricitet, tunc febris sine siccitate erit. Non tamen est, quod his
& similibus vtamur argumentis, cū facillimū habeamus, & quod
multum vrget. Argumentum huiusmodi est, si febris essentia in siccita-
tate etiam est posita, ergo omnis febris coniunctum habebit maras-
mum, sed hoc est falsum, ergo & primum. Maior nota est, quia ma-
rasmus nihil aliud est, quàm intemperies sicca morbofa totius. Assum-
ptionem falsam esse, experientia docet. Ad argumenta facile erit sa-
tisfacere. Ad Gal. qui febrem appellat passionem siccam, & calorem
siccum: Respondeo, in febre semper esse siccitatem, quia immoderata
caliditas ex accidenti consumendo humidum eam sibi adsciscit, hæc
tamen non est morbofa, sicut neque ea quæ est in homine bilioso. Quid
Vallesius ad Hippocratem? Vallesius sentit Hippocratem in febribus victum
taxatur. humidum imperare, præcautionis gratia: Quod nobis non placet, quia
in febribus solent phrenitis, lethargus, & alia symptomata frequen-
Cur Hipp. ter euenire, quæ à nobis non præuidentur, quia non contingunt neces-
febricitan- sario: cur ergo marasimum, qui rarissimè in febribus euenit, præcaue-
ribus impe- bit Hippocrates? Dicendum ergo est Hippocr. victum humidum impe-
rar victu rare febricitantibus, propter calorem, quia humiditas eum obtundit,
humidum. sicut siccitas acuit. Secundo febrem dicimus esse in toto corpore, quia
Febris in quum intemperies calida sit in corde, quod fons est caloris, & à quo
toto corpo- calidum partium fouetur, non est mirum, si affecto principio omnes
re. partes afficiantur. Hoc autem intelligendum est, si nihil impediatur,
quod

ad propter typhiam & epialam dicimus. Hoc considerans Gal. 6. e-
 .part. 1. com. 29. in febribus calorem in toto corpore, aut saltem præ-
 cis, aut pluribus partibus collocat. Ultima definitionis pars calorem
 rilem morbosum & præter naturam esse demonstrat. Huius enim Calor fe-
 bris proprium est omnia corrumpere, & naturalium actionum or-
 brilis mor-
 em perturbare. Vbi per actiones naturales, eas quæ secundum na-
 am sunt, intelligimus, quæ animales et naturales comprehendunt, Quæ actio
 tamē, ut in febribus actiones naturales potissimum lædatur, & inter nes lædan-
 illa, quæ cocotrix appellatur. Dices, nonne in febribus saltem dia-
 tur in fe-
 s, imaginatio, ratio, & memoria sæpe illesæ seruantur? Respondeo tribus.
 per lædi, quia non ita recte, neque tanto tēpore exercentur actiones
 edictæ, ac in sanitate. Neque hoc mirandum est, quia in febribus Obiectio.
 trumentum commune la sum est, nempe calidum innatum. Tum e-
 m, quia febris morbus est omnium partium.

Differētiæ

His positis, differentiæ febrium tradendæ sunt: quarum quædam febrium.
 nt essentielles, quædam accidentales. Essentiales illæ sunt, quæ ex es-
 Essentiales
 uia febris (qui calor est) desumuntur. Quæ tres sunt: Prima desu-
 febrium
 itur ex qualitate caloris: Secunda ex motu: & tertia ex eius subie-
 differētiæ
 . Ex qualitate caloris, febres appellantur magnæ, aut parvæ: siue tres.
 opriè loquentes intensæ, & remissæ. De his loquitur Hipp. 6. epyd. Prima.
 nt. 29. cum scribit febres quasdam esse statim ardentes, & quasdam Secunda.
 biles. Ex motu pendent illæ febres, quas Hip. eodem loco, primò mi-
 Tertia.
 s, deinde incrementales, & aliis è conuerso statuit. Ex materia diuidi-
 Ex quali-
 r febris, in diariam, putridam, & hecticam. Diaria dicitur illa, in
 tate caloris
 ia calor factus est in spiritibus. Putrida, in qua in humoribus, ia differētiæ
 ex eorum putredine ortus sit. Hæctica verò in qua in partibus soli-
 ex motu.
 s (hoc est quæ consistentiam habent) calor factus est, at in humoribus Differ. ex
 ~ spiritibus inferi. Differentiæ febrium ex qualitate & motu calo-
 materia.
 s desumptæ à materia pendent, quia calor in materia sicca intensus Diaria.
 oparet, at in humida remissus: in materia tenui celeriter mouetur, in Putrida.
 assa tardè. Et ideo has omittimus differentiæ, & eas, quæ ex mate-
 Hæctica.
 a sumuntur, appellamus essentielles, quia variam postulant curatio-
 Omnes fe-
 em, & cum finis sit ratio formalis artis, variam finem istius partis brium dif-
 eratiæ in medicina, qui est curare morbos. Differentiæ febrium, quæ ferentiæ re-
 accidentales appellari solent, sumuntur ex accidenti proximo, aut re-
 uocantur
 toto. Ex accidenti proximo, cum ex colore febrem diuidimus, quia ta-
 ad differē.
 s in cute efflorescit color, qualis est humor, qui redundat. Hac ratione ex mater.
 Hippocr. supradicto loco, 6. epyd. febris prærubræ, præpallidæ, & lini-
 cur differ.
 e meminit, ubi in rubris & pallidis utimur dictione præ, quia illi co-
 ex mat. di-
 res, nisi sint valde intensi, non sunt mali, contra quàm accadat in lini-
 cūtur essen-
 o colore, qui malus semper est, etsi non sit valde intensus. Ex acciden-
 tiales.
 remoto variæ etiam febrium differentiæ sumi solent: Quæ sunt, fe-
 Differ. ac-
 ris longa, & brevis, nocturna, & diurna: continua, & intermittens, cūctales.

&

DE CVRAND. MORB.

Differētiæ & aliæ similes. Ex his omnibus febrium differentiis, eas, quæ ex acci-
febrium ex dēi ortū habent, omittimus, tum etiam quæ ex motu, & qualitate ex-
accidenti hris desumuntur, solūque disputare instituimus de his differenti-
remoto. febris, quæ à materia pendent, de putridis, scilicet & hēctica propri-
capitibus, præsenti autem loco de diaria, de qua autor non disputamus
agere nos instituimus.

Febris dia Febris diaria aut est exquisita, aut non exquisita. Febris diaria ex-
ria exqui- quisita illa est, quæ ex calefactis spiritibus ortū habens, per spatium
sita. unius diei (hoc est vigintiquatuor horarum) perdurat, siue ortum ha-
Non ex- beat à causa externa affectum in corpore relinquire, siue non relin-
quisita dia quente affectū. Quod dico propter Menam & alios, qui eam febrem
ria. diariam, quæ ex causa externa, affectum aliquem in corpore relin-
quente ortum habet, diariam minus exactam appellant. Non exqui-
sita diaria est illa, quæ ex vaporibus ab humoribus calidis eleuatis fit.

Quæ media est inter diariam, & putridam: Communicat enim cum
diaria, quia non fit ex putredine humorum, neque ex caliditate facta
in partibus solidis: cum putrida verò communicat, quia ex calefactis
humoribus ortum habet. Ex his diariis, quædam appellantur Synochi
non putres, in quibus feruet sanguis in vasis ab ira exercitatione, aut
alia causa, à cuius vaporibus cor calefit. De his febribus agi Gale-
nus nono method. capite 1. & 2. Aliæ sunt diariæ ortæ ex leui obstru-
ctione cutis, in his hominibus, in quibus acres sunt humores 9. meth.
cap. 4. In eis enim calidi vapores eleuati cor calefaciunt, & inde fit fe-
bris diaria. Hæ febres facile mutantur in putridas, aucta obstruc-
tione, nisi præcautione vitamur, sanguinis missione reuellentes humores.

An detur Solent medici hoc in loco querere, An detur febris diaria ex putredi-
diaria ex ne spiritus. Hæc controuersia ex hac altera pendit: An possint spiritus
putredine putrescere. Vallesius cōstanter affirmat spiritus posse putrescere. Quod
spirituum probat primò autoritate Aristotelis 4. lib. meth. cap. 1. ubi scribit o-
Vallesi- mnia putrescere præter ignem. At spiritus non est ignis, ergo putrescet.
sententia. Secundò, aer potest putrescere, ergo & spiritus. Antecedens experien-
Pri. Val- tia docet, in pestilenti constitutione. Consequentiam probat ex Galeno,
lesii. qui in libro, An sang. in art. contineatur, spiritum esse aere crassiorem
scribit, ac proinde oculis videri. Quod autem crassior sit, ostendit, quia
fit concoctione ex ipso aere, at coctio incrassat. Ego tamen constantis-
sententia- simè assero, spiritum non posse putrescere. Quod cōfirmo ex natura rei,
cōtra Val- quia ad putredinem obstructio requiritur, quam nunquam faciet spi-
lesium. ritus, tenuissimus cum sit, & facile diffletur. Quod consideras Gal. 1.
de diff. feb. cap. 7. febrem diariam exemplo lapidum, & aliorum, quæ
alterari possunt, & non putrescere, demonstrant. Præterea, ad putre-
dinem requiritur quies, quam spiritus nō habet. Adde materiam pu-
tredinis esse humiditatem excrementitiā, quæ in spiritibus non repe-

Solutio ritur, cum ad igneam accedant naturam. Rationes Vallesii nil conclu-
dunt

nt. Prima enim ostendit, ipsum non recte aduertisse ea, quæ docet prima ratio Aristot. 4. metheo. cap. 1. Eo enim in loco non sentit omnia alia corruptionis Val ab igne putrescere: non enim ignorat Arist. ferrum, lapidem, elementes in terrenum, quod summe siccum est, non putrescere, sicut nec alia similia corpora, quæ multum sicca sunt. Non ergo erit hæc bona consequentia, ex Aristotele omnia putrescere possunt præter ignem, ergo virtus putrescent. Ad Aristotelem ex serie contextus respondendum est, in eo enim cap. 1. agit de generatione, quam dicit fieri à calido & frigido, quia calidum frigido temperatum (quod est calidum innatum) generationem efficit, permiscendo humidum cum sicco. Et ita igneum elementum est agens, quod permiscet, at alia elementa sunt materia ignis, quia cum miscentur, ab eo patiuntur: & ideo possunt putrescere, cum ignis victus non potest gubernare mixtionem, cum autem vincit, non fit putredo: unde ignis non potest putrescere, quia est agens, bene alia, quæ sunt materia ipsius, videat ergo Vallesius, quam longe à mente Aristotelis proponat propositionem, quæ simpliciter prolata falsa est, nisi contextus antecedentia & consequentia aduertamus. Ad secundam rationem respondeo, negando consequentiam. In cuius confirmatione duo affirmat Vallesius. Primum est, ex Galeno spiritum esse crassiores aere: Secundum, spiritum videri: Quæ duo Solutio falsa sunt. Primum, quia spiritus est crassior, non aere, ut vult Vallesius, sed æthere (ut eo loco ait Galenus) hoc est aere purissimo, ex rationis quo fit: nam ex tenuissima aeris parte, & vaporis sanguinis etiam spiritus tenui parte, spiritus generationem obtinet in corde, concoctione: quæ, non est crassa, etiam si incrasset, non proinde dicendum est spiritum esse crassiores aere, sed fieri aere, tenuissima aeris parte, ex qua generatur. Unde hæc consequentia non valet, aer putrescit, ergo & spiritus. Quia aer quicquid potest esse in uno loco, habetque continuitatem, & humiditatem, & sic potest putrescere: quæ omnia deficiunt spiritui, ut diximus. Secundum, quod spiritus Vallesius scribit, nempe ex Galeno spiritum videri, quod & omnes non video affirmare video: ostendit ipsos per transennam legisse illum libellum, tur. cui titulus est, An sanguis in arteriis contineatur, in quo Galenus contra Erasistratum disputans probat, spiritum solum, non contineri in arteriis hac prima ratione. Si spiritus solus in arteriis contineretur, videremus eum exire, ergo solus non continetur. Propositionem confirmamus, quia si videremus eum exire, id colligeremus ex coincidentia arteriarum. Quod similitudine possumus ostendere in vire, in cuius compressione solemus dicere, nos videre aerem ex eo egredi. Respondebant sectatores Erasistrati Galeno, non est necessarium nos videre exire spiritum ex arteriis, quia tenuis, & levis est spiritus, & sic facile expirat. Contra hos disputat, ea ratione, qua diximus ex compressione desumpta. Videant ergo, qui spiritum videri ex Galeno affirmant, quantum à veritate aberrant: aliud enim est dicere videri spiritum

spiritum, & aliud videre spiritum exire, hoc enim vltimum signo p-
dicto possumus intelligere. Iam si tam acutè vident, vt eis non latet
spiritus, dicant mihi eius colorem, aut ipsum ostendant mihi, hoc eni-
sensu, non ratione debet probari.

Febrem diariam aliqui in varias differentias diuidunt, pro var-
tate spirituum, qui aut sunt vitales, aut animales. Non considerant
Differetie spiritum vitale solum in corde calefactum efficere diariam. Dicendum
diariarū. ergo est, febrem diariam vnicam esse, neque posse in varias differen-
tias partiiri, cum spiritus vitalis vnicus tantum sit: at cum pro caus-
rum varietate, curatio diariæ varietur, differentia diariæ ex causis
vris desumendæ erunt. Diaria semper fit a causis externis, in quibus
opus est considerare, an sint præsentēs, an non, tum an febrem efficiant
Causæ præ affectum aliquem in corpore generando, vel sine affectu. Si causæ præ-
sentes in- sistentes sunt curationem indicant, non autem, si sunt absentes. Si causæ
dicant. affectum aliquem efficiunt, vt frigus, & balneum aluminosum densi-
tatem cuius, ablatis causis non ad febrem, sed ad curationem affectus
veniendum erit. Si verò nullus sit affectus, diariam curabimus, vt ma-
nifestum est in illa, quæ fit ex ira, & exercitatione. Et ita cum Gal. 8
method. in fine, diariam conuenire cum hectica scribit, intelligit de dia-
ria, cuius causa nullum affectum in corpore generauit, hæc enim cu-
ratur alteratione, sicut & hectica.

Signa com Signa febrium diariarum quadam sunt communia, quedam verò
munia dia propria. Communia omnibus diariis conueniunt, quæ traduntur à Ga-
liarum. leno primo de differen. febr. cap. 8. Propria signa sunt illa, quæ causas
Signa pro- particulares febrium diariarum rationem, refrigerationem, cruditi-
pria. tatem, iram, tristitiam, bubonem, vini potum, & alias similes demon-
strant: de quibus agit Galen. 1. de arte curat. ad Glauconem, & 2. Cri-
seon cap. vltimo. Ex quibus locis hæc omnia pete, neque enim animus
est transcribendi ea, quæ rectè à Galeno sunt explicata, vt multi face-
re solent, eo solum nomine, vt chartas impleant, & aucti voluminis
auctores videantur.

Methodus De febribus putridis iam cum auctore agendum est, sed antequàm
ad curan- particularem earum curationem agrediamur, æquum erit breuiter
das febres methodum generalem proponere, quæ id præstare possumus. Primò er-
putres. go aduertendum est, in omnibus febribus putridis, hos septem affectus
7. affectus reperiri. Primus est febris, 2. putredo, 3. prohibita transpiratio, 4. obstru-
febris pu- ctio, 5. humoris multitudo, 6. humoris crassities, 7. humoris glutinosi-
tride. tas. Vnde febris varias habet causas antecedentes, quarum quedam
solum sunt causæ, vt putredo, & fluxio humoris multi, crassi, aut glu-
tinosi. Prohibita transpiratio est symptom. & causa putredinis. Ob-
structio est morbus, & causa putredinis. Hæc febrium causæ aliquan-
do omnes sunt præsentēs, aliquando non omnes. Præsentēs sunt omnes,
cum febris est in principio, tunc enim est fluxio humoris, obstructio,
proh

Prohibita transpiratio, & putredo. Nō autem sunt omnes causæ præ-
 tes, cum febris est in aliis temporibus: nam in augmento februm
 deficit fluxio, sicut in statu fluxio & obstructio non sunt, in de-
 natione verò sola est putredo (sicut in statu) sed iam euacuatur. Se-
 cundo aduertendum est, omnes febres putres conuenire in putredine,
 ferre autem pro varia putredinis differentia ex loco, seu foco putre-
 nis desumpta. Putredo enim vel est in toto corpore, aut maximis putredinis
 asis, ut in febre syncho, vel est in vna tantum parte. Rursus hæc pu-
 tredo, quæ in vna consistit parte, vel est cum Phlegmone, vel citra de in cu-
 plegmone: si est sine phlegmone, pars illa, quæ obstructiōnem ha-
 et, in qua putrescit humor, dicitur focus putredinis. Si humor pu-
 ret in toto corpore, febris ex eo orta caret accessionibus. Si verò in v-
 na tantum parte putreat, particulares circuitus efficit: simulque fe-
 rem continuam, aut intermittentem: continuam, si humor putrefa-
 ctus in foco, ob eius multitudinem, aut facultatis expultricis imbecil-
 itatem, intra vasa continetur: intermittentem verò si propter causas
 contrarias, per habitum corporis expellatur. Hæc omnia considera-
 mus, propter curationem, quia cum in syncho, non sint circuitus, ho-
 ra consueta cibabimus ægrotum, non sic in aliis febribus, quæ circui-
 tum habent, in quibus in hora accessionis abstinentum est ab alimen-
 to, nisi urgeat aliqua occasio: ut si vires concidant, qua ratione 8. me-
 thod. biliosi aliquando in hora accessionis cibantur. Tum in syncho, &
 continuis, dummodò adsint vires, quouunque tempore licet sanguinem
 mittere, at in intermittentibus solum in hora intermissionis. His posi-
 tis methodo rationali ex indicationibus desumpta, febrem putrem hac
 ratione curabis. Febris putris est morbus fiens, hoc est, qui habet cau-
 sam ipsam fouentem. Habet ergo aliquid factum, & aliquid quod curandi fe-
 sit. Id quod factum est, debet curari, quia est morbus: id quod fit, de-
 bet prohiberi, ne fiat, quod præstabis auferentes causam, quæ est res.
 putredo. Hæc etiam habet quid factum, quod curationem etiam postu-
 lat, & quid fiens, quod prohibebitur, auferentes prohibitam transpi-
 rationem, quæ est eius causa. Prohibita transpiratio non habet quid
 factum, & quid fiens, ut malè voluit Alomarivus, quia hæc suam es-
 sentiam habet in fieri, & perpetuò ab alio dependentem. Debet ergo
 auferri quod præstabis, prospicientes obstructioni, quæ est eius cau-
 sa continens. Obstructio etiam habet aliquid factum, indicans cura-
 tionem: & aliquid quod fit præuisione egens: quam præstabis,
 auferentes eius causam, quæ est fluxio humoris multi, crassi, aut glu-
 tinosi. Unde in hac resolutione principium à febre sumimus, & tan-
 dem ad fluxionem gradatim descendimus, ita ut id quod in resolutione
 vltimum est, sit primum in curatione: quia affectus non potest tolli ma-
 nente causa, unde ortus est. His si addamus indicationes, quæ à viti-
 bus, & natura sumuntur, integram habebimus methodum. Indication-

DE CVRAND. MORB.

Non agi- nem à natura tunc addemus, cū in quotidiana ratione habuerim
mus de fe- ventriculi, in tertiana iecoris, in quartana vero lienis. Aduer- en
bre sym- præterea est, nos in hoc libro nō agere de febribus, quæ inflāmat.
ptoma. nes sequuntur, quoniā hæ sunt symptomata, et curata inflāmatio
cessant: sed de aliis febribus putridis, quæ citra inflāmatōne sūnt
et in quibus septē illos affectus cōsideramus. Quid autē vnusquis
ex illis indicet, propriis capitibus explicabimus incipietes à synoch

Nomina Febres quotidiana, tertiana, & quartana dicuntur, non quia
februm beant accessionem, singulis diebus, tertio, aut quarto euenienter
putridarū. quia hac ratione duplex tertiana diceretur quotidiana: sed quia
de synoch. calt sūnt humore, quotidiana, quia sit à pituita, ter iana à bile, qua
Duplex sy tana ab humore melancholico. Ex his manifeste patebit, febrem s.
nochos. nochon (hoc est continentem) appellari eam quæ ex sanguine ortu
Synochum habet: quæ caret circuitibus, & vna continua clauditur accessione
ex sangui quia non habet vnū certum locum affectum sed multos. Hæc dupli
ne oriri est, non putris, & putris. Synochum non putrem ex vaporibus san
probat, ex granis calefactis generari, & ad diariam referri supra, cū de dia
eius causa ris erat sermo, explicauimus. De qua in presentia non disputamus
primo. sed de altera synoch. putri, quæ habet ortum ex putredine succorū
vel sanguinis (quod idem est) in omnibus vasis, vel maximis, & ca
lidis, qualia sunt illa, quæ inter alas, et inguina clauduntur: ubi eni
caudices venæ, & arteriæ existere anatomes docet. Hanc autem pu
tredinē in omnibus vasis, ut magnis inclusam solus sanguis (hoc est
massa sanguinaria) efficere potest. Quia eius putredinis causa est
plenitudo (vt ex 9. metho. c. 5. & prima historia c. 4. colligimus) nō eo
quæ est ad vires, sed ad vasa. Vtraque autem à solo sanguine fit, nul
lus enim humor solus tantum augeri potest, vt venas distendat, quoc

Obiectio. in morbo regio experieris, & aliis similibus affectibus. Dices, nonni
dantur plethora biliosa, melancholica, atque etiam pituitosa, quam
nos plethoram secundum quid appellamus? poterit ergo ex hac fieri
etiam synochos. Respondeo concedendo consequentiam, cum enim in
hac plethora humor non sit separatus à sanguine, si in eo breue ha
buerit augmentum, poterit facere synochon: sin verò magnum, cū iam
tunc sanguis sit multum pituitosus, melancholicus, aut biliosus, ne
que poterit facere plethoram ad vasa, et febris quæ sequetur habe
bit circuitus illius humoris aucti. Quod synochos febris fiat ex solo
sanguine per præpollentiam dicto, (quia sanguis humor quartus so
lus nunquam extat) præter rationem dictam, aliis etiam cōfirmabi
mus, ita vt hæc sit secunda ratio, desumpta ex 9. metho. c. 3. ubi scribit
Secunda Gal. febrem synochon fieri, cum humor equaliter, & cito, in omnibus
ratio. vasis, aut magnis putrescit. Vbi illa duo verba equaliter, & cito con
sideranda sunt: equaliter enim in omnibus vasis solus sanguis, qui in
eis potest redundare, putrescere poterit, sicut & cito, cum non diffila

, quia est calidus, & sic facile intemperiem calidam concipiet, & humidus: & ideo multi calidi et humidi vapores ab eo elenati neque te gubernati citò putredinis erunt auctores, sicut & ipsemet san- is citò etiam facile putredinem concipiet. Tertia ratio ex eodem lo- Tertia ra- Galeni synochos febris neque in frigida aetate, ut senectute, neque tio. frigido corporis temperamento, quale est hominis melancholici & cuirosi, quia melancholia, & pituita cito non possunt pure fieri, ne- ie in hominibus gracilibus, hoc est biliosis, quia multum distantur, ri potest. Ergo fiet in solis sanguineis. Quarta ratio ex eodem capite Quarta ra- Galeni, synochos carnosos & multo sanguine affluentes afficit, ergo tio. lium fiet ex sanguine. Quinta in syncho pulsus est maximus ex eo- Quinta ra- m loco Galeni, ergo ex solo sanguine fiet, quia homines sanguinei tio. & carnosus, cum habeant maximum pulsum, & alia natura & que Sexta ra- d magnum tantum possunt peruenire. Sexta ex curatione colligit in- tio. iutum, quia solum in synochis mittimus sanguinem & que ad animi Septima reliquium, ut inferius ridebimus, propter plethoram, quæ à solo san- ratio. guine fit. Septima ex 9. method. cap. 5. desumpta aperte id monstrat, eo nim in loco Gal. plenitudinem ad vires synochon non effluere scribit, quia ea nec obstruit venarum ora, ita ut prohibeat refrigerationem, nec tunicas earum distendit, nec ruborem, nec tumorem inuehit. Iam à contrario sola illa causa, illa causa faciet synochon, quæ distendit ve- nas, ita ut in eis tumorem efficiat, qui est signum non plenitudinis, sed magnæ plenitudinis, quæ rubor. m induci in cute. Certissimum er- go erit homini vel medicis iudicii, hæc omnia à solo sanguine summe ueto fieri, & ita hunc solum synochon generare posse. Ex his colliges male Alcomarium à bile, pituita & melancholia syncera synochon Alcomari- etiam fieri scripsisse. Probat autem etiam à bile fieri his rationibus. sententia. Prima desumitur ex Gal. lib. 2. diff. febrium cap. 7. ubi continuam ex Pr. m. ra- bile febrem diuidit in synochon, & continuam. Secunda etiam vim ha- tio. bet ex lib. 2. Criseon cap. 6. ubi Gal. postquam synochon febrem consi- maxii pr- nuam esse, & acutam scripsit, consequenter de ipsa loquens hæc ad- bans sync- dit, sufficit enim genus agnoscere, quod biliosa sit, atque deurens, hæc chon fieri Gal. si synochos est biliosa, ergo bilis synochon efficiet. Tertia ratio ex bile. Hippocr. 4. de ratione victus sic habet: Cum venæ totius corporis exic- Secunda. cata, attraxerint acres, ac biliosas humiditates, ex carnibus, febres Tertia ra- ardentes fiunt. Iam si hoc ita est, si bilis à venis omnibus attrahatur, tio. ex carnosus partibus faciet synochon. Quarta ratio, si synochos febris Quarta fit ex sanguine putrescente, ergo & ex bile, consequentiam probat, ratio. quia sanguis cum admodum putrescit, eius tenuior portio in bilem mutatur.

Probat p

Quod ex pituita etiam generare possit, probat ex lib. 4. acutorum, cuius ge- ubi Hippocrates fatetur, pituitam falsam à totius corporis venis at- tractam, aliud causi genus efficere: ergo cum hæc pituita erit putre- noehon.

z z

facta

DE CVRAND. MORB.

facta in omnibus venis, vnam habebit accessionē, & sic erit synochon. Hæc Altomarius. Cuius rationes soluendæ sunt, cum iam paulò super probauerim solum sanguinem ex quatuor humoribus constitutum, synochon generare posse. Prima ratio desumpta ex Galeni loco non retinetur.

Solutio considerato: ibi enim hoc est 2. de disse. feb. totum quæ ex flaua bilis additum est, & superfluum imò repugnans Galeni doctrinæ. **primæ rationis** Al- ut disputationis series persuadet. Postquam enim Gal. egit de intermittentibus febribus, illo cap. 7. incipit agere de continuis, eas diuidens hoc modo: Continuae febres, aut sunt continentes, aut nomine generis seruantes, continuæ dicuntur. Rursus continentes tres habent differentias, sicut & continuæ, quæ eo loco enumerantur. Et ita ex

cundæ rationis. replicatio huius loci, ostendet etiam locum, qui habetur 2. criseon, ex qua secunda ratio habet vim, corruptum esse: ibi enim totum illud, quod biliosa sit, delendum est, ut ex contextu colligo. In eo enim incipiens agere Galenus de continentibus febribus, eas ait esse continuas, & ardentes, nullam faciens mentionem, quod sint biliosæ, ac proinde cum

Solutio ter concludit, sic legendum est, Sufficit enim genus agnoscere, quod continua sit, & adurens. **tertiæ rationis.** Tertia ratio ridiculam habet consequentiam. Imprimis cum Hippo. dicit venas exiccatas attrahere bilem ex carnibus, intelligendum est, venas eo modo affectas attrahere ex carnibus ichores sanguinis. Non tamen intelligendum est, hos semper reattrahuntur, facere febrem: hoc enim falsum est, sed tantum, quando in aliqua vena à crasso humore obstructio incepta est, tunc enim ichores ibi detenti augent obstructionem, & sic fit putredo tanta, quæ potest

Quartæ rationis solutio. test generare febrem, secundo, etsi venæ attrahant bilem ex carnibus, & hæc perficiendo obstructionem febrem generet, habebit circuitus tertianos. Tum bilis flaua non potest obstruere, quomodo ergo efficiet synochon? Quartæ facillimum erit satisfacere, si enim sanguis iam habet tenuem portionem in bilem mutatam, febrem efficiet habentem tertianos circuitus, & tunc Galenus eam appellat febrem biliosam, nos autem non loquimur, nisi de sanguine non mutato adhuc in bilem, aut melancholiam, & putrefacto, hic enim est, qui facit synochon. Ultima ratio quæ probat pituitam salsam generare synochon duo habet absurda, quæ sunt, pituitam salsam posse in toto corpore

Differentiæ synochæ febris disputemus, quæ tres sunt. Prima appellatur à Græcis chæ febris acmastica, à Latinis augescens: quia à principio suæ generationis semper habet accessionē incrementem: causa huius rei est, quia in ea plus putrescit sanguinis, quam dissipetur de putrefacto. Secunda dicitur à Græcis omatonomos, cuius accessio semper eundem seruat tenorē: hoc est, differētia. quæ neque diminuitur, saltem sensibilibiter: quod prouenit ex eo, quod Tertia distans dissipatur humoris putrefacti, quantum de nouo putrescit. Tertia differētia synochos, à Græcis paracmastica, à Latinis decrescens

die

itur, in qua accessio semper decrefcit, quia plus diffipatur ex pu- Obiectio.
 facto sanguine, quam putrefcat de nouo. Dices, si vnaquæque syno- Solutio me-
 os vnam habet accessionē, ergo habebit etiam vnum tempus solū: dicorum.
 respondent omnes medici, verum esse synochon solū habere vnum Refutatio
 mpus morbi sensibile, & tria insensibilia. Qui quantum errēt, hac solutionis.
 tione probamus. Sanguinis missio non est exercēda in statu, aut mor-
 declinatione: sed si synocha febres habent vnum tantū tempus,
 inc in eis sanguinem mittimus in statu, & declinatione: ergo hæ fe-
 res non habent vnum tantū tempus, sed multa. Maiorē probamus,
 uia tempore status non est fluxio humoris, & est coctio perfecta. At
 declinatione, cum humor peccans iam a natura euacuetur, non est
 uod eius motū perturbemus sanguinis missione. Assumptio nota est, Propria sq
 uia in omotono (si tantum habet statu) cum sanguinē mittimus in sta lutio &
 u exercemus euacuationem, sicut in paracraftica in declinatione. vera.
 go autē (vnā cum Ludonico Collado præceptore doctissimo) sentio, has
 res synocha febris differentias, habere quatuor tempora vniuersalia
 ensibilia. Cognoscuntur autē ex cruditate & coctione: principium e- Obiectio.
 im est, quando est signū cruditatis in calore, pulsu, & vrina. Augmē
 um, quando incipit coctio. Status, quādo perfecta est, declinatio verò,
 um febris iam misceat. Dices, si hoc ita est, quā ratione vnā appella-
 nus augescētē, aliam in eodē statu permanentē, & aliam decrefcē- Solutio.
 em? Respondeo, quia hæc est propria constitutio huius febris, vt in
 declinatē erit manifestum, in hac enim in principio humor multus fa-
 cit obstructionē, ita tamē fluit ad eam, vt minus fluat, quā diffi-
 tur, hoc tamen, non tollit febrem esse in principio, idem dicendū in aliis
 temporibus. Quod autem hoc sit verum, colliges ex 9. metho. cap. 4. in
 secunda historia serui cuiusdam, qui synochon putrē patiebatur. Quē
 Gal. post secundā noctē vidit putrescentium humorū præbētē notas,
 unde quæso Gal. desumit notas humorū putrescentium, nisi, vt iam dixi-
 mus, ex calore, pulsu, & vrinis? Tum nōne quando humor putrescit,
 est cruditas? Adde in eadē historia inferiūs hæc scribere Galenum,
 itaq; ad portionē minuentis se febris, vrinæ quoq; cōcoctio
 præcesserat, eratq; haud obscurū septimo finiendā. Sensim er-
 go procedebat concoctio, in hac synocha post cruditatē, & ideo, quando
 in synochis sanguinem mittimus, in principio sensibili id præstamus.

Secundo facta basilica dextra.) Synochos febris non potest cu- Sectio re-
 rari, nisi prius causæ eam generantes auferantur, quæ sunt putredo, nā.
 prohibita transpiratio, obstructio, & multitudo humoris. Ex his cau-
 sis cum sit prima multitudo, ab hac incipiēda est curatio. Hac indicat
 sui ablationē, quæ fit per contrariū nōpe euacuationē lib. 2. apho. sent.
 22. Cum autē euacuatio possit fieri inedia, balneo, frictione, exercita-
 tione, purgatione & sanguinis missione, de remedio euacuante in hac
 affectu, hoc modo deliberabis. Plethora in synocha est magnus affe-

DE CVRAND. MORB.

Etus, postulat ergo magnum remedium, qualia sunt inedia, exercitatio
 balneum, frictio, & similia, quæ ideo omittuntur. Remanent ergo d
 remedia magna, purgatio, & sanguinis missio. Purgatio caret oc
 sione, quia non est affectus eam indicans, remanet ergo sola sangui
 missio, quæ cito, et multum omnes humores potest ex toto corpore eu
 Sanguinis cuare. Hæc autem exercetur à Galeno aliquando, usque ad animi a
 missio usque liquidum 9. meth. cap. 4. sic & 6. epy. par. 1. com. 29. & aliis locis del
 ad animi berans de ipsa ex affectu postulante talem euacuationem & præse
 deliquium tiz virtutis. Affectus postulans est maxima plenitudo, quæ maxima
 postulat euacuationem. Vires autem summae sunt, quia homo est ca
 nosus, & iuuenis, & ideo habet maximum pulsuum: inde colliges, in h
 febribus synochis (cum ratione maioris & minoris differant) non es
 necessario mittendum sanguinem, usque ad animi deliquium, sed an
 mi deliquium, esse terminum istius euacuationis, ita ut in summa ple
 nitudine, non liceat ulterius euacuare, nisi voluerimus agram interfi
 In biliosis cere. Unde videat Vallesius, quæ ratione possit constare sua sententia
 febribus quæ lib. 7. controuersiarum nititur probare, in febribus biliosis cont
 probat nris, etiam sanguinem mittendum esse, usque ad animi deliquium. Pri
 Vallesius ma ratio, Gal. 2. aph. com. 29. in ardentissimis febribus sanguinem mit
 sanguinem tiz usque ad animi deliquium: sed febris tertiana continua est febr
 esse mitti ardentissima, ergo in ea licebit talem euacuationem exercere. Secundu
 dum usque Gal. sanguinem mittit in hac febre, ut refrigeret, ergo & id licebit in
 ad animi tertiana continua, in qua intensior est caliditas, quam in syncho. Ter
 deliqui. tia ratio, in synochis Gal. copiose euacuat, ne humor propter feruorem
 Prima ra in partem principem feratur: sed in tertiana continua magis feruet ca
 tio. lor quam in syncho, ergo licebit in ea propter eandem causam eu
 Se unda cuate copiose, hoc est usque ad animi deliquium. Et cum possit aliquis
 ratio. ei obicere, in tertiana continua deficere virum robur. Respondet se lo
 Terria ra qui non de ea tertiana, quæ exquisita est, sed de notha, in qua vires
 tio. possunt constare. Certè ego multum miror virum doctissimum nunquam
 Contra aduerfiss, has rationes nil concludere, neque ex quo affectu delibere
 Vallesii, mus in syncho, de sanguinis missione. Nos enim, ut Gal. & rei natu
 Secundæ ra docent, in ea usque ad animi deliquium euacuamus, in indicatione
 & terriæ sumpta ex causa obstructionis, quæ plethora est, non ergo mittimus
 rationes sanguinem, ut refrigeremus, v. secunda ratio docet. Quod si ex tali eu
 soluntur. cuatione sequatur corporis refrigeratio, & inde delectatio, id ex acci
 denti provenit, non quod nos id instituamus efficere. Neque etiam san
 guinem mittimus, ne sanguis decumbat ad partem principem, ut ter
 tia ratio docet, verum est, ex hac sanguinis missione id aliquando pro
 Soluitur hiberi. Prima ratio nil concludit, quia etsi Gal. scribat lib. 2. aph. in ar
 prima ra dentissimis febribus, sanguinem esse mittendum usque ad animi deli
 tio. quium. Quid intelligat per febres ardentissimas ipsemet explicat lib.
 6. epy. & lib. decur. 7. v. per sang. miss. cap. 11. & 9. methodi: in quibus
 locis

is agit de hac copiosa euacuatione, & solum meminit ardentissimum, quæ ex sanguine sunt, & quamuis id non scripsisset, nos ex cura rei acerbimus id colligere. Si enim hæc tam copiosa & summa euacuatione, postulat magnam plethoram et summum virium robor, quæ considerantur in tertiana quolibet, quomodo licebit in ea summe euacuare? Quod si in tertiana notia sunt vires, ut vult Valsius, non tamen summe, sed tales, quæ poterunt ferre euacuationem, propter resolutionem factam.

Tertiò, potu magno.) Post sufficientem sanguinis missionem, nam cognosces ex coctione, quæ in urina apparere incipit, cum iam urata sit causa obstructionis ad hanc veniendum est. Curabitur obstructio suo contrario, quod est aperiens. Hoc varium est, decoctum cailorum renensis, cichorea, aut alterius similis cum oxymelle. Eligenda enim sunt aperientia minus calida, quia quæ calidiora sunt, augent calorem humorum putrum, augebunt & putredinem. Aduerte tamen aperientia medicamenta obstructionem curare, sanguinem fluxilem efficiendo, & motum ei tribuendo. Iam obstructione curata, ut possit putredo per convenientes regiones expelli, vilitur exhibetur aque frigide potus. Qui refrigerans partes ab intemperie calida languidas, eis robur addit, temperiem generando: hæc autem roborata, putredinem expellere solent, per sudorem, urinam, vomitum aut deiectionem: aut simul multis ex his euacuationibus. Quod si æger iuuenis fuerit, et carnosus, æstate media, natatio in aqua frigida comoda erit, quæ corrigendo paruum intemperiem, sudorem mouebit. Neque frigiditas densando poros cutis eam prohibebit, quia potius ab ea, ad medicritatem reducuntur, nimis dilatati à calore febrili, et æstatis. Quod si Hippocr. lib. 3. acutorum natationem in aqua frigida vitet in agrotis, intellige cum Gal. in illis agrotis, qui virium habent imbecillitatem. Dices, cur putredinem nos non euacuamus? Respondeo ad auferendam putredinem in viuentibus, nos expectare actiones facultatum naturalium, qua ratione in synocha separata parte putri à non putri, eam quæ putris est, facultas expultrix euacuat, quæ sollicita est de animalium salute, & proinde rectè dicebat Hipp. natura medicus, nos enim ministri tantum sumus. Iterum obiciet, diminuisse tradidisti curationem, quia prohibitam transpirationem, quæ etiam debet auferri, omisisti. Respondeo, consultò id esse factum, quia, ut iam supraddixi, prohibita transpiratio habet essentiam in fieri, et ideo curata obstructione cessare.

Quartò, concoquenti bilem.) neque bilis eget præparatione, neque hic affectus pendet ex bile, cur ergo præparet bilem, nescio.

Quintò vacuantibus bilem.) Febris synochos, ex sanguine oritur Auctor habet, et non ex bile, proinde non est quod eam euacuemus. Verum est, si hæc taxatur. febris perseveret, sanguinis tenuioris portionem mutari in bilem: et hac febrè iam esse biliosam, quæ curabitur ea ratione, qua inferius videbis.

- Descriptio.* **A**rdens febris Latinis, causos Græcis, est febris biliosa de genere continuarum: errant igitur qui cum Arabibus volunt a falsa pituita posse procreari: errant quoque qui cum iisdem ponunt discrimen inter ardentem febrem & tertianam continuam: quia neque à bile flaua putrescente in venis, quæ a corde distant, fit, neque illa à eadem bile putrescente in venis cordi propinquis tantum sed (Gal. authore in variis locis, præsertim comm. 59. lib. 4. aphorif. febris ardens eiusdem est generis cum tertiana exquisita intermittente, eò quòd ab eodẽ humore bilioso ambæ procreentur. Differt tamen ardens à tertiana exquisita quòd in hac flaua bilis per totum corpus fertur, in ardente autẽ febre ipsa bilis in venis vna cum sanguine continetur.
- Causa.* Omnia quæ bilem flauam procreant, efficere possunt febrem hanc, Aer scilicet nimis calidus, alimenta acria & admodum calida, vt piper, sinapi, cæpe, allia, vinum vetus, & similia, & animi & corporis labores. Ex his enim flaua bilis gignitur omni tempore, & ætate, præsertim ætate, & iuuetute: à qua in venis putrescente fit ardens febris. His notis cognoscitur, lingua eorum, qui hac febre laborent, arida fit, aspera & nigra, ventriculi erosio, sitis intolerabilis, vigiliæ, capitis dolor, nonnunquam etiam delirium, mouentur ferme semper ab vna parte in aliam, vt animalia turgida & venere capta, & tumores turgidi, à quibus sæpe fit hæc febris. Quare deiectiones alui eis liquidæ, & pallidæ sunt, quamuis sæpe aluius dura sit. Pulsus celerrimus, vrina flaua, & aliquando alba, quæ delirium futurum significat: fiunt aliquando surdi hi, & nonnunquam muti. Septem remediorum generibus curatur.
- Victus.* Primo, victu tenui refrigerante satis & humectante, vt aere in ætate parato, aqua rosata inspersa sæpe per totam habitationem, foliis etiam lactucæ, myrti, salicis, floribus violarum, nupharis, & rosarum, fuga anhelitus multorum, iræ, & aliorum, quæ calfaciunt. Nutriatur cremore hordei, succo granatorum, lactuca, præcipue cum aceto & saccharo, cichorea, cucurbita, lacte amygdalarum dulcium, & quatuor seminum frigidorum, cucurbita saccharo codita, radice buglossæ saccharo codita, scapo lactucæ condito saccharo, dicitur a Valentinis gorga daniel. Si sit æger imbecillus, nutriatur iure pulli cum lactuca in eo elixa, vel hordeo sine cortice: semper tamen habenda ratio eorum, quæ diximus capite præcedenti cum Hippocrate 17. aphorismo primi libri, & etiam eo-

um, quæ 8. & 10. Aphorismo eiusdem lib. docuit Hippocrates, in quibus habetur, in vigore morborum, & iuxta vigorem non esse cibum exhibendum, neque in his, in quibus vigor est omnis morbus, vt in apoplexia, vel maxima febre: At *Error factus* in aliis plus cibi esse dandum in initiis, & semper versus *in viciis* vigorem minuendum, cuius contrarium consilium nostræ *in viciis* sœ-
minæ quotidie sequuntur, dant semper in morborum initiis parum cibi, & augent ipsum cōtinuo vsque ad vigorem, & ipsum sœpe augent, vel multum saltem præbent, quo errore non pauci ægri pereunt. Potus sit aqua hordei sine *Potus.* cor-
rice solum. In prandio & cœna, & cum julep violarum, & rosarum, & syrupo acetositis citri quacunque alia hora.

Secundo, secta basilica dextra, si fuerint signa sanguinis, *Sectio venæ.* rubedo scilicet totius, venæ magnæ & plenæ, vrina rubra & *na.* ætas florida, & robur virium. Cum vero in hac febre nō *Ansecan-* parent signa sanguinis, non est necessaria sanguinis missio: *da sit venæ* sed purgatio bilis, neque in omni putrida febre est secanda *in omni fe-* vena, vt multi recentiores medici cum Gal. ii. meth. volunt. *bre putri-* Nam non deprauato sanguine, primo vel secundo loco per *da.* mixtionem vel corruptionē potius noceret, & ideo ipse Galenus libro primo de arte curatiua ad Glauconem cap. de curatione tertianæ exquisitæ, nihil de sanguine mittēdo dicit: & post eodem lib. capite de tertiana notha: quod si inquit, sanguinem mittere oporteat, neque hoc quoque omittendum, sed ab initio statim adhibita earum rerum quas scis distinctione tantum mittendum, quātum præsens exigit status: & capite de curatione quartanæ eodem libro, deinceps de quartanis dicemus, quas etiam ab initio mediocriter ac leniter tractare oportet, nullum acre medicamentum, aut euacuationem exhibentes, nisi sanguis forte vehementer superabundans appareat, & si vena incisa is qui fluit niger videatur ac crassus, præcipue verò in iis, qui liene laborāt, huiusmodi cernitur, audaciùs mittendus est: quod si tenuis, aut flauus extiterit, statim supprimendus: & postremo eodem libro cap. de curatione cōtinuarum, Sanguinem verò, inquit, mittere oportet, & ob morbi magnitudinem, & quibus multo plus ruboris insit, quàm naturæ cōueniat, & maior quam pro consuetudine corporis tumor, & venæ eminentiores atque magis extensæ, his omnibus est auferendus, nisi vires, aut ætas, aut aliquid eorum, quæ supra commemorauimus, prohibuerit. Concludamus cum Gal. his in locis, sanguinem non esse mittendum in omni febre, quæ dependet ex putredine humorum. Huic libro est maxima fides adhibēda, quia
scrip

DE CVRAND. MORB.

scripsit in eo de febribus ex professo, & propriam disputationem de his tantum instituit, in methodo vero generalium omnia persequitur. Deinde librum hunc ad Glauconem scripsit, qui in philosophia & medicina diu multumque versatus erat.

- Cut ma-* Neque Galeni autoritas vndecimo methodi repugna
gna fides (vt diximus) huic nostræ, vel potius Galeni sententiæ & ve
adhibenda ritati, neque etiam commetarius 23. primi libri aphorismo
lib. de arte rum, vt aliqui recentiores medici censent, est contrarius no
entia ad bis, in quo non docet Galenus omnem febrem ardentem in
Glauco- digere sanguinis missione vsq; ad animi deliquium, nam no
nem. verum id est, nisi quando sanguis peccat cum bile. Cum enim
sola bilis putrescit, sanguis nullo modo mittendus est: quia
eius vacuatio simul cum spiritu & nativo calore vel mortem
Si bilis vel maximum periculum induceret. Bilis ergo putrescens in
turget. hac febre ardenti si sit turgida absque cōcoctione, & sine san
Potio. guinis missione vacuanda est hac, aut simili potione: ℞. me
dullæ tamarindorum, & medullæ cassiæ fistularis recens ex
tractæ. an. ʒ. ss. infusionis. ℞. iij. rhabbari in aqua endiuæ
per noctem factæ, diaprunis solutiui ʒ. ij. ss. syrupi violarum
Potio di- ʒ. j. decocti florum cordialium. q. s. misce, & fiat potus. Vel si
uiti. est diues: ℞. mannæ electæ ʒ. j. ss. infusionis ʒ. ij. rhabbari in
aqua endiuæ factæ, iuris pulli gallinacei, decoctionis flo
Potio pau- rum cordialium, quod satis est, misce, & fiat potus. Si fuerit
peri. pauper, fiat vacuatio per priorē potionē sine rhabbaro, die
sequenti, & omnibus diebus, dempto die euacuationis, per
Clyster. medicamenta purgantia hoc, vel simili clystere alius lubri
cetur, ℞. foliorum maluarum, violarum, lactucæ, cichoreæ,
& mercurialis an. m. j. furfuris, hordei sine cortice, quatuor
seminum. f. m. conquassatorum. an. p. ss. fiat decoctum, de quo
percolato accipe ʒ. xv. olei violarum ʒ. iij. sacchari rubri, &
cassiæ fistulæ præparatæ. an. ʒ. j. misce, & fiat clyster. Si maxi
ma fuerit caliditas febrilis, adde trochiscorum de campho
ra ʒ. j. mucilaginis seminis psyllij, & cydoniorum. an. ʒ. iij. o
lei papaueris ʒ. ij. Cordi a primo die omni hora admovea
Epithema tur epithema aut simile: ℞. aquarum rosarum, & acetosæ. an.
cordi ad- ʒ. iij. aquæ buglossæ ʒ. ij. aquæ melissæ, & aceti rosati. an. ʒ. ss.
monedum. pulueris diamargaritonis frigidi, & trochiscorum de cam
phora. an. ʒ. ss. misce, & fiat epithema pro corde. Vnguentum
cardiacum Gainerij, cuius descriptio continetur cap. præ
Prepara- cedenti, sæpe cordi admoveatur tepidum.
tio bilis nō Tertiò, si materia biliosa non turgeat, apparatus syrupo
turgentis. endiuæ. S. violarum, granatorum, endiuæ compos. acetosi
tatis

atis citri, acetositatis limonum, nenupharis, de papauere
um duplo aquæ, vel decocti endiuæ, cichoreæ, acetosæ, sca-
iola, lactucæ & similium concocta hac bile.

Quarto, vacuantibus bilem, vt cassia fistulari, tamarin- *Purgatio.*
lis, rhabarbaro, & aliis dictis primo cap. lib. 1. ex quibus sim-
plicibus & compositis variæ & multæ sunt formulæ, vt *℥. Potio.*
medullæ cassiæ fistulæ recens extractæ, & medullæ tamarin-
dorum an. *℥. ss.* infusionis. *℥. j.* rhabbari electi in aqua endi-
uæ per noctem factæ, diaprunis solutiui *℥. iij. ss.* syrupi vio-
larum *℥. j.* decocti florum cordialium. *q. s.* misce, & fiat potus. *Decoctum*
Die sequenti aluus leniatur, & lauentur intestina clystere de- *hordei lo-*
scripto cap. præcedenti, aut simili, vel bibat *℥. iij.* decocti co *clyste-*
hordei cum cortice cum vnciâ vna sacchari. Si omnino æ- *ris.*
ger non possit bibere potum purgantem, vel eius ventricu-
lus statim ipsum expellat, fiant boli, aut buccellæ, vt dixi-
mus capite superiori.

Quinto, refrigerantibus cor, iecur, & totum corpus in- *Alteratio.*
ternis & externis, vt potu aquæ frigidæ in magna quantita-
te, obseruatis omnibus, quæ diximus cap. præcedenti, tertio
genere remedium. Nam in hac febris ardenti vtilior est & *Sumenda.*
magis necessarius, & hac mixtura: *℥.* conseruæ violarum, *Potus a-*
nenupharis, acetosæ, & rosarum. an. *℥. j.* conseruæ borragi- *quæ frigi-*
nis *℥. ss.* pulueris diamargaritonis frigidi, & diarrhodonis *de hic v-*
Abbatis an. *℥. j.* sacchari, *q. s.* misce, & fiat conditum auro *tilissimus.*
coopertum, quo sæpe vtatur, præcipue tempore sitis cum a- *Conditum.*
qua hordei: vel *℥.* julep rosati, & violati, an. *℥. iij.* syrupi a- *Mixtura*
cetositatis citri *℥. ij.* misce, & vtetur cum eadem, vel simili *ad biben-*
aqua tempore sitis. Summo mane per aliquot dies accipiat *dum.*
drachmas quatuor electuarij diatrion santalorum, vel diar- *Electua-*
rhodonis Abbatis, vel diamargaritonis frigidi, cum pauca *ria, &c.*
aqua acetosæ, vel cichoreæ, vel hordei, vel paucio vino albo
benè diluto. Syrupus ex aqua, vel succo cucurbitæ valenter
extinguit sitim & calorem febrilem. Hoc electuarium cor- *Electua-*
roborat, refrigerat, & est suauis gustu: *℥.* sacchari dissolu- *rium suau-*
ti in aqua rosata *℥. iij.* fiat electuarium in tabulis ponderan- *ne.*
tibus *℥. iij.* si adderes pulueris margaritarum electarum, &
ossis de corde cerui. an. *℥. j.* esset magis cardiacum, quod om-
ni tempore est vtile. Hæc enim confectio est bona, præfer-
tim si cor afficiatur palpitacione, vel alio affectu, animi sci-
licet deliquio & simili: *℥.* theriacæ de citro *℥. j.* conseruæ a-
cetosæ, & nenupharis ana. *℥. ss.* confectiois de Hyacintho *Confectio*
℥. ij. pulueris diamargaritonis frigidi, & coralli rubri præ- *cardiaca.*
parati ana. *℥. j.* foliorum auri numero *ij.* syrupi acetositatis
citr

DE CVRAND. MORB.

Aque cor- citri, q. s. misce, & fiat confectio. Dosis omni hora cochle-
di admo- rium vnum cum pauca aqua acetosæ, vel buglossæ. Admo-
uenda. ueatur sæpe in die & omni tempore cordi epithema desc-
 ptum in fine secundi generis remediorum huius capitis, in
 æstate actu frigidum, & in hyeme tepidum: & bis in die ad-
 moueatur vnguentum cardiacum Gainerij, de quo capit-
Hepati. præcedenti, aut simile. Hepati quoque bis in die admoueatur
Observa- tur cerotum santalatum, vel vnguentum tepidum, & sæpe in
tio. die hoc, aut simile epithema: ℞. aquarum endiuig, cichoreæ
 & schariolæ. an. ʒ. iij. aquæ absinthij ʒ. ij. aceti albi cochlea-
 rium vnum, pulueris santalorum omnium, & pulueris diar-
 rhodon. Abbatis an. ʒ. j. misce, & fiat epithema pro hepate
 Hæc non sunt admouenda hepati, nisi post vacuationes. Re-
 nibus, & spinæ admoueatur bis in die vnguentum, vel cero-
 tum santalatum, quod habet vim refrigerandi.

Correctio Sexto, corrigentibus symptomata videlicet oris, & linguæ
symptoma siccitatem, & nigrorem, capitis dolorem, & vigilias immo-
rum sicc- dicas. Siccitas linguæ & oris, & nigror curantur continua
tatis & ablutione facta aqua rosata cum pauco aceto rosato, vino
nigroris. albo, bene aqua diluto, lacte amygdalarum non decocto, &
Confectio. sine saccharo: humectantibus quoque, vt mucagine seminis
 psyllij & cydoniorum aqua rosarum extracta: & hac mixtu-
 ra seu loch, quæ sitim quoque extinguit, sæpe & parum ex ea
 transglutiendo: ℞. mucilaginis seminis psyllij, & cydonio-
 rum. an. ʒ. ss. sacchari candi violati puluerizati ʒ. j. syrupi vio-
Doloris larum. q. s. misce, & fiat confectio. Capitis doloris curatio tra-
capitis. dita est cap. 3. primi libri, quamuis curata febre, illius causa
 curetur. Symptoma hoc, dolor scilicet, aliquando trahit ad
Vigiliarū. se curationem ob sui magnitudinem. Vigiliæ immodicæ cu-
 rantur, vt diximus cap. quarto prioris libri, emulsione sci-
 licet seminis papaueris, syrupo papaueris, vnguento popu-
 leonis fronti admoto, & fotu seu lotionem tibiæ ex deco-
 cto foliorum arundinis, lactucæ, salicis, myrtillorum, corti-
 cum papaueris albi, & similium: & hoc potu sumptō hora
 nona, vel decima post solis occasum: ℞. confectiois Alker-
 mes ʒ. ss. syrupi papaueris ʒ. j. ss. aquæ nenupharis ʒ. j. misce,
 & fiat potus.

De febre ardente. CAP. II.

Scholium.

Febris ar-
dens condi-
tio est fe-
bris.



Ardens febris Latinis.) Febris causas, aut ardens, non est
 differentia febris, sed conditio. Illa enim febris dicitur ar-
 dens, quæ habet magnum ardorem, & inexhaustam sitim,

acut. sent. 17. & I. epyd. com. 1. Et ideo synochos, tertiana continua, tertiana intermittens, & quartana continua, ardentes sunt. Dices, nonne Omnes a-
 Hippocr. 4. acut. quendam causam ex pituita salsa describit? Respon-
 do verum esse, illum tamen ad eum, qui ex bile fit reuocari: quia ex dentes.
 b. de morbo & symp. omnis humor calidus biliosus est. Hoc cap. au-
 tor de tertiana continua disputat. Quæ (sicut & omnes aliæ conti-
 nuæ) cum syncho conuenit in hoc, quod continua est, tum in calore, pu-
 tredine, & obstructione. Differt verò ab ea, quia in syncho, obstru-
 ctio fit à plethora: at tertiana continua ab humore crasso, aut glutino-
 so. Tum synochos caret accessionibus, non autem continua. Febres ar-
 dentes curantur ea ratione, qua synochos: primò mittentes sanguinem:
 secundò auferendo obstructionem: tertio putredinem: & quarto fe-
 brem refrigerantes. Curationem tertianæ continuæ, de qua hîc agit au-
 tor, ex sequenti capite (ubi agit de tertiana exquisita) etiam intelli-
 ges: quoniam amba sunt eiusdem generis, sunt enim à bile, cum hoc chos.
 amen discrimine, quòd in febre ardente humor faciens febrem intra
 crassa manet, at in intermittente fertur per carnes, aut habitum corpo-
 ris. Solum duo hoc in loco explicare volo breuiter. Primum, An in fe-
 bribus continuis, sanguinis missio, in sola declinatione exerceri possit.
 Secundum, An febris lenticularis appellata, propter symptomata, po-
 tuit particularem curationem. Et ergo à primo exordiar, respondeo, tunc san-
 guinem mittere, dummodò sit in principio morbi. Id confirmo hac mittendus
 ratione. De sanguinis missione deliberamus, ex affectu postulante e-
 in accessio-
 uacuationem omnium humorum, & absentia impediendum. Sed in fe-
 brium continuarum accessionibus, quocunque tempore illa duo repe-
 riuntur, ergo licebit in quocunque tempore sanguinem mittere. Assum-
 ptionem probo, quia in quocunque tempore accessionis prædictæ, est flu-
 xio humorum ad focum, & robur virium. Imò melius est tempore quo
 viget accessio, sanguinem mittere: quia tunc solent fluere humores ad
 focum, in quo viget magis calor II. method. Neque est par ratio in in-
 termittentibus, quia cum in his tempore accessionis, humor à natura
 expulsus extra venas, sit in habitu corporis, sanguinis missione poterit
 remigrare ad venas, & ita ex intermittenti fieri continua. Vnde cum
 in his habeamus prohibens, nempe motum naturæ contrarium, sangui-
 nem mittimus tempore intermissionis. Dices, Galenus lib. de cur. rat.
 per sang. miss. cap. 20. scribit, in ipso die, in quo sanguinem mittimus,
 obseruadam esse inclinationem febris (ut statim addit) particularium
 circuituum declinationem. Respondeo, loqui Galenum de illis febribus, An febris
 in quibus sanguinis missio in hora circuitus propriam habet indicatio-
 nem. Secundum explicamus, de febre lenticulari (quam Tauardillo ca-
 rris habeat stellani, & nos Valenini vulgò appellamus, ob maculas in cute ap-
 parente similes pulicum moribus) aliqui integros libros scripserunt, et curationem.

DE CVRAND. MORB.

Varia sentia postulabat integrum librum hæc disputatio, in quo nil aliud sciendum erat, nisi errores in illis contentos refutare. Quidam enim *essentia.* hanc febrem semipestilentem efficiunt, hoc est or. am ex putredine, & venenato humore: & ideo esse contagiosam, & habentem periculosam accidentia. Alii hanc febrem non pestilentem, sed quæ induxit naturam pestis appellant: et quod fiat à putredine, habente pravam qualitatem.

Varia sententia. Unde omnes hi concedunt habere propriam curationem, tum propter in cū pter maculas, tum quia sine alexipharmacis non cessat. Et ita quidam *ratione.* sanguinem mittunt ob plethoram, alii non ob virum imbecillitatem. Quidam purgant in principio, & alii non purgant. Quidam vtuntur cucurbitulis, frictionibus, et sudorem mouentibus: alii bene vtuntur cucurbitulis cum scarificatione, quia attrahunt ad cutem, & evacuant, non tamen sudorem mouentibus, neque urinam, quia hæc cum sint calida, augent feruorem humorum. Omnes in principio vtuntur alimentis frigidis & adstringentibus, quidam ob putredinem, quidam ob venenum, & alii ob seminarium, hoc est pravam qualitatem. Multi etiam in principio vtuntur alexipharmacis ex margaritis, & aliis adstringentibus constructis. Non vtuntur alimento tenui, quoniam inquinant à prauitate humoris statim vires debilitantur. Hanc, & multam aliam varietatem videbis, quæ ostendit eos ignorare morbum, & veram eius curationem. Breuiter ergo veritatem sic accipe.

Propria Hæc febris continua est, quia à principio vsque ad finem nunquam cessat: & putrida, vt ex calore, pulsu & urina conspicimus. In eius principio solent apparere maculae, in cute, quæ symptoma sunt in excretis. Non sunt autem exanthemata, quia non sunt tumores: vnde reuocare eas poteris ad vitiliginem. Hæ maculae non sunt ob feruorem, vt *sententia.* Galenus & alii sentiunt, nescio enim vnde in hac febre feruor contingat, potissimum cum ipsimet ab humore crasso pendere scribant, sed fiunt ab humore vi facultatis expultricis ad cutem delato, quia cum putredo sit in humore crasso, sua acrimonia irritat. Præterea hoc symptoma, cum non deiciat vires, neque augeat affectum, non trahit ad se curationem, ac proinde contemnendum. Solum enim ex eo colligimus, morbum esse mali moris, hoc est qui sit ex inequali humore, qui non ita facile coquitur. Non autem est signum putredinis venenatae, quia tunc

Non est morbus vt hæc febris multos interficeret: & excretionem veneni in cute videre-
nenatus. mus, quod non contingit, imò nulla sunt veneni signa. Dices, non est pestilens, sed semipestilens. Quid mea, dicere febrem esse semipestilentem, est somnium & res ad libitum scripta: si enim putredo, quæ facit febrem, habet venenum, nonne erit pestilens? huius febris putredinem appellat Mercado putredinem sordidam, quasi putredo sit vlcus. Neque in cute apparentes maculae, significant pravam qualitatem humoris nobis incognitam, quia hæc febris sine alexipharmacis vllis cessat. Iam si lenticulae sunt symptoma, quod ad se non trahit curationem, cucurbit

arbitula, sudorifica medicamenta, frictiones & alia nonne erunt inu-
 lia? In principio enim morbi si applicentur, aut adhaereantur augen-
 obstructionem, putredinem etiam augebunt 8. method. Si in princi-
 pio, quando apparent, his non utantur, quid proderunt? Curanda et- *Curatio*
 o erit febris hac lenticularis, sicut aliae febres continuæ. Primò vi- *huius fe-*
 tum in ea instituentes, habita ratione virtutis, & status morbi, *ab-*
 erdumque est, & præter experientiam affirmare, vires in hac febre
 atim in principio, à prauitate humoris debilitari, cum nos innume-
 os quos curauimus, decies aliquando, & plus in principio sanguinis
 iissione euacuerimus. Alimenta etiam adstringentia, quæ exhibent,
 aspersa pulueribus ex margaritis & aliis lapidibus, & medica-
 nentis adstringentibus maxime lædunt, obstructionem augendo. Iam
 atim in principio sanguis mittendus est, non ob plenitudinem, ut hi
 entiant, sed ut reuellamus humores fluentes ad focum. Sanguine mis-
 o, & curata fluxione, ad obstructionem veniendum est, eam aperien-
 es attenuantibus medicamentis, constructis ex decocto borraginis, ci-
 orei cum radicibus, capillorum veneris, cum syrupis capillorum ve-
 neris, borraginis, oximelle, & similibus. Aperta obstructione, si na-
 tura rectè euacuat, nil est efficiendum: si verò non euacuat, aut dimi-
 nutiue euacuat, tunc oportet purgare. Et tandem potu aquæ frigida
 febris curanda. *V*sus Alexipharmacorum nullus est, imò hæc quocun-
 que tempore nocent, quia sunt crassa, & obstruentia, neque habent in
 hac febre qualitatē contrariam. Hac ratione curamus in hac valenti-
 na ciuitate contemnentes lenticulas, ac si non essent, cum felici succes-
 su: quia exercemus ea, quæ rei natura docet, & experientia (quæ in
 ciuitate multa est) confirmat. Neque mirandum est multos in Bethica
 regione mori, cum prauè curetur, imò tota medicorum curatio ex insti-
 tuto videtur excogitata ad hominum perniciem. Quid de symptomati-
 zis in hac febre apparentibus? Hæc febris cum sit continua pro varia
 corporis dispositione, modò phrenitim, modò lethargum, modò alia syn-
 ptomata inducit, quæ non solum in hac, sed & in aliis continuis febr-
 bus etiam euenire solent.

De tertiana exquisita. CAP. III.

EXquisita tertiana, febris intermittens est, à sola bile *Definitio.*
 flaua: proueniens extra venas putrefacta, quare pe- *tertiana*
 riculo caret, ut docent Hippocrates & Galenus A- *exquisita.*
 phorismo 43. libri quarti, etiam si sit acutus morbus autore
 Galeno comment. 20. lib. 3. cuius contrarium tradere vide-
 tur comm. 30. lib. v. aphor. in initio. Duplex est tertiana syn-
 cera, prima vnica, altera duplex: vnica verò est, cum tertio
 quoque die semel accessio fit. Altera duplex, scilicet ea cum
 bis

DE CVRAND. MORB.

bis accessio exquisitę bilis fit, vel quolibet die solius bilis accessio apparet.

Causę ex- Externę causę sunt similes causis febris ardentis, quam
quisitę ter- uis minores, Galeno autore comment. 59. lib. 4. aph. Vtraque
uianę. a flaua bile fit, interna est bilis flaua mota per corpus totum
Signa ter- & extra venas putrescens, autore Galeno eodem commen-
tianę ex- tario. Hęc tertiana exquisita statim ab initio in singulis ac-
quisitę. cessionibus affert rigorem vehementem, pungentem, ac vul-
nerantem: quia mouetur acris humor per partes sentientes
& in hoc differt ab ardenti febre, in qua non accedit rigor
nisi ante crism bonam, vel malam: bilis quoque vomitu ex-
pellitur. Est in hac tertiana syncera ordo exactus, & æquali-
tas pulsuum, qui in augmento accessionū ad vehementiam,
ac magnitudinem, atque frequentiam excitantur. In vigore
fitim inuehit magnam, post calor æqualiter per totum cor-
pus diffunditur, & primo cōtactu sentitur plurimus, ac mor-
dax, & statim a manu tangente vincitur. Et terminē semper de-
finit cum sudore accessio, quę intra duodecim horas termi-
natur: si vero diuturnior, ac longior fuerit accessio, non est
exquisita tertiana. Vrina eius similis est vrinę eius, qui febre
ardente corripitur.

Curatio. Curatur quatuor remediorum generibus. Primò, victu si-
Pictus. mili ardentis febris, per omnia fere: quamuis hęc tertiana
Aduerte remissioribus egeat, & in ipsa accessione æger nullo modo
quando in sit nutriendus, Hippocr. autore aphor. 11. primi libri, nisi fa-
accesione cultas esset imbecilla, aut natura ægri biliosissima parata ad
cibandus sit hecticam, qua in re non solum est cibus dandus in ipsa ac-
æger. cessione, sed in eius tempore deteriori, in statu scilicet. Præ-
ter hęc ante ipsam accessionem, saltem per septem horas est
nutriendus, & post ipsam: semper tamē sequi oportet, quod
docet Hippocr. aph. 17. lib. in vigore tamen accessionis æger
bibat copiosę aquam frigidam hordei cum syrupo violato,
vel saccharo, præsertim si bilis sit concocta: sudore enim su-
perueniente statim finietur accessio, & etiam totus morbus.

Signum le- Somnus maximē nocet in principio accessionum, & in aug-
thale. mento minus, & in vigore forsan, nocet, in declinatione
maxime iuuat, in qua si noceat, est signum lethale, cum Ga-
leno com. 1. lib. 2. aph.

Prępara- Secundo, apparantibus bilem, de quibus dictum est cap.
rio. superiori tertio genere remediorum, & i. c. primi libri.

Purgatio. Tertiò, vacuantibus bilem in die post accessionem quar-
tam, quę solet esse status huius morbi, præsertim quando fi-
nitur in septem circuitibus, aliquādo vnico, vel duobus cir-
cuit

litibus terminatur: intellige de vacuatione, quæ fit per in- *Aduerso.*
riora. Nam in ipsa accessione non est faciendâ vacuatio ab
te, ne addamus laborem labori: per vomitum vero initio,
per sudorem in fine accessionum sæpe natura, & ars ipsam
quens solent euacuare. De medicamentis, quæ bilem pur-
ant, simplicibus, & compositis dictum est cap. superiori quar-
genere remediorum, & primo cap. 1. lib. & in multis aliis
cis, præcipuè 1. 3. & 4. cap. primi libri.

Quartò, refrigerantibus, & corroborantibus cor, iecur, *Alteratio*
nes, & totum corpus, internis, & externis dictis quinto ge- *& corro-*
re auxiliorum, cap. præcedenti quamuis hic paulo mitio- *boratio.*
conueniant.

De tertiana exquisita. CAP. III.

Scholium.

EXquisita.) Terciana intermittens, ex bile putrescente in
loco obstructionis fit. Dico in loco obstructionis, quia bilis *Bilis flaua*
flaua tenuis cum sit, obstruere non potest: omnis enim ob- non ob-
structio ex Galeno fit à tribus causis, ab humore multo, crasso, aut leni struit.
: At bilis non potest esse multa, quia per multum Galenus 10. meth.
p. 2. plethoram intelligit, quam bilis sola efficere non potest. Bilis e-
im neque crassa est, neque glutinosa. Fit autem febris ex bile hac
tione, quando ab humore crasso aut lento obstructio est in aliqua ve-
s, bilis adueniens perficit obstructionem, & cum ipsa abundet, pu-
esit nõ disflata, et hac ratione generat febrẽ. Est autẽ hæc intermit-
ns, quia quando incipit putrescere bilis in foco putredinis, expellitur
tra rassa per sentientia membra: ubi putrescit omninò, et facit accesi-
onẽ, quæ ut in plurimum sudore finiuntur. Dices, nõne bilis vitellina, Obiectio,
porracea, possunt obstruere? Respondeo id concedendo, quia cras- *Solutio*
sunt. Neque cum Gal. de arte curatiua ad Glauc. scribit hanc fe-
rem fieri ex concitata bile flaua, per concitaram bilem intelligit tur-
ntem, sed bilem per habitum corporis motam. Signa febrium pu-
ium in genere habes, lib. 1. de diff. feb. cap. 7. Signa verò tertianæ ex-
quisitæ, lib. 2. cap. 3. & 1. de arte curatiua ad Glauc. nem.

Curatur quatuor remediorum generibus.) Si vires consent *Victus.*
que ad statum, tenui victu utere, ut ptisina. Quod si vires langui-
ores fuerint, victum augentes exhibebimus gallinæ pullum, aut gal-
nam. Post concoctionem crassiori victu utemur, (cerebellis suum, pe-
bus, carne porcelli & aliis) ut probè hominis substantia, (quæ mul-
um dissipata est) resarciatur. Tum quia hæc alimenta facile corrumpi
i non possunt, imò qualitatem bilis retundunt. Quod si vires sint lan-
uidæ, misce cum eis quæ obstructiones aperiunt, malua utitur etiam
i Galenus, lactuca, & astriplice, quæ frigida sunt. Omis utemur etiam

A

arte

DE CVRAND. MORB.

ante coctionem decoctis cum paucis petroselino. Ex fructibus pira et
 etia cum paucis cinnamomo & saccharo optima sunt: pira enim refri-
 gerant, cinnamomum adstrictionem corrigit, & saccharum aperi-
 Pruna etiam, & cerasa conceduntur, ex piscibus saxatiles: turdus, in-
 lis, phichis, sparus. Vinum ante coctionem ob consuetudinem, aut
 sit aquae vehiculum concedatur, ac prout debet esse paucum. Post
 coctionem liberalius dandum, quia urinam & sudorem mouet.

Secundo, apparantibus bilem.) In tertiana hi sunt affectus
 calor, putredo, prohibita transpiratio, obstructio ab humore crasso
 & fluxio humoris ad obstructionem: unde curatio debet in ipere
 In tertiana sanguinis missione. Multi imò omnes affirmant, Galenum in libro a-
 na Galen. tis curatiua omisisse sanguinis missionem, & incepisse à refrigeranti-
 sanguinem bus, propter febrem, quae magna est. Decipiuntur tamen, quia ibi
 mittit. tiam consiliū sanguinis missionem, ut qui indicationes intelligit, videri
 re poterit. Ibi enim postquam scripsit: contrariis contraria esse re-
 media, quae quod superat reprimunt, quod autem deest, faciant. Fluxio
 uae autem bilis humor, omnium qui in corpore sunt humorum, calidissimus
 ac siccissimus est, itaque exinanientius est: haec Galenus. Si bilis
 est exanimata quia alia ratione quasi, nisi in principio sanguinis mis-
 sione: & post coctionem purgatione? dices in hac febre non sunt vires.
 Respondeo verum esse vires deficere ad euacuandum, non autem a-
 reuellendum. Quod si adeò imbecilles sint, ut sanguinis missionem no-
 ferant, multum refrigerantibus uti. Quae acrimoniam bilis tem-
 perabunt, & sic retardabunt eius impetum. Ex Galeno enim 3. de san-
 tu. bilis cum impetu fluens perficere potest obstructionem, quae si sen-
 sim moueatur, eam exterget.

Secundo, apparantibus bilem.) Sedata fluxione humoris bi-
 liosi ad focum putredinis, quod ex coctione incipiente deprehendes: quod
 Obstructio ut dicit auctor, sed ad curandam obstructionem veniendum est. Quo
 curatur. curabitur syrupis refrigerantibus ob febrem, & aperientibus pro-
 pter obstructionem, qualia sunt syrupus endiuiae, borraginis, acetosae,
 Obiectio. tatis citri cum decocto hordei, cichorei, borraginis, & endiuiae. Dices, si
 Solutio. augmento non licet sanguinem mittere: Respondeo bene licere, qui
 tunc adhuc est fluxio, neque multum diuertimus naturam.


Purgatio. Tertio, euacuantibus bilem.) Aperta obstructione si natura
 non expurgat bilem, tunc eam purgabimus extra accessionem tamen
 ne impediamus naturae motum, qui ad externa fit. Considerare autem
 oportet motum humoris, qui si lateat, quia natura nullam tentauit
 euacuationem, tunc per intestina, per quae solet communiter natura eu-
 uacuare bilem, purgabimus. Per deiectionem purgat Galenus absin-
 thio, quod deiectione, & per urinas optime euacuat, obstructiones ape-
 rit, ventriculi que os roborat. Per urinas purgat decoctum apii. Per
 sudorem

sudorem autem balneum dulcis aquæ, quod humectat corpus, & excrementa, per habitum corporis euacuat: refrigerat etiam ex accidenti, euacuatis calidis excrementis.

Quartò, refrigerantibus.) Si putredine euacuata intemperies Refrigerat aliqua calida remaneat in iecore, corrigenda est ea ratione, qua do- *ti iecoris* cet auctor in fine capitis superioris: omitte tamē descriptionem cardiacam ibi descriptam, quia continet aurum & alia inutilia.

De Tertianâ nothâ, seu spuria.

CAPVT IIII.



Tertiana nothâ, seu spuria, est febris intermittēs, *Descriptio.* quæ fit ex flauâ bile vincēte, & pituita pauciore: & hæc dicitur a barbaris maioris famæ: quia sæpius accidit: vel a bile flauâ dominante, & atra bile pauciori, putridis extra venas, & per totum corpus: & hæc dicitur a barbaris minoris famæ, qui rarò accidit. *Externæ Causæ.* Causæ sunt omnes, quæ bilem simul, & pituitâ gignunt, vt de ipsa agamus, quæ magis accidit. Sed vincētibus causis bilem generantibus vide, quæ diximus capite 2. huius libri, & capite sequenti de quotidiana, & ex his compara tecum causas: notæ enim mixtæ sunt, non simplices, vt in syncera, & *Notæ.* exquisita tertiana, aut in quotidiana pura: & ideo incipit accessio cum rigore mitiori, & leuiori, quam in exquisita tertiana: licet sit longior horror, sentiatúrque frigus actu, a frigidis enim humoribus humor syncerus, & vehemens fieri nequit. Longius etiam principium est accessionis, quemadmodum omnia tempora accessionis & etiam totius morbi: nam excedit duodecim horas, & quantò maior est accessio, tanto magis ex pituita gignitur: & quantò longior accessio, tanto totus morbus longior: aliquando enim incipit tertiana nothâ initio autumnus, & finitur vere: exquisita vero longissima septem circuitibus iudicatur. Sitis in hac est minor, & sudor: quamuis aliquando ægroti sudent copiose, quòd si frigidus sudor fuerit, maximam indicabit longitudinem. In ventre apparent obstructiones, aliquando in hepate, & aliquando in splene. Quod si in membris durities aliqua fiat, hydropem indicat imminentem. *Curatio.* Curatur sex re- *Victus.* mediocri generibus: Primò, victu refrigerante, & hume- ante magis, quàm calfaciente & exiccante, habita ratione multitudinis vtriusque humoris, quæ per signa cognosci potest: ideoque Galen. primo artis curatiuæ ad Glauconem optimè miscet parum piperis cum cremore hordei non nimis tenui, quia morbus hic diuturnus est, duratque multos

A 2 non

- menes, aliquando sex: semper tamen nutriendus est æger extra ipsam accessionem vel in declinatione ipsius, nisi æger fuerit imbecillus, vt diximus capite præcedenti. Nutriatur ergo iure gallinæ teneræ, & carnibus arietinis cum hordeo excorticato, & paucis ciceribus nigris, vel radice petroselin. Nutriatur quoque carnibus ipsius gallinæ non solum elixæ, sed etiam assatæ, & pullo gallinaco, coturnice, perdice, & hædo, & frusto aliquo cuniculi. In initio cœnæ comedat cappares sine sale, & cum saccharo, vel senationes cum melle, & aceto, vel folia raphani, & similia. In fine verò cortices citri saccharo conditos, vel nucleos pini conditos etiam saccharo, & similia. Potus sit aqua cinnamomi, vel aqua ceterach, seu scolopendriæ Græcorum, non officinarum, quia est lingua ceruina, & phyllitis Dioscoridis, quæ astringit. Quod si appetitior vini sit, debet album parari, vel rubrum tenuis substantiæ. Somnus in primis tribus temporibus accessionis magis nocet, quam in exquisita tertiana. Motus & exercitatio extra ipsam accessionem moderata est utilis, & necessaria, saltem frictio totius corporis.
- Cibus.**
- Potus.**
- De scolopendria.**
- Horroris & frigoris ablatio.**
- Potus vi- ni sedat rigorem.**
- Hepata ranarum.**
- Sectio venæ.**
- Clyster ante sectio nem venæ.**
- Preparatio humorum.**
- Secundò, tollentibus horrorem, & rigorem, qui sua longitudine, & vehementia solet ægrum cruciare: vt pannis lini actu calidis partibus extremis admotis, & parti ei, quæ inter testes, & anum interiacet. Oleo ex camomilla, vel lilio, vel rutæ bene calido illis partibus admoto mederi possumus. Paucum vinum, si bibatur, curat hunc rigorem cum horrore: & si sit cum infusione trium radicum plantaginis erit efficacius remedium. Aliqui in hoc genere remediorum laudant tria hæpata ranarum cum paucio vino. Quæ si in initiis trium accessionum sumantur, solent curare hos vehementes horrores, & rigores.
- Tertiò, secta vena cubiti dextra, si fuerint signa sanguinis (de quibus cap. 2. huius libri de febre ardenti diximus) sanguinisque copia extrahatur respondens plenitudini, natureque ægri, inanito tamen ventriculo, & intestinis per hunc vel similem clysterem: ℞. foliorum maluarum, & folio violarum nigrarum an. m. j. fursuris & camomillæ an. p. j. seminis carthami ʒ. ij. fiat decoctum, de quo percolato accipe ʒ. xv. in quo dissolue diacatholiconis ʒ. j. benedictæ ʒ. ss. olei violarum ʒ. ij. olei camomillæ ʒ. j. salis ʒ. j. misce, & fiat clyster.
- Quartò, apparantibus bilem cum pituita, quamuis habitata ratione pituitæ quantitatis, vel qualitatis sint vel augenda, vel multis diebus sumenda calida hac, vel simili forma, vt ℞. syrupi de bizantiis, & endiuix compositi an. ʒ. ij. rhodom

domellis ʒ.vj. misce. Item ℥. aquarum capilli veneris, cichoreæ, fœniculi, & endiuæ. an. ʒ.vj. misce, vel earundem rerum lb. ij. Hæc sumatur per sex dies, vel si opus fuerit plures his, donec paratus sit humor: quamuis ob sui diuersitatem non vnica sed pluribus vacuationibus indigeat, semper præcedentibus concoctionibus multis.

Quintò, vacuantibus materiam mistam ex bile vincente, *Purgatio.* & pituita pauciori, vt ℥. diacatholiconis ʒ.vj. diaprunis solutiu ʒ. iij. diaphœniconis ʒ. ij. rhodomellis ʒ. j. decoctionis communis. q. s. misce, & fiat potus. Vel ℥. pilularum aggregatiuarũ ʒ. j. optimi diagridij ʒ. iij. cum aqua buglossæ fiant pilulæ septem, & aurentur. Vel ℥. pilularum de rhabarbaro ʒ. ij. agarici trochiscati ʒ. j. optimi diagridij ʒ. iij. cum aqua borraginis fiant pilulæ septem, & aurentur. Aliqui hac notha tertiana affecti solo vomitu sunt liberati, vt vult Gal. primo de arte curatiua ad Glaucōnem, qui si sponte satis non excitatur, potest arte moueri, syrup. acetoso simp. cum decocto seminis raphani, & aliis similibus. Si tamen prior, & vnica euacuatio non suffecerit, quemadmodum rarò in his nothis tertianis sufficit, iterum corroboratis ventriculo, hepate, & corde, & refrigeratis per ea, quæ dicemus sexto sequenti genere remediorum, est humor concoquendus syrupis, & medicamentis iam dictis genere quarto præcedenti, vel hoc, aut simili medicamento: ℥. quinque radicum diureticarum, quiritiæ ana. ʒ. j. capilli veneris, ceterac, cichoreæ, endiuæ, scabiosæ, absinthij, borraginis an. m. j. fiat decoctum, de quo percolato accipe lb. iij. sacchari lb. j. syrupi de bizantiis, & endiuæ compositi an. ʒ. iij. trochiscorum de rhabarbaro ʒ. ss. pulueris diarrhodonis Abbatis ʒ. ij. pulueris, cinnamomi ʒ. j. misce, & fiat syrupus non perfecte decoctus: Dosis vnciæ sex quolibet die. Et qualibet hebdomada semel, vel bis fiat vacuatio per has pilulas: ℥. pilularum de rhabarbaro, & aggregatiuarũ ana. ʒ. j. fiant pilulæ xv. & aurentur, si non est pauper, Dosis tres. Si opus fuerit, adde cuilibet earum ʒ. j. optimi diagridij, vel si nò amat pilulas, vel nò potest ipsis transglutire, ℥. diacatholiconis ʒ. ij. diaprunis solutiu ʒ. j. diaphœniconis ʒ. ss. agarici trochiscati, & conseruæ borraginis an. ʒ. ij. rhodomellis quod sufficit, misce, & fiat confectio: Dosis cochlearium vnum cum aqua absinthij, vel buglossæ. *Confectio.*

Sexto, refrigerantibus iecur, & totum corpus internis, & externis, & aperientibus obstructions venarum meseraicarum, hepatis, & lienis, si fuerint quæ in hac notha tertiana sæpe reperiuntur, præsertim quando est longa: quamuis ob-

A 3 struct

D E C V R A N D. M O R B.

Obstructio obstructio curanda prius sit, quam vacuanda materia, imò sine prius cu- eius curatione nunquam curabitur febris: apparente ergo randa, obstructione fiat totus in ipsa & toto ventre inferiori ex de- quam va- cocto quinque radicum diurericarum, camomillæ, seminis cuanda lini, fœnugræci, absinthij, præcedenti fotu hoc, vel irrigatio- materia. ne facta spongia bis in die vacuo ventriculo vngatur venter


Vnguentū versuſ splenem hoc vnguento: ℥. olei de capparibus, & a- mygdalarum amararū an. ʒ. j. ʒ. vtriusq; dialthææ, vnguenti spleni ad- Aragon ana. ʒ. ʒ. armoniaci dissoluti in aceto ʒ. ii. j. ceræ q. f. mouendū, misce, & fiat vnguentum: adde pulueris trochiscorū de myr- rha ʒ. j.

Hepati Hepati laboranti obstructione admoueatut hoc, aut simi- le vnguentum: ℥. olei amygdalarum amararum vnciam j. olei nardini ʒ. ʒ. ceræ quod sufficit, misce, & fiat vnguentum. Et si opus fuerit vti non solum externis dictis, sed aliis, & in- ternis ad has obstructiones necessariis, vide quæ diximus ca- pitibus 42. & 45. primi libri. Curatis his obstructionibus, at- que euacuata iam materia, refrigeratio, & corroboratio per electuarium diarrhodon. Abbatis facta per aliquot dies erit utilis, & necessaria, sumptis quolibet die drachmis quatuor

Refrigera cū pauco vino albo aqua diluto. Et hepati admoueatut hoc, tio & cor- vel simile vnguentum, ℥. vnguenti santalati ʒ. j. ʒ. olei nar- roboratio. dini ʒ. ʒ. pulueris diarrhodonis ʒ. j. misce. Si ventriculus la- Hepati. borauit aliqua imbecillitate, ei admoueatut hoc, aut simile Venticu- vnguentum: ℥. olei de absinthio ʒ. j. olei laurini ʒ. ʒ. pulueris lo, gariophyllorum, cinnamomi, & rosatæ nouellæ an. ʒ. ʒ. ceræ, q. f. misce, & fiat vnguentum. Et si opus fuerit, vide alia scri- pta cap. 31. de imbecillitate ventriculi libri primi.

De tertiana notha, C A P, I I I I, Scholium.

Que sit
tertiana
notha.



Tertiana notha.) Tertiana notha, aut spuria, potest fieri a bile vitellina, quæ crassa est, & hæc raro contingit: aut a permixtione humorum crassorum cum bile. Frequenter autem solet accidere ex permixtione pituitæ cum bile. Et ideo symptomata habet non bilis sincere sed confusa & mixta, ut re- fte docet auctor.

Victus in
morbis.

Primò, victu refrigerante.) Galenus in lib. i. de art. cur. in mor- bis, inquit, victus ex morbi longitudine, & virium robore, virium ro- bur ex pulsu, cognoscimus: Morbi verò longitudinem, & breuitatem, ex humoris morbum facientis natura, & aliis symptomatis. Nam si humor sit pituitosus, longior erit morbus, quam si sit biliosus. Tum si singulis accessionibus nulla fiat vacuatio, rigor sit exiguus, accessio-

que

ne periret, signum est morbum esse longum: si contra res eueniat, reuiorem. Si ergo vires sunt robustæ, & morbus coctus difficilis, inedia conducet. Quia hoc victu nec morbus augebitur, nec vires concident, quæ ob robur sufficient, & quæ ad morbi coctionem, quem vincentium non impediuntur ab alimento. Quod si vires sint languidæ, & morbus facilis coctionis, vitendum erit victu crassiori, qui eius alimentum humorem augeat, cum facile coquatur, à viribus robustis vincitur. Hos duos modos solum adducit Galenus, quia ex his facile est tertium inuenire victum, qui in morbo contumaci, & viribus languidis imperandus est. Hic victus tertius medicis esse debet, nec tam tenuis, ac in virtute robusta, nec tam crassus, ut in his, qui vires habent languidas, cum morbo facili coctu coniunctas. Corroborabimus ergo vires, sed non adeò ut malum augeamus, quod contumax est. Hinc colligemus victus in quo victu sit vitendum in hac tertiana, quem ex longitudine morbi, & tertiana, viribus debemus instituere. Quod difficile est, posse exacte præstare, cum sint contrariæ indicationes, quæ ex morbo, & virtute sumuntur. Consulentes enim vni, alteri officimus. Quantum enim inedia morbo est utilis, tantum deicit vires, quas in hoc morbo oportet seruare, cum debeant longiori tempore laborare.

Secundo, tollentibus horrorem, & rigorem.) Radicem plantaginis proprietate valere contra rigorem, & horrorem, sentiunt multæ. Aliqua taginis proprietate valere contra rigorem, & horrorem, sentiunt multæ. Quod ridiculum est, magis autem quod scribit auctor, de tribus herba contra patibus ranarum, quasi duo, aut quatuor non possent prodesse, si verum horrorem rum esset facultate occulta agere, ita ut ex ipsis utilitas sequeretur. irridetur.


Tertio, secta vena.) In hac febre sicut in aliis putridis, supradictæ. Sectio venæ. Et affectus sunt considerandi. Et cum indicatio à febre non urgeat: na. sicut in supradicta, prout Galenus nullam mentionem fecit refrigerantium, & humectantium, incipienda ergo erit curatio ab obstructione fiente siue ab humore, qui eius est causa. Hunc reuellemus mittentes sanguinem (etsi non sint signa sanguinis) si tamen vires consent. Obiectio. Dices, hæc febris non est magnus morbus, ergo non licebit in ea sanguinem mittere, cum ex morbi magnitudine, & virium robore de hoc Solutio. remedio deliberemus: Respondeo, verum esse, nos non mittere sanguinem propter magnum morbum præsentem, sed propter alios morbos graues imminentes.

Quarto, præparantibus bilem.) Sanguine missa diuretica medica. Diuretica camenta propinabimus. Non quod velimus, urinam ante coctionem medicamentum mouere, hoc enim non est faciendum: sed quia diuretica aperientia sunt. Ita. Et ita propter obstructiones ea propinamus, dummodo non sint multum calida & sicca, ne febrem augeamus. Vtemur ergo syrupis his oxymelle simplicis, syrupo endiuiæ compositio, borraginis, sumiterræ, & aliis cum aquis quinque radicum, cichorei, borraginis. Si hæc non sufficiunt potissimum hyeme & aliis temporibus, in quibus humor con-

DE CVRAND. MORB.

- Apozema-** tumax est, vii poteris *Apozematis*: quæ sunt syrupi longi ex syrupi
ta. aquis, trochiscis et aliis compositi. Licet etiam vii syrupo de absinthio
Absin- aut decocto, non ante septimum diem: Quia ante septimum diem cru-
thium. ditates multæ sunt in ventriculo, quæ ab absinthio impinguntur ex &
 de san. tu. At cum post septimum diem tenui victus ratione, humore
 sint cocti, vtiliter tunc absinthio utemur, quod roborat interna viscera
 & deobstruit. Coctionem humoris iuuabimus quiete, quia in hac calor
 non mouetur ad externa, vt in exercitio. Fomentis etiam externis, vr-
Balnea. gentes iecur, ventriculum & lienem oleo de absinthio vt calefiant, &
 roborentur. Balnea ante coctionem inutilia sunt, tum quia in hac febre
 non est necessaria corporis humectatio: Tum quia augent obstructio-
 nes: Tum quia humores crassi à balneo non poterunt euacuari. Post co-
 ctionem non adeò audacter eo utemur ac in tertiana exquisita, pro-
 pter dictas causas: semel tamē & bis ipsum concedimus, vt melius hu-
 mores coquantur. Clysteribus fortioribus vii oportet ex chamemelo, ris-
 ta & aliis cum agarico, aut diaphenicone, & hiera.
Purgatio. Quinto, euacuantibus.) Rectē purgat auctor. Aduerte tamen,
 quod si materia impetum fecerit ad vrinæ meatus, tunc vtendum esse
 diureticis. Vomitus vtilissimus est, hic tamen non est ciendus, nisi nat-
Vomitus. sea precedat. Facilius autem est post cibum vomere, quia permiscen-
 tur excrementa cum alimentis.

De Quotidiana. CAP. V.

- Diuisio,**  **Quotidiana** febris duplex est, altera intermittens,
Causæ, quæ fit a pituita extra venas, & per totum corpus
 putrida, singulis diebus accidens: altera sine inter-
 missione, quæ fit a pituita putrida in venis. Vtriusque febris
Signa, causæ sunt alimenta pituitosa, vt pisces, herba frigida, le-
 gumina, & otium. Quotidiana intermittens haud qua-
 quam cum rigore primo statim die inuadit, sed temporis
 progressu, refrigeratio potius, quam rigor occupat: & quan-
 to pituita est frigidior, tanto maior est refrigeratio. Quare
 in ea, quæ ex acida, vel vitrea contingit pituita, erit maior,
Pulsus. quam in ea, quæ ex dulci generatur. Pulsus, cum primū
 accessio fit, inordinatus est, & inæqualis, tardus, paruus, ac
 debilis. Neque in augmento magnitudo, velocitas motus,
Calor, & frequentia quotidianæ accidunt: Calor illi non tam a-
 cris, ac in tertiana, neque multum, ac crebro spirare compel-
 lit, sed anhelitus expirationes humida, fumosa, & multum
 vaporosa sunt. Tarde ac ægre acceditur, ac tempus longum
 consumit, dum ad summum inualescendo peruenit. Non fi-
Præse, tiunt ii; vrinæ albæ, aquosæ, tenues, vel crassæ, aut turbulen-
 te. Nullus sudor in primis diebus erumpit, neq; exacta quies
 appar

operaret donec ad finem totius morbi deuentum sit. *Spatium* *Spatium*
 accessionum est decem & octo horarum, & quietis falsę sex.
 las omnes notas, & plures alias scribit Gal. primo de arte
 curatiua ad Glauconem, & secundo de differentiis febrium, *Febris quō*
 & secundo de crisi- *bus*. Sed quia Hispani, & qui habitant ca- *ridiana* *ra*
 das regiones rarissime his febribus exquisitis laborant his *risima a-*
 ratermissis ad curationem ipsam accedo. *pusd nos.*

Curatur quinque remediorum generibus. Primò, victu *Curatio.*
 incidente, & extenuante, de quo capitibus septimo, & octa-
 o, & aliis locis prioris libri dictum est, dummodò non nu-
 tiatur nisi in fine accessionis, & extra ipsam, nisi deficerent *Victus:*
 ires. Victus quoque non sit tenuis propter morbi longitu-
 dinem: Nutriatur ergo iure columbi cum ciceribus, & radi- *Cibus.*
 e petroselini, vel iure gallinæ cum eadem radice, & foliis
 raphani, vel perdice, vel turture & similibus cum pipere,
 innamomo, croco, & aliis aromatis.

Potus sit aqua cinnamomi, vel radicis petroselini. *Potus.*

Secundò, corridentibus rigorem, vel potius frigus oleis *Frigoris*
 calidis spinæ tori admotis, vt rutę, lauri, de lilio, de castoreo, *correctio.*
 & extremis apponantur panni bene calidi. Drachma vna
 heriacæ magnæ, vel mithridati, vel rubeæ trochiscatæ cum
 pauco vino, decoctionis rutæ, saluæ & abrotani est opti-
 num remedium, in hoc præcipue post 14. diem, & parum
 purgato corpore.


Tertiò, concoquentibus pituitam medicamentis dictis *Concoctio.*
 primo c. & aliis de morbis pituitosis prioris lib. per 8. vel 10.
 dies.

Quartò, vacuantibus pituitam exhibitis tempore falsæ *Purgatio.*
 quietis: de quibus dictum est cap. 1. & aliis prioris libri. Ali-
 quando est utilis vomitus in hac febre, præcipue si natura
 indicauerit, quem decocto seminis raphani, & anethi cum
 oxymelle simp. poterimus prouocare.

Quintò, corroborantibus ventriculū, & hepar: vt electua- *Vomito-*
 rio rosatę nouellæ, aromatico rosato Gabriels, theriaca ma- *rium.*
 gna, mithridato, conserua acori, sticados. Dosis horum est 3. *Corrobo-*
 vna vsque ad 3. ij. cum vnciis duabus, vel tribus aquæ vel ratio.
 decocti fœniculi, anisi, petroselini, melissæ, & similium.

De Quotidiana. CAP. V.


Scholium.

 Quotidiana febris duplex est.) Quotidiana febris à pi- Quotidia-
 mita putrescente ortum habet. Cuius signa lege apud Gal. na.
 lib. 2. de diff. feb. c. 4. In hac febre (putrida cum sit) affectus
 super

DE CVRAND. MORB.

Signa. superius cap. i. explicata, considerare oportet, ut recte curetur. **Debi-**
Curatio. mus enim incipere à causa obstructionis, quæ est humoris fluxio. **A-**
An in quo autem eam debeatius sanguinis missione auferre, nec ne, distinctio
idiana sit est opus. Si enim succi crudi in hac febre abundant, multi sint, et pa-
sanguis cus sanguis cum ipsis permixtus, tunc non licet sanguinem mittere.
mittendus. quia non constant vires. Quod si sanguis plurimus sit, & humore
Curatio ob crudi plurimum non excedant, sanguinem mittemus: quia est robu-
structionis. virium. Sanguine misso, cum obstructio fiat ab humore crasso, & glu-
Interpreta timoso, inscindentibus, & urinam mouentibus, (quæ rim habent ape-
sio loci Ga riendi) vtendum erit, in primis diebus (vt ait Gal. ar. cu. ad Glau-
leni. aut vt vertit Leonicens, post primos dies. Acachia, Mena et alii pri-
 mam lectionem sequuntur: nos secundam. Quamuis enim vtraque le-
 ctio tollerari possit, secundam tamen elegimus, quia melius est primis
 diebus vii inedia, sic enim coquantur humores in ventriculo contenti.
Ventriculi & hac ratione post primos dies melius attenuabuntur. Extenuantia
ratio ha- quibus vtendum est, sunt oxymel, syrupus de stechade, rhodomel me-
benda. licratum cum decocto feniculi cichorei et similium. Circa statum opus
Quies. est ventriculi (vbi pituita generatur) rationem habere, ita vt in ipsi
Inditio. recte humores coquantur. Quietem ergo imperabimus, & exterius
 vngemus ventriculum corroborantibus, oleo irino, mastichino, de ab-
 sinthio, nardino, & similibus: quæ calorem ventriculi augent, & ip-
 sum constringunt: quod post coctionem faciendum est, sicut & romi-
 tus post coctionem mouendus, deoquentes semen radiculæ, & oxyme-
 permiscentes. Post humoris coctionem, eum purgabimus, diaphanico-
 ne, hiera & allis. **Victum** ex cap. superiori institues. Aduerte tamen
 in hac febre non esse multum calidis medicamentis vtendum, quia ex
 4. de san. tu. in his, qui cruditatibus laborant, eas ad venas deducunt
 maiores.

De Quartana. C A P. V I.

Diuisio. uartana duplex est, quædam continua, quæ fit, ex
 atra bile putrescente in venis: altera intermittens,
 quæ fit ex atra bile extra venas, & per totum corpus
 putrescente. Et hæc duplex est, vna intermittens quartana,
 cuius accessio accidit quarto quoque die, vel duplex, cuius
Causa. duo circuitus sunt in quinque diebus. Accessio primi re-
 spondet quarti diei accessioni, & secundi accessio quinti diei
 accessioni, tertius verò est dies quietis tantum. Cuius causæ
 sunt alimenta melancholica vt salsa omnia, carnes hircinæ,
 bubulæ, leporinæ, ceruinæ, cochleæ, legumina, animi & cor-
 poris labores immodici, & aliarum febrium longitudo, præ-
Nota. cipue si fuerint sine ordine, & autumno. Hæc febris non sta-
 tim, & primo die cum rigore vehementi, inuadit, sed talis
 est

qualis iis, qui frigesunt gelu vehementi, progrediente
 idaucta febre vna cū rigore augetur, inualefcitque quo-
 ie vsque ad totius morbi augmentum. Sensus rigoris non
 pungentis, & stimulantis cutem, sicut in exquisita ter-
 na, sed inducentis algorem vehementem, & tanquam of-
 frangentis. De differentia rigoris, tertianæ, & quartanæ
 de Galenum 2. de differentiis febrium cap. 5. & 2. de crisi-
 s cap. 3. Et si vis scire, an frigidi humores rigorem efficere
 leant, vide commentarium doctissimi Valleriolæ cap. 5.
 ri de symptomatum causis. Pulsus in ea sunt satis tardi,
 in principio accessionum rari, & duri, in augmento, & vi-
 re fiunt veloces, & frequentes: quamuis si conferantur
 in pulsibus febrium biliosarum, & sanguinearum, sint tar-
 iores, & rariores: in hac enim paulatim humor veluti la-
 s, aut testa, aut os succenditur, & semel incensus diu con-
 ruatur. Quare longiores sunt accessiones, & morbus lon-
 gissimus est, fere semper durat vnum annum, aliquando
 duos, & quandoque duodecim annos scimus durauisse: atra
 bilis vehementer resistit, & tardè mouetur: ægri cutis
 atra est, & densa, & tempus, in quo fit frequentius est inæ-
 tale, autumnus videlicet, vrinæ ægrotantium sunt tenues,
 bæ, & aquosæ.

Curatur sex remediorum generibus. Primò, victu humi- *Curatio.*
 do, & parum calfaciente, vt iure arietis & gallinæ cum bu- *Victus.*
 olla, & borragine, & aliis omnibus dictis capite nono prio *Qui cibi*
 s libri dummodò æger sumat alimentum extra accessio- *vitandi.*
 nem, nisi vires deficerent. Ceuendum est, ne sint alimenta *Potus.*
 atuosæ, & melancholicæ, vt legumina salsa, & alia similia
 is. Potus sit vinum rubrum mediocris substantiæ, & ætatis
 mediæ, dilutum aqua decoctionis radicis buglossæ. Utatur
 quiete corporis, & animi, & somno. Bis saltem in hebdoma- *Clyster.*
 a venter hoc, aut simili clystere leniatur, & lubricetur: ℞.
 oliorum maluarum, mercurialis, borraginis & buglossæ, an.
 .j. cpytimi ℥.ss. furfuris p. prunorum damascenorum paria
 ex, fiat decoctum, de quo percolato accipe libram vnā se-
 nis, cui adde diacatholiconis ℥.j. confectionis medicaminis
 Hamec, ℥.ss. oleorum sesamini, & camomillæ, an. ℥. ij. butyri
 recentis ℥. i. misce, & fiat clyster.

Secundò, si omnia ferme sanguinis signa adsint secta ve- *Sectio ve-*
 na interna cubiti, dextri, & misso sanguine, qui plenitudi- *na.*
 ni, & viribus respondeat autore Galeno primo de arte cu-
 ratiua ad Glauconem: quamuis in hac longissima febre
 sanguis parce est mittendus. Aliqui lienis venam secant in
 hac

DE CVRAND. MORB.

An secan- hac febre. Sauanarola vir doctissimus in ipsa coniunctio-
da sit ve- secat iecorariam sinistram, & se multos laborantes quart-
na iecora- na pristinae salutis restituisse dicit.

ria sinistra Tertio, post tres menses ab initio febris concoquentibu
Concoctio & apparantibus atram bilem, de quibus cap. 1. & 9. prior
Syrupi. libri dictum est: Sed propter tyrones: ℞. syripi borragini
Aqua vel & buglossæ. an. ʒ. viij. syripi de fumo terræ simp. & de epith
decoctum. mo. an. ʒ. iij. syripi de scolopendria. ʒ. iij. misce: & ℞. aqua
 rum buglossæ, borraginis, scolopendriæ, & capilli vener-
 ana vncias decem, vel decocti horum libras tres semissem.

Purgatio. Quartò, materia aliquo modo apparata vacuanda est
Posio. hoc, vel simili medicamento: ℞. diasenæ, & medullæ cassiæ
 fistularis recens extractæ. an. ʒ. ʒ. pulueris epythimi, ʒ. ij. si
 decocti florum cordialium quod, s. misce, & fiat potus, quer-
 in secundo die quietis accipiat, si vnica sit quartana: si du-
Pilula. plex, in die quietis, si verò continua, in die minoris laboris
 Qui non possunt purgans liquidum bibere, vel statim ip-
 sum euomunt, has, aut similes pilulas hora consueta sumat
 ℞. pilularum Indarum, & de fumo terræ an. ʒ. ʒ. optimi dia-
 gridij grana quinque, cum aqua buglossæ fiant pilulæ se-
 prem, & aurentur. Post debitam vacuationem propter siccita-
 tatem à pilulis relictam loco iuris sine sale, bibat vncias sex
 decocti fructuum & florum cordialium vncias duabus sac-
 chari.

Admoni- Sed quia hæc materia est eterogenea, & terrestris, non sa-
tio. tis est vna preparatio, & purgatio, sed pluribus eget, dum-
 modo inter eas corpus, & partes corroborentur medicamen-
 tis, quæ dicemus in quinto remediorum genere: hic tamen
 syrupus est optimus, & probatus in huius materiæ præpa-
 ratione: ℞. pimpinellæ buglossæ, borraginis, lupulorum, an.
 m. ij. capilli veneris, scolopendriæ, absinthij, an. m. j. fiat deco-
 ctum: de quo percolato accipe ℞. ij. cui adde succorum si-

Syrupus ne residantia borraginis, endiuix, & fœniculi. an. ℞. j. succi
preparans pomorum redolentium. ℞. iij. sacchari, quod, s. misce, & fiat
materiam syrupus. Dosis vnciæ tres cum aqua, vel decocto scolopen-
secundo driæ, & borraginis. Post cuius vsum fiat vacuatio hoc, aut si-
loco. mili medicamento, ℞. cassiæ fistularis recens extractæ. ʒ. vj.
 diasenæ, & confectionis medicaminis Hamec, an. ʒ. iij. deco-
 cti florum cordialium facti in sero caprino addendo parum
 epithymi quod s. misce, & fiat potus. In hebdomada semel
 fiat vacuatio per hanc mixturam: ℞. diacatholiconis, diasen-
 næ, an. ʒ. j. s. confectionis medicaminis Hamec, ʒ. j. pulueris
 epithymi ʒ. iij. conseruæ buglossæ. ʒ. vj. syripi borraginis,
 quod

Modo f. misce, & fiat confectio: Dosis cochlearia duo. Ali- *Confectio.*
 ando tamen initiis accessionum est conueniens vomitus *Vomitus*
 arte factus, & a natura: quamvis hæc materia suo ponde- *laudatur.*
 aptius per inferiora expellatur, vt autor est Hippocr. 4.
 hor. propter causas nobis occultas graue ascendit, & leue
 scendit. Prius natura tentante bibat in initio accessionis
 cias quatuor decocti seminis raphani, & anethi cum vn-
 a oxymellis, vel infusionem, vel decoctum raphani
 in virtute hellebori in oxymelle simpl. factum.

Quinto, corroborantibus ventriculum, hepar, splenem, *Corroboratio.*
 totum corpus, vt conserua buglossæ, borraginis, cortice *citro.*
 ri condito, electuario rosatæ nouellæ, electuario diamar-
 ritonis frigido: Dosis drachmæ duæ cum aqua aut deco-
 o, vel syrupo absinthij, vel de scolopendria. Hæc confectio *Confectio*
 in hoc genere optima: ℥. confectiois Gentilis contra *corroboratio.*
 elancholiam, & conseruæ buglossæ an. 3. j. conseruæ borra-
 nis, & corticis citri cum saccharo conditæ an. 3. ss. pulue-
 ræ laticis Gal. & laticantis Rhasis, & rosatæ nouellæ an.
 j. syrupi de pomis. q. s. misce, & fiat confectio: Dosis est o-
 ni hora cochlearium vnum cum aquis melissæ, & buglos-
 si. Si splen laborat obstructione, vel menses, vel hæmorrhoi-
 s. suppressæ sint, considera, quæ diximus cap. 45. 52. & 56.

Sexto, rigorem & frigus curantibus, quamuis hoc sym- *Curatio*
 ptoma ob sui vehementiam aliquando post secundum ge- *horroris.*
 nis auxiliorum sit admouendum, præcipue mitioribus re-
 mediis, vt pannis bene calidis in initiis accessionum parti-
 bus extremis sæpe admotis, & spinæ similiter, madefactis o- *Vis theriac*
 lis de lilio, de ruta, laurino, & de castoreo. Drachma vna *ca magnæ*
 theriacæ magnæ, vel mithridati cum paucio vino optimo *& mithri-*
 curat rigorem, & frigus, & quandoque ipsam quartanam, *dati.*
 maxime post debitam purgationem. Curat similiter hoc
 ptoma, & ipsam quartanam drachma vna pulueris se-
 nis hypericonis, vel pulueris millefolij cum paucio vino
 primo. Eandem vim habet drachma vna assæ fœtidæ. Hæc *Confectio.*
 ixtura est optima in hoc: ℥. pulueris assæ fœtidæ, piperis
 ongi, rutæ siccæ an. 3. ij. mellis quod. s. misce, & fiat confectio: *Puluis.*
 Dosis drachmæ duæ cum vino optimo, vel aqua roris mari-
 i, vel saluæ. Hic puluis est in hoc genere optimus: ℥. bac-
 trum lauri 3. j. zinziberis, & radicis gentianæ an. 3. ij. mis-
 ce, & fiat puluis: Dosis scrupulus vnus cum vino albo opti- *Vnguen-*
 o. Rigor, frigus, & alia cum quartana curantur, præsertim *tum.*
 extrema pannis, regulis, & lateribus ignitis calefiant, &
 orum hoc vnguento bene calido vngatur, ℥. theriacæ ma-
 gne

Curationes gnæ 3.ij. gariophyllorum, spice nardi an. 3. j. s. olei antiqui
varia. & optimi vini an. 3. ij. s. omnia prunis imposita vase aliquo
ferueant. Vnguentum Aragon in hoc genere laudatur: Qui-
dam in hoc genere laudant drachmam vnam pulueris cu-
nei humani cum vino optimo. Alij experientia longa cur-
bant simul rigores, & quartanas succo plantaginis, & aqua.
Multi liberati sunt à rigore, frigore & quartana hoc me-
dicamento: ℞. mithridati. ʒ. iij. succi plantaginis 3. ij. misce.

Vnguentū ti, & vini albi odoriferi an. 3. ij. misce. Expertum medicame-
tum in hoc genere est vnum os de corde cerui redactum
puluerem cum pauco decocto dictami, saluie, camedreo
& camepiteos, Puluis ossis leonis curat rigorem, & frigi-

Almoni- vngantur plantę pedum, volę manuum, tempora, frons, &
rio. pulsus, & nares: sit bene calidum, & bibat drachmam vnam
rubeę tinctorum cum vino optimo. Succus calamenti, si b-

Vis timo- batur ante accessionem, curat quartanam: animaduerte ta-
ris. men, ne hæc nimis calida ante euacuationem exhibeantur
ne ex vna fiat duplex, vel ex intermittente continua. Timo-

magnus ab inimicis incussus curauit quartanam vnus an-
ni. Quidam initio accessionis in flumen deiectus curatu-
fuit: quidam etiam subito, & præter spem audiens tonitrui
artificiale à quartana liberatus est, hoc tamen prudenter fie-
ri debet: nam etiam si gaudium magis possit interficere
quàm timor, tamen ipse timor magis, quàm ira, quę nulli
modo potest occidere hominem, autore Galeno.

De Quartana. CAP. VI.

Scholium.

Focus in Quartana duplex est.) Cum lien humore melancholico n-
quarta. triatur, ipsum ex iecore attrahens, non est mirum, si quar-
tana (quæ ex humore melancholico generatur) in ven-
lienis habeat focum, & principium. Signa quartanæ intermittenti-
de qua hic agimus, pete ex lib. 2. de disse. feb. cap. 5.

Secundo si omnia ferme sanguinis.) Ex Galen. lib. 1. de art.
curat. ad Glan. quartanas aut per initia esse blandè tractanda.

Nm

Nullum enim medicamentum vehemens exhibendum est, quia hoc Interpretatur
 nue humoris rapit, & reliquum incrassat. Neque vacuandum est, tur locus
 si sanguis admodum exuperet. Vbi per exuperantiam sanguinis non Galeni.
 t, quod intelligamus plethram, quæ in his, qui quartana laborant,
 non reperitur, sed in hominibus carnosiss, & multo optimo sanguine Sanguinis
 buntantibus: intelligimus ergo per abundantiam sanguinis, mul- mistio.
 um sanguinem melancholicum in venis contentum. Quando enim ta-
 is extat, sanguinem mittimus in principio propter causam sæpius di-
 tam, quæ est fluxio humorum ad focus putredinis. Quod si sanguis
 ecta vena egrediens flavus sit, tunc non est mittendus sanguis, imò
 iendus: quia cum is, qui in venis continetur, non sit melancholicus,
 num est, ipsum non augere obstructionem, neque eius fuisse cau-
 am: Imò ipsum oportet servare, ut inuet humoris frigidi, & crassi Sanguinis
 concoctionem. Sanguinis missio exercenda est ex brachio sinistro sem- missio ex
 ner, & ex basilica, si apparet propter rectitudinē venarum, et naturæ, quæ vena.

Tertiò post tres menses.) Gal. in quartana vitur medicamen- Medicamē
 o, quod diatylon pipereon appellant, & diaspoliuco appellato. Hæc ad ea quibus
 extenuandos crassos humores exhibentur, compositiones eorum 4. de Gal. atte-
 san. tu. scribit. Vbi diaspolici medicamenti durs tradit compositiones: nuabat mo
 Vnam, quæ magis movet alvum, in qua par est portio niri et aliorum lancholiā.
 medicamentorum: Alteram verò ad magis attenuandum, quæ mino- Præpara-
 rem habet niri portionem. Nos non solemus his medicamentis atte- tio melan-
 nuare melancholicum succum, sed syrupis de fumo terræ, borraginis, cholæ.
 endinæ compositi, de bizantiis & aliis. Cum decocto fumi terræ, radi-
 cis capparis, borraginis, hamarisci & similibus.

Quartò, materia.) Coctione absoluta quando iam non est obstru- Purgatio.
 etio, purgandū est ea ratione, quæ docet autor. Vomitu possumus etiam Vomitus
 purgare post cibum, & sic si nil obstat vii possumus helleboro albo cum helle-
 cum Gal. decoquentes ipsum cum raphano, et præbere raphanum: hac boro.
 enim ratione ipsum propinabant antiqui, facta prius totius corporis
 præparatione, humectantes ipsum cibo, potu, quiete, & balneo. Nam
 qui ipsum aliter propinant, ex instituto interficiunt. Iam si vomitio-
 nibus non sit assuetus æger, potius oportebit per inferna purgare Theriaca
 quam helleboro. Andromachi theriaca rectè purgat hunc humorem. Androma
 vitur etiam Gal. medicamento ex succo cyrenæico: Cuius compositio- chi.
 nem tradit libro de rigore, sit enim ex succo cyrenæico et castoreo. Quo Medica-
 medicamento utemur perfecta coctione, & facta purgatione, quando mentū ex
 aliquid humoris remanet, repetuntque paroxysmi, neque liberatus est succo cyre-
 homo à febre. Ab hoc enim medicamento quod relinquitur humoris naico.
 attenuatur & expurgatur.

Quintò corroborantibus.) Antè coctionem frictionibus, vitur Gal.
 exercitationibus, & balneis vitur Galen. Frictiones non debent esse ante coctio
 fortes, sed pingues. Exercitationes non vehementes, balnea pauca, nem.

DE CVRAND. MORB.

aut quod melius erit, nulla. Salsamentis etiam vitur, quæ sunt r. sale condita, multa enim sale condiebant veteres, vt asparagos, & alia arborum germina. His ergo vitulum ob tenuandi vim quam habent: nam aliter sal crassarum est paruum, & ideo probatur in quantum condimentum est. In morbi vigore, quies imperanda, & viscer fouenda, vngentes lienem oleo de absinthio, de capparibus radicibus thamarisci, & similibus, vnguento etiam marciaton, & de agrippa vel decocto radicis brionia, quæ maximè attenuat, vel oleo, in quo radices capparidis, aut thamarisci sint decoctæ: His humor melancholicus, maximè attenuabitur.

Medicamē Sexto, rigorem.) Hæc symptomata, si sunt refrigerato corpore, et a quædam ab humore, & a retractione sanguinis & spiritus ad interna, quidam dicitur. faciet cranium humanum, succus plantaginis, os de corde cerui, aut os leonis?

De febribus compositis. CAP. VII.

Difficilis est descriptio febrium compositarum, difficilior earum tantum cognitio, quod docet Gal. de arte curatiua ad Glauconem, dicens: Paucae febres sunt, quæ ad sui dignotionem exquisitam die quarta indigeant: difficillima curatio, sua enim contraria natura, & longitudine hydropem, vel hecticam efficere solent. Sed antequam de iis verba faciam, prius oportet scire tertianam non esse adnumerandam inter has compositas febres, quamuis ex bile, & pituita constet: quia seruat motum bilis vinctis, siue sit vnica forma simplex actu, & potentia duæ, siue non. In aliis autem compositis, vt in hæmitritæo sunt duæ, vel plures formæ humorum actu, vel saltem hæ non seruant motum vnius humoris proprium. Harum compositarum febrium infinitæ ferme sunt species, quàm in primis omnia earum genera possint componi, & omnes etiam ex humoribus genitæ cum aliis, vt hectica cum putrida, & biliosa cum pituitosa, & melancholica: sed quia omnium complicatio, confusio, & compositio in præsentia non est tradenda, ne noster sermo prolixior fiat, tantum agam de febris tertianæ, & quotidianæ compositione, cuius quatuor sunt complicationes autore Gal. cap. 7. lib. 2. de differentiis febrium, & cap. 9. lib. 2. de crisi. Vna, quum tertiana, & quotidiana commiscetur, altera, quando tertiana intermittens quotidianæ continuæ coniungitur, & hæc propriè semitertiana dicitur, & hæmitritæus: tertia, quando quotidiana intermittens tertianæ continuæ miscetur: quarta, vbi quotidiana continua tertianæ continuæ coniungitur: semitertiana (au-

Dimisso.

re Galeno commentario de typis) alia est exigua, alia me-
 a, alia magna: prima spatio, 24. horarum vertitur, secunda
 magna verò 48. quæ & continuæ febrî propinqua est.
 Quidam volunt tres esse differentias, seu species hæmitri-
 tæ, maiorem scilicet, minorem, & medium ponentes, apud
 quos maior est, quàm continua biliosa, intermittenti me-
 lancholicæ coniungitur, minor, quando biliosa continua
 quotidianæ intermittenti, medius, quando biliosa intermit-
 tens quotidianæ continuæ. Harum febrium causæ, & signa *Causæ, se-*
 & notitia simplicium febrium cognoscuntur, similiter & cu *gnæ, et cu-*
 ratio. Considera itaque dicta capite de tertiana notia: nam *ratio unde*
 ordine & ratione, qua cognoscitur & curatur illa, co- *petenda.*
 noscetur, & curabitur quæcunque alia febris composita:
 Imper tamen formidandus est exitus harum febrium tan-
 quam suspectus, & maxime periculosus, præcipue quando
 febris melancholica aliis coniungitur. Multos tamen labo- *Quibus re-*
 rantes hæmitritæo siue semitertiana sanaui post vacuatio- *mediis cu-*
 nes factas pilulis de rhabarbaro, pilulis aggregatiuis, vel con- *raueri an-*
 fectione diaphœnicon. præcedenti longa concoctione, & post *tor febres.*
 auxilia interna & externa obstructionibus hepatis & splenis
 cilibus remediis, nimirum confectiōe ex testudine & sy-
 upo, quorum hæc sunt descriptiones: ℞. carnem vnius testu-
 dinis benè coctam cum aqua hordei, pulueris electuarij re-
 umptiui. ℞. s. cinnamomi electi 3. j. medullæ passularum, gra-
 rorum pini, in aqua rosarum calida prius infusorum, & a-
 nygdalarum dulcium sine cortice an. ℞. s. sacchari dissoluti
 in aqua buglossæ. q. s. misce, & fiat electuarium ad formam
 manus Christi: Dosis quolibet die summo mane vncia semis *Syrupus.*
 um vnciis quinque huius syrup. ℞. melissæ, borraginis, ci-
 choreæ, absinthij, ceterach, capilli vene. rostri porcini, sca-
 iolæ an. m. j. quinque radicum diureticarum, radicis buglos-
 æ, liquiritiæ an. 3. j. fiat decoctum, de quo percolato accipe
 libras octo, sacchari libras quatuor, trochiscorum de rha-
 barbaro vnciam semis, diarrhodon. Abbatis 3. ij. misce, &
 fiat syrupus non perfecte decoctus.

De febribus compositis. CAP. VII.

Scholium.


Difficilis descriptio.) Qui recte cognoscit febres simplices,
 & methodum eas curandi, non ignorat, neque ignorabit
 compositarum febrium curationem.

De Hæctica. CAP. VIII.

B

Hæct

Descriptio



Hætica febris est, quando calor præter naturam non solum in spiritibus & humoribus, sed in partibus etiam solidis consistit, neque pendet ab humorum putredine, neque a calore spirituum, esseque fixus ac confirmatus difficulterque soluitur, quemadmodum habitus. Fit ferme semper sensim, & longo tempore, ideoque non sentitur, ut in æquâ intemperies: raro tamen ob patientis affectionem, & agentis vehementiam fit subito, & rarius non præcedentibus diaria & humerali febre, ut contingit in fulmine consumente ferrum intacto corio, & lana. Moror ergo, ira, lassitudo, ieiunia, febres ardentes, & omne diuturnæ febres hæticam generant. Initio difficulter cognoscitur, quæ in marasmodum incidit, cognitu facillima est. Quam hætica quum cognoscitur, curari non potest. Quando verò est sanabilis, est incognita, ideoque non esse tres hæticæ species affirmo, ut Arabes, & alij non pauci voluerunt: neque etiam quatuor humiditates cum Auicenna pono, nempe nomen non habentem, rorem, cambium, & gluten, ob quarum consumptionem tres species constituuntur. Gal. tamen

Signa.

Error A-7.
rabum.

Methodi quatuor siccitatis differentias recenset, à quibus forsan Arabes, & alij multi iuniores occasionem arripuerunt diuidendi hæticam in tres species: nos tamen cum Gal. duplicem esse tantum credimus, primam fixam in hærentem partibus solidis, quæ omnes corporis humores calfacit, alteram, quæ hætica marasmodus, aut simpliciter marasmodus nominatur. Hæc omnes corporis partes colliquat, & consumit, omnemque curationem respuit, ut diximus, cuius signa notissima sunt: alterius verò notæ deprehenduntur ex calore tantum percepto a cibo, & potu per duas horas, nam quemadmodum aqua calci infusa calorem excitat, ita cibi & potus humiditas a partibus solidis calorem occultum mouet, & elicit. Totius corporis siccitas, & ariditas & sordes in ipsis arida apparent, pinguedo in excrementis quoque videtur, & totius corporis extenuatio: non illa maxima, quæ in marasmo spectatur. Pulsus tenuis, durus, debilis, & frequens, & velocior est, qui augetur adhibito cibo, calorque, ut diximus, incenditur. Caliditas cum primò manus admouetur, debilis est, paulò post acris, & rodens erumpit: acriorque sentitur, quum diutius arteriam tetigeris. Si verò his præsentibus notis ventris profluuium superueniat, & pili defluant, mors propinqua est. ¶ Hætica febris priusquam ad tabem deueniat, omni conatu curatur refrigerantibus, & humectantibus. Primo aere arte parato (si naturalis reperiri non possit) violis, nenupha-

Curatio.

Victus.

Aer.

re

re, rosis, aqua rosata, foliis salicis, lactuca & similibus. Cibus *Cibus*
boni succi & facilibus concoctu, & paucis, præcipue glutin-
nantibus, qui substantiam difficile dissolutu generant, qua-
les sunt pedes animantium, præcipue suilli vnius anni, &
ranae, testudines, cancri fluuiatiles, & limaces hi tamen egêt
præparatione: quamuis limaces inter alimenta, quæ atram-
bilem generant, a Galen. numerantur, ideoque a multis eo-
rum aqua, & ius magis laudatur. Modus præparandi trade-
tur. Nutriatur ergo iure gallinæ, & cremore hordei, & iure
arietis. Nutriatur etiam pullo gallinæ, gallina tenera,
perdice, attagene, coturnice, turture, cuniculo paruo, vitulo
allatis & elixis: ouis recentibus sordilibus, piscibus paruis &
saxatilibus, & anguilla, quæ in salubri aqua vixerit, si benè
coquatur, eius tamen aqua est tutior. Lac laudatissimum &
optimum alimentum est, nisi adsint, quæ eius vsum impe-
diant, de quibus cap. 29. præcedentis libri de tabe: & hoc
etiam cap. de his copiosius agetur. Et quia ob morbi longi-
tudinem omnes ferine hectici carent appetitu cibi, oportet
aliqua auxilia cap. 34. superioris libri in medium adducere,
præsertim quæ huic feбри non nocent, quales sunt succus
malorum granatorum acidulcium cum saccharo, & paucis
cinnamomo, succus agrestæ, succus acetosæ. Alimentum *Leucophæa*
etiam, quod fit ex oriza, pectore gallinæ, lacte caprino, (di-
gitur maniar blanco) vtile est. Aliquando in his, atque aliis
grauissimis morbis cum Hippocrate lib. 2. aphorismorum
cibi mali præponuntur bonis, & ideo senex Rhases 10. ad
Almanforem cap. de hectica præbet infirmis huiusmodi ci-
bum ex hepatibus auium, ouis, croco & aceto simul frixis:
laudat etiam intestina quadrupedum plena carnibus, quæ
lucanica dicuntur, a nostris longanizas. Fructus, qui huic *Lucanica*
feбри conferunt, sunt pruna damascena, vna præsertim per
aliquot dies suspensæ, acida cerasa, quæ dicuntur guindas,
mora parû matura, mala punica acidulcia, & melones aliqui
molliores, scilicet qui pepones dicuntur, & a barbaris bathe-
cæ, refrigerant, humectant, & prosunt satis, nisi humida cum
hectica coniungatur. Herba & olera bona sunt, vt lactuca,
portulaca, cucurbita, borrago, spinachia & similia. Si æger *Si æger sit*
sit multum imbecillus, nutriatur rebus liquidis, vt iure opti *multum im-*
mo gallinæ & testudinis cum cremore hordei, vel emulho- *becillus.*
ne quatuor seminum frigidorum maiorum, vel succo aceto-
sæ, vel agrestæ. Succus carniū refrigeratus aliqua ex rebus
supradictis, & mixtus iuri optimus est, & maximè nutritia-
qua tamē carniū est concoctu faciliior, maximè citissimè-

DE CVRAND. MORB.

que nutrit : sed eget hæc aqua carniū refrigeratione , facta per ius, & alia superius dicta, ne calor febrilis augeatur.

Fit aqua carniū hac ratione : ℥. pectus vnius gallinæ iuuenis, & pectus vnius capī, diuide in partes minutas, ac inde laua eas aqua rosata & buglossæ, vel malorum cydoniorum,

*Aqua car
niū.*

*Eius præ-
paratio.*

si sit ventris profluuium , & illo suspende omnes has partes in vase vitreo paruo , cuius os bene occludatur massa , post imponatur prædictum vas vitreum ollæ semiplenæ aqua feruēti, donec aqua exprimatur a carniū supradictis. Obseruandum tamen est, ne carnes admodum siccate (a quibus omnis aqua per resudationem extracta fuit) ad se ipsam trahant. Huius aquæ quinque vel septem cochlearia præbenda sunt cum iuris pari quantitate , sexta quaque hora. Aliqui Medici satis eruditi & probati in maxima viriū resolutione laudant aquam destillatitiam ex sanguine hominis iuuenis, & perfecte sani, dummodo extrahatur, cum primum fluit a vena secta & instrumento vitreo, & paucio igne. Quia superius diximus alimentum frigidum & humidum, glutinosum esse vtile, & necessarium hecicis, vt ex testudinibus, cancri fluuiatilibus , limacibus , & anguillis de his omnibus, & horum præparatione verba facienda sunt. Nam anguilla genita ex putredine, vel per coniunctionem serpentis cum anguilla , est pessima , & si sequenti præparetur forma iuuabit multū. Diuisa ergo anguilla prius semota eius pelle, & bene lota aqua rosata salita imple eius carne præparata ventrem gallinæ iuuenis , & post cum sufficienti quantitate

*Præpara-
tio aquæ
ex anguil-
la.*

aquæ , & paucio hordeo excorticato concoquatur aqua , & anguilla, fiat aqua per distillationem instrumento vitreo, & igne paucio : Dosis vnciæ duæ cum paucio saccharo. Multi medici eruditi ex testudinibus, limacibus, & ranis parū decoctis cum herbis frigidis & humidis aquā per distillationem extractam non minus, quam factam ex anguilla, & anguillam laudant in hac febre. Cancrī fluuiatiles ex bona aqua electi vehementi lotionē egent cum sale, surfure, & cineribus: deinde si aqua dulci lauentur & ex hordeo excorti-

*Ex cancri
fluuiatili-
bus.*

cato , sufficientique aque parte decoquantur perfecte , sunt optimi alimenti hecicis, & faciles concoctu. Testudines ne morales pauca egent præparatione , quamuis earum ius est facilius concoctu: limaces montani sunt meliores, & optimè nutriunt, si per aliquot dies non pascantur: post tamen saccharo , & farina nutriantur duobus tribusve diebus , dummodo prius decoquantur aqua & paucio sale, postremò iure optimò gallinæ, vel arietis. Hac ratione præparati refrige-
rant

rant, humectant, & bonum sanguinem generant, nec difficiles sunt concoctu: quamuis aqua ex ipsis solis per distillationem expressa sit concoctu facilior, & eandem facultatem ex limacibus habeat, qua curatus fuit illustrissimus Marchio Zeneranus ab egregio doctore medico Dolesà Valentino. Inter omnia, quæ hanc febrem solent & possunt perfectius, & citius curare est lac, quia valenter nutrit, humectat, parum refrigerat, & facillime concoquitur, humanum tamen est omnibus perfectius, atque utilius ob similitudinē, huic bonitati proximum est asininum, deinde verò caprinum, & mox vaccinum, a quo butyrum extractum sit. Eligatur ergo iuuenis perfecte sana, optima prædita natura, vel sanguinea, a partu distans per duos, vel tres menses: si tamen abhorret a lacte humano, vel si haberi non possit, eligetur lac asinæ nigræ iuuenis a partu distantis per duos, aut tres vel quatuor menses nutritæ hordeo, & herbis frigidis & humidis, aut lactuca, endiuia, cichorea & similibus: ante tamen lactis usum alia sunt obseruanda prius, ea scilicet, quæ ipsum dari prohibent, vt sunt primū catarrhus, & distillatio, & capitis dolor, secundum febris putrida, tertium quibus hypochondria suspensa murmurant, quartum ventris profluuium. Quod vero lac quodcūque prædictis morbis maxime aduersetur, docuit Hipp. lib. 5. aphor. 3ph. 64. lac inquit dare caput dolentibus malum, malum verò & febricitantibus, & quibus illa suspensa murmurant, & siticulosis, malum autem & quibus in febribus acutis biliosæ sunt deiectiones, & quibus sanguinis effusio multa accidit. Conuenit autem & tabidis dare, qui non valde febricitant, & in febribus longis, & paruis, si nullum ex supradictis signis affuerit, & præter rationē absumptis: quod confirmat Gal. variis locis, præsertim commentario huius aphor. in quo demonstrat lac ab omnibus causis calidis celerrimē in nidore fuliginosum verti: quamuis per se probum gignat succum aliquid habens flatulentum: si tamen asininum sit lac, nullam habet acrimoniam, quum omnibus sit humidius Gal. autore lib. 4. de ratione victus in morbis acutis aph. 7. ideoque ventrem solum magis soluit, etiam si inter purgantia omnia medicamenta mitissimum tranquillissimūque existat, & omni lacte sit humidius, ac proinde magis ventrem subducit, vt idē Gal. censet aph. 109. eiusdem lib. 4. de ratione victus in morbis acutis. A quibus Galen. locis & aliis, sumpsit Iacobus Syluius animum nūc sententia purgandi affectos vero causo lacte asinæ cocto, quod, pace tanti viri, repugnat Hippocr. Gal. rationi, & experientiae: batur.

DE CVRAND. MORB.

quamvis lac sua humiditate, & facultate mitissima, & acrimonię experte minimè febris ardentibus noceat, quia illius substantia facillimo negotio alteratur & corrumpitur, maximeque his & similibus morbis aduersatur, si per os sumitur, sed coctum minus: tempore namque Græcorum ferunt tutius aliis medicamentis acribus, & calidis purgabat: nostro tamen felicissimo tempore manna, rhabarbarū, cassia fistularis, tamarindi, & myrobalani saluberrimè purgāt, & his, aliisque, & siccis morbis minimè nocent. Quādo igitur nihil est, quod lactis vsum impediāt, fugat æger ipsum ab uberibus fœminæ nutritæ rebus frigidis, & humidis, vel ter in die ventriculo vacuo, vel bibat primo lac caprinū, vel asininum ab ʒ. ij. vsque ad ʒ. vj. dummodo ne alteretur ab aere, quia facillimè corrumpitur, cui semper adde parum sacchari, ne coaguletur in ventriculo, quod etiam valentiùs prohibetur a sale, vel melle, si æger non possit sugere ab uberibus lac, extrahatur in vas actu calidum, vt conseruetur naturalis calor. Quod si sumpto lacte sentiat acidus ructus, vel putredinem aliquam, ablineat ab eius vsum & nutriatur cremore hordei, & iure pulli gallinacei, vel gallinæ, & confectione ex testudine, de qua statim loquemur. Quamuis c. 29. de tabe descripta sit a nobis cōfectio ex testudine tamen in præsentia maioris doctrinæ gratia, duas proponam conficiendi formas, quarum prima est minoris pretij, vt ℞. carnis testudinis aquaticæ optimæ aquæ decoctæ cum hordeo excorticato ʒ. ij. medullæ vuarum passarum, & amygdalarū dulcium sine cortice. an. ʒ. j. granorum pini aqua rosata calida prius infusorum ʒ. ʒ. pulueris electuarij resumptiui ʒ. ʒ. seminis papaueris & cinnamomi electi an. ʒ. j. conseruæ borraginis ʒ. ij. sacchari dissoluti in aqua borraginis q. s. misce, & fiat electuarium ad formam manus Christi. Altera confectione est maioris pretij ad diuites: ℞. carnis testudinis nemoralis decoctæ cum iure hordei sine cortice ʒ. ij. carnis pectoris gallinæ iuuenis, & capi. ana. ʒ. j. pulueris electuarij resumptiui ʒ. ʒ. pulueris diarrhodon. Abbatis, pulueris diamargaritonis frigidi an. ʒ. ij. gummi dragaganti, gummi Arabici, seminis papaueris albi, & seminis portulacæ, seminis lactucæ, quatuor seminum frigidorum maiorum mundatorum, seminis bombacis an. ʒ. j. amygdalarum dulcium sine cortice, medullæ vuarum passarum an. ʒ. j. nucleorum pini in aqua rosarum prius calida infusorum ʒ. ʒ. interioris cinnamomi ʒ. j. sacchari dissoluti in aqua buglossæ. q. s. misce, & fiat electuarium, ad formā manus Christi deauratū. Dosis hu

uius cōfectionis vncia semis cum vnciis sex cremoris hor-
 dei, & iure gallinæ, vel gallinacei cum testudine, & ranis. *So Electua-*
 um electuarium resumptiuum recens est sitis vtile hecti- *riū resum-*
 is: Dosis ʒ. ss. cum iure prædicto, vel aliqua aqua ex superius *piūum.*
 dictis. Inter prandium, & cœnam vel quacunque hora ven- *Potus.*
 triculo vacuo bibat aquam hordeaceam, qua semper in po-
 tu vtatur, nisi ventriculus admodū sit imbecillus, quia tunc
 vinum bene aqua dilutum, vel aqua cinnamoni esset potus
 conuenientior. Extra igitur mensam bibat aquam hordei *Conditum.*
 cum hac mixtura: ℞. conseruæ violarum, rosarum, nenu-
 pharis & borraginis an. ʒ. ij. corticis citri saccharo conditi.
 ʒ. ss. quatuor seminum frigidorum maiorum mundatorum,
 seminis papaueris. an. ʒ. j. pulueris electuarij resumptiui ʒ.
 ss. sacchari q. s. misce, & fiat conditum auro coopertum. Do- *Extinguen-*
 sis cochlearia duo, vel tria. Iulep violarum, vel rosarū, syru- *tiæ sitim.*
 pus de nenuphare, & de cucurbita extinguit sitim & totum *Clysterum*
 corpus humectat, & exiccat. Refrigerant, & humectant he- *uiliat.*
 par, & totum corpus clysteres ex solo lacte caprino, vel ouino:
 aut ex oleis, violaceo, nenupharis, & papaueris, aut ex
 hordei cremore, & si opus fuerit adde cassiam fistularem, vel
 butyrum recens. Hic clyster, vel similis est optimus: ℞. iuris *Clyster.*
 pulli gallinacei, decoctionis hordei sine cortice, foliorum
 violarum & lactucæ ʒ. x. cassiæ fistulæ præparatæ ʒ. iiij. mu-
 cilaginis seminis cydoniorum ʒ. iiij. vitellos ouorum ij. sac-
 chari optimi ʒ. ij. misce, & fiat clyster, si tamen adsit ventris
 profluuium, abstine ab iis. Vnguenta ex oleis, & rebus hu-
 mectantibus & refrigerantibus spinæ, seu dorso, hepati, &
 pectori admoda bis vt minimum in die ventriculo vacuo
 sunt vtilissima, & necessaria huic feбри, inter quæ hoc vel si-
 mile est optimum: ℞. oleorum violarum, nenupharis, rosa- *Vnguento*
 rum & papaueris lotorum bene aqua rosata. an. ʒ. j. mucila- *rum vsus.*
 ginis seminis psilij, cydoniorum & althææ aqua rosata ex-
 tractæ, ʒ. ij. butyri recentis, axungię gallinæ, medullæ cru- *Vnguentū*
 rum vituli. an. ʒ. iiij. pulueris electuarij resumptiui, & pulue- *Balnei com-*
 ris diamargaritonis frigidi. an. ʒ. j. ss. ceræ q. s. misce, & fiat vn *moditas.*
 guentum. Balneū est huic morbo præsentissimum auxilium,
 præsertim si non coniungatur hecticę catarrhus, febris pu- *Balneum*
 trida, obstructio & similes affectus, quibus multū nocet bal- *ex aqua*
 neum, siue sit ex sola aqua frigida, siue ex tepida. Primum *frigida cur*
 quamuis a Gal. laudatur 10. methodi cōtra Herophilum est *noceat.*
 suspectum, & aptum ad extinguendū calorem imbecillum
 hecticorum, & præter hoc sua intensa, & actuali frigiditate
 per accidens calfacit, & exsiccat internas partes, ideoque pi-

D E C V R A N D. M O R B.

ruitosos & crassos humores (a quibus fit tetanus) resolu-
 autore Hipp. & Gal. 5. lib. aph. 21. aph. nam si laborans tetan-
 carnosus, iuuenis, in ætate, & regione calida potest cura
 balneo aquæ frigida, hecticus cum non possit esse carnosus
 non poterit sine periculo tollerare balneum aquæ frigida.
 Aliqui post balneum aquæ tepida, laudant balneum aquæ
 frigida, precipue si æger fuerit iuuenis: non multum imbecil-


Quod bal- lus, & assuetus balneo aquæ frigida. Alij sensim hecticos
neum sit balneis parum calidis ad minus calida, & tandem ad frigida
probandum. transferunt, ne ab vno extremo in aliud fiat transmutatio
Ante bal- Balneum aquæ tepida solius, vel ex decocto lactuca, folio
neum ser- rum & florum violarum, salicis, nenupharis, capitum & pe-
uamla. dum arietinorum, vel vitulinorum est tutius, & a me sæp-

expertum, aliqua tamen prius oportet animaduertere ante
 balneum necessaria, & in balneo, & a balneo. Ante balneum
 per quatuor, vel quinque horas nutriatur æger solo lacte a-
 sinino cum saccharo, vel optimo iure ex gallina, & testudi-
 ne, & hordei cremore, vel duobus recentibus ouis, & sorbi-
 libus, & parum ante balneum sint vacua intestina. In vere
Hora bal- hora balneum ingrediendi sit octaua ante meridiem, in æ-
nei. state septima, in autumno & hyeme quinta, vel sexta a me-
 ridie. Habitatio sit moderatè calida quemadmodum & aqua,
 ne sudore & fatigatione afficiatur æger: tempus ergo balnei
 respondeat voluntati, & delectationi ægroti. Numerus bal-
 nei sit pro ratione morbi, & ægri: quauis semel in vno quoq;
 die sit satis aliquando bis, & ter in hebdomada. A balneo a-
 missio actu humore externo per pannos lini non calidos, sed
 per frictionem moderatam & blandam vngatur dorsum,
 pectus, & hepar vnguento superius scripto, vel simili, aut lac-
 te humano, & asinino, vel caprino vel bubulo tepidis, dein-
 de quiescat in lecto, & nutriatur cremore hordei facto iure
 gallinae, & ranis, & testudine, vel confectio ex testudine,
 & iure, vel aqua ex limacibus, & aliis superius dictis.

De Hectica. C A P. V I I I.

Scholium.

Hectica
quid.
Inæqualis
intemperies.



Hectica febris est.) Hectica febris, est calor præter natu-
 ra habuum corporis occupans. In hac est æqualis intemperies
 in omni- us partib. corporis, quoniam in calore mutatae sunt,
 quæ habent ac si esset propria natura, et ideo ab ipso non do-
 lent, nec molestantur, hoc autem quo ad sensum intelligere oportet. Non
 enim sunt omnino partes mutatae, à calore præter naturam, quia nec
 moriuntur, nec tumores, qui in hecticis oriuntur, vniquæ ad suppuratio-

em venient, nec calorem febris putridæ (quæ hectica superuenit) sentiremus. Hectica duobus modis fit: Primo sequendo alios morbos, fe- Duobus
res scilicet ardentes, diarias, & inflammationes internas. Secundo in- modis fit
ipiando, & statim à principio. Quæ similem habet cum diaria genera- Hectica.
tionem, ex causa aliqua procatarrica, ira, tristitia, exercitatione, aut Primus.
assitudine cum vitione. hoc secundo modo raro contingit: hectica homi Secundus
nes calidissimos, & siccissimos tantum inuadens. Hectica duplex est, v- Hectica
na simplex, & altera composita. Simplex illa dicitur, in qua calor fa- duplex.
tus est in partibus sine humiditatis alicuius consumptione. Composita
verò, quæ siccitatem aliquam morbosam habet coniunctam, quam he-
cticam marasmodem nominamus. Ac soluta harum hecticarum cogni-
tio ex lib. I. de diff. feb. habenda est, hoc in loco de curatione febris he-
cticæ simplicis agere instituiamus vna cum auctore, hæc enim febris
difficile cognoscitur, quamvis facilius curatur.

Hectica febris priusquam ad tabem.) Febris hectica cum sit Curatio al-
calor simplex, vnam habebit & simplicem curatoriam indicationem ab teratione
eo assumptam. Calor enim per contraria refrigerantia scilicet est aufe- sit.
rendus. Debent autem refrigerantia, humectantia etiam esse, quia hu- Refrige-
miditas obtundit caloris vim. Tum quia, cum calor sit in partibus so- rantia.
lulis factus, oportebit prauideri, ne siccitas introducat. Huius hecti-
cæ curatio quamvis 10. method. a Galeno tradatur, breuiter tamen
hoc in loco eam transferemus. Remedia ergo, quibus hectica curatur,
aut foris applicantur, aut interius assumuntur. Foris applicanda sunt Sex reme-
aer, medicamenta cuti admixta, & balneum. Interius verò assumuntur diis cura-
cibus, potus, & aer inspiratus. De quibus agendum est incipientes à ci tur hecti-
bo vna cum auctore. Alimenti qualitas, huic febre accommodata, de- ca.
bet esse frigida & humida, quia affectus est calidus, & qui exicat Alimenti
corpus. Vnde pristina accommodata est, alimenta etiam temperata al-
terata tamen rebus frigidis lactuca, succo aggrosta, & similibus. Et
cum in hac febre laborantibus magna fiat substantiæ dissipatio, &
calor sit fixus in partibus, alimenta debent habere aliquam glutinosi-
tatem, ne dissipentur facile à calore febrili, qua ratione vna cum gal-
lina testudinis partem coques, comedens ius & gallinam, non autem
testudinem, quam nullus antiquorum commendauit, & difficile co- Damnar-
quitur. Inde colliges multo minus esse exhibenda illa alimenta, quæ s- tur aliqua
lebant exhiberi, appellata electua, ia in forma manus christi, quia in alimenta.
his carnes testudinis, & frigida, & corrupta iam sunt. Poteris etiam
extremities animalium, cum carnibus facilis coctionis elixare, cum Quantitas
paucis petroselinis: & hæc sufficiant de qualitate alimenti. Quantita-
tem ex robore facultatis concoctricis ventriculi habebis. Cum enim in Lactis.
hectica languida sit facultas, oportebit parum, & sape cibare. Inter Impedien-
alimenta lac commendatur. Quale autem esse debet & qua ratione tunc assam-
assumendum recte docet auctor. Quæ impediunt lactis assumptionem primum.
hæc

DE CVRAND. MORB.

Primum. hæc sunt. Primo, corruptio eius in ventriculo, quam deprehendimus ex pulsu, & ructu. Ex pulsu, si inæqualis fiat, & parvus, à lactis assumptione, hic enim pulsus solet fieri affecto orificio ventriculi. Ex ructu hoc modo. Si ructus sit acidus, & a frigilitate ventriculi, corruptum erit lac, si nidorulentius & fumosus a calore. Secundo impeditur lactis assumptionem febris putrida, quia ab eius calore corrumpitur, & in vapores mutatur. Tercio dolor capitis, quia vapores multi, qui à lacte, dum coquitur, in ventriculo eleuantur, caput implent, ac grauant. **Quartum.** Quarto hypochondria eleuata, ab aliqua inflammatione: vapores enim multi, qui à lacte consurgunt, comprimunt tumorem. Quinto murmurantia hypochondria, quia cum murmur, seu rugitus fiat à flatu, augebitur à vaporibus lactis. Sexto, sitis, siticulosi enim calidum habent ventriculum, à quo lac corrumpetur. Septimo deiectiones biliosæ: quia hæc calorem arguunt, à quo similiter lac corrumpetur. Ultimo impeditur lactis exhibitio à profluvio aliquo sanguinis, qui præcepsit. Hic enim refrigeravit corpus, ventriculus autem refrigeratus non poterit rectè concoquere lac. Potus sit cremor ptisanæ, aut decoctum hordei. Aer inspiratus sit frigidus, dummodò cutim nō attingas. Sanguinis missionis, aut purgationis, nullam fecimus mentionem: quia in hæctica nullus est affectus euacuationem postulans.

De remediis, quæ exterius applicantur, modò agendū est, incipientes ab aere ambiente. Aer, etsi sit materia remedii, cum sit materia nobis comata, proinde indicat, aut sui conseruationem, quando qualitatem habet morbo contrariam, aut sui ablationem ob alterationem contrariam, quando eius qualitas morbum fouet. In hæctica ergo aer aut est temperatus, aut calidus, aut frigidus. Si temperatus est, non ledit: si sit calidus fugiendus est, quia calorem auget febrilem, aut alterandus aqua cum aceto mixta irrigantes cubiculum, in quo decumbit ægrotus, aut aqua per curipos cadente, aut aspergendo frigidæ herbas, & flores, ut folia salicis, arundines, rosas, mirrhos, & similia: si aer frigidus sit pro gratia est habendus, habens naturam morbo contrariam. Quod si sit frigidissimus inspiratus remedium est, quia per trachæam arteriam, & pulmones cor petit, at per cutem nō poterit ingredi sibi ipsi viam præcludens, frigiditate condensans cutem, & prohibens calidorum vaporū exhalationem. Ac proinde permittendum est, ut inspiretur: corpus autem restitutus operiatur, ne aer hic cuti suo contactu alteret. Epithemata, aut medicamenta, quæ cuti applicantur, debent esse frigida & humida, non autem astringentia, qualia sunt, quæ crassas habent partes, hæc enim non possunt penetrare. Difficile autem erit inuenire medicamenta refrigerantia sine adstrictione, pauca enim sunt. Inter omnia tamen uti debemus medicamentum à Gal. 10. meth. descripto, quod officinæ unguentum refrigerans Galeni appellare solent. Hoc sic potest parari, ut ex eo loco colligimus. ℞. olci rosati omphacini ℥. iiii.

Epithemata.

Unguentum refri-

iii. cere alba & loræ ʒ. j. liquentur in duplici vase, deinde refrige- gerant Ga-
 tur. Et ultimo loco agitando illa in vase addatur tantum aque fin- leni.
 ra, quantum imbibere possit: sed si tibi placet, inde parum aceti. Hoc me-
 ammento vititur Gal. ad Erysipelata, & ad ulcera pudendorum, ma-
 ne enim refrigerat, ut simplicia, quæ ipsum componunt, ostendunt. In
 inis oleum rosatum omphacinum duplici nomine est frigidum, &
 ia habet rosas permixtas, & quia factum est ex oliuis immaturis.
 quamuis cera solum adhibeatur tanquam materia, lauatur tamen
 amittat acriminiam, & calorem, quem ex melle contraxit. Liqua-
 r autem cera cum oleo in duplici vase, ne ab igne aliquem concipiat
 lozem. Tandem additur aqua, ut magis refrigeret, & humectet. Di-
 te posse addere parum aceti, propter penetrationem. Aduerte tamen, Aduerte.
 officinis seruari medicamentum refrigerans Galeni à Mesue tra-
 tum: quod, ut distinguas à primo, opus erit, ut hoc modo schedulam
 rscribas: ʒl. vnguenti refrigerantis Galeni ex IO. method. &c. Hoc
 guento debemus inungere regionem eam pectoris, quæ est supra
 r, ietur, & totam spinam: ita tamen, ut cum manifestè iam calefa-
 um est, à corpore abstergamus ipsum, & de nouo fiat inunctio. Ter- Balnei par
 o hinc febris let applicari balneum: hoc quatuor habet partes, pri- tes qua-
 ia solum continet aerem calidum, in quo vestes deponimus, in quo æ- tuor.
 er parum immorari debet, ne calore fiat substantiæ dissipatio: secun- Prima.
 a est, ubi lauatur ager, ut meatus aperiantur: tertia est lauacrum Secunda.
 quæ frigida: debet autem hectica laborans aqua tepida lauari ut Tertia.
 aliditas balnei simul cum calore agrotantis sit nutrimentum parti-
 us solidis, quæ carnis tegumeto destituuntur: ad hoc, ut cū lauuntur
 rigida non ledantur consumpto paucio calore, qui in eis est. Loto au- Loto in
 em frigida est febris remedium. Sic dicebat Gal. hectici nihil balneo frigida.
 uantur, nisi in frigida immurgantur. Nec mirum, nam in lauacra
 tepido calor augetur, & vapor humidus, qui in corpore paucus est,
 multum augetur, qui male frigido corrigit, fluxum coercens, & calo-
 em extinguens. Dices, Hipp. 2. de rat. vic. in acut. sent. 59. balneum in- Obiectio.
 quit, non conuenire his, quibus vires languent, non ergo hectici sunt Solutio.
 auandi, languidi cum sint. Respondetur, Hippocratem loqui de balneo
 uacuatorio, quod multos fiores mouet, quæ de hectici non conuenit:
 bene tamen illud, quod ad refrigerandum calorem excedentem exhibe-
 ur. Iterum obicies, hectici exiguum habent calorem, poterit ergo fa-
 ile extingui ab aqua frigida.

Respondetur, verum hoc esse, sed propter motum non est omittendum Obiectio.
 remedium, melius enim est cū periculis aliquid agere, quam sinere cer- Explica-
 d hominem mori. Et quamuis Gal. lib. 3. acut. scribit languidos nō pos- tur Gale-
 se ad frigidam peruenire sine lesione: non proinde eam omittunt hecti- nus.
 i, quia ibi, loquitur de morbis acutis, exercetque methodū in pleuri- Quarta
 tide. Quarta pars balnei est, in qua saniores absterguntur, hæc hectici pars.

inut

D E C V R A N D. M O R B.

- Nostra** inuulilis est. Nos heclicos adhuc balnea non ducimus, sed eos in prop
leuo. cubiculis lauamus. Primum aqua tepida, & secundo perfundimus
 aqua frigida, non actu, sed mixtione aquae calidae temperata, quae co
 paratione alterius aquae frigida est. Sic Hipp. lib. 3. acutorum sent.
 multas aquae mixturas paratas habet. Praeterea oportet maxime
prima cau siderare, balneum multis causis omitti, Prima est interna inflamm
sa balnei tio, quia humores a balneo liquati ad ipsam confluent. Quod si Hi
impediens. lib. 3. de ratione victus in fine, balneum concedit pleuriticis, & pe
 pneumonicis, id intelligendum est, post totius corporis euacuatione
 quo tempore iam nil fluit ad partem affectam: immo tunc spiritus fa
Secunda. litatur, imminuitur inflammatio, & dolor mutescit. Secunda est alio
 ius partis principis imbecillitas, propter quam facile recipiet humo
 fluentes in balneo. Quod si pars languida non sit princeps, tunc be
 poterimus balneo uti, quia ad articulos & cutem solet natura cum co
Tertia. modo animalis expellere. Tertia est plenitudo ad vires, vel ad vas
 Quia in plenitudine ad vires humores fusi magis grauabunt, in p
Quarta. nitudine vero ad vasa rumpent aliquam venam. Quarta est febris p
 rrida. Quia haec obstructionem habet, quae augebitur fusi humo
Quinta. bus. Quinta cruditas, haec enim a calore balnei ad venas attrahit
Sexta. Sexta est alui fluor. Quae duabus de causis balneum impedit, Prim
 est: quia cum balneum ad cutem attrahat, impedit motum naturae p
 aluum expellentis. Secunda est, quia balneum cum humectandi vi
 habeat, fluxiliorem reddet aluum, & ideo heclicis diarrhoea laborat
Septima. tibus interdicitur. Septima est alui densitas & constructio: Quia a c
 lore balnei, tenuiores faecum portiones sursum ad hepar & alias par
Octaua. tes ascendunt. Vltima causa usum balnei impediens, est cibus & potus
 si parum ante assumpta sint, balneum enim ea cruda ad venas rapie
 Et ideo statim a balneo nil est sorbendum, priusquam balnei pertur
 batio sit sedata.

De febre pestilenti. C A P. I X.

- Descriptio.** **P**estilens febris est febris epidemialis, perniciofa, &
 venenosa, qua multi afficiuntur & pereunt vno te
 pore, & vna regione, vel ciuitate aeris ratione, ve
 (vt autor est Gal. lib. de tneriaca ad Pisonem) pestis quaedam
 bellua existit non paucos interimens, ciuitates quoque to
 tas depascens male conficit: quippe praua quaedam aeris ac
 corruptionem prompta mutatio efficitur, & homines cum
 respirationis necessitate periculum euitare nequeant, ipsi
 aerem veluti venenum quoddam ad se per os attrahunt. Di
 scrimen inter pestem epidemiam, & eudemum, siue endem
 mium demonstret Gal. com. 9. lib. 1. de ra. victus in morbis a
 cutis, in quo docet Hippocratem in lib. de aere, aqua, & lo
 ci

egisse de endemio morbo, & de epidemio in lib. epide. sed peste nullum peculiarē librum confecit, quia vnum morbum ex epidemiis esse pestē, per libros epidemiorum monuit, & hac de causa 3. epidemiorum lib. pestilentes quāquam tempestates descripsit, vnde infert ex genere esse vltrem morbum. Quāquam sunt multæ causæ pestis, tamen *Causæ.* tantum, quæ medico sunt necessariae, recensēbo. Fit itaque omnis pestilentia à putredine aeris, autore Gal. 2. de differentiis febrium cap. 5. In pestilenti aeris constitutione *Externa.* irritatio potissimum est causa, cur homines corripiantur peccati aer enim nos circumstans a putrescente euaporatione vitur, ab aquis videlicet putribus vt lacubus, paludibus, à multitudine cadauerum. A vi etiam cœlesti saepe fieri solet *Interna.* aliquando, aliquando ira Dei mittitur nostris peccatis in nos. Semper tamen dispositio humorum, qui sunt in nostro corpore est interna causa satis potens, & ideo in eadem citate, vel domo aliqui afficiuntur peste, aliqui non, & affici non omnes ab æquali causa moriuntur. Hinc etiam accipitur, rarò tamen, vnum aere nondum infecto peste laborare, quamuis pestis proprie non sit, sed peculiaris morbus venarus & perniciosus. Lapsus magnus aeris ad calidū, & humidū est causa satis magna pestis, & ideo Gal. 1. de temperamentis cap. 4. scribit, temperamentum aeris pessimum esse calidum & humidum. Qui etiam pleni sunt malis succis, & raua victus ratione vtuntur, facile in febres pestilentes inidunt. Inter omnia anni tempora exitum æstatis & initium autumnū videmus maximè febribus pestilentibus conuenire. Indicia futuræ pestis sunt aer minus calidus, & humidus, *Signa.* multitudo exanthematum, & papularum, quæ à nostris Variolis variolæ & morbilli dicuntur, multitudo etiam phrenitidis venenosæ, copia carbunculorum, multitudo etiam murium, & animalium quæ fiunt ex putredine. Si verò volucres aerem proprium fugiant, & in ipso pereant, præsentem constitutionem pestilentem ostendunt, & quum pisces fugiunt aquam & in ipsa moriuntur, ab aqua esse ortam pestem dices. Notæ, quæ hominem pestilentia iam correptum demonstrant, plurimæ sunt, febris scilicet ab initio maxima, quamuis saepe exteriora frigeant, & interiora ardeant, capitis grauitas, oris siccitas, vehemens sitis, & vehemens angustia, difficultas spiritus, vomitus creber, oculorum aspectus toruus, ac varius, vigilæ, & deliria, & aliquando propensio magna in somnum: inter ignotas est, si post aures, aut sub alis, aut circa inguina potissimum bubones cum febre parua,

&

DE CVRAND. MORB.

& magna oriantur, in aliis etiam partibus internis ad exte-
nas: si enim in collo appareat tumor præter naturam, ce-
brum potissime male affici ostendit, si in alis, cor: si vero
inguinibus, iecur, quod Hippocr. 6. epidemiorum parte 2.
phor. 4. voluit dicere, abicellus veluti bubones signa sunt
eorum partium, unde exuberant. Sed quum non semper app-

Præcautio reant bubones, alias notas bene considera. Priusquam cur-
pestis. tionem præsentis pestis demonstremus, quo modo præ-
Fuga. uenda sit ostendere conabimur, quod certissimo fiet, si ad lo-
ginquas & salubres regiones fugiamus, neque reditum la-
dabo, nisi post perfectam & integram aeris alterationem,

Animæ commutationem: semper tamen ad Dei iram placandam
curatio. cura animam tuam: sæpe enim corporis morbi ab ani-
mæ morbis fieri solent, dicente Domino languido, quem san-
uerat, vade, & noli amplius peccare, ne deterius aliquid ti-
contingat. Et alibi si oculus tuus, id est, anima tua simpli-
fuerit, totum corpus lucidum erit: nam propter peccata no-
stra iratus Deus pestē, & sua fulmina in nos mittit, vt in l-
ge veteri scriptū est, & etiam in noua ante iudicij aduētū
Seruatore nostro docente. Quare ieiuniis, precibus, & ele-

Viētus. mosynis Dei iustitia placanda est. Anima igitur curata præ-
Aer. cautio fiet viētū conuenienti. Primo, aere non montano, no-
propinquo aquis, aliisque rebus putridis, cadaueribus scilicet,
stercoribus, coriis, brassicis euulsis, & aliis prauis arbori-
bus. Eligatur ventus septentrionalis, vel orientalis, meridie-
nalis enim est omnibus deterior, medius verò occidentalis.

Sol. Habitatio quoq; admodum propinqua centro, & cauernosa
Luna. est pessima. Radij solares optimi sunt, lunæ verò noxij, qui
Aer. putredinem efficiunt autore Galen. 3. de diebus decretoriis.

Historia. Aeris alteratio & emendatio summe necessaria est nō solū
in curanda peste, sed præcauenda, quod maxime vi solij
ignis fieri solet, præsertim ex quercu, & aliis arboribus sa-
lubribus: habemus enim exemplum luis illius, quæ ex Ae-
thiopia ad Græcos peruasit, quam Hipp. multis modis ad-
mirandus curauit igne per totam ciuitatem incenso, vt G-
lenus eius fidissimus interpres lib. de theriaca ad Pisonē scri-
bit. Quāquam igitur ignis maximā habet facultatē in aere
alterando, & puriore reddēdo, multa tamē sunt calida, & fr-

Aerem sa gida & temperata cardiaca, quæ aerem efficiunt salubrem
lubrem ef- & illius qualitates prauas & contrarias tollunt. Calida am-
ficientia. bra, moschus, thus, mastix, sandaracha Arabū, lignum aloes
Calida sim myrrha, aloë, resina pini, resina cupressi, laudanum, iuniperi
plicia. rus, aristolochia, nux muscata, gariophylli, gummi iuniperi
eber

benus, acorus, enula campana, squinantum, bdellium, vi-
 um aromaticum, cortex citri, storax liquida, laurus, ocy-
 num, been, cinnamomū, crocus, calamentum, cassia lignea,
 edoaria, lilium album, doricum, melissa, mēta, ros mari-
 us & similia. Frigida, quæ aerem calidum alterant, & pur- *Frigida.*
 ant sunt acerum, Karabe, rosa, labruscus, poma, pyra, cydo-
 na, corallus, santali, acetosa, viola, cichorea, endiuia, nenu-
 har, balaustra, coriandrum, bolus armenius, terra sigillata,
 argentum, myrtus, malū granatū, citrāgulus, arancia, limo-
 nes, agresta, & similia. Temperata cardiaca, quæ aerem pu- *Temperata.*
 iorem reddunt, & pestilentem discutiunt, numerantur bor-
 ago, buglossa, margarita, carbunculus, hyacinthus, zaphy-
 rus, & similia. Ex his & aliis cardiacis medicamentis multa *Composita.*
 cardiaca cōponūtur, vt theriaca magna, mithridatum, con-
 fectio Gentilis cordialis contra melancholiam, confectio de
 hyacintho, confectio ex granis tinctorum, quam alkermes *Lus con-*
 nominant, hæc efficacissima multorum regum ac reginarum *fectionis*
 testimonio est probata, & a Valentinis omnibus maxime *alkermes.*
 cognita, & frequenter probata, præsertim in quibus natura
 languet ob longum, vel valde acutum morbum spiritum vi-
 talem dissipantem: quamuis Valentini ob magnam corpo-
 rum raritatem, & aptitudinem ad caloris & spiritus dissolu-
 tionem hoc, & simili cardiaco medicamēto magis egeant, &
 ideo ægri omnes illa semper amant, & postulat. Quare non
 sunt taxandi Medici, qui in hac regione sæpe iis vtūtur, ne-
 que quorundam, & Manardi ratio demonstrat coccū baphi- *Manar-*
 cam solum astringere, & suo rubro colore sanguinem, & spi- *dius.*
 ritū ratione similitudinis ad se magis distrahere, & dissipare,
 quam cogendo firmare: quia rubra visa mouent sanguinem,
 & imaginatio per visum ad externas partes etiam sangui-
 nem euocat, sed interius sumpta cardiaca sunt, corroborant
 cor, quod meliorem generabit spiritum. Neque multorum
 recentiorum ratio probat lapidem cyaneum, seu stellatū vo-
 mitu & deiectione purgare, & naturam turbare, humorēsq;
 melācholicos exagitare, nullius enim momēti est ratio: nam
 etiam si rhabarbarum, & lapis cyaneus largius sumpta pur- *De lapide*
 gantia sint, tamē si parcius sumātur, alia substātia astringen- *cyaneo.*
 te & cardiaca corroborāt, & purgatoria imbecilla nō mouēt
 corpus, præsertim si bene præparentur, vt in hac confectio-
 ne alkermes lapis cyaneus sæpe lotus, & in electuario ex
 gemmis rhabarbarum pauca quantitatē. Neque vera est *Error re-*
 multorum recentiorum etiam opinio dicentium, cardiaca *centiorum.*
 omnia esse odora, licet quodcunque odorum sit cardiacum,
 ideoq;

DE CVRAND. MORB.

Species ideoque apud hos margarita non est cardiaca, neque lapide
cardiaco- prætiofi, & sericū, aut similia: variæ enim sunt medicamen-
rum Med. torum cardiacorum differentia & species. Prima eorum est
Prima. quæ temperatam obtinent naturam, quamvis Auerrois ve-
lit parum calida medicamenta temperatis magis corrobo-
Secunda. rare. Secunda est illorum, quæ qualitates habent secunda
corroborationi aptas, quales sunt stipticitas, odor bonus,
Tertia. vt in rosis, & moscho & similibus experimur. Tertia eorum,
quæ à proprietate agunt, siue sint coniuncta qualitati ma-
nifestæ cardiacæ, vt in spica & croco reperitur proprietas
cardiaca cum bono odore & stipticitate, siue per solam oc-
cultam vim agant, vt hyacinthus, margarita, & similes. Est
tamen inter hæc cardiaca tertij modi discrimen: egent enim
quæ à proprietate coniuncta manifestæ qualitati agunt, re-
ductione de potentia ad actum, hoc est quod natiuus noster
calor agat in ipsa, & cum in actum redacta sunt per euapo-
rationem eorum vis, (quæ à quibusdam tertia vis dicitur)
ad cor mouetur, ipsūque corroborat: quæ verò sola pro-
prietate, & occulta vi agunt, nō egent reductione de poten-
tia ad actum, sed tantum eorum vis ad cor deferretur, quæ à
nonnullis medicis quarta facultas nominatur. Præter supe-
riores modos medicamentorū, quæ per se & primò cor cor-
roborant, sunt etiam alij modi medicamentorum cardiacorum
per accidens & secundariò, quæ remouent nocumenta,
& qualitates veneficas à corde vacuando, vt lapis stellatus,
& mirobalani: quæ facultate propria tertia à corde magis e-
nacuunt, aut in contrarium alterando per primas qualita-
tes, aut corroborando simul, & prohibēdo vaporum elatio-
nem, vt terra sigillata, & bolus armenus: aut incidendo, vt fa-
cit aqua raphani contra fungos, & acrimoniam auferendo
vt butyro facimus. Sunt etiam alia medicamenta cardiaca
non per se, sed mediatè, & magis per accidens, quàm supe-
rius dicta, nempe quæ aliorum medicamentorum vires ad
cor deferunt, vt pulegium, stechas & similia: & quæ prohi-
Differentia bent aliorum medicamentorum solutionem, vt opium. Ex
ad cor. his igitur & aliis cardiacis compone medicamentum ad for-
mam spheræ, quod dicitur pomum, vel trochiscos, qui supra
ignem positi, aut dissoluti in aqua & aceto aerem putridum
& foetidum salubrem efficiunt: gumosa tamen magis amant
ignem, & alia humida, & liquida per habitationem inspersa
conferant. Hoc pomum est optimum in pestilenti constituti-
one, quæ sit frigida: nempe ʒ℥. beizoin ʒ. ss. storacis calamita
ʒ. j. gariophyllorū, laudani optimi, ligni aloes, cinnamo-
mi,

mi, rosarum an. 3. ij. santalorum citrinorum, corticum citri, *Pomum in*
 anthos an. 3. ʒ. thymiami, storacis liquida an. 3. j. mentæ sic- *causa fri-*
 æ, calami aromatici, macis, nucis muscatæ an. 3. ʒ. musci, *gida.*
 ambra, an. ʒ. x. si fuerit diues, adde quantitatē ambra, & mu-
 sci: omnia misceantur, & cum mucilagine gummi dragaganti
 pauca fiat pomum, vel duo poma perforata positis moscho
 & ambra in superficie. Hoc pomum aerem calidū pestilen- *Pomum in*
 tem reddet salubrem, vel saltem puriorem: ʒ. florū viola- *causa ca-*
 rum, nenupharis, buglossæ, rosarum, citranguli, & spodij an. *lida.*
 3. iij. corticum citri, macis, nucis muscatæ, storacis, calami-
 tæ, cardamomi, masticis splendidi, ligni aloes, cubebæ an. 3. j. *causa ca-*
 laudani 3. j. S. musci & ambra an. ʒ. x. cum mucilagi-
 ne dragaganti dissoluta in aqua rosarum fiat pomum, vel duo
 poma perforata. Aere bene alterato præsertim igne ex lau-
 ro, rore marino, calendula, iunipero, & similibus.

Secundò, cibus facilibus concoctu, boni sanguinis & pau- *Cibi.*
 corum excrementorū: semper tamen iis sunt miscenda, quæ *Putredini*
 resistunt putredini, cuiusmodi sunt acetū, succus limonum, *resistētia.*
 succus citri, succus granatorū, succus agrestæ, & acetosæ, &
 fructus acidi. Alij omnes præsertim humidi nocent: Nocet *Quæ no-*
 quoq; lac, & quæ ex lacte sunt, & magis si cibus comedatur. *cent.*
 Nocent similiter alimenta, quæ pinguedine superabundant.
 Denique nocet ciborū multa quantitas, & varietas, & inor-
 dinatus sumēdi modus, vt si cibus crassus præcedat tenuem,
 & prandio minimè concocto cœnet homo. Cibus igitur vei-
 lis iis est panis boni tritici, carnes arietinæ Hispanæ, hœdi-
 næ, vitulinæ, aues montanæ, pullus gallinaceus, gallina te-
 nera, cuniculus paruus, lepus paruus, oua recentia & forbi-
 lia, pisces parui, & saxatiles, & alij boni succi, vt lucium. *Potus.*
 Potus sit aqua optima fluuiialis, vel fontana, & vinum album,
 aut rubrum mediocris substantiæ, & ætatis mediæ bene di-
 lutum aqua. Aliqui in hac præcautione pro potu & cura lau-
 dant acetum, & succum granatorū acidulcium: sed ego his
 non pro potu, sed pro medicamento in parua quantitate ad
 futuram putredinem præcauendam vtor. Somnus diurnus *Somnus.*
 nocet, & magis inassuetis, sit brevis in die, & per duas horas
 à cibo, & in loco obscuro. Nocturnus sit pro hominis natura
 sex aut septem horarum: nam ex aphorismo quarto libri se-
 cundi, somnus, & vigilia si modum excesserint, utrūque ma-
 lum. Inanitio & repletio immodica nocent, fames ergo & si- *Quinque*
 tis magna mala sunt, & calidis natura pessima, quemadmo- *nocent, &*
 dum plenitudo frigidis. Quare in hac præcautione & cura- *totiæ pro-*
 tione quinque maximè nocent, fames, fatigatio, fructus, fœ- *sunt.*

- Deiectio.* mina, flatu, & alia quinque maxime iuuat phlebotomia, focus, fuga, frictio, fluxus, ideoque singulis diebus saltem semel ab ltercoribus intestina sunt purganda clystere, aut supposito-
*Animi per-*torio, si natura hoc non faciat. Animi perturbationes, calfa-
*turbatio-*ciunt, & spiritus motu impetuoso mouet, ac resoluunt, mul-
nes. tum nocent, vt ira, tristitia, odium, & coitus, praesertim im-
*Se-lio ve-*modicus, & magis a cibo. Praeter hac debita victus rationem
ne. ad praecauendam pestem necessaria est sanguinis missio, si vi-
Purgatio tium sit in sanguine. Saepe etiam purgatio est utilis, & neces-
*per pilu-*saria in hac praecautioe, praecipue si fiat per pilulas Ruffi
las. quas multi Rhazis appellant, constant enim duabus parti-
bus aloes, vna myrrha, & medietate croci, & vino albo: Do-
sis est drachma semis ad drachmam vnam. Semel in hebdo-
mada purgant sine violentia, & putredine impediunt. Aloes
& myrrha mortua corpora nulla putredine, & foetore affecta
*Pilula a-*conferuant, nedum vna. Haec pilulae sunt valentiores, & me-
*lia praes-*liores multo, & a multis maxime probatae, & expertae: ℞. a-
uiores. loes hepaticae. 3. ij. myrrhae. 3. ij. croci. 3. j. rhabbarbari electi. 3.
j. s. agarici 3. ij. gariophyllorum. 3. j. spicae. 3. j. s. corticu citri
3. j. seminis citri. 3. ij. tormetillae. 3. s. iantalorum rubrorum,
& granoru ribes, vel seminis acetosae. 3. s. corallorum rubro-
rum 3. s. boli armenici praeparati 3. ij. prius agarico inciso,
& per sex horas in oximelle simp. infuso, & aliis omnibus in
puluerem redactis cum syrupo acetoso simplici fiant pilulae
septem pro drachma: Dosis drachma semis ad drachmam v-
*Boli arme-*nam. Bolus armenus solus habet vim magnam in hac pra-
*ni laus.*cautione: Dosis est eius drachma semis ad drachmam vnam
cum vino albo & aqua rosata. Hoc medicamento vsus fuit
Historia. quidam Dux Mediolanensis, & omnes eius familiares, quo-
*Theriaca*rum nullus fuit peste affectus. Theriaca magna non solum
*magna.*curat praesentem pestem, sed & generari prohibet. Dosis scrup-
ulus vnus ad drachmam vnam cum aqua acetosae, vel rosae-
rum per horas quinque ante cibum, & per sex vel septem post
Refutatio cibum: nonnulli tamen credunt hanc theriacam afficere ve-
*quorundam.*neno sanos, & veneno affectos curare, quorum opinio mihi
displicet: sed Gal. verba lib. de theriaca ad Pisonem, & auream
de eius laudibus sententiam audi: in summa theriaca & ex-
trinsecus apposita, & epota rabiosorum moribus praesenta-
*Theriace*nei medicaminis cuiusdam instar exacte opitulatur. Cate-
*commenda-*rum nobis etiam in pestifera lue solum hoc antidotum ma-
*tio.*lo correptis prodesse adeo visum est, vt nullum aliud praesi-
*Tormen-*dium ad resistendum huic malo fuerit idoneum. Radix tor-
*tilla.*mentillae (quae est species pentaphylli, dicitur vincens toxi-
cum

cum) est optima in hoc genere. Dosis cum vino, vel aqua rosarum, vel acetosæ est ʒ. j. Radix dictami est etiam optima. *Dictami.* Eandem habet vim scabiosa sola, vel cum aceto & pimpinel *Pilula.* la. Hæ pilulæ conducunt in hoc genere, ℥. xyloaloes ʒ. ʒ. tormentillæ ʒ. ij. dictami ʒ. j. zedoariæ ʒ. ʒ. croci ʒ. j. ʒ. berbenæ ʒ. j. cornu cerui ʒ. ij. santalorum rubrorum ʒ. j. corallorum rubrorum, seminis acetosæ an. ʒ. ʒ. margaritarum electarum ʒ. j. boli armenici ʒ. ij. gemmarum, electuarij de gemmis an. *Scabiosa.* ʒ. ʒ. cornu vnicorni ʒ. j. cum syrup. de acetositate citri fiant pilulæ in æstate, vel in hyeme cum syrupo de mentha. Dosis drachma semis vsque ad drachinam vnā bis vel ter in hebdomada. Ex his, & similibus fieri possunt sacculi ad cor apti *Sacculi.* ad præcautionem, & ad curationem aptiores. Sola tractatio hyacinthi, smaragdi, zaphyri & carbunculi habet non paruum vim ad præcauendam pestem.

Ephimera pestilens periculosior est aliis, vt aliqui viri e- *Curatio* ruditi tradūt, quoniam venenum vitæ spiritui aduersatur, *diarie.* vt hellebori succus sanguini, & cerebrum felis humano cerebro, & cantharides vesicæ: ideoque si spiritus animæ seruiens veneno afficiatur per se, & subito peribit, neque hoc repugnat aphorismo 55. lib. 4. ex inguinum videlicet tumoribus febres omnes malæ, præter diarias. Hæc igitur febris curatur statim, & summa cum festinatione medicamentis cardiacis internis & externis, & iis quæ spirituum calorem *Spiritibus* præter naturam extinguunt, & qualitati venenosæ resistunt, *utilia.* & tandē spirituum dissolutionē prohibēt, & ipsos gignunt, qualia sunt primo ius gallinæ, & arietis, vel succus eius, vel aqua carnis cum succo agrestæ, vel acetosæ, vel succo limonum, vel citri etiam, si morbus acutissimus sit, egeatque per se victu tenuissimo. Aliquando tamen in robustis & Castellanis solus succus granatorum cum saccharo, & paucō pane loto est satis idoneum alimentum, vel succus limonū, & citri cum saccharo, & paucō pane, vel pyra tosta, aut mala cydonia. Potus sit aqua hordei cū paucō vino albo optimo, vel a- *Potus.* qua rosarū, vel acetosæ, vel buglossæ. Inter prandium & cœnam bibat aquā hordei cum julep rosato, & syrupo de citro, vel de limonibus, vel cum hoc condito: ℥. conferuæ acetosæ ʒ. ij. cōferuæ rosarum, & nenupharis an. ʒ. j. coralli rubri præparati, margaritarum electarum, pulueris radicis dictami, & boli armenici præparati. ana. ʒ. ʒ. sacchari. quod s. misce, & fiat conditum deauratum. Si diues sit, adde fragmento- *Conditum.* rum lapidum smaragdi, hyacinthi, Zaphiri. ʒ. ʒ. Omni quoque hora iuuat multum hæc confectio: ℥. confectiois de
C 2 hyac

DE CVRAND. MORB.

Confectio. hyacintho. ʒ. j. ʒ. confectiois Gentilis cordialis contra melancholiam, & conseruæ acetosæ. an. ʒ. vj. theriacæ magnæ. ʒ. ij. coralli rubri præparati, margaritarum electarum, boli armenici præparati, pulueris radices dictami, tormentillæ, & seminis acetosæ. an. ʒ. j. rasuræ cornu vnicorni, ossium de corde cerui. ana. ʒ. j. ʒ. syrapi acetositatis citri, q. s. misce, & fiat confectio, adde lapidum prætiosorum. ʒ. ʒ. folia auri tria. Lapidēs hi, & alia multa vt sericum, os de corde cerui, & similia cardiaca cor corroborant, & spiritus puriores, & lucidiores reddunt a tota subtilitā, vel proprietate, vt nos cōtra quosdam iuniores superius docuimus, neque ratio quorundam valida est. Græci hæc, & similia inter cardiaca non scribunt, igitur non sunt cardiaca, quemaamodum neque hæc ratio valet, cassia fistula, manna, rhabarbarum, mirobalani non scribuntur inter medicamenta purgantia a Græcis, ergo non purgant: si magnes attrahit ferrum, & Karabe paleas, & pæonia collo appensa prohibet morbum comitalem fieri a tota substantia, & non a manifesta qualitate, poterunt quoque multa medicamenta non odora esse cardiaca. Admouenda sunt cordi sæpe, imo semper quæ calorem febris extinguunt, veneno resistunt, & ipsum cor corroborāt in forma sacculi, vel vnguenti, vel liquida: vt ℥. aquæ rosarū, acetosæ, & buglossæ. an. ʒ. iij. aquæ melissæ, & ocymi. ana. ʒ. j. aquæ florum aranciorum ʒ. ʒ. pulueris diamargaritonis frigid. ʒ. ij. trochischorum de camphora ʒ. j. misce, & fiat epithema ad cor. Putrida pestis, quæ ferme semper fit, curatur primò, victu diariæ pestis: Secundò sanguinis missione, si virium robur adsit, per sectionem vtriusque basilicæ simul, ne sanguis venenosæ qualitatis particeps a parte dextera in sinistram fluat, extrahaturq; sanguinis copia plenitudini respondens. In aliis etiam morbis, vt in apoplexia sanguinea, in articulari & in phlegmone amborum testium fieri solet sanguinis missio ab utroque brachio simul. Sed si tumor, vel carbunculus in hac febre sit post aurem, cephalica eiusdem partis est secanda: si verò sub ala, basilica eiusdem partis: si tumor sit in inguine, vena tibiæ, aut pedis interna eiusdem partis: si autem in ambabus auribus simul, vtraque cephalica est incindenda, & si sub duabus quoque, vtraque basilica simul etiam scindenda: si verò in vnoquoque sit inguine, venæ vtriusque pedis, aut tibiæ. Pari modo faciendum est, si simul sit bubo sub ala dextra, & inguine dextro, simul secabis basilicam dextram, & venam tibiæ, aut pedis dextri. Quando vires, & ætas prohibent in hac febre venæ sectionem, sang

sanguis est mittendus per cucurbitulas cum scarificatione seruata semper rectitudine.

Tertio, purgatione sine concoctione, quia materia vene- *Purgatio*
nosa semper est turgida proprie & per se, vel ob eius læsio- *sine conco-*
nem: statim enim subito cor lædit, quod doctissimus Manar- *ctione.*
dus vult lib. 13. epist. 1. Male igitur contrarium contra verita-
tem docuit Alosius Mundella epistola decimasexta. sed quia *Alosius*
huius febris materia ferme semper est biliosa, hoc aut linu- *Mundella.*
li medicamento vacuari poterit: ℞. medullæ tamarindo-
dorum, & medullæ cassiæ fistularis recens extractæ ana. ʒ. ʒ. Potio.
rhabarbari electi infusi per noctem in aqua endiuia. ʒ. iij.
electuarij de succo rosarum. ʒ. iij. syrupi acetositis citri ʒ. j.
aquæ acetosæ quod sufficit, misce, & fiat potus. Vel ℞. pilu- *Pilula.*
larum de rhabarbaro ʒ. j. fiant pilulæ 7. Ab hac purgatione *Clyster.*
quotidie & ante ipsam excrementa sunt depellenda saltem
clystere leniente.

Quarto, corroborantibus & alterantibus, vt syrupis con- *Corrobo-*
fectionibusque, ac conditis, & electuariis cardiacis, de qui- *ratio &*
bus dictum superius in præcautione & curatione diariæ pe- *alteratio.*
stilentis. Drachma vna theriacæ magnæ vsque ad duas est
nobilissimum medicamentum, si detur cum vino, aut li-
quore cardiaco, ægroto mox lecto imposito, vestibus & stra-
gulis operto, quo sudor erumpens sanitatis nuntius fuit sæ-
pissime. Multi quoque antidotum celebre ad eundem vsum
experti sunt, cuius variæ sunt descriptiones: sed ego magis
eam laudo, qua doctissimi medici Germani sunt vti, præci- *Antidotū*
puè Simon Riquinus Treuir summus philosophus, & medi- *nobile.*
cus Coloniae in stupenda illa febre sudatoria prius Britan-
nica, deinde Germanica dicta, quæ sic habet: ℞. ouum, &
reieto eius albumine per foramen angustum adimpleatur
croco, & igne lentissimè torreatur, donec cortex croceum
præbeat colorem, postea ouum in pyla contundatur minu-
tissimè, & corticis reliquiæ non appareant: huic pulueri ad-
de medietatem oui, seminis cruceæ, radicis tormentillæ, di-
ctami albi ana. ʒ. ij. seminis cardui benedicti, seminis aceto-
sæ. ana. ʒ. j. ʒ. nucis vomicæ ʒ. j. rasuræ cornu monoceruini,
vel cerui (si primum comparari non possit) ʒ. ʒ. theriacæ ma-
gnæ ad pondus omnium, deinde in mortario simul miscean-
tur, & confundantur, vt formari possint trochisci, quorū do-
sis est drachma vna semis cum paucō aceto. Omnes ferè, qui
hoc antidoto diu vti sunt, liberi à peste euaserunt. Hoc quo-
que medicamentum est præstantissimum in præcautione &
curatione pestis, & expertum à multis principibus Germa-

DE CVRAND. MORB.

- Confectio laudatissima.* niæ consilio doctissimorum medicorum: ℞. rasuræ vnicorni rasuræ eboris. ana. 3. j. xyloaloes, myrrhæ an. 3. j. β. been albi & rubri, doronici Romani an. 3. β. agarici optimi per octo horas in aqua buglosiæ macerati. 3. ij. zinziberis. 3. j. gentianæ. 3. j. β. carpobalsami ḡ. xxv. rhabarbari electi. 3. j. β. corticum citri 3. j. santalorum alborum, & citrinorum, ana. 3. j. β. ossis de corde cerui 3. β. seminis citri. 3. ij. fragmentorū quatuor lapidum præciosorum. a. 3. j. limaturæ auri optimi 3. β. pulueris liquiritiæ. 3. ij. coriandri præparati 3. iiij. conferuæ enulæ, conferuæ rosarum an. 3. iiij. mellis. q. s. misce, & fiat confectio, adde syrupi acetositate citri lb. β. conseruetur in vase argenteo, vel vitreo, & tanquam thesaurus habeatur: aduersatur enim non solum pesti, sed vniuersis fere venenis. Dosis in aurora drachma vna semis: hæc confectio est non minoris momenti, laudata & probata a multis sapientissimis medicis, eaque non pauci peste correpti, & fere mortui ad sanitatem optimam sunt reuocati: in præcautione quoque est optima: ℞. sanguinis anatis maris & foeminæ, anseris, hædi, rutæ syluestris, seminis fœniculi, cymini, anethi, rapæ syluestris an. 3. iiij. piperis albi, & longi, costi, anisi, cinnamomi ana. 3. ij. radices gentianæ, trifolij, squinantij, thuris, rosarum siccarum ana. 3. iiij. agarici maris 3. ij. myrrhæ, spicæ nardi, an. 3. vj. benzoi, azari, ammoniaci an. 3. ij. carpobalsami grana xxx. ireos, croci, reupontici, zinziberis, masticeis ana. 3. j. sticados 3. β. fiat puluis ex his tenuissimus, & cum quadruplo melle fiat confectio, quæ conseruetur vase argenteo, vel vitreo tanquam res summa & fere diuina ad pestem, & venena alia, & præter hoc languentem ventriculum corroborat, flatūsque omnes valenter discutit. Dosis drachma vna vsque ad duas drachmas superioris medicamenti. Sed quia suprascripta tria medicamenta calida satis sunt, ideoque febri nocent, necessaria præter illa erunt alia cardiaca frigida interna, & externa, de quibus superius dictum, & etiam cap. de febre ardenti, & cap. 30. superioris lib.
- Carbunculi curatio.* de palpitatione, & syncope. Si carbunculus huic febri superuenerit, præter vacationem per sectionem venæ eiusdem partis, purgationem debitam, cordis cōfirmationem, febris, & venenose qualitatis curationē iam dictam, chirurgus doctus omni arte trahat exterius venenum ad mouendo carbunculo animalia viua gallum videlicet gallinaceum, vel gallinam, cucurbitulas, & sanguisugas, vt aliqui volunt, vel ignem actu, aut potentia vt Angli faciunt. Mixtura ex luteo oui & sale præcedenti incisione, habet facultatem mitem attrah
- Admonenda.*
- Mixtura.*

attrahendi & abstergendi. Panis si actu calidus, dum à fur- *Panis.*
no educitur, carbunculo admoueat, attrahit exterius ve- *Extrahen-*
nenum. Mixtura ex ficis siccis, & puluere salis, ireos, & aloes *tia vene-*
habet magnam in hoc facultatem, fermentum cum oleo, & *num.*
sale est eiusdem facultatis. Idem efficit mixtura ex opopona-
co, fermento, & sale. Cataplasma ex scabiosa, fermento & sale
laudatur in hoc. Aliquando oportet ad valentiora procede-
re: postea tamen crusta inducta sensim, & non violenter est
euellenda solo butyro, aut pinguedine suilla, non salita ad-
huc, vel cataplasmate ex radice althææ, butyro & pinguedi-
ne suilla non dum salsa: post crustam euulsam necessaria est *Crustæ eu-*
ulceris purgatio, & carnis instauratio per medicamēta pro- *uulsio.*
bata, cuiusmodi est mixtio ex sarcocolla & melle, vel diachy *Carnis in-*
lon, sine gummis, vel foliis ocymi, vel consolida maiori. Si *stauratio.*
fuerit cum hac febre tumor post aures, vel sub alis, vel in in-
guine, aut in alia parte, habita prius debita, & iam superius
dicta victus ratione, tactisq; necessariis vacuationibus, corde
corroborato per ea, quæ superius dicta sunt, tumori sunt ad-
mouenda, quæ venenū exterius attrahunt: vt cucurbitulæ, &
theriaca magna, quæ (Gal. autore libello de theriaca ad Pi-
sonem) non solum interius sumpta, sed exterius admota est
optimum remedium. Quidam medicus doctissimus & senex *Medici cu-*
mixturam ex cantharidibus, butyro & fermento his veneno- *usam ca-*
sis tumoribus admouere solebat. Factæ post bullæ scindan- *randi ra-*
tur, extrahaturque humor venenosus, & crusta, & tandem *tio.*
facta debita abstersione, & incarnatione vlcetum multos af-
fectos pestilentibus bubonibus Deo auspice curauit.

De febre pestilenti. CAP. IX.

Scholium.

Pestilens febris.) Morbi aut sunt epydemii, aut sporades: Epyde-
Epydemii à Latinis, populariter grassantes, vulgares, & minus mor-
communes appellari solent. Dicitur autem epydemius mor-
bus ille, qui vnus existens multos afficit. Qui causam habet omnibus
communem. Sporades morbi (à Latinis vocati sparsi) dicuntur, cum mul-
ti morbi multos homines sparsim afficiunt, vt quando eodem tempore morbi.
pleuritis, angina, dyssenteria, & simul alii distincti morbi infestare so-
lent. Hi causam habet particularem nempe victus rationem. Rursus
morbus epydemius aut est eudemus, aut seruans nomen generis epyde-
mius dicitur. Eudemus qui à Latinis dicitur patrius, regionalis, aut ver-
naculus, nil aliud est, quam vnus morbus plures afficiens in vna regio-
ne: vt Ianuēsis fit tussis, et catarrhus: Neapolitanis podagra, et aliis
tumores in collo. Epydemius morbus diuiditur in simpliciter epydemium

DE CVRAND. MORB.

Simplici- & pestem. Morbus epydemicus simpliciter est vnus morbus multos af-
ter epyde- ficiens, sed non interficiens multos: hac ratione pleuritis, dyssenteria,
mus. exanthemata, & alii huiusmodi populariter vagari solent: pestis vero
Pestis. est epydimia perniciofa: epydimia, quia multos afficit, perniciofa vero,
quia multos e morbo tollit. Hi morbi pestilentes varii esse solent, car-
bunculus, febris, & alii similes. De morbis simpliciter epydimiis egit
Hippoer. in libris epydemion, in quibus etiam de peste egit, ac proinde
ei particularem non dicunt librum. Cum pestis sit communis morbus,
aliquando vniam solam regionem, aliquando plures inuadens; qualis
fuit illa, que tempore Marci Antonii totam Babyloniam, Græciam,
Causa pe- & Romam inuasi. Habebit ergo causam comunem ex lib. 2. de homi-
stis, nis natura sen. 3. & 1. epyd. in proæmio. Hac causa communis est aer
ambiens, quo omnes perpetuo vimur. Proinde dicebat Galenus 1. de
differen. febr. 5. pestilentem febrem inspiratione potius contrahi. Aer
autem dicitur habere pestilentem conditionem duobus modis: primo,
cum habet prauam qualicatem, hoc est, putredinem, toto tempera-
Primus mento nobis contrariam, quam reneatam dicimus. Hanc putredi-
modus, quoniam aer vel a se ipso contrahit, vel aliunde. A se ipso, quum ex vapo-
aer dicitur ribus cum eo permixtis, & non purefactis, aliqua eius pars ob pro-
habere pe hibitam transpirationem purefcit praua putredine. Aliunde eam con-
stilentem trahit, quum vapores a terra, aqua lacustri, leguminibus, holeribus,
conditione, fetidis cloacis, aut a mortuis hominibus, putredinem habentibus re-
Quorum- nenatam, cum eo permiscuntur. Aliqui, ex corporum celestium coniun-
dam resu- ctione hanc in aere infectionem prouenire affirmant. Cum scilicet Sa-
tatio. turnus, Iupiter, & Mars: aut cum Iupiter & Mars congregiuntur in
humana domo & signo. Qui mittendi sunt tanquam architecti, in
cælo fabricantes domos sola intellectus operatione. Neque enim in cæli
corporibus vis nobis contraria est, quæ creata sunt vt nobis seruirent,
verum tamen est hanc contagionem tam lethalem a cælo prouenire,
hoc est a Deo, vt peccata puniat. Quod temporibus David regis euenisse
Secundus in sacris bibliis legimus. Secundo modo dicitur aer habere pestilen-
modus. tem conditionem, quum calidus & humidus est: qua ratione 1. de tem-
pe. Gal. calidam & humidam constitutionem aeris pestilentibus mor-
bis obnoxiam scribit: & Hippocr. 2. epyd. par. 1. sen. 1. in Cranone ex ea-
dem constitutione carbunculos pestilentes factos testatur, erat enim
Obiectio. æstas cum pluuiarum multitudine. Dices, nonne pestis habet putredi-
Solutio. nem prauam, qua ergo ratione aer calidus et humidus dicitur pestilens?
Respondeo, aerem calidum & humidum corpora nostra reddere calida
& humida, in eisque humiditates augere, & hac ratione in plerisque
Triticum corporibus prauam generari putredinem, ex qua vapores eleuatos, &
nec aqua cum aere permixtos similem in eo generare perniciem, et tunc iam esse
faciunt pe causam pestis. Si aer causa pestis est, errant ergo, qui triticum pure-
stem. factum, aut aquam pestem efficere sentiunt. Nam etiam si in tritico,

ut aqua possit esse putredo venenata, interficiet ea ratione, qua pestis, non tamen dicitur pestis, quia cum non sit causa communis, non inficit multos. Quæres, si aer est infectus, cur non afficit omnes, cum o- Obiectio. mnes eum inspirent? Respondeo ad actionem non solum requiri causæ Solutio. efficientis præsentiam, sed passi dispositionem: & cum non omnia corpora sint disposita ad pestem, non omnia, eam concipient. Corpora di- Corpora ad disposita sunt illa, quæ habent aliquas obstructions, aut excrementa pestem di- ad putredinem parata, qualia in corporibus calidis & humidis repe- disposita. riri solent, quæ contactu aeris putris facile putrent.

Prius quam curationem præsentis pestis.) Præcautio cor- In duobus poris a peste in duobus consistit: primò in status aeris consideratione: se- consistit cundò in corporis natura. Si aer caliditate, & humiditate pestem fa- præcautio, ciat, ipsum alterabimus refrigerantibus, & exsiccantibus. Si aer iam à peste, habeat putredinem, in ciuitate, & domo ignem accendes ex tymo, pu- Primo in legio, iunipero, cupressu, & aliis odoratis: quæ caliditate rarefaciunt aere. acrem, et siccitate humiditatem absument. Secundò considera corpus, Secundo in nam si aer sit calidus, & humidus, & corpus similiter, hoc refrigeran- corpore. dum, & exsiccandum erit. Si corpus habeat dispositionem contrariam, frigidam scilicet & siccam, conserua ipsam. Si aer habeat prauam qualitatem, considera an corpus habeat firmam sanitatem, an lubri- cam: si habet firmam & integram sanitatem, tota præcautio consistet in expurgatione excrementorum, quæ secundum naturam colliguntur. Sic quotidie alui excrementa ducentur (si spontè non fluant) pilulis Rhasis, thamarindis, & cassia. Excrementa secundæ coctionis, bilis, et melancholia cum facibus expurgantur. Urina reddenda est, quia de- tenta acres emittit vapores. Vt excrementa tertiæ coctionis liberè eu- cumentur, oportet ab aere frigido, aquis, & aliis astringentibus cauere, ne ab his cutis densetur. Si corpora habent sanitatem lubricam (est au- tem hæc in corporibus plethoricis, & cacochimis) oportebit plethoram ipsam euacuare atque cacochimiam expurgare. Quòd si plethora con- iuncta reperiatur in corpore cum aliqua cacochimia, tunc temporis v- trunque erit præstandum, primò igitur secabimus venam basilicam, & deinde corpus purgabimus à cacochimia. Si praua in corpore excre- menta reperiuntur, per conuenientes, & ad id à natura destinatas corporis regiones sunt educenda. Si sit in aliqua vena obstructio, eam aperire curabis. Si corpus non transpiret, & disflatur, balneo aquæ tepidæ cutis spiramenta rarefacies. Præter hæc omnia dicta opus etiam erit in rebus non naturalibus seruare mediocritatem. Cibi sint fami- Cibi. liares, parum habentes excrementi, & extenuantes. Quòd si ex natu- ra tales non sint, arte eos tales reddemus mixtis condimentis: Vinum sit tenue: Aqua pura: Animi parhemata fugienda. Exercitatio, & re- nus modum seruent. Tandem vtendum est rebus putredini contrariis, Potus. qualia sunt aromata. Quòd si aliquis consuevit vti theriaca, aut alio

alex

DE CURAND. MORB.

alexipharmaco, bene poterit eo vii præcautionis gratia: si verò non habuerit illud confectum, omittendum erit. Quàm falsa sint, quæ hoc loco docet autor de cardiacis medicamentis, intelliges ex capite de syncope.

Nō datur Epimera pestilens.) Omnis febris pestilens ex Gal. lib. I. de diff. diaria pe- feb. cap. 7. ex putredine est orta: ac proinde diaria pestilens non restilens. peritur, quia, ut cap. I. huius lib. probauimus, spiritus non possunt putredine crescere. Aliqui existimant, bene dari pestilentem diariam, & respon ratio pro- dent rationi supra dictæ: non omnem pestilentem febrem esse putridam, bant non quia ex Gal. li. 3. de præfatio ex pulsibus c. 4. datur pestilens hectica, omnem pe at hectica non fit ex putredine. Respondeo aliud esse febrem criri ex stilentem putredine, & aliud esse putridam. Nam febris putrida est illa, quæ esse putredine. ortum habet ex putredine existente in humoribus cauitatis cordis.

Solutio. At febris ex putredine orta illa est, quæ ortum habet ex putredine, siue sit in cordis cauitate, siue in eius corpore. Et hac ratione hectica febris non est putrida, ortum tamen habet ex putredine, quam ex factore anhelitus colligimus. Putret autem in ea substantia per corpus cordis dissipata, quæ ros dicitur, a cuius calore corpus cordis dispositum suscipit factam alterationem. Cum autem hac putredo sit venenata, & dispersa per corpus cordis, non est mirum, si hectica pestilens ita citò hominem interficiat, corrumpendo temperamentum cordis, ut nullum medico aut remediis locum relinquat.

Putrida pestis quæ.) Febrem putridam pestilentem hac ratione curabis. Cum sit putrida, habebit affectus, quos i. scholio diximus putridas febres habere. Et ita curatio est incipienda ab humore, qui fluit ad locum affectum. Vnde in principio sanguinem mittemus ex cuiuslibet brachii basilica: neque enim ambæ basilicæ simul sunt inscindendæ, ut autor voluit: præsertim cum eius ratio friuola sit: sectio enim venæ, ex quacunque parte fiat, per ipsam euacuat sanguinem, non autem eo replet partes vicinas.

Purgatio. Tertiò, purgatione.) Nunquam in principio licet purgare in febre pestilenti: quia fere omnes, qui purgantur, moriuntur, & meritò: natura enim eo tempore aut expulsi humorem ad cutem, vel non, si expulsi, iam inuanda est, neque impediendus est eius motus, qui ad externam sit, præsertim cum humor hic venenatus sit, & in motu ad interiora possit maxime lādere aliquid ex visceribus. Si natura non expulsi humorem, cum crudus sit, non poterit purgari: neque enim turgēt humor, cum sit firmatus in loco obstructionis. Dices, quando ergo

Obiectio.

Solutio.

Obiectio.

Solutio.

erit purgandum? Facilis est responsio, cum purgatio post coctionem utiliter fiat, si natura non euacuat. Dices, in hoc morbo, cum humor sit venenatus, nunquam alterabitur à natura. Respondeo, verum esse non alterari ob nutritionem, sed ut ad excretionem aptus reddatur ea ratione, qua atram bilem (quæ etiam non potest nutrire) vincit. Hoc ex Gal. lib. 5. metho. c. 12. possumus probare: ubi describit quandam con-

stitit

ritutionem pestilentem, in qua expurgato corpore vomitionibus et alui deiectionibus: tandem omnibus, qui euadebant, apparebant nigra exanthemata, octauo, & nono die: quæ erant reliquiæ sanguinis, qui in febre putruerat: quas veluti cinerem natura ad cutem trussit, sicut solet alia etiam superuacua expellere. Iam expurgationem corporis vomitionibus, & alui deiectionibus factam, post coctionem sequutam fuisse, intelliges ex eo, quod utilis fuit. Si hoc ita est, poterit ergo humor venenatus coqui, & à natura utiliter expelli.

Quartò corroborantibus.) quando humor venenatus (obstru- Quando
ctonis causa) in hac febre expellitur à natura ad cutem, & facit car- apparet
bonem: tunc opus est uti medicamentis interius assumptis, quæ sudo- carbo.
rem moueant, & exterius attrahentibus. Sudorifica sunt, primò hæc Sudorifica
confectio: ℞. confectionis de hyacintho & theriacæ magnæ an. ʒ. j. medica-
pulue. scordii ʒ. ss. decocti scordii, aut carlinæ, quæ est chamæleon al- menta.
bus, aut cori herbæ quantum sufficit, misce, & fiat potio. Hæc cōfectio
habet compositionem ex hyacintho, quæ roborat interna, ut expellant
ad cutem, habet theriacam & scordium, quæ venenis contrariantur,
& tenues habent partes, quibus, cum decoctione dictarum herbarum
mouetur humor ad exteriora: debet tamen æger vestibus & stragulis
operiri. Aut possumus etiam uti confectione ad modum opiæ, ℞. the Opiæ.
riacæ magnæ ʒ. iiii. confectionis de hiacinto ʒ. ii. antidoti de sangui-
nibus Gal. ʒ. ss. pulueris scordii ʒ. iiii. conseruæ capillorū veneris & a-
cetositatis citri an. ʒ. ss. cum syrupo acetositatis citri, fiat confectione, ex
qua accipiat vsque ad ʒ. iiii. cum decocto scordii, & cooperiatur. Confe-
ctio scordei à Fracastoreo descripta optima etiam est cū dictis decoctis. Applica
Exterius supra carbonem, ut attrahant venenum, animalia riuia, lu- da supra
teum oui cū sale, panem actū calidum, & alia, quæ tanquā imbecilla carbonem.
omittantur. Oportet ergo scarificare carbunculum: deinde ipsum lauare
aqua salita: & teriò apponendū causticum medicamentum: siue tale
sit actū, ut est ignis, siue potentia, ut argentum, et vnguentū ægyptia-
cum. Vltimò crusta sensim amouetur, & vltus ad cicatricē perduca- Bubo.
tur. Et cum in transitu humoris ad carbunculum detineatur humor in
glandulis ex sua natura languidis, proinde fiunt bubones. Quibus o-
pus est applicare etiā medicamenta, quæ attrahunt, qualia sunt cucur-
bitulæ. Emplastrū ex quatuor gūmis oppoponaco, serapino, ammoni-
aco, & euphorbio utile est: debent enim hæc misceri, & subigi cū oleo ru-
taceo, aut camemeli, aut irino, et fieri emplastrū buboni applicandum.

De Exanthematis. CAP. X.

EXanthemata Græcis, Plinio, & Latinis papulæ, Descriptio.
sunt tumores, & affectus cutis sponte florentes,
ut Manardus de re medica optimè meritis libro
septimo epistolarum suarum epistola secunda est autor, qua
morb

DE CVRAND. MORB.

morborum omnium nomina à nostris recentioribus medicis recepta, & ab antiquis prodita explicantur, quem hac in parte Fuchsius de omnibus bonis disciplinis non secus meritis lib. 5. cap. 8. de curandis morbis sequutus est: quamvis eruditissimus Franciscus Valleriolo lib. 1. enarrationum suarum enarratione octava demonstret variolas & morbillos, qui in pestilentibus febribus sæpe (vt præsentis hoc anno, qui est 1555.) apparere per modum quendam iudicii solent, non dici à Gal. exanthemata, neque esse herpes, vt idem Manardus loco superius citato vult: sed nulla nominum questione cum Valleriolo herpes morbillos non esse (pace quod Manardi dixerim) affirmamus: quod optimè probat omnium bonorum autorum sententia. Sunt ergo duplicia hæc exanthemata, quædam sublimia, & cum tumore satis perspicua, & apparente, præsertim circa augmentum & vigorem ipsorum, quæ dicuntur à barbaris medicis variolæ, & ab Hispanis vulgari nomine dicuntur viruelas. Alia exanthemata sunt lata & sine sensibili tumore, quæ barbaris medicis sunt morbilli, & Hispanis sarampion. Qua in re fallitur Leonarthus Fuchsius loco superius citato, & sensibus omnino repugnat, dicens, variolas latas esse, & morbillos sublimes: neque enim illud docet Gal. comm. 9. lib. vj. aphor. dicens pustulas, & tubercula, quæ fiunt ab humoribus calidis in acumen tendere, & altum petere, quæ verò à frigidiori, latæ sunt, & non admodum pruriunt, quia fiunt ab humore non acri, aut minus acri, ideoque variolæ sanguineæ magis pruriunt, & sublimiores sunt iis, quæ à sanguine pituitoso fiunt. Morbilli tamen à biliosissimo fiunt sanguine, & ob id minimè petunt altum, nullumque habent sensilem tumorem, quemadmodum erysipelas: sanguis enim maximè biliosus in hac cutis affectione maculas, & pustulas pulicum morsibus similes procreat latas, & non sublimes, maiores tamen, latiores, & rubicundiores iis, quæ fiunt in pestilentibus, & maximis febribus ab Hispanis dicitur pulgon. Hi morbilli sponte in cute erumpentes breui tempore euanescent, nulla relicta vlceratione. Quare nulla, postquam perfecte eruperunt, egent curatione.

Diuisio.

Lata.

Error.

Fuchsi.

Causæ.

Fiunt papulæ sanguineæ, seu variolæ à menstruo sanguine materno saltem aliqua ex parte, si Arabibus credimus, qui (vt inquit Valleriolo nostræ ætatis eruditissimus) plenus de his, & quantum ad substantiæ rationem, & curationem, quam græci tractauerunt. Auicenna præcipue, qui Fen. prima quarti post febris pestilentis tractationem eximiam egit

regit de variolis, & morbillis, indicans & à sanguinis, & humorum feruore hæc papularum genera nasci, & per modum cuiusdam crisis fieri transmittente scilicet, quæ nostrum corpus regit, facultate in eximias corporis partes vitiatos succos: vbi etiam ostendit quibus temporibus, ætatibus, anni constitutionibus, eueniant potissimum, & qua ratione per sanari possint, idque profectò non minus copiose, quam docte. Atque hæc ipsa in præsentia de Auicenna, vt ostendam non omnino, vt plerique nunc volunt, tanti viri dogma abiciendum esse, sed sæpius amplectendum atque imitandum, vbi præsertim quid exacto iudicio illius methodum examinantibus rectè tractasse videatur, & vbi etiam apud Græcos & Latinos accuratam doctrinam non inueniamus. Morbilli *Morbillo-* verò a sanguine biliosissimo gignuntur, menstruo tamen a- *rum origo.* liqua ex parte & venenoso adiuuante in his, & variolis procreandis, aere venenoso & praua victus ratione. Quare inter morbos epidemiales numerantur, & futuram pestem indicant, quando iis multi eodem tempore, eadem regione corripuntur. Si quis dubitat, cur hoc papularum genere omnes, modò ad legitimam peruenerint ætatem, semel afficiantur, quamuis aliquando bis, vt ego vidi, & nonnunquam ter aliqui corripiantur, illi satisfaciet opinio quorundam Arabum, & aliorum, apud quos, vt diximus, menstruus sanguis est causa saltem aliqua ex parte huius mali: cum omnes in utero generentur ipso sanguine, ac nutrantur: nulla enim externa causa potest esse tam communis omnibus: sæpius tamen pueri, & aliquando iuuenes, rarissime senes hoc morbo corripuntur: natura enim corpus profundum expurgans senibus est imbecillior, pueris valentior, & illorum corpus magis rarum, paratiusque ad plures morbos ob intemperan- *Signa.* tiam victus, & natura non potest diu sanguinem prauum *Dolor dor-* ferre. Deprehenditur hoc malum fiens, & factum vno ex vi- *si.* ginti signis. Primum variolarum signum est dorsi dolor, ob sanguinis feruorem: vena enim magna ascendens admodum plena est, partesque ei proximæ, & musculos compressione, *Pruritus* pondere & calore dolere afficit, vt in plethora experimur. *nasi.* Secundum est nasi pruritus, ascendunt namque à sanguine *Timor in* efferuescente vapores acres. Tertium est timor in somno, hoc *somno.* est insomnia illis sunt multa, & ipsos terrent, à toto enim *Punctio.* corpore ascendunt vapores, & fumi imaginationem, cogitationem, memoriæque corrumpentes: quo fit vt dormientes sæpe clament. Quartum est partium sentientium vehemens punctio, præsertim earum, quæ cuti subiacent: sanguis enim

Tensio.

Rubor.

Fervor hu-

morum.

Pandicu-

tatio.

Fuchsius.

enim ardens, eiusque fuliginosi, & ignei vapores cutem distendunt, dolorémque pungentem efficiunt. Quintum, totius corporis pondus, & tensio a toto sanguine feruente, partesque omnes corporis extendente. Sextum, faciei rubor, praesertim oculorum & maxillarum, quemadmodum in peripneumonia videmus. Septimum, lachrymae ob vapores a sanguine ascendentes calidos, & acres, a quibus & humoribus aliis destillant lachrymae. Octauum, sanguinis, & humorum feruor, & calefactio per vniuersum corpus, qualis reperitur in synochis. Nonum, est frequens pandiculatio, quam halicem medici barbari ex Graecis, qui halin & halicin vocant, nominarunt: de qua Hip. aph. 57. lib. 7. & Gal. in comm. egerunt, quo in loco de pandiculatione & oscitatione fit sermo: quamuis Fuchsius dicat eos errare, qui pandiculationem vertunt halicin, cum anxietudinem significet, quam si habuerint sani, Gal. autore, semper praesentibus molestantur, & ab vno negotio, & actione ad aliam transeunt: eodem modo & agros illos anxios esse, qui accubitus non ferentes iacendi figuram euariant, quia semper praesens aggrauat eos. Hoc vero praecipue illis euenire consuevit, quibus in ore ventriculi, (quem nos abutentes vocabulo saepe solemus stomachum nominare) certa quaedam humoris qualitas continetur ventriculo molesta, quae neque plurima est, neque in ventriculi fluitat cavitatem, sed eam ipsam imbibere tunica: sed meo quidem iudicio, licet illud sentiat Fuchsius, Gal. in comm. non solum de oscitatione, quae chasma dicitur graece, sed etiam de pandiculatione, quae Graecis est halici, agit dicens: sed & oscitari, sicut pandiculari contenta aliqua in musculis, per quos tales fiunt motus, quos pandiculationes & oscitationes nominamus, vel humiditate flatuosa, vel spiritu vaporoso fieri, est a nobis demonstratum, sed & pandiculationem vocat Theodorus, & Marius Nizolius vir doctissimus: & teste Sebastiano Corrado in literis omnibus, sed maxime Tullianis versatus couertens Gal. expositionem linguarum Hip. halysmon, & halicin hesitationem, & agitationem vocauit. Quin & Petrus Iacobus Steue linguarum omnium & rei medicae peritus lib. 2. epyd. sect. 6. aph. 29. contra sententiam Fuchsi halicin pandiculationem interpretatus est, ac ut Fuchsi non impedimus, quo minus anxietudinem conuertat, ita nos autoritate horum virorum pandiculationem verè appellabimus. Hic aphorismus secundi epidimion similis est aph. 57. lib. 7. aph. praeterquam quod in calce aphorismi epydimion additur, aut lac, quod pandiculationi, seu anxiet

anxietudini, & oscitationi multum nocet, quum hæc symptomata a flatu, & frigidis humoribus fiant, & propterea vinum aqua temperatum ea curat, non lac. Quare adiectitiam esse illam partem fatemur: autore enim Gal. com. 34. lib. 6. aphor. quando in libris sapientis alicuius sermo inuenitur aliquis manifestò falsus, non sine ratione contingit legentes dubitare, & primo quidem sibi ipsis diffidere, quasi neque illa, quæ sint, manifeste noscentibus, deinde suspicari, quod mendum fuerit interiectum. Sed his prætermisissis redeamus ad signum nonum papularum. Tam igitur pandiculatio, quæ est, vt diximus, symptoma omnium musculorum, quam oscitatio, quæ est eorum tantum, quæ sunt iuxta maxillas (hæc symptomata à somno fiunt) quam etiam anxietudo ægrorum, de qua diximus, indicant exanthemata ob vapores calidos acres, & multos à sanguine efferuescente musculos omnes acriter ferientes, imò etiam totum corpus. Decimum est palpitatio, seu concussio, quam barbari saltum *Palpitatio* appellant. Hæc differt maximè à conuulsione, tremore, & rigore, vt docet Gal. lib. 5. cap. 2. de symptomatum causis. Unde *Anhelitus* decimum est anhelitus compressio, à copia sanguinis, & vaporis, & fumi crassi thoracem comprimantis. Duodecimum *Raucedo* est vox rauca. Decimum tertium sputum crassum à nimio *Craßities* spiritu. Decimum quartum est capitis pondus, & grauitas. *Capitis* Decimum quintum dolor capitis, non solum cum grauitate, *grauitas.* sed etiam pungens. Decimum sextum est cordis palpitatio, quam *Dolor ca-* Arabes caphan, & barbari tremorem cordis nominant. Fit à *pitis pun-* febre ardenti & ferme pestilenti. Decimum septimum est omnes simul. *ges simul.* ris exsiccatio, & ariditas, quæ semper solet febres ardentes *Palpitatio* cõsequi. Decimum octauum est animi perturbationes, con- *cordis.* uulsio, & syncope ob materiam venenosam cerebrum, neruos, *Oris sicci-* & cor lædentem. Decimum nonum est dolor thoracis, & gut- *tas.* turis. Vigessimum est tremor pedum, præsertim si supra dor- *Animi per-* sum iaceat æger, nerui in tali accubitu sanguine & vaporibus *turbatio.* impleti non libere animalem spiritum suscipiunt: Vnde *Dolor tho-* tremor pedum fit, & non solum pedum, sed & aliarum partium, *racis et la-* & aliquando totius corporis, vt ego vidi. Vigessimum primum *ryngis.* est febris synochus putrida, & ardens, præsertim in morbil- *Tremor* lis, Cuius febris principium, & augmentum occulta sunt: vi- *pedum.* gor tamè statim apparet, cum sit tempus iudicij. Rhases ta- *Febris sy-* men breuitati studens paucioribus notis demonstrat ortum *nochus.* variolarum, & morbillorum lib. 10. ad Almanforem cum inquit: febris acuta, & cõclusa pueris præcipue, & iuuenibus evenire cœperit, & cum ea costant dolor, nasi pruritus, & in somno ti-
mor

DE CVRAND. MORB.

mor, & capitis grauitas, & oculorum rubor, & in corpore
Renouatio sentitur punctio, argumētum est agro vel variolas, vel mor-
ad signa billos cito superuenturos: & libro diuisionum, hoc est apho-
pauciora. rismorum, signum, inquit, generationis variolarum est fe-
Discrimen. bris acuta, caliditas conclusa, & vehementia doloris dorsi, &
 pruritus nasi, & timor in somno. Differt morbillus a vario-
 la, vt superius diximus, quia nō habet sensibilem tumorem,
 lachrymæ etiam in origine morbillorum sunt plures, & ma-
 iores, maior calor, maior respirandi difficultas, & dolor dor-
 si minor. Salutaria maxime omnium signa sunt febris, o-
 mnium symptomatum remissio, facilis egressus, denique o-
 mnia boni iudicij signa: mala & saepe lethalia signa sunt du-
 rities, color viridis, violaceus, difficilis & tarda eruptio, tar-
 da suppuratio variolarum, frequens syncopa, & animi de-
 fectio, & si post illarum eruptionem subito euanescent, ma-
 lum indicant, & si contigua sibi sunt omnia variolarum tu-
 bercula, & ferme vnum efficiant, vel si vna variola supra a-
 liam exoriatur est signum noxium, & ostendit materiæ vi-
 tiosæ copiam. Peius etiam signum in hoc morbo erit, & le-
 thalius, si colori viridi, violaceo, vel nigro tingantur, & si co-
 piofius in thorace, & ventre, quam in cruribus & extremis
 partibus efflorescant, sunt noxiæ. Signum etiam in his le-
 thale est vrina sanguinea, & deinde nigra, præsertim si fa-
 cultatis defectus comiteretur: omnes tamen, qui hoc laborant
 morbo, angina præfocati ferme semper pereunt, & aliquan-
 do ventris profluuium dysenterico, vt inferius de puero dice-
 mus.

Curatio. Duplex est curatio exanthematum ante eruptionem, &
 ab eruptione, prior vtrisque est necessaria, altera verò tan-
 tum variolis, quæ ex sanguine non bilioso fiunt. Ante eru-
 ptionem curatur quatuor remediorum generibus.

Ante eru- Primò, victu tenui parum refrigerante, & humorum mo-
ptionem vi- tum prohibente, vt aere parum frigido natura, vel arte para-
elus. to, floribus, herbis, & aquis frigidis. Cibus frigidis, & pauci

Cibus. sanguinis, vt hordei cremore, lacte amygdalarum dulcium,
 cucurbita saccharo condita, succo malorum granatorum a-
 cidulcium, lentibus, pyris, pomis, & coroneis assatis, & absti-
 nentia carniū, ouorum & vini. Potus sit aqua lentium bis-

Potus. coctarum. Omnia calida nocent, quare alimenta multum
 dulcia, & salsa, vt cete falsum, & similia male à nostris fœ-
 minis Valentinis exhibentur, quod demonstrat senex A-
 uenzoar: ipse enim puer cum esset, absente patre medico la-
 borans exanthematis ob esos pisces salios, & sumptum mel
 consil

onfiliis foeminarum in perniciofa symptomata incidit.

Secundo, auertentibus, vt sanguinis miffione per venæ *Auerfio*
 ectionem in ætate florentibus, & robore virium vel per cu- *per fectio*
 urbitulas cum fcarificatione fcapulis, aut natibus affixas, nem *venæ*
 & per clementem & falubrem purgationem, quæ fiet callia *Purgatio*
 iftulari, tamarindis, manna, prunis damafcenis, rhabarba- *fit clemens*
 o, & mirobalanis, & non per vehementiora medicamenta,
 quæ dysenteriam concitare valeant, hoc enim fymptoma *Dysente-*
 perniciofum fæpe hûc morbû fequitur, quo multi pereunt, *ria timen-*
 t ego fæpe vidi præfertim hoc anno 1555. Inter alios Valen- *das*
 iæ obiit nobilis & magnificus Iacobus de Sylua puer, fex
 ut feptem annos natus, qui cum a variolis magnis & mul-
 tis leuatus efferet, & poftea affectus morbillis ventris proflu-
 uio correptus perijt, & patiebatur anhelitus, & respirandi
 difficultatem. Optimus quoque eft hic clyfter in hoc genere *Clyftera*
 remediorum: ℞. foliorum maluarum, violarum, & mercu-
 rialis an. m. j. hordei fine cortice, & furfutis an. p. j. fiat deco-
 ctum, de quo percolato accipe ℞. xv. diacatholiconis ℞. j. olei
 rofarum ℞. iij. facchari rubri ℞. ſ. mifce, & fiat clyfter. Suppo- *Suppofitio*
 fitoria, feu glandes ex melle, fale, & oleo auxilia funt, & ne- *ria.*
 cefaria etiã infantibus ante primum annum, & fi opor-
 tuerit, adde parum pulueris hieræ fimplicis. Clyfterem quo- *Obferuatio*
 que pauca quantitatibus, & vis exhibere pueris, & infantibus
 ſolemus: auertentia tamen per fanguinis miffionem, & pur-
 gationem nutrice, & non infanti conueniunt.

Tertio, refrigerantibus cardiacis, vt fyrupo grânatorum, *Refrige-*
 fyrupo rofarum, de agreſta, cydoniorum, myrtillorum, de *ratio per*
 acetofitate limonum, de acetofitate citri folis, vel cum de- *cardiacis*
 cocto lentium bis decoctarum fæpe, & omni hora exhibitis
 infantibus quantitate vnius cochlearij, grandioribus vero
 maiori: conſerua etiã rofarum, violarum nenupharis, cy- *Conferuæ*
 doniorum, & acetofæ, vel hac aut ſimili mixtura: ℞. theria-
 cæ de citro, & limonatæ ſmaragdorum an. ℞. j. confectionis *Confectionis*
 de hyacintho ℞. iij. coralli rubri præparati ℞. ij. cōferuæ ace-
 tofæ, & rofarum an. ℞. iij. fyrupi ac- *gratis citri. q. ſ. mifce;*
 & fiat confectionis. Si æger fuerit paupe *Paupe*
 & limonatæ ſmaragdorum an. ℞. j. ſucci citraugulorum, &
 malorum grânatorum acidulcium an. ℞. ſ. mifce igne pauco.

Quarto, corroborantibus partes aliquas, ne offendantur, *Corrobo-*
 affectasque curantibus, inter quas fæpius, & magis oculi, *ratio.*
 pulmones & inteſtina læduntur: ſtatim ergo initio febris an- *Initio febris*
 te eruptionem exanthematum fæpe oculis intillerut hic,
 aut ſimilis liquor frigidus aëtu: ℞. aquæ roſatæ ℞. iij. ſemi-

DE CVRAND. FEBRIB.

nis cydoniorum, sumac. an. 3. j. misce. Zaphirus lapis oculi
Visum cor suo tactu corroborat. Si incipiant eruptiones exanthem
roborans. tum, adde parum croci medicamentis repellentibus & p
Quando rum aquæ fœniculi: si tamen oculi laborarint exanthema
oculi labo bus, summo studio prohibenda est eorum maturatio p
rant va- exiccationem factam mixtura ex sale, camomilla, & fursu
riolis. actu calidis, aut ex semine fœniculi, milio & ruta. Oculo
 albugo, & cicatrix, ne visio pereat, curatur aqua corticu
 fabarum, syrupo rosarū, rhodomelle, pulvere sacchari ca
Quibus di, pulvere ossis sepia, & aliis, de quibus capite 18. & 19. s
curatur perioris lib. Thorax, & pulmones corroborantur ab initi
albugo. & semper loch ex lentibus, cuius duæ sunt præcipue desc
 ptiones, prior hæc: ʒ. farina, vel pulueris lentium. ʒ. ii. j.
 minis papaueris, ʒ. j. conferuæ rosarum ʒ. ij. iulep rosati ʒ
Corrobo- misce, & fiat loch: altera est in vsu apud Valentinus: ʒ. len
rantia tho tium p. ij. vuarum passarum sine granis. p. j. seminis papau
racem. ris. ʒ. ij. rosarum ʒ. ʒ. fiat decoctum ad pondus lib. j. cui pe
 Loch len- colato adde sacchari candi lib. ʒ. Pulueris diagraganti frig
tiū, cuius di ʒ. ij. misce, & igne paucio fiat loch, de quo accipiat sensu
 duæ sunt transglutiendo, vt ab vna via in aliam permeet. Intest
 descriptio. corroborantur clystere ex solo lacte, in quo lapides igni
Intestino- extincti sint, vel calybs. Si vëtris profluuium adsit, adde pu
rum corro ueris diagragati, masticeis, sanguinis draconis. an. 3. j. & si ho
boratio non satis fuerit, illa necessaria erunt, quæ cap. 36. 37. & 38. s
Narium perioris libri diximus. Naribus quoque ne impediatur ca
auxilia. pitis purgatio, & refrigeratio, sunt admoenda oleum vio
Post erup laceum, amygdalarum dulcium, sesaminum, vnguētum ro
tionem. satum, & ad maiorem purgationem succus betæ, vel maio
 ranæ cum aqua rosarum est bonus. Vlcera narium curantu
 terfione per mulsam, rhodomel, oxymel simplex, & post pe
 vnguentum lithargyrii cum paucio pulvere tuthiæ præpa
 rata, vel consule doctum chirurgum. Apparentibus exan
 thematis, si natura probe illa excreuerit, nullam oportet fa
 cere medicinam iuxta aphorismū vigesimum primum Hip
 pocratis libri primi, quæ iudicantur, aut iudicata sunt inte
 grè neque mouere, neque nouare siue medicamentis, siue
Victus. aliter irritando, sed sinere oportet, victus tamen est permu
Aer. tandus, nam omnia, quæ non impediunt eruptionē, & ipsam
Cibus. facilem reddat, sunt necessaria, vt aer calidus, victus tenuis,
Potus. aperiens, & mouēs ad cutē humores, vt est ius ex ciceribus,
Inspectio foliis raphani, petroselini, & croco, & similibus. Potus sic
rerum ru- aqua hordei, & caricarum. Inspecere res rubras, & punicas
brarum. summe necessarium, propter imaginationem enim feruntur
 ad

ad cutem humores. Aliqui inuoluunt infantes pannis puni-
 ceis, quod non damno, sed primum magis laudo. Quod si
 natura in expellendis humoribus tardior, aut imbecillior sit,
 ipsaque exanthemata difficulter egrediantur, & modo emi-
 neant, modò aspectum fugiant, est signum perniciosum: si id
 ob magnam plenitudinem aduenit, sanguinis missio fiat se-
 cta vena iecoraria, vel ab scapulis sanguis mittatur per cu-
 curbitulas cum scarificatione: hæc enim vacuatio non im- *Quando*
 pedit opus naturæ, quemadmodum ea, quæ sit secunda vena, *sanguis va-*
 Deinde, etiam, si non præcesserit sanguinis missio, plenitudo *cuandus.*
 non est, & robur virium, hoc, aut simili medicamento vtere, *Optimum*
 quod tollit obstructions clementer, humoresque ad sum- *auxilium*
 mam cutem ducit: ℞. caricas xv. seminis fœniculi, apij, lac- *cum natu-*
 cæ, an. ʒ. ij. lentium sine corticibus ʒ. j. β. gummi dragaganti, ra *tarda*
 rosarum, santalorū, seminis cydoniorum an. ʒ. ij. decoquan- *est in edu-*
 tur in libris viij. aquæ ad medietatem, cui percolato adde- *cendo ad*
 croci in puluerem redacti, ʒ. ij. Dosis bis in die vncia vna. *cutem.*
 Hoc medicamentum est etiam expertum, & optimum huic
 generi: ℞. laccæ ablutæ ʒ. vj. létium sine cortice ʒ. viij. gum-
 mi dragaganti ʒ. iij. decoquantur in ʒ. viij. aquæ ad medietate-
 tem: Dosis omni hora est cochlearium vnū præsertim ven-
 triculo vacuo. Si ei adderes syrupi de duabus radicibus, &
 cap. Ve. an. ʒ. ij. melius saperet, & valeret. Suffitus rerum re- *Suffitus.*
 dolétium calidarum trahit quoque humores ad cutem. In-
 uoluere etiam totum corpus pannis calidis suffitu rerum
 calidarum ducit ad cutem humores. Post integram exâthe-
 matum eruptionem, & maturationem est necessaria puris
 euacuatio, & exsiccatio: ruptis igitur exanthematibus acu *Euacua-*
 aurea, vel argentea perfectius, & citius exsiccabuntur, & in *tin.* & ex-
 futurum parvæ remanebunt cicatrices: pus enim, si diutius *siccatio*
 permanserit, magnam efficiet cavitatem, maioresque cica-
 trices apparebunt. Hoc medicamento desiccantur exanthe-
 mata: ℞. salis, farinæ fabarum, & lentium an. p. j. farinæ oro-
 bi, lithargirij, cerusæ an. p. β. misce. Exsiccantur similiter fo-
 tu solius salis, quo auxilio vtuntur nostræ fœminæ in desic-
 candis exanthematibus, etiam non facta arte incisione: quam *Laudatur*
 vis si, vt dixi, fiat, multo minores cicatrices, & vestigia appa- *inciso.*
 rebunt. Sed si cupis exanthematum vestigia tollere, & faciem *Al rei in-*
 pristino nitore restituere, lege, quæ diximus cap. 22. Inter *gia tollere*
 alia oleum roris marini (optimū fit in oppido de Oëment, *da.*
 & aliis Valérinæ ditionis oppidis) & balsamum in hoc sunt
 sæpè probata. Mixture ex optimo melle, ex puluere ossis se- *Mixture*
 piæ, & puluere sacchari candi sæpè admota locis affectis *optima.*

D E C V R A N D. F E B R I B.

Spuma maris. omnes cicatrices, & maculas tollit. Eandem vim habet spuma maris. Post balneum frequens laua sæpe faciem, & alias partes affectas cicatricibus, & signis aqua calida cum farina orizæ, fursure, & amydo, & curabis. Hæc aqua calida eundem præstabit vsum, si ea sæpe calida lauentur partes: ℞. radicis serpentariæ lib. j. foliorū, florum, & corticum fabarum viridium. m. iij. succi saponariæ ℥. iij. aquæ rosarū, & succi limonum an. ℥. iij. misce, & fiat ex his aqua per distillationem. Idem præstat hoc medicamentum: ℞. pinguedinis gallinæ ℥. j. gummi draganti, & arabici, florum fabarum an. ℥. j. ℥. fiat decoctum in aqua decocti fursuris, quo reseruato in vitreo vase laua partes has saltem bis in die. Hoc quoque medicamentum est optimum in hoc genere remediorum: ℞. lithargiri j. benè loti, cineris radicum cannarum, ossium canis, vel leonis, farinæ cicerum, & orizæ, seminum melonum, cucurbitæ, been, colti an. ℥. ℥. misceantur omnia, & cum mucilagibus fœnugræci, seminis lini, & pauco melle fiat mixtura, quæ a nostris fœminis dicitur muda, quæ sæpe faciem, & alias partes his maculis laborantes prima nocte & summo mane lotas aliqua ex supradictis aqua, vel solo decocto fursuris proculdubio curauit. Deoque auspice, cui laus & gloria sempiterna tribuenda est.

Aqua præstantissima.

Medicamentum optimum, quod dicitur.

De Exanthematis. CAP. X.


Scholium.

EXanthemata Græcis) Quamuis exanthema sit nomen generale, omnes cutis efflorescentias comprehendens speciatim, per exanthemata, variolas & morbillos intelligimus.

Febres in variolis & morbillis. Sunt ergo duæ febres, quarum una synochos est, & altera tertiana continua: quæ eam habent naturam, & constitutionem, ut celerem habeant motum, & statim crisi finiuntur, ita ut synochos humorem expellat ad cutem, qui facit variolas, quæ sunt tumores a nostris appellati pigota: tertiana vero efficit morbillos, tumores latos & lenatos parum, qui a nostris pallola dicuntur. Humor autem in his febribus neque est permixtus cum sanguine mēstruo, neque est venenatus: sed aut est sanguis, aut bilis: quæ talem putredinem conceperunt, quæ cito vincitur, & expellitur: ita ut illos tumores efficiat. Inter hos tumores est discrimen: morbilli enim sunt tumores siccis, & qui non veniunt ad suppurationem: bene tamen variolæ, in quibus statim humor mutatur in pus: & sic vlcera multa efficit. Inde colliges, malum esse humorem, & recurrere ad interna, quia facit in ventriculo, intestinis, & aliis partibus multa vlcera quæ lethalissima sunt, quia ex ipsis


ipsis lyenteria, & alia symptomata eueniunt. Quem metum non habemus in morbillis. Harum febrium curatio, cum sint purres, ab obstructio-
 ne fiene erit inchoanda, ac proinde in principio sanguinem mittimus. Et cum natura statim vincens humorem in foco existentem efflo-
 rescentias faciat, aut verius tumores: proinde his apparentibus oportet cessare à missione sanguinis, & motum naturæ iuuare. Quod motus na-
 præstamus potus, alimentis, & medicamentis astringentibus, robora-
 rantes partes internas. Sic potus est secundum ius lentium quod astringit. Alimenta sunt pyra, malum granatum & similia. Nos solemus Alimēta.
 malum granatum totum contundere, succumque exprimere, cui permiscemus croci parum & syrupum de agresta, quod interdum propinamus sæpè. Medicamenta sunt syrupi astringentes, & alia similia. Medica-
 Unde videbis errare Amatum, & qui illum sequuntur in his exan-
 thematis videntes rebus sudorem mouentibus: hæc enim aperiunt meatus internos, & sic imminet periculum, ne humor ad interiora recurrat. Hoc autem timemus, non quia humor in transitu exulceret, ut
 omnes video sentire, humor enim benignus est, & à natura victus: sed ne fiant in solis partibus internis tumores, quos variolas appellamus. Atque hæc sufficiant. Sique laus, gloria, & honor Omnipotentis Deo semper.

F I N I S.



Medica disputatio.

An cannabis, & aqua, in qua mollitur, possint aerem inficere.



Vm febrium tam multarum, tamq; grauium, quæ proximo autumno Valentiam inuasert, causam eruditissimi medici scrutarentur, in eam opinionem quidam inciderunt, vt hæc omnia detrimenta, quæ non solum ad Valentiam, sed etiam oppida finitima rediissent, ad congeries aquarum, in quibus cannabis emolliretur, referrent. Qua sententia intellecta meam vt proferrem, iusserunt, grauissimi inquisitores nostri, quorum familiæ ego medicus præpositus sum. Quibus vt libentissime parerem, quid sentirem, volui declarare. Cannabem igitur, & aquam, in qua infunditur atque mollitur, aerem inficere atque corrumpere qui censent, ex ingrato odore demonstrare conantur, qui effectus a putredine cum sit, maximam vim affert ad aerem alterandum, quo alterato necesse est morbos procreari. Quod argumentum videtur Galenus in libello de theriaca ad Pi-

DE CVRAND. FEBRIB.

sonem Hippocratis exemplo confirmare his verbis. Quam ob rem inquit Hippocratem illum multis modis admirandum laudo, qui luem illam ex Aethiopia Græcos inuadentem non aliter curauerit, quam aeris mutatione, & alteratione, ne talis amplius inspiretur. Præterea Auicenna sententia prima, quarto libro, tractatu secundo, capite primo visus est, velle aerem infici posse ab aqua, in qua cannabis maceraretur his verbis: putredo accidit aut propter cibum malum, quum est præparatus, vt putrescat illud, quod generatur ab eo propter malitiam suæ substantiæ, aut propterea quod velociter recipit corruptionem, quanuis sit bonæ substantiæ, sicut lac: aut quia aquosus nutrimenti mali remouens sanguinem à substantia sua, sicut illud, quod generatur à fructibus humidis, valde tardis ad digerendum, aut quoniam ex illis est, qui non conuertuntur ad sanguinem bonum, imò remanet humor malus, frigidus, quem abhorret calor Innatus, & putrefacit illum, sicut ille, qui generatur à cucumere, & citrulo, pyris & similibus, aut propter malitiam artificij eius, aut horæ ipsius, aut ordinis eius, secundum quod scis: aut propter oppilationem prohibentem respirationem, & euacuationem propter complexionem corporis malam, cum non potest digestionem facere bonam: aut propter dispositiones extrinsecus ex aeribus malis, sicut est aer pestilentiae, & aer lacunarum & locorum infusorum, in quibus huiusmodi res madefiunt, vt linum, & spartum paulo post alias ferme putredinis causas scribit Auicenna, motum videlicet, & balneum à cibo, & solem in æstate, & alimenta calida in secunda mensa. Sed omnibus iis argumentis aduersatur experientia, cui magna fides habenda est autore Galeno libris prioribus de simplicium medicamentorum facultate: sunt enim vrbes, & oppida multa in Hispania saluberrima, in quibus magna cannabis copia feritur, & emollitur, Setabis videlicet, Tarraco, Alcagnicium, Requena, Vriolum, Vilanova infantium, & de Alcarras (sunt hæc oppidorum nomina) in quibus & plerisque alijs homines, & sanitate, & senectute fruuntur. Contra vero plurima oppida vidimus febribus vexata, in quibus nullus cannabis cultus est. Imò Valentia anno 1523. & 1530. maxima peste fuit correpta, quo tempore ne ferebatur quidem cannabis, nedum macerabatur: ab anno tamen 1530. ad hæc vsque tempora magna vis cannabis alitur, & molitur, nec pestilens constitutio genita est. Verum his experimentis multæ subiunguntur rationes, quarum prima est non solum non

alte


alterare aerem, sed putredinem noxiam expellere, & superare quæ posset in aqua gigni. Atque ut hoc intelligentius expediatur, quid de cannabe scripserint phyfici, & medici veteres, videndum erit. Dioscorides ergo lib. 3. cap. 141. du-
 plicem esse cānabem asseruit, vnam syluestrem, quæ inflam-
 mationes lenit, tumores discutit, tophos articularum, lapi-
 dosasque duricies dissipat, & funibus texendis est apta: alteram verò satiuam, cuius semen maiori copia sumptum
 genitale semen extinguit, eiusque succus auribus instilla-
 tus earum dolores curat. Plinius verò libro 19. cap. 9. dicit,
 eam ingratum habere odorem, quando seritur, & quando
 vellitur, cuius semen Italorum est cibus, & post lib. 10. cap.
 23. dicit cannabis in syluis nata est nigriore filo & asperio-
 re, semen eius extinguere genituram virorum dicitur suc-
 cus vermiculos aurium, & quodcunque intrauerit elicit, sed
 cum dolore capitis: tantaque vis ei est, ut aquæ infusus eam
 coagulare dicatur. Radix contractos articulos emollit in
 aqua coacta, itē podagras, & similes impetus. Galenus post
 Hippocratem medicorum facile princeps i. de alimētorum
 facultatibus cap. de semine cānabis, asserit quosdam ipsum
 contusum cum aliis tragematibus, id est bellariis secundæ
 mensæ potus gratia comedere: & lib. 7. de facultatibus sim-
 plicium medicamentorum eadem, quæ Dioscorides scribit,
 additque, flatus eo dissipari. Cuius ergo tanta vis ut est hæc
 omnia, quæ ab his autoribus scribuntur, efficiat, credi non
 facile potest, aerem infici ab eo posse, sed nec inficere posse
 credendum est, cum graniina omnia, & herbæ noxiæ ipsius
 vicinitate pereant. Quod si hæ vires cannabi tribuuntur,
 non tantum putrefaciet aquam, quantum, quæ sit putredi-
 nem excutiet. Vires autem hæ cannabis, quæ calidissima &
 siccissima est, ac planè ignea, & ab scriptoribus proditæ
 sunt, & eas experimur quotidie. Tam acri ergo facultate
 prædita cum sit, agricolæ, ut ea uti possint, in aquis mergūt,
 ut humiditate & frigiditate contrariis qualitatibus eius vis
 vinci possit, quæ in pugna tam remissæ sunt vires harum
 qualitarum, ut cum neutra superet alteram, putredo noxia
 gigni non possit: quæ tamen caliditate & humiditate supe-
 rante generatur. Ingratum verò odorem esse, & caput eo of-
 fendi ex Plinio scimus: non tamen valde putrem: nec enim
 id vllus autor affirmavit, nec ratione confirmari potest, sed
 cum tanta sit eius acrimonia, tamque ignea eius facultas,
 potest offendere nō solum odoratum, sed caput etiā ipsum:
 at hoc ad gignēdos morbos populares, quales isti volebant,

DE CVRAND. FEBRIB.

fitis esse non constitit, nec vlla ratione demonstrarunt. Ne-
 que locus **ex** Galeno indicat veram esse illorum sententiam,
 neque eo vti potuerunt, nisi ostensum fuisset, aerem canna-
 bis aquam posse infici, nam alioqui infecto aeri sola eius
 mutatione, & alteratione mederi possumus. De Auicenna
 autoritate ita iudico, vt contra nihil faciat, cum in ea nulla
 cannabis fiat mentio, & si vera esset, loca, in quibus spartum
 emollitur, essent insalubria quod experientia aduersatur,
 cum oppidum del Villar regni Valentini sit saluberrimum:
 infunditur tamen semper spartum. Præterea si in his omni-

In Auicē- bus esset credendum Auicennæ, alimenta mali succi, vt fru-
nan, ctus ab eo dicti, & etiam lac optimi succi, & alia multa vt
Tempera- exercitationes, balneum, calida alimenta à cibo essent om-
ta omniū nino prohibenda. Scio ego temperatam regionem esse om-
saluberr- nium saluberrimam, quam non possident Valentini, vt Le-
ma, desima eruditissimus credebat: scio & hanc paratam esse ad
Valentia morbos humidos, & pituitosos. quanuis fere omnes sint bi-
quibus liosi, & propterea multi apoplexia pereunt, plurimi morbo
morbis comitiali perimuntur: sed tamen hæc omnia non conuin-
obnoxia ciunt ad cannabis lacunas causam morborum esse reiicien-
dam. Sed his omnibus omissis non esse hæc curanda vellem,
sed dico regionem hanc non iis, sed aliis circumfusiis aquis
totam alterari, ideoque pars, quæ ad mare pertinet, est in-
salubrior, vt domus regia, & omnes domus, à via saguntina
vsque ad mare non salubri loco sunt, sunt enim humiliores,
nam loca montana salubria sunt magis. Si ingratus cense-
tur ab his odor cānabis, multo magis brutorū, & vermium,
quibus nostra Valentia sæpissime est plena: si ingratus est
odor cannabis, multo grauior est odor excrementorum cor-
poris humani, quorum vacuatione carere non possumus, at
multo magis iis abundant, quia cloacæ innumeræ sæuam
exhalant graueolentiam, & semper apertæ sunt. Si princi-
pes ciuitates, & domus saluberrimas amant, & vaporum
grauolentium expertes, eligant loca temperata, & alta, & à
mari, & aliis aquis stagnantibus multum distantia, in qui-
bus nulla arbor, nullaque herba acrem aliquando inficiant,
qualis sunt nux, ficus, sambucus, helleborus, eruca & brassi-
ca. Sed cum ex his intelligi possit, pestilentium morborum
aliò referendam fuisse causam, plures rationes non addam,
cum tamen adiungi possint & rationi, & experientiæ con-
sentaneæ.

INDEX



I N D E X

R E R V M , A C V E R B O R V M

quæ in contextu sunt, primus nu-
merus folium indicat: a, pri-
mam paginam: b, se-
cundam.

A

- A**cria nocent Diar-
rhææ. 100.a
Accipitris & mu-
rium vis. 41.a
Achorum descriptio causæ
& notæ. 17.b
Admonitio in sistendo fluxu
sanguinis a capite. 72.a
In partu difficili. 161.b
In quartana. 190.b
Adeps caprinus curat ven-
tris profluuium. 101.a
Aerem salubrem efficientia.
199.b
Aetius reprehenditur. 23.a
145.b
Albuginum oculorum de-
scriptio causæ & curatio.
59.b
Alexandri Tralliani medi-
camentum purgans pi-
tuitam lethargi. 29.b
Algalia quando necessaria.
135.b
Amati lusitani error. 97.b
Amor insanus quid. 43.b
Amoris insani præseruatio.
ibidem
Animæ curatio. 199.b
Anasarcæ curatio. 122.b
Ani, procidentia descriptio
& causæ. 150.b
Curatio. ibid.b
Anodyna in arthritide.
168.b
Anginæ descriptio & causæ.
68.b
Causæ notæ & curatio. 69.a
Ante balneum quæ seruan-
da. 196.b
Antiquæ cephalalgia cura-
tio. 23.a
Antidotum nobile ad pe-
stem. 203.a
An secunda sit vena in omni
febre putrida. 181.a
A pleuritide suppurata pau-
ci euadunt. 78.b
Apium & alia multa epile-
psiam detegunt. 36.a
A pituita fere semper epilep-
sia. ibidem
Apoplexiæ descriptio & cau-
sæ. 46.a
Notæ & curatio. ibid.b
Apoplexiæ topica auxilia.
47.b
Apoplexiæ vitæ & mortis
exploratio. 48.a
Apoplectici cur non sepe-
liendi nisi post tres dies.
ibidem

Apo

I N D E X.

- Apophlegmatismi, mastica-
 toria barbari vocant. 47.a
 Apoplexia proxima epile-
 psiæ. 38.a
 Appetentia immodica, &
 eius causæ. 94.a
 Appetentia cur necessaria.
 95.b
 Appetentia quomodo fiat &
 quid sit. ibid.
 Apparantia bilem cum pi-
 tuita & vacuantia. 186.b
 Aqua ligni guaiaci. 12.b
 Aqua smilacis asperæ. ibid.
 Aquæ faciem tersiorem &
 candidiorē, reddentes. 66.a
 Aqua efficacissima & ap-
 probata. 59.b
 Aqua Ceraforum præstan-
 tissimum remedium in e-
 pilepsia. 36.b
 Aqua præstantissima in Ta-
 be. 84.b
 Aquæ carnis laus eius præ-
 paratio. 194.b
 Aqua roris marini utilissi-
 ma resolutis. 50.a
 Aqua carnis hæcticis. 194.b
 Aquæ ex limacibus laus
 195.a
 Ardoris urinæ descriptio,
 causæ, & notæ. 137.b
 Ardoris urinæ curatio. 138.a
 Arabum opinio in Iscuria.
 134.b
 Arthritidis descriptio spe-
 cies & causæ externæ. 167.a
 Artrithide pauci laborabāt
 Hippocratis tēpore. ibid.
 Artrithide laborantes Eu-
 nuchos vidit Galenus, non
 autem pueros. ibidem
 Artrithicus visus puer 7.8.9
 annorum. ibidem
 Artrithus hereditarius mor-
 bus. 167.b
 Arthritidis curatio. 168.a
 Ascitis causæ & Anasarcæ.
 122.a
 Ascitis curatio. 123.b
 Aspectum corroborantiæ.
 58.b
 Acuentia. 59.a
 Asthma quid. 74.a
 Asthma vt epilepsia acces-
 siones habet. ibidem.b
 Asthmatis curatio extra ac-
 cessionem. ibidem
 Asthma morbus cronicus.
 ibidem
 Auertentia sanguinis impe-
 tum. 69.a
 Auertentia pituitam. 21.b
 Auertentia in accessione e-
 pilepsiæ. 34.b
 Auenzoar vixit 135. annos.
 160.b
 Augentia capillos. 7.b
 Auctor quibus auxiliis cu-
 rauerit febres compositas.
 193.a
- B
- Balnei commoditas. 196.a
 Balneum ex aqua frigida no-
 cet hæcticis. ibidem
 Benedictæ Nicolai compo-
 sitio. 5.b
 Bene & liberaliter nutrien-
 tia. 36.a
 Bilis purgatorium mixtum
 cum purgatorio pituitæ
 purgat pituitam. 30.a
 Bilis flaua coquenda est. 2.a
 Bilem flauā coquentia sim-
 plicia

INDEX.

plicia & composita. 2.b
Bilem atram concoquentia
simplicia & composita. 3.a
Bilem atram purgantia sim-
plicia & composita. 3.b
Bilis vacuatur in arthritide
sine concoctione. 168.b
Bilis turgentis purgatio.
181.b
Bilis non turgentis præpa-
ratio & euacuatio. ibid.
Bouis ortui propinqui caro
est boni succi. 39.b
Brafauoli error. 71.a
Britannica febris sudatoria.
203.a

C

Calculi vesicæ causæ & no-
tæ. 131.a.b
Calculi renum notæ ibid.
Calculi renum & vesicæ cu-
ratio. 132.a.b
Camphora calida. 87.a
Cantharides. 134.b
Cantharidum improbatio.
223.a
Cancris fluuiatiles. 194.a
Capitis doloris nomina &
causæ generales. 19.a
Capitis doloris singularis
causæ & notæ. 19.a.b
Capitis doloris curatio. 19.b
Capitis distillatio diarrhææ
facit. 100.a
Cardiacorum species. 199.b
Carbunculi curatio. 203.b
Cataplasma ad hydropem.
125.a
Cæparū efus largus lethar-
gum gignit. 29.b
Cauterium in fluxu sangui-
nis quando necessarium.
146.a

Cibi fastidium quid, causæ,
notæ, & curatio. 95.b
Cinis scorpionum. 133.a
Cinis leporis corticum ouo-
rum gallinarum & morta-
cillæ. ibid.b
Clyster nutriens. 40.a
Clyster ad somnum. 102.b
Clyster ex iure gallorum.
112.b
Clyster communis colici do-
loris. ibidem.a.b
Clyster potentissimus in mo-
la. 160.b
Clyster periculosus habentibus
herniam. 165.b
Clyster in quartana. 190.a
Cholerae descriptio causæ
notæ & curatio. 97.a.b
Colici doloris descriptio
causæ & notæ. 110.a.b
Colici doloris curandi re-
gulæ obseruandæ. 111.a.b
Colici forus & repellentia.
112.b
Colocynthis substantia
nocet intestinis. ibid.a
Comitialis morbi descri-
ptio, diuissio, causæ & notæ.
33.b
Comitialis morbus hæredi-
tarius non curatur, non
hæreditarius difficulter
maxime à 25. annis. 34.a
Composita lapidem frangen-
tia. 134.b
Composita pituitam conco-
quentia. 3.a. purgantia. 3.b
Concoctio quid indicat. 2.b
Concoctione non præcedēti
vacuatio nō facienda. ibid.
Cond

I N D E X.

- | | |
|--|---|
| <p>Conditum in hectica. 195.b</p> <p>Confectionis hamech compositio, & dosis. 5.a</p> <p>Confectio purgans ad Gallicum morbum. 12.a</p> <p>Confectio vtilissima mingentibus sanguinem. 140.a</p> <p>Confectio diabete optima. 141.b</p> <p>Confectio vtilissima conuulsioni. 49.b</p> <p>Confectio expuentibus sanguinem. 82.b</p> <p>Confectiones duæ in quartana. 191.a</p> <p>Confectio laudatissima ad pestem. 203.b</p> <p>Corizæ catharrhis rauca-do, tusses. 71.a</p> <p>Correctio rigoris & frigoris in tertiana. 186.b</p> <p>Corrigētia symptomata febrium putridarum. 182.b</p> <p>Corroborandus ventriculus in tertiana notha. 187.b</p> <p>Constantinus. 109.a</p> <p>Consuetudo Carpentanorum in fumendis syrupis. 3.a</p> <p>Cōsolida optima in hernia. 166.a</p> <p>Cōuulsionis descriptio, species & diuisio. 50.b. 51.a</p> <p>Conuulsionis causæ. ibid.</p> <p>Conuulsionis notæ & curatio. 52.a</p> <p>Conuulsionis purgatio sine concoctione. 52.a</p> <p>Cōuulsioni admirabile medicamentū topicum. 52.b</p> <p>Cucurbitula vomitum & deiectionem cohibet. 98.a</p> <p>Curatio achorum cum pi-</p> | <p>leis. 18.b</p> <p>Curatio mixta doloris colici & renum. 112.a</p> <p>Curatio Artrithidis calidæ. 168.a</p> <p>Curatio frigidæ Artrithidis. 168.b</p> <p style="text-align: center;">D</p> <p>Decidentia capillorum descriptio causæ & signa. 1.a</p> <p>Decidentia capillorum morbi Gallici symptoma est. 1.a</p> <p>Decidentia capillorum curatio. 1.a</p> <p>Decidentia capillorum à causa valida vnguentum. 7.a</p> <p>Decidentia capillorum à causa frigida vnguentū. ibid.</p> <p>Decoctum fumendum die purgationis melancholiæ. 40.a</p> <p>Defluxus humorum à capite. 71.a</p> <p>Dentium dolores, & de ipsis quoque denigratis & mobilibus & horum causis. 67.a</p> <p>Dentium dolorum notæ & curatio. ibid.</p> <p>Dentes maiori cum dolore medicamentis quam ferro euelluntur. 68.a</p> <p>Dentium omnem dolorem curant serpentum exuuiæ. ibidem</p> <p>Dentibus enascentibus pueris multi morbi fiunt. ibidem.b</p> <p>Deriuatio humorum in lethargo. 50.a</p> <p>Deriuatio in vertigine puit</p> |
|--|---|

INDEX.

- | | | |
|-------------------------------|-------|------------------------------|
| tuitosa. | 33.a | sumpto medicamēto put- |
| Deriuantia pituitam. | 22.a | gante. |
| Diabetis descriptio & cau- | | Dosis syruporum. |
| sæ. | 140.b | 3.a |
| Diabetis historia inaudita. | | Dysenteriae descriptio cau- |
| ibidem | | sæ & notæ. |
| Diabetis signa & curatio. | | 106.a |
| ibidem. | | Dysenteriae curatio. |
| Diaphœnicon compositio & | | ibid.b |
| dosis. | 5.a | Dysenteriae antiquæ curatio. |
| Diarrhææ descriptio & di- | | 107.b |
| uisio. | 99.b | Dyspnææ descriptio, causæ, |
| Diarrhææ notæ & curatio. | | notæ. |
| ibid.100.a | | 74.a |
| Diligentior epilepsiæ cura- | | |
| tio in gratiam valentino- | | E |
| rum. | 34.b | |
| Discrimen doloris colici à | | Electuariorum ferme om- |
| magnitudine & humore | | nium purgantium compo- |
| acri. | 110.b | sitio & quantitas simpliciū |
| Discutiētia reliquias in me- | | valenter purgantium & |
| lancholia & alterantia. | | dosis. |
| 40.b | | 6.a.b |
| Dissipātia humores qui an- | | Electuarium mirabile ad sol- |
| ginam pepererunt. | 69.b | uendam epilepsiam. |
| Dissipantia in morbo late- | | 37.a |
| rali. | 78.a | Electuarium in febre com- |
| Dissipantia in artrithide. | | posita. |
| 169.a | | 193.a |
| Discutiētia pituitam. | 22.a | Electuarium in hectica ex- |
| Dissoluentia grumos fan- | | testudine. |
| guinis. | 83.a | 195.b |
| Distillationis à causa frigi- | | Empyematis descriptio, cau- |
| da curatio. | 71.b | sæ, & notæ. |
| Distillationis à causa calida | | 83.a |
| curatio. | 72.a | Empyematis curatio. |
| Diuertentia in morbo co- | | ibid.b |
| mitiali. | 35.b | Epylepsiæ descriptio, causæ, |
| Doloris aurium causæ & no- | | & signa. |
| tæ. | 61.a | 33.b |
| Doloris aurium curatio. | | Epylepsiam mouentia. |
| ibidem.b | | 36.a |
| Dormiendūmne sit an non | | Epylepsiæ curatio. |
| | | 34.a |
| | | Epithema cardiacum. |
| | | 181.b |
| | | Error quorūdam in purgan- |
| | | tibus medicamentis. |
| | | 4.b |
| | | Error Fuchsi. |
| | | 206.b |
| | | Error quorundam in com- |
| | | ponēdo diaphœnicon. |
| | | 4.b |
| | | Error quorundam in com- |
| | | ponendis pilulis cochiis. |
| | | 6.b |
| | | Error Auicennæ. |
| | | 35.a.& |
| | | 193.b |
| | | Error indoctorum in pleuri- |
| | | tid |

INDEX.

tide. 78.b
 Error in explicatione icteri. 119.b
 Error in curandis hæmorrhoidibus. 147.b
 Error iuniorum super affectione rhabbari. 97.b
 Error quorundam in præparandis cantharidibus. 124.a
 Errores digni memoria. 179.b
 Error fœminarum in victu februm putridarum. 181.a
 Error Arabum in hectica. 193.b
 Error recentiorum in febre pestilenti. 200.a
 Errhina ad lethargum. 30.a
 Exempla duo vertiginis antiquæ. 33.a
 Excitantia & liberantia epilepticum in accessione. 35.b
 Extinguentia sitim in hectica. 196.a
 Exanthematum descriptio, diuissio, & causæ. 206.b
 Exanthematû origo. 206.b
 Exanthematum notæ multæ. ibidem
 Exanthematum curatio. 207.b

F

Facultas argenti viui an timenda sit. 13.a
 Facultas lapidis Smaragdi 102.a
 Fastidienti melancholico omnia genera ciborum offerenda. 40.a

Fastidium cibi quid, & famemes. 95.b
 Fastidij cibi seu inappetentiæ causæ, notæ, & curatio. 96.a
 Febris sanguinem sinochus putrida. 172.b
 Febris tertiana exquisita. 184.a.b
 Febris ardentis descriptio causæ & curatio. 180.b
 Febris ardentis & tertianæ discrimen. ibid.
 Febris compositæ difficilis descriptio, difficilior cognitio, & curatio. 192.b
 Februm compositarum diuissio. ibidem
 Februm compositarum notæ, causæ, curationes. 193.a
 Febris pestilens quid sit. 198.b
 Febris pestilentis causæ, & signa. 199.b
 Febris pestilentis victus ratio. 199.b
 Febris pestilentis curatio. ibidem.b
 Febris pestilentis putridæ curatio. 202.a
 Figura naturalis partus. 162.a
 Fluxus sanguinis quando sistendus. 146.a
 Fœlicitas nostri temporis. 195.b
 Fœminæ valétinæ damnantur in curandis infantibus. 35.a
 Fœtus mortui signa. 162.a
 Fœtum mortuum expellentia. ibid.
 Fœt

INDEX.

Fœtum mortuum suffitus expellens. 162.b
 Formulæ purgantium omnium humores. 4.a
 Formulæ omnium medicamentorum purgantium caput per loca propinqua. 47.b
 Forma præparandi cantharides. 124.a.134.b
 Frangentia lapidem à qualitate manifesta. 133.a
 Frangentia lapidem simplicia ferre omnia. 134.a
 Fuchsius notatur. 23.a

G

Græcorum medicamenta purgantia vehementia. 77.b
 Gallici morbi descriptio, causæ, & signa. 11.b
 Gallici morbi curationes multæ. ibidem
 Gallicum morbum iuvantia & nocentia. ibidem
 Galli morbi antiqui curatio. 13.a
 Grandiorum epilepticorum curatio. 35.b
 Grauedo ad nares. 71.a

H

Hæmorrhoidum descriptio, & differentia. 145.a
 Hæmorrhoidum causæ, notæ, & curatio. ibidem.b
 Hæmorrhoidum dolor quibus curatur. 148.a
 Hæmorrhoides quatuor de causis ægre curantur. ibid.
 Hæctica quid sit. 193.b

Hæctica notæ & curatio. 193.b
 Hepatis obstructio. 117.b
 curatio. 118.a
 Hepatis inflammationis natura, causæ, & notæ. 115.b
 Hepatis inflammationis in causa parte curatio. ibid.
 Hepatis inflammati in gibba curatio. 116.b
 Herba contra vermes. 143.b
 Herniæ differentia, causæ, & notæ. 164.a.b
 Herniæ flatuosæ curatio. 165.a
 Herniæ carnosæ curatio. ibid.
 Herniæ aquosæ & varicosæ curatio. ibidem
 Hernia facile curatur in infantibus. 166.a
 Hernia aliquando postulat operationem manuum. ibidem.b
 Hieræ logodionis compositio, & dos. 5.b
 Hieronymus Gabucinus. 143.b
 Hieræ simplicis laus. 123.a
 Historia scitu digna. 66.b
 Historia puellæ habentis lumbricos multos. 142.b
 Historia puellæ habentis lumbricum duodecim cubitorum. 94.b
 Historia Arnaldi de ictero. 121.a
 Historia in timpanite mira. 123.b
 Historia de profluuiio mensum. 252.a
 Historia mira in hæmorrhoidum curatione. 147.b
 Hist

INDEX.

- Historia admiranda in fœmina pariente flatû. 160.b
 Historia febris pestilentis. 199.b
 Historia doctissimi Dolefæ. 194.a
 Historiæ quorundam autorum quomodo, an vxores vterum gererent non cognouerunt. 160.b
 Hædus bonus cibus etiam melancholicis. 39.a
 Hollerius. 170.a
 Homines Alexandriæ vescuntur carnibus asininis atque etiâ camelinis. 91.a
 Horrorem & rigorem tolerantia. 186.b.191.a
 Horroris in quartana curatio. ibid.
 Hora balnei. 196.b
 Humores lethargum gignētes repellentia. 29.b
 Hydropis descriptio & species. 122.a
 Hydropis signa communia. ibidem.b
 Hydropis formarum distinctio. ibidem
 Hypochondriaca melancholia quomodo dignoscenda. 39.b quomodo iuranda. 41.a

I

- Iacobi Syluij error. 195.a
 Icteri descriptio & causæ. 119.b
 Icteri notæ & curatio. 120.a.b
 Ileus quid. 110. Curatio eiusdem. 113.b

- Imbecilli aspectus descriptio, causæ, & curatio. 58.a
 Incisio inter costas in tabe. 87.a
 Incisio quomodo facienda in hydropes, & eius duæ admirandæ historiæ. 125.a
 Incubonis descriptio, causæ, & notæ. 42.b
 Incubonis curatio. 43.a
 Incurabilis tremor. 55.a
 Infanientium præ amore descriptio, & notæ. 43.b
 Infantium præseruatio ab epilepsia. 34.a
 In pharmacopolas. 35.b
 Intemperies sicca quibus alteratur. 40.b
 Intestina lupi. 112.a
 Ischiadis doloris remedia validiora arthritidis. 169.b
 Ischuriæ descriptio, causæ, notæ, & curatio. 128.a

L

- Lac virgineum. 66.a
 Lactis chalybeati laus. 107.a
 Lactis facultas. 195.a
 Lactis genera. ibidem
 Lac humanum melius. ibid.
 Lacte sumpto non dormiendum. 84.b
 Lac an noceat hydropicis. 124.b
 Lac humanum fœtum mortuum expellit. 162.b
 Lac an noceat dysentericis sumptum per os. 107.a
 Lac dari quæ prohibet. 195.a
 Lactis coagulationem quæ impediunt. ibid.
 Lapidis lazuli vis. 3.b
 Lapid

INDEX.

- Lapidis armem & lazuli v-
sus reformidatur. 40.a
Lapidum renum, & vesicæ
causæ discrimen, & notæ.
131.a
Lapidis renum, & vesicæ cu-
ratio duplex. ibid.b
Lapidem frangentia quali-
tate manifesta. 133.a
Lapidem fragentis compo-
sita. 134.b
Lapis Iudaicus. 133.a
Lapis spongiæ. ibid.b
Lapis lyncis. ibid.
Lapis hominis & porci. ibid.
Lapides gallorum. 134.a
Lapis Aquilæ. 161.b
Lapis cyaneus. 200.a
Laus aquæ ex limacibus.
195.a
Laus cõfectionis Alkermes.
200.a
Lethargi descriptio, diuifio,
causæ, & notæ. 29.a. 30.b
Lethargi curatio. ibid.
Lethargicorum pulsus & v-
rina. ibid.
Letharhiorum præcipua
symptomata. 30.b
Leucophagum hecticis con-
fert. 194.a
Liquor sputum promouens.
78.a
Lienis obstructionis descri-
ptio, causæ, & curatio.
127.a.b
Loch ad sputum educendum.
78.a
Longa melancholicorum vi-
gilia. 40.a
Lucanicæ. 194.a
Lumbricorum differentia,
causæ, & notæ. 142.b. 143.a
Lumbricorum curatio du-
plex. ibidem
Lunæ radij noxij sunt.
199.b
Lyenteria. 104.a

M

- Medicamenta duo præstan-
tissima ad vindicandos in-
fantes ab epilepsia. 34.b
Medicamentum visum ma-
ximè confirmans. 60.b
Medicamentum visui vtile.
ibidem
Medicamētum visui senum
perutile. ibid.
Medicamētum interius pus
efficiens. 78.b
Medicamenta necantia ver-
mes. 143.b
Medicamentum conseruans
vterum in suo loco. 150.b
Medicamētum optimum ad
mensum fluorem. 152.a
Medicamenta menses mo-
uentia. 155.b
Medici audaces taxantur.
37.b
Melancholiæ descriptio, cau-
sæ, & diuifio. 38.b
Melancholicorum imagina-
tio incerta ratio redditur.
39.a
Melancholiæ curatio. 39.b
Melancholici possit dysenteri-
cis cum Galeno. 107.a
Mēsum immodicorum cau-
sæ. 151.a
Mēsum immodicorum no-
tæ & curatio. ibid.
Mensium suppressorum cau-
sæ, notæ, & curatio. 154.b

INDEX.

Micleta astringit satis. 101.b
 Moderate dissipantia in ar-
 trithide frigida. 168.b
 Modus conficiendi aquam
 carnis. 194.b
 Molæ vteri descriptio & cau-
 sæ. 160.a.b
 Molæ vteri signa historiæ &
 curatio. ibid.
 Morbi comitialis ex lacte
 coagulato in ventriculis
 infantium curatio. 35.a
 Morbillos origo. 207.a
 Curatio. 208.b
 Mouentia epilepsiam. 36.a
 Mundellæ error in purgan-
 dis peste laborantibus.
 203.a
 Muscus marinus. 144.a

N

Narcoticorum vsus. 26.a
 Narcotica quomodo secu-
 riora. 102.b
 Narcoticorum vsus in coli-
 co dolore. 113.a
 Narcotica quouetustiora se-
 curiora. 102.b
 Necantia vermes. 67.b
 Nicolai Florentini curatio
 rara. 37.a
 Nicandri laus. 88.a
 Notatur mulieres exhiben-
 tes pueris cerusam, argen-
 tū viuū & minium. 35.b
 Notæ singularum causarum
 distillationis & tussis. 71.
 a.b
 Notæ omnium causarum
 fluxus sanguinis, & par-
 tiunt a quibus fluit. 81.a
 Nutriens clyster quādo me-

lächolicis necessarius. 40.a

O

Obseruatio elegans in mis-
 cendis medicamentis. 5.a
 Obseruanda historia. 30.a
 Obseruatio in curanda ver-
 rigine pituitosa. 32.b
 Obstructionis hepatis cau-
 sæ, notæ, & curatio. 117.b
 Oculis noxia. 59.b
 Odora vehementer vterum
 ad se trahunt. 158.b
 Oleum ad secundinam ex-
 pellendam. 163.a
 Ophthalmiæ diuifio, descri-
 ptio, causæ, & notæ. 55.a
 Ophthalmiæ curatio. ibid.b
 Ophthalmiæ antiquæ cura-
 tio. 56.b
 Oribasij error. 115.b
 Ortophnæa quid. 74.a
 Ortophnææ notæ, & cura-
 tio. ibid.b
 Ossa mespilorum. 133.b
 Oñium corruptio cauterio
 eget. 13.b
 Oxyrodinum lethargo vtile.
 29.b

P

Palpitationis descriptio no-
 tæ & curatio. 86.b
 Palpitatio a veneno. 88.a
 Paraphrenitis quid. 25.a
 Curatio. 26.a
 Paralyfis descriptio. 48.a
 Paralyfis causæ, notæ, & cu-
 ratio. ibid.b
 Paralyfi vtilis confectio.
 49.b

Par

INDEX.

Paralyſi topica medicamen- ta.	49.b	Pituitam purgantia ſimpli- cia & compoſita.	3.b
Paralyſis curatæ pulchra hi- ſtoria.	ibid.	Pleuritidis deſcriptio, cau- ſæ, & notæ.	76.b
Partus laborioſus & ſecun- dæ retentæ.	161.b	Pleuritidis curatio.	77.a
Partum facillimum quæ ef- ficiant.	ibid.	Pleuriticis quæ vena ſecan- da.	ibid.b
Pectinatio aſſidua capillos auget.	7.b	Pleuriticis quæ purgantia exhiberi poſſunt.	ibid.
Peleiſiana non laudatur.	35.b	Plinius.	132.b
Pentaphylli radix.	166.a	Pomum confert in conſtitu- tione peſtis frigida.	201.a
Perdix aſſa & elixa aſtringit.	100.a.	Pomum in cauſa calida.	ibid.
Peripneumoniæ deſcriptio, cauſæ, & notæ.	76.b.77.a	Porrorum barbæ cum hor- deo viſ.	29.b
Peſſi in mola.	160.b	Potiones vacuantes concre- tum lac in ventriculis in- fantium.	35.a
Petri Iacobi Steue laus.	98.a	Potus lethargicorum.	29.b
Phrenitidis deſcriptio.	24.b	Potus menſes ducens.	155.b
curatio.	25.a	Potus aquæ frigidæ in ſyno- cho impedimenta.	173.b
Phriſij deſcriptio & cauſæ eiufdem notæ.	83.b	Potus in quartana.	190.a
Phriſis antiqua incurabilis.	85.b	Præſeruatio ab arthritide.	169.a
Phriſica furnaria vixit 28. annis.	ibid.	Præparatio aquæ ex anguil- la.	194.b
Picra vermes necat.	144.a	Præcautio peſtis.	199.b
Pilularum omnium ferme, quæ in uſu ſunt compoſi- tio & quantitas medica- mentorum valenter pur- gantium.	5.b.6.a	Procidencia ani quomodo curanda in puero.	150.a
Pilularum uſus damnatur in morbis biliſis.	133.b	Procidencia yteri	ibid.
Pilulæ ex helleboro.	14.a	Promouentia ſputum & ro- borantia pulmones.	75.b
Pilulæ nobiliſſimæ.	33.a	Pulmo vulpis & Ericij.	85.a
Pilulæ ad epilepſiam.	37.a	Puluis Ioannis de Vigo.	13.b
Pilulæ laudatæ in aſthmate.	75.a	Puluis ſaluberrimus ad me- lancholiam.	40.b
Pilulæ menſes euocantes.	156.a	Puluis ad dentes liueſcentes aut nigreſcentes.	68.a
Pituitam concoquentia ſim- plicia & compoſita.	3.a	Puluis ad fulciendos dentes mobiles.	ibid.
		Puluis Cimicis.	131.b
		Puluis anferis.	134.a
		E 2	Pul

I N D E X.

Puluis pullorum hirundi-
num. ibidem
Puluis optimus ad resoluē-
dos flatu in hidrope.
124.b
Puluis optimus in partu
difficili. 163.a
Punctura nerui conuulsio-
nem efficit. 53.b
Purgatio in hydrope per v-
rinam. 124.b
Purgatio in tertiana exqui-
sita quādo facienda, 184.b
Pyra partum impediunt.
161.b

Q

Quantitas clysteris in ven-
tris profluuiis cur pauca.
107.b
Quartanæ diuisio, causæ, &
notæ. 189.b
Quartanæ longa curatio.
190.a
Quæ dicuntur medicamen-
ta benedicta. 7.a
Quæ Aureos reddant ca-
pillis. 7.b
Quæ nigros capillos effi-
ciunt. ibid.
Quæ in vertigine fugienda,
32.a
Quæ vena secanda in me-
lancholia. 40.a
Quæ abscessum rumpunt
in peripneumonia, atque
etiam in pleuritide. 78.b
Quæ necessaria sint in hy-
drope curanda. 123.b
Quæ ano apposita hæmor-
rhoidas sanant. 147.b
Quæ hepati admouenda in

febre putrida, & quando.
182.b
Quibus partibus admouen-
dum vnguentum in cura
morbi Gallici. 13.b
Quibus fiat reuulsio in ac-
cessionibus vertiginis.
32.a
Quotidianæ febris descri-
ptio, causæ, & notæ. 188.b
Quotidianæ curatio. 187.a

R

Raporum vis oculis prodest.
58. b
Ratio cognoscendi quæ sint
benigna, & quæ valentia
medicamenta purgantia.
4.b.5.a
Raucedinis, tussis, corizæ,
catharri eadem ferè natu-
ra. 71.a
Raucedo ad asperam arte-
riam. ibid.
Raucedinis causæ. ibid.
Refrigerantia & corrobo-
rantia iecur. 174.a
Refrigerantia cor, iecur, &
totum corpus interius &
exterius in febribus. 182.a
Reliquias materiæ ex oculo
vacuantia & resoluentia.
56. a
Remedium optimum ad la-
uandum ventriculum &
intestina à purgatione. 2.a
Remittentia feruorem san-
guinis. 168.b
Repellentia humores angi-
næ. 69.b
Repellentia medicamenta
foris non sunt admouen-
da

INDEX.

da in pleuritide. 78.a
 Resoluentia humores epile-
 pticæ. 37.a
 Roborantia caput melan-
 cholicorum. 40.b
 Rubedo faciei, & eius cau-
 sæ, & reuulsio. 65.b
 Ruptio abscessus in angina.
 70.a

S

Salubria medicamenta quæ
 dicantur. 20.b
 Sanguinem fluentem auer-
 tentia. 63.a
 Sanguinis è naribus fluentis
 causæ & notæ. 62.b
 Sanguinis profluuij curatio.
 63.a
 Sanguinem sistentia à tota
 substantia. 64.a
 Sanguinē expuentibus opti-
 ma purgatio. ibid.
 Sanguinē quæ medicamen-
 ta purgantia sistunt. 82.a
 Sanguinem fluentem nar-
 cotica compescunt. ibid.b
 Sanguinem sistentibus mis-
 cenda pectoralia. ibid.
 Sanguinis mixtio. 139.b
 Sauanarola laudatur. 190.b
 Schirrus lienis quibus cu-
 ratur. 127.b
 Secundinē expellentia. 162.b
 Sectio venæ quando simul
 ex duabus venis. 202.b
 Sectio venæ an conueniet in
 febre putrida. 181.a
 Sedantia singultum. 93.b
 Signa causæ sine humore &
 cum humore cuiuscūque
 doloris capitis. 19.b
 Singultus descriptio, & cau-

sæ. 93.a
 Singultus notæ & curatio.
 ibid.b
 Sistentia fluxum humorum
 à capite. 72.a
 Sitim extinguentiæ. 196.a
 Somni profundi lethargico-
 rum curatio. 30.b
 Somnus arcendus sumpto
 veneno. 120.a
 Somnus quando cauendus
 in accessionibus febrium.
 184.b
 Spatium accessionis tertia-
 næ exquisitæ. ibid.b
 Species medicamentorum
 cardiacorum. 200.b
 Spiratio lethargicorū qua-
 lis. 29.a
 Sputi sanguinis causæ, & cu-
 ratio. 81.a.b
 Sputi sanguinis reuulsio.
 ibidem
 Sputo sanguinis vtilia. ibid.
 Stercus lupi à tota substantia
 colicum dolorem mirum
 in modum sanat. 112.a
 Scillæ vis ad morbum comi-
 talem. 37.b
 Suffusionis descriptio & cau-
 sæ. 60.a
 Suffusionis curatio. ibid.
 Suppurationis descriptio,
 causæ, & notæ. 83.a
 Suppurationis curatio. ibi-
 dem.b
 Suppurati loci cognitio.
 60.a
 Suppressionis vrinæ descri-
 ptio, causæ, notæ, & cura-
 tio. 128.a.b
 Syncope. 86.b. curatio e-
 iusdem. 88.a

I N D E X.

- Synochi, descriptio, diuisio,
causæ, notæ, & curatio.
172.b.173.a
Syrupus ex decocto ligni
guaiaci. 12.a
Syrup. vtilissimus in hepatis
obstructione. 193.a
Syrup. in quartana secundo
loco. 190.b
Syrup. ad febres compositas.
193.a

T

- Tabes. 83.a
Tapfus barbatus tenesmo
vtilis. 109.b
Tempus curandi morbum
Gallicum. 12.b
Tentatoria curatio in pleu-
ritide. 78.b
Tenesmi descriptio. 109.a
Tenesmus vterum gerenti-
bus molestus. ibid.
Tenesmi causæ, notæ, & cu-
ratio. ibid.b
Tenesmus quomodo abor-
sum faciat. ibid.
Tertianæ exquisitæ descri-
ptio, causæ, notæ, & cura-
tio. 184.a.b
Tertianæ notæ descriptio,
diuisio, causæ & notæ.
186.a.b
Tertianæ nothæ curatio.
ibidem
Theriaca magna an sanos
veneno afficiat. 35.a.b
Theriacæ commendatio.
201.b
Theriacæ & Mithridati vis.
191.a
Timoris vis. 191.b

- Topica ad lethargum. 30.a
Topica ad sputum excitan-
dum. 75.b
Tormentilla. 201.b
Tremor ex imbecillitate ner-
uorum. 54.b
Tremoris notæ, causæ, & cu-
ratio. 55.a
Tres formulæ purgantes bi-
lem flauam. 3.b
Tres formulæ purgantes pi-
tuitam. ibid.
Tussis causæ, & curatio. 71.b
72.a

- Tympanitæ causæ. 122.b
Tympanitæ notæ & diffe-
rentiæ. ibid.b
Tympanitæ curatio. 123.a

V

- Vaccarum stercus vtile co-
lico dolori. 112.b
Valentinæ mos ad tuen-
dos infantes ab epilepsia.
34.a
Valleriana. 166.a
Variæ melancholicorum i-
maginationes. 39.a
Vena quæ secanda in quar-
tanæ. 190.b
Venenum conuulsionem fa-
cit. 51.a
Venenum conuulsionem fa-
cit. 51.a
Venenum educentia. 53.b
Ventriculi imbecillitas, do-
lor, inflammatio. 90.b
Ventriculi gallinarum mer-
gi & struthiocamelli an
corrobovent nostrum ven-
triculum. 92.a
Verbasculum. 37.a
Vert

INDEX.

Vertiginis descriptio & causa.	32.a	obstructis admouendz.	187.b
Vertigo non differt ab scotomia.	ibid.	Vnguentum ad quartanam.	191.a
Vini generosi vsus.	95.a	Vngula mulæ.	152.b
Vini multi vsus.	53.b	Vomitus prouocādus in dolore colico.	113.a
Vinum Alkekengi valenter prouocat vrinam.	130.a	Vomitus excitatio in tertiana spuria.	187.a
Vini Alkekengi confectio.	ibidem	Vomitus utilis in tertiana.	ibidem
Vires theriacæ & mitridati.	190.b	Vomitus laus in quartana.	191.a
Vis cantharidum.	134.b	Vrinæ suppressio.	128.a
Visus imbecilli descriptio, causæ, & notæ, curatio.	58.a	Ardor.	137.b
Visum acuentia.	59.a	Vfus pilularum damnatur & medicamēta vehementer purgantia in morbis biliosis.	173.b
Visui quæ nocent exterius & interius.	58.b	Vteri procidentia descriptio, & causæ.	150.b
Vnguentum expertum ad morbum Gallicum.	13.a	Vteri procidentia notæ, & curatio.	ibid.
Vnguētum humectans melancholicos.	41.a	Vteri suffocationis varia descriptio, & nomina.	157.b
Vnguentum filij Zachariæ.	109.b	Vteri suffocationis causæ, notæ, & curatio.	158.a
Vnguentum optimum ad suppressam vrinam.	129.b	Vtero admouenda in profluuiio mensium.	152.b
Vnguentum optimum ad lapidem renum & vesicæ.	ibidem		
Vnguentum ad hemorrhoidas.	147.a.b		
Vnguentum ad partum difficilem.	163.a		
Vnguentum optimum biliosis & febribus venenosis.	174.a		
Vnguentum spleni & iecori			


X


Xyloaloe. 199.b


Z

Zaphyrus. 199.a. 201.a. 208.a
 Zebet. 188.b
 Zedoaria. 200.a


FINIS INDICIS.







29 80



29 80